EXÁMENES DE LADIS

CURSO 2016–2017




"Las matemáticas son la reina de las ciencias y la aritmética es la reina de las matemáticas."

— Carl Friedrich Gauss

EXÁMENES DE LADIS

1º ESO

CURSO 2016 – 2017



> *La matemática es el alfabeto con el que Dios ha escrito el Universo.*
>
> **— Galileo Galilei (1564 – 1642)**

Junta de Castilla y León
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EXAMEN MATEMÁTICAS
1º ESO GRUPO A 27/10/2016

Nº1.- Calcula las siguientes operaciones y anota el resultado:

a) 207+897 b) 512-276 c) $9 \cdot 98$ d) $657 : 73$ e) $25 \cdot 8+40 \cdot 5$

f) $\sqrt{49} + 3^2$ g) $\sqrt{16} + \sqrt{9}$ h) $4^2 + \sqrt{49} + 5$

Nº2.- Completa con los números correspondientes:

a) 8765 + ☐ = 19 806 b) ☐ - 3870 = 8702 c) 99 · ☐ =1881

d) 1001 : ☐ = 11 e) ☐ : 23 = 1794

Nº3.- Efectúa la división 135 : 11 y señala el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. ¿Qué operaciones tendrás que hacer para saber si has hecho bien la división? Escribe una igualdad con el dividendo, el divisor, el cociente y el resto de esta división.

Nº4.- Haz estas las operaciones:

a) $17 + 4 \cdot (108 - 65) : 4$

b) $375 + (79 - 36) \cdot (121 : 11) - 575$

c) $\sqrt{225} - (19 + 5) : 8$

d) $18^2 + (107 - 44) : (66 - 63)^2$

Nº5.- Una potencia del tipo a^b, donde b es mayor que 2, consiste en:

a) Un producto de la forma: (a · a · a · …· a.) b veces

b) Un producto de la forma: (b · b · b · … ·b.) a veces

c) El producto de a por b.

Nº6.- La raíz cuadrada de 16 es:

a) 8, porque 8 · 2 es 16.

b) 4, porque 4 · 4 es 16.

c) 32, porque 16 · 2 es 32.

Nº7.- Expresa como una sola potencia:

a) $2^4 \cdot 8^2$ b) $3^6 : 27^2$ c) $125 : 5^2$ d) $49^4 \cdot 7^2$

Nº8.- María ha decidido repartir su colección de cromos en sobres. Si tiene 437 cromos y 30 sobres, ¿cuántos cromos tendrá que poner en cada sobre? ¿ le sobra algún cromo?.

Nº9.- El mes pasado un frutero pagó a su proveedor 1900 € por 950 kg de tomates. Este mes el frutero ha pagado 1870 €. Si los tomates estaban al mismo precio, ¿cuántos kilogramos de tomates ha comprado este mes?

Nº10.- Quiero comprar unas zapatillas que cuestan 97 €. Le pido a mi madre 50 € y a mi padre otros 50 €. Compro las zapatillas y me devuelven 3 € de cambio. Le doy 1 € a mi madre y otro a mi padre y yo me quedo con el euro que sobra. Ahora le debo a madre 49 €, a mi padre otros 49 €. 49 + 49 + 1€ mío = 99 €. ¿Dónde está el euro que falta?

SUERTE JÓVENES

1.º ESO · CURSO 2016–2017

MATEMÁTICAS

Examen Completo Resuelto

Grupo A · 27 de octubre de 2016

Operaciones · Potencias · Raíces · Problemas

∑ √ π ∞ ²

> «Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. La matemática es el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo.»
>
> — Max Planck, Físico y Premio Nobel

THE ART OF MATHEMATICS · ACADEMIA PRESS

Índice de Ejercicios

▸ CONTENIDOS DEL EXAMEN ◂

1	Operaciones aritméticas básicas	3
2	Completar con números desconocidos	5
3	División: 135 ÷ 11 — Elementos y comprobación	6
4	Operaciones con jerarquía, potencias y raíces	8
5	Test: Definición de potencia a^b	10
6	Test: Raíz cuadrada de 16	11
7	Expresar como una sola potencia	12
8	Problema: Cromos en sobres	14
9	Problema: Kilos de tomates del frutero	15
10	Acertijo: ¿Dónde está el euro que falta?	16

📚 Instrucciones de uso del libro:

Cada ejercicio presenta primero el enunciado original del examen, seguido de una resolución detallada paso a paso. Se incluyen ilustraciones para facilitar la comprensión visual de cada concepto matemático. Los hipervínculos del índice llevan directamente a cada ejercicio.

1 ARITMÉTICA BÁSICA

Calcula las siguientes operaciones y anota el resultado

📋 ENUNCIADO

Calcula las siguientes operaciones y anota el resultado:

a) 207 + 897 **b)** 512 − 276 **c)** 9 · 98 **d)** 657 ÷ 73

e) 25 · 8 + 40 · 5 **f)** $\sqrt{49} + 3^2$ **g)** $\sqrt{16} + \sqrt{9}$ **h)** $4^2 + \sqrt{49} + 5$



Operaciones aritméticas

✏️ Resolución Completa Paso a Paso

Apartado a) 207 + 897

Sumamos las unidades: 7 + 7 = 14 → escribimos 4, llevamos 1.

Sumamos las decenas: 0 + 9 + 1 (llevada) = 10 → escribimos 0, llevamos 1.

Sumamos las centenas: 2 + 8 + 1 = 11 → escribimos 11.

207 + 897 = **1 104**

Apartado b) 512 − 276

Unidades: 2 − 6 no es posible → tomamos prestado: 12 − 6 = 6.

Decenas: 1 − 1 (prestado) − 7 no es posible → tomamos prestado: 11 − 1 − 7 = 3.

Centenas: 5 − 1 (prestado) − 2 = 2.

512 − 276 = **236**

Apartado c) 9 · 98

Podemos usar la propiedad distributiva: 9 · 98 = 9 · (100 − 2) = 9 · 100 − 9 · 2 = 900 − 18 = **882**

Verificación directa: 9 × 98 = 9 × 90 + 9 × 8 = 810 + 72 = 882 ✓

9 · 98 = **882**

Apartado d) 657 ÷ 73

Estimamos: 73 × 9 = 657. Comprobamos: 73 × 9 = 73 × 10 − 73 = 730 − 73 = 657. ✓

Por tanto el cociente es exacto: 657 ÷ 73 = **9**, resto = 0.

657 ÷ 73 = **9** (exacta, resto 0)

Apartado e) 25 · 8 + 40 · 5

Por la **jerarquía de operaciones**, las multiplicaciones se hacen antes que la suma:

$25 \cdot 8 = 200$

$40 \cdot 5 = 200$

$200 + 200 = \mathbf{400}$

$25 \cdot 8 + 40 \cdot 5 = \mathbf{400}$

Apartado f) $\sqrt{49} + 3^2$

Calculamos cada término por separado (primero potencias y raíces):

$\sqrt{49} = 7$ (porque $7 \times 7 = 49$)

$3^2 = 9$ (porque $3 \times 3 = 9$)

$7 + 9 = \mathbf{16}$

$\sqrt{49} + 3^2 = \mathbf{16}$

Apartado g) $\sqrt{16} + \sqrt{9}$

$\sqrt{16} = 4$ (porque $4 \times 4 = 16$)

$\sqrt{9} = 3$ (porque $3 \times 3 = 9$)

$4 + 3 = \mathbf{7}$

$\sqrt{16} + \sqrt{9} = \mathbf{7}$

Apartado h) $4^2 + \sqrt{49} + 5$

Primero calculamos la potencia y la raíz:

$4^2 = 16$ (porque $4 \times 4 = 16$)

$\sqrt{49} = 7$ (porque $7 \times 7 = 49$)

Ahora sumamos: $16 + 7 + 5 = \mathbf{28}$

$4^2 + \sqrt{49} + 5 = \mathbf{28}$

RESUMEN: a) 1104 · b) 236 · c) 882 · d) 9 · e) 400 · f) 16 · g) 7 · h) 28

2 ÁLGEBRA BÁSICA
Completa con los números correspondientes

📋 ENUNCIADO



Encontrar el número que falta

Completa con los números correspondientes:

a) 8 765 + ☐ = 19 806

b) ☐ − 3 870 = 8 702

c) 99 · ☐ = 1 881

d) 1 001 ÷ ☐ = 11

e) ☐ ÷ 23 = 1 794

✏️ Resolución Completa Paso a Paso

💡 Para encontrar el número desconocido utilizamos la **operación inversa**: si el número se suma, lo despejamos restando; si se multiplica, lo despejamos dividiendo, etc.

Apartado a) 8 765 + ☐ = 19 806

El número desconocido se suma a 8 765 para dar 19 806.

Operación inversa → restamos: ☐ = 19 806 − 8 765

19 806 − 8 765 = 11 041

Comprobación: 8 765 + 11 041 = 19 806 ✓

☐ = **11 041**

Apartado b) ☐ − 3 870 = 8 702

Al número desconocido se le resta 3 870 para dar 8 702.

Operación inversa → sumamos: ☐ = 8 702 + 3 870

8 702 + 3 870 = 12 572

Comprobación: 12 572 − 3 870 = 8 702 ✓

☐ = **12 572**

Apartado c) 99 · ☐ = 1 881

El número desconocido se multiplica por 99 para dar 1 881.

Operación inversa → dividimos: ☐ = 1 881 ÷ 99

1 881 ÷ 99 = 19 (porque 99 × 19 = 99 × 20 − 99 = 1980 − 99 = 1881)

Comprobación: 99 × 19 = 1 881 ✓

☐ = **19**

Apartado d) 1 001 ÷ ☐ = 11

1 001 se divide entre el número desconocido para dar 11.

Operación inversa → dividimos: ☐ = 1 001 ÷ 11

1 001 ÷ 11 = 91 (porque 11 × 91 = 11 × 90 + 11 = 990 + 11 = 1 001)

Comprobación: 1 001 ÷ 91 = 11 ✓

☐ = **91**

Apartado e) ☐ ÷ 23 = 1 794

El número desconocido se divide entre 23 para dar 1 794.

Operación inversa → multiplicamos: ☐ = 1 794 × 23

1 794 × 23 = 1 794 × 20 + 1 794 × 3 = 35 880 + 5 382 = 41 262

Comprobación: 41 262 ÷ 23 = 1 794 ✓


☐ = **41 262**

RESPUESTAS: a) 11 041 · b) 12 572 · c) 19 · d) 91 · e) 41 262

3 DIVISIÓN

División 135 ÷ 11: Elementos y comprobación

📋 ENUNCIADO



Elementos de la división

Efectúa la división 135 ÷ 11 y señala el **dividendo**, el **divisor**, el **cociente** y el **resto**.

¿Qué operaciones tendrás que hacer para saber si has hecho bien la división?

Escribe una igualdad con el dividendo, el divisor, el cociente y el resto de esta división.

✏️ Resolución Completa Paso a Paso

💡 Recuerda: la **división euclídea** garantiza que siempre existen un cociente y un resto únicos tales que: Dividendo = Divisor × Cociente + Resto, y el Resto es siempre menor que el Divisor.

Paso 1 — Realizar la división algoritmo largo

```
 1 3 5 | 1 1
 ———— |————
     | 1 2
```

Dividimos 135 entre 11:

- ¿Cuántas veces cabe 11 en 13? → 1 vez (1 × 11 = 11). Bajamos: 13 − 11 = 2. Bajo el 5: 25.
- ¿Cuántas veces cabe 11 en 25? → 2 veces (2 × 11 = 22). 25 − 22 = 3.
- El residuo final es 3, que es menor que 11 → fin de la división.

Cociente = **12**, Resto = **3**

Paso 2 — Identificar los elementos de la división

Elemento	Valor	Definición
Dividendo	**135**	El número que se divide
Divisor	**11**	El número entre el que se divide

Cociente	**12**	El resultado de la división
Resto	**3**	Lo que sobra (siempre < divisor)

Paso 3 — ¿Cómo comprobar si la división está bien hecha?

Para comprobar una división se utilizan dos operaciones:

1. **Multiplicación:** Divisor × Cociente = 11 × 12 = 132
2. **Suma del resto:** 132 + 3 = 135

Si el resultado coincide con el Dividendo (135), la división es correcta. ✓

Igualdad de comprobación: Dividendo = Divisor × Cociente + Resto

135 = 11 × 12 + 3 → 135 = 132 + 3 → 135 = 135 √

4

JERARQUÍA · POTENCIAS · RAÍCES

Operaciones con jerarquía, paréntesis, potencias y raíces

📋 ENUNCIADO



Orden de las operaciones

Haz estas operaciones:

a) $17 + 4 \cdot (108 - 65) \div 4$

b) $375 + (79 - 36) \cdot (121 \div 11) - 575$

c) $\sqrt{225} - (19 + 5) \div 8$

d) $18^2 + (107 - 44) \div (66 - 63)^2$

✏️ Resolución Completa Paso a Paso

💡 **Regla de jerarquía:** (1) Paréntesis; (2) Potencias y raíces; (3) Multiplicación y división (de izquierda a derecha); (4) Suma y resta (de izquierda a derecha).

Apartado a) $17 + 4 \cdot (108 - 65) \div 4$

Paso 1 — Paréntesis: $(108 - 65) = 43$

Queda: $17 + 4 \cdot 43 \div 4$

Paso 2 — Mult. y div. de izq. a der.:

$4 \cdot 43 = 172$

$172 \div 4 = 43$

Queda: $17 + 43$

Paso 3 — Suma: $17 + 43 =$ **60**

Resultado: **60**

Apartado b) $375 + (79 - 36) \cdot (121 \div 11) - 575$

Paso 1 — Paréntesis:

$(79 - 36) = 43$

$(121 \div 11) = 11$

Queda: $375 + 43 \cdot 11 - 575$

Paso 2 — Multiplicación: $43 \cdot 11 = 473$

Queda: $375 + 473 - 575$

Paso 3 — Suma y resta de izq. a der.:

$375 + 473 = 848$

848 − 575 = **273**

Resultado: **273**

Apartado c) √225 − (19 + 5) ÷ 8

Paso 1 — Paréntesis: (19 + 5) = 24

Paso 2 — Raíz: √225 = 15 (porque 15 × 15 = 225)

Queda: 15 − 24 ÷ 8

Paso 3 — División: 24 ÷ 8 = 3

Queda: 15 − 3

Paso 4 — Resta: 15 − 3 = **12**

Resultado: **12**

Apartado d) $18^2 + (107 - 44) \div (66 - 63)^2$

Paso 1 — Paréntesis:

(107 − 44) = 63

(66 − 63) = 3

Queda: $18^2 + 63 \div 3^2$

Paso 2 — Potencias: $18^2 = 324$; $3^2 = 9$

Queda: 324 + 63 ÷ 9

Paso 3 — División: 63 ÷ 9 = 7

Queda: 324 + 7

Paso 4 — Suma: 324 + 7 = **331**

Resultado: **331**

RESUMEN: a) 60 · b) 273 · c) 12 · d) 331

5

TEST DE OPCIÓN MÚLTIPLE

Definición de potencia a^b (con b > 2)



Concepto de potencia

📋 ENUNCIADO

Una potencia del tipo a^b, donde b es mayor que 2, consiste en:

a) Un producto de la forma: (a · a · a · … · a) → b veces

b) Un producto de la forma: (b · b · b · … · b) → a veces

c) El producto de a por b.

✏️ Resolución Completa Paso a Paso

Análisis de cada opción

Analizamos cada alternativa utilizando la definición formal de potencia:

✅ **Opción a) CORRECTA:** $a^b = a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (b veces)

Esta es la definición exacta de potencia: la base (a) se multiplica por sí misma tantas veces como indica el exponente (b).

Ejemplo: $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ ✓

❌ ~~**Opción b) INCORRECTA:** No es b · b · … · b (a veces)~~

~~Eso sería b^a, no a^b. Se confunden la base y el exponente.~~

~~Ejemplo: si fuera 2^4 → esto daría 4 · 4 = 16 por casualidad, pero $3^4 \neq 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ ($3^4 = 81$) ✗~~

❌ ~~**Opción c) INCORRECTA:** No es el producto a · b~~

~~a × b sería simplemente una multiplicación ordinaria, no una potencia.~~

~~Ejemplo: $2^4 = 16$, pero 2 × 4 = 8 ✗~~

DEFINICIÓN: $a^b = a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (el factor "a" aparece b veces)

💡 Ejemplos para entender la diferencia:

- $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$ (la base 3 se multiplica 4 veces)

• $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ (la base 4 se multiplica 3 veces)

Observa que $3^4 \neq 4^3$, lo cual demuestra que la base y el exponente no son intercambiables.

RESPUESTA CORRECTA: Opción a)

6 TEST DE OPCIÓN MÚLTIPLE

La raíz cuadrada de 16


📋 ENUNCIADO

La raíz cuadrada de 16 es:

a) 8, porque 8 · 2 es 16.

b) 4, porque 4 · 4 es 16.

c) 32, porque 16 · 2 es 32.



Raíz cuadrada — concepto geométrico

✏️ Resolución Completa Paso a Paso

Concepto de raíz cuadrada

La **raíz cuadrada de un número n** (escrita como √n) es el número positivo que, multiplicado por sí mismo, da como resultado n.

Es decir: $\sqrt{n} = x \iff x \cdot x = x^2 = n$

Para √16, buscamos x tal que x · x = 16.

❌ ~~**Opción a) INCORRECTA: 8**~~

~~Razonamiento del enunciado: "8 · 2 = 16". Esto es incorrecto porque la definición de raíz cuadrada exige multiplicar el número por sí mismo, no por 2.~~

~~Comprobación: 8 · 8 = 64 ≠ 16 → 8 **no** es la raíz cuadrada de 16.~~

✅ **Opción b) CORRECTA: 4**

Razonamiento: 4 · 4 = 16, es decir, $4^2 = 16$.

Por tanto √16 = 4 ✓

Interpretación geométrica: un cuadrado con lado 4 tiene área = 4 × 4 = 16 unidades cuadradas.

❌ ~~**Opción c) INCORRECTA: 32**~~

~~Razonamiento del enunciado: "16 · 2 = 32". Esto simplemente dobla 16, no tiene nada que ver con raíces cuadradas.~~

~~Comprobación: 32 · 32 = 1 024 ≠ 16 → 32 no es la raíz cuadrada de 16.~~

$\sqrt{16} = 4$ porque $4 \cdot 4 = 4^2 = 16$ ✓

💡 Raíces cuadradas exactas que debes conocer: $\sqrt{1}=1 \cdot \sqrt{4}=2 \cdot \sqrt{9}=3 \cdot \sqrt{16}=4 \cdot \sqrt{25}=5 \cdot \sqrt{36}=6 \cdot \sqrt{49}=7 \cdot \sqrt{64}=8 \cdot \sqrt{81}=9 \cdot \sqrt{100}=10$

RESPUESTA CORRECTA: Opción b) $\sqrt{16} = 4$

7

POTENCIAS · PROPIEDADES

Expresar como una sola potencia

📋 ENUNCIADO


Expresa como una sola potencia:

a) $2^4 \cdot 8^2$

b) $3^6 \div 27^2$

c) $125 \div 5^2$

d) $49^4 \cdot 7^2$



Propiedades de las potencias

✏️ Resolución Completa Paso a Paso

PROPIEDADES USADAS: $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ | $a^n \div a^m = a^{n-m}$ | $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$

Apartado a) $2^4 \cdot 8^2$

Primero expresamos todo en base 2:

$8 = 2^3 \rightarrow 8^2 = (2^3)^2 = 2^{(3 \cdot 2)} = 2^6$

Ahora aplicamos la propiedad del producto de potencias de igual base:

$2^4 \cdot 2^6 = 2^{(4+6)} = 2^{10}$

Comprobación: $2^4 = 16$; $8^2 = 64$; $16 \times 64 = 1024$; $2^{10} = 1024$ ✓

$2^4 \cdot 8^2 = \mathbf{2^{10}}$

Apartado b) $3^6 \div 27^2$

Expresamos 27 en base 3:

$27 = 3^3 \rightarrow 27^2 = (3^3)^2 = 3^{(3 \cdot 2)} = 3^6$

Ahora aplicamos la propiedad del cociente de potencias de igual base:

$3^6 \div 3^6 = 3^{(6-6)} = 3^0 = 1$

Nota: cualquier número elevado a 0 es igual a 1 (excepto 0^0).

Comprobación: $3^6 = 729$; $27^2 = 729$; $729 \div 729 = 1 = 3^0$ ✓

$3^6 \div 27^2 = \mathbf{3^0 = 1}$

Apartado c) $125 \div 5^2$

Expresamos 125 como potencia de 5:

$125 = 5^3$ (porque $5 \times 5 \times 5 = 125$)

Ahora aplicamos la propiedad del cociente:

$5^3 \div 5^2 = 5^{(3-2)} = 5^1 = 5$

Comprobación: $125 \div 25 = 5$ ✓

$125 \div 5^2 = \mathbf{5^1 = 5}$

Apartado d) $49^4 \cdot 7^2$

Expresamos 49 como potencia de 7:

$49 = 7^2 \rightarrow 49^4 = (7^2)^4 = 7^{(2\cdot4)} = 7^8$

Ahora aplicamos la propiedad del producto:

$7^8 \cdot 7^2 = 7^{(8+2)} = 7^{10}$

Comprobación: $49^4 = (7^2)^4 = 7^8$; $7^8 \cdot 7^2 = 7^{10}$ ✓

$49^4 \cdot 7^2 = \mathbf{7^{10}}$

RESUMEN: a) 2^{10} · b) $3^0 = 1$ · c) $5^1 = 5$ · d) 7^{10}

8

PROBLEMA · VIDA REAL

Colección de cromos: cromos por sobre y sobras

📋 ENUNCIADO

María ha decidido repartir su colección de cromos en sobres. Si tiene **437 cromos** y **30 sobres**, ¿cuántos cromos tendrá que poner en cada sobre? ¿Le sobra algún cromo?



Repartir cromos en sobres

✏️ Resolución Completa Paso a Paso

Paso 1 — Identificar los datos del problema

- Total de cromos: 437
- Número de sobres: 30
- Incógnita 1: ¿Cuántos cromos van en cada sobre? (= cociente)
- Incógnita 2: ¿Sobra algún cromo? (= resto)

Paso 2 — Plantear la operación

Para repartir en partes iguales se usa la **división**:

437 ÷ 30 = ?

Paso 3 — Realizar la división

Buscamos cuántas veces cabe 30 en 437:

30 × 10 = 300

30 × 14 = 420 (30×10 + 30×4 = 300 + 120 = 420)

30 × 15 = 450 → demasiado grande

Por tanto el cociente es 14.

Calculamos el resto: 437 − (30 × 14) = 437 − 420 = 17

437 ÷ 30 → Cociente = **14**, Resto = **17**

Paso 4 — Comprobación

Divisor × Cociente + Resto = Dividendo

30 × 14 + 17 = 420 + 17 = 437 ✓

$437 = 30 \times 14 + 17 \rightarrow 420 + 17 = 437$ ✓

María pone 14 cromos en cada sobre y le sobran 17 cromos.

9


PROBLEMA · PROPORCIONALIDAD DIRECTA

El frutero y los kilogramos de tomates

📋 ENUNCIADO

El mes pasado un frutero pagó a su proveedor **1 900 €** por **950 kg** de tomates.

Este mes el frutero ha pagado **1 870 €**. Si los tomates estaban al mismo precio, ¿cuántos kilogramos de tomates ha comprado este mes?



Proporcionalidad directa en la compra

✏️ Resolución Completa Paso a Paso

Paso 1 — Identificar los datos

Mes pasado: 950 kg → 1 900 €

Este mes: ? kg → 1 870 €

Precio por kg: constante (mismo precio ambos meses)

Paso 2 — Calcular el precio por kilogramo

Precio por kg = Total euros ÷ Total kilos

Precio por kg = 1 900 € ÷ 950 kg = 2 €/kg

Comprobación: 2 × 950 = 1 900 ✓

Paso 3 — Calcular los kilos comprados este mes

Kilos = Total euros ÷ Precio por kg

Kilos = 1 870 € ÷ 2 €/kg = 935 kg

Comprobación: 2 × 935 = 1 870 ✓

Paso 4 — Método alternativo: Regla de tres directa

Si 1 900 € corresponden a 950 kg,

entonces 1 870 € corresponden a x kg.

Montamos la proporción:

1 900 / 950 = 1 870 / x

x = (950 × 1 870) / 1 900

x = 1 776 500 / 1 900

x = 935 kg ✓

Ambos métodos dan el mismo resultado.

Precio/kg = 1900 ÷ 950 = 2 €/kg | Kilos = 1870 ÷ 2 = 935 kg

Este mes el frutero ha comprado 935 kg de tomates.

10 ¿Dónde está el euro que falta?

RAZONAMIENTO LÓGICO · ACERTIJO

📋 ENUNCIADO



El acertijo de los euros y las zapatillas

Quiero comprar unas zapatillas que cuestan **97 €**. Le pido a mi madre **50 €** y a mi padre otros **50 €**. Compro las zapatillas y me devuelven **3 €** de cambio. Le doy **1 €** a mi madre y **1 €** a mi padre, y yo me quedo con el **1 €** que sobra.

Ahora le debo a madre 49 €, a mi padre otros 49 €:

49 + 49 + 1 € mío = 99 €. ¿Dónde está el euro que falta?

✏️ Resolución Completa — Análisis del Acertijo

💡 Este es un famoso acertijo matemático. El "euro que falta" no existe: el error está en la forma incorrecta de plantear la cuenta. Analizamos paso a paso qué sucede realmente.

Paso 1 — Seguir el dinero con precisión

Movimiento	Cantidad
Recibo de mamá	+50 €
Recibo de papá	+50 €
Pago zapatillas	−97 €
Cambio recibido	+3 €
Devuelvo a mamá	−1 €
Devuelvo a papá	−1 €
Me quedo yo	−1 €
SALDO FINAL	**0 € ✓**

50 + 50 − 97 + 3 − 1 − 1 − 1 = 0 € ✓ Todo cuadra perfectamente.

Paso 2 — ¿Dónde está el error en el enunciado?

El error está en **mezclar deudas con dinero gastado** en la misma suma.

La suma correcta debe ser:

- Lo que gasté realmente en zapatillas: 97 €
- Lo que tengo yo: 1 €
- Total: 97 + 1 = **98 €**

¿De dónde salieron esos 98 €?

- Deuda con mamá: 49 €
- Deuda con papá: 49 €
- Total deudas: 49 + 49 = **98 €** ✓

Paso 3 — ¿Por qué la suma 49 + 49 + 1 NO tiene sentido?

Los **49 + 49 = 98 €** representan lo que debo (dinero que ya gasté: 97 € en zapatillas + 1 € que me quedé).
Sumarle el **1 €** que ya está incluido en esa deuda es una doble contabilización.

Es como si alguien dijera: "Tengo 98 € de deuda, y además 1 euro en mi bolsillo, luego hay 99 € en juego". El 1 € del bolsillo ya está reflejado en la deuda: parte de los 98 € prestados se usaron para quedarme ese 1 €.

La operación correcta es:
Deuda total = Precio zapatillas + Euro guardado = 97 + 1 = 98 €
Financiado con: 49 (mamá) + 49 (papá) = 98 € ✓

¡No falta ningún euro! El euro "perdido" es una ilusión creada por una suma sin sentido matemático.

Lo correcto: Deuda(98€) = Precio zapatillas(97€) + Mi euro(1€) √
Lo incorrecto del enunciado: Sumar la deuda(98€) + mi euro(1€) = 99€ → ERROR (doble contabilización)

No falta ningún euro. El acertijo confunde "lo que debo" con "lo que gasté". La cuenta real es: 49 + 49 = 98 € de deuda = 97 € (zapatillas) + 1 € (guardado). Todo cuadra.

🎓

¡Fin del Examen!

«Las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo.»

— Galileo Galilei

Junta de Castilla y León

EXAMEN MATEMÁTICAS
1º ESO GRUPO A /11/2016

Nº1.- A) Un número es divisible por 3 cuando:

a) Su última cifra es 3. b) Su última cifra es 3, 6 o 9. c) La suma de sus cifras es múltiplo de 3.

B) Observa los números y responde cuáles son divisibles por 4, 6 o 10 y explica por qué.

50.550 , 12.348

Nº2.- Indica los números divisibles por 2, 3 y 11 y explica por qué

Número	2	3	11
1.232			
12.390			
22.222.202			

Nº3.- Se quiere hacer un campeonato de Trivial por equipos. En nuestra clase somos más de 20 y menos de 30 alumnos, y si hacemos equipos de dos, tres o cuatro personas nos sobra una. ¿Cuántos alumnos hay en la clase?

Nº4.-Comprueba, mediante divisiones, cuáles de estos números son primos.

21, 37, 63, 83, 91, 121

Explica en cada caso qué divisiones haces.

Nº5.- Haz la descomposición en factores primos de estos números.

72= 84 = 1 001 =

Nº6.- Calcula todos los divisores de los números 24 y 98.

Nº7.- Decide si son verdaderas o falsas estas afirmaciones:

a) El M.C.D. de dos números es el menor de sus divisores comunes.
b) El m.c.m. de dos números es el mayor de sus múltiplos comunes.
c) El M.C.D. de dos números es el mayor de sus divisores comunes.

Nº8.-¿Cuál es el máximo común divisor de 66 y 120?

Nº9.- ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de los números 12, 18 y 21?


Nº10.- Tres hermanos van a ver a su abuela. El mayor acude cada 5 días, el segundo cada 6 días y el menor cada 10 días. ¿Cada cuántos días coincidirán los tres hermanos en casa de su abuela?

SUERTE JÓVENES

Examen de Matemáticas

1º ESO — Resolución Completa Ilustrada

Edición estilo libro didáctico profesional



"La matemática revela sus secretos sólo a quien se acerca a ella con amor puro, por su propia belleza."

— Arquímedes (atribuida)

Documento generado y resuelto rigurosamente en LaTeX

31 de marzo de 2026

Índice general

Guía de lectura III

1. Ejercicio 1: Criterios de divisibilidad por 3, 4, 6 y 10 **1**

1.1. Enunciado original 1

1.2. Resolución completa 2

1.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 1 2

2. Ejercicio 2: Divisibilidad por 2, 3 y 11 **3**

2.1. Enunciado original 3

2.2. Resolución completa 4

2.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 2 5

3. Ejercicio 3: Problema de congruencias en equipos **6**

3.1. Enunciado original 6

3.2. Resolución completa 7

3.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 3 7

4. Ejercicio 4: Comprobación de números primos **8**

4.1. Enunciado original 8

4.2. Resolución completa 9

4.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 4 9

5. Ejercicio 5: Descomposición en factores primos **10**

5.1. Enunciado original 10

5.2. Resolución completa 10

5.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 5 11

6. Ejercicio 6: Cálculo de divisores de 24 y 98 **12**

6.1. Enunciado original 12

6.2. Resolución completa 12

6.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 6 13

7. Ejercicio 7: Verdadero o falso sobre MCD y mcm **14**

7.1. Enunciado original 14

7.2. Resolución completa 14

7.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 7 15

8. Ejercicio 8: Máximo común divisor de 66 y 120 **16**

8.1. Enunciado original 16

8.2. Resolución completa 16

8.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 8 17

9. Ejercicio 9: Mínimo común múltiplo de 12, 18 y 21 **18**

9.1. Enunciado original 18

9.2. Resolución completa 18

9.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 9 19

10. Ejercicio 10: Coincidencia periódica de visitas **20**

10.1. Enunciado original 20

10.2. Resolución completa 20

10.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 10 21

Conclusión **22**

Guía de lectura

Este libro contiene los **enunciados completos** del examen y la **resolución detallada paso a paso** de cada ejercicio, sin omitir justificaciones.

Para verificar rápidamente la estructura del documento:

- Cada ejercicio aparece como un capítulo independiente en el índice con su hipervínculo.
- Dentro de cada capítulo se incluyen dos secciones: *Enunciado original* y *Resolución completa*.
- Los subíndices corresponden exactamente a esas secciones para todos los ejercicios.

1

Ejercicio 1: Criterios de divisibilidad por 3, 4, 6 y 10

1.1 Enunciado original

Enunciado 1

A) Un número es divisible por 3 cuando:

- a) Su última cifra es 3.
- b) Su última cifra es 3, 6 o 9.
- c) La suma de sus cifras es múltiplo de 3.

B) Observa los números y responde cuáles son divisibles por 4, 6 o 10 y explica por qué:

$$50\,550 \quad \text{y} \quad 12\,348.$$

1.2 Resolución completa

Resolución completa

Parte A. El criterio correcto es la opción **c)**: *la suma de sus cifras es múltiplo de 3.*
Justificación: Si un número decimal se escribe como

$$N = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \cdots + a_1 10 + a_0,$$

entonces, como $10 \equiv 1 \pmod 3$, también $10^k \equiv 1 \pmod 3$ para todo k. Por tanto,

$$N \equiv a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0 \pmod 3.$$

Así, N es divisible por 3 si y solo si la suma de sus cifras lo es.
Parte B. Estudiamos cada número para 4, 6 y 10:
Número 50 550:

- Divisible por 10: sí, porque termina en 0.
- Divisible por 4: no, porque las dos últimas cifras son 50 y $50 \div 4$ no es entero.
- Divisible por 6: para ser divisible por 6 debe ser divisible por 2 y por 3. Termina en 0, luego sí es divisible por 2. Suma de cifras: $5+0+5+5+0 = 15$, que sí es múltiplo de 3. Entonces **sí** es divisible por 6.


Número 12 348:

- Divisible por 10: no, porque no termina en 0.
- Divisible por 4: sí, porque las dos últimas cifras son 48 y $48 \div 4 = 12$.
- Divisible por 6: termina en 8 (par, luego divisible por 2) y suma de cifras $1+2+3+4+8 = 18$ (múltiplo de 3). Por tanto **sí** es divisible por 6.

Conclusión final:

Número	4	6	10
50 550	No	Sí	Sí
12 348	Sí	Sí	No

1.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 1



2

Ejercicio 2: Divisibilidad por 2, 3 y 11

2.1 Enunciado original

Enunciado 2

Indica los números divisibles por 2, 3 y 11, y explica por qué:

$$1\,232, \qquad 12\,390, \qquad 22\,222\,202.$$

2.2 Resolución completa

Resolución completa

Aplicamos criterios:

- Por 2: última cifra par.
- Por 3: suma de cifras múltiplo de 3.
- Por 11: diferencia entre suma de cifras en posiciones alternas es múltiplo de 11 (incluido 0).

1) 1 232:

- Por 2: termina en $2 \Rightarrow$ sí.
- Por 3: $1+2+3+2=8$, no múltiplo de $3 \Rightarrow$ no.
- Por 11: $(1+3)-(2+2)=4-4=0$, múltiplo de $11 \Rightarrow$ sí.

2) 12 390:

- Por 2: termina en $0 \Rightarrow$ sí.
- Por 3: $1+2+3+9+0=15$, múltiplo de $3 \Rightarrow$ sí.
- Por 11: $(1+3+0)-(2+9)=4-11=-7$, no múltiplo de $11 \Rightarrow$ no.

3) 22 222 202:

- Por 2: termina en $2 \Rightarrow$ sí.
- Por 3: suma de cifras $2+2+2+2+2+2+0+2=14$, no múltiplo de $3 \Rightarrow$ no.
- Por 11: posiciones alternas


$$(2+2+2+0)-(2+2+2+2)=6-8=-2,$$

no múltiplo de $11 \Rightarrow$ no.

Tabla final:

Número	2	3	11
1 232	Sí	No	Sí
12 390	Sí	Sí	No
22 222 202	Sí	No	No

2.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 2



3

Ejercicio 3: Problema de congruencias en equipos

3.1 Enunciado original

Enunciado 3

Se quiere hacer un campeonato de Trivial por equipos. En clase hay más de 20 y menos de 30 alumnos, y si hacen equipos de 2, de 3 o de 4 personas, sobra 1 alumno. ¿Cuántos alumnos hay en la clase?

3.2 Resolución completa

Resolución completa

Sea n el número de alumnos, con

$$20 < n < 30.$$

La condición "sobra 1" al formar equipos de 2, 3 o 4 significa:

$$n \equiv 1 \pmod 2, \qquad n \equiv 1 \pmod 3, \qquad n \equiv 1 \pmod 4.$$

Equivale a que $n - 1$ sea múltiplo de 2, 3 y 4, es decir, de su mcm:

$$\text{mcm}(2, 3, 4) = 12.$$

Por tanto,

$$n - 1 = 12k \quad \Rightarrow \quad n = 12k + 1.$$

Buscamos valores entre 21 y 29:

$$12 \cdot 1 + 1 = 13 \text{ (no vale)}, \qquad 12 \cdot 2 + 1 = 25 \text{ (sí vale)}, \qquad 12 \cdot 3 + 1 = 37 \text{ (no vale)}.$$

Única solución en el intervalo dado:


$$\boxed{n = 25.}$$

Comprobación:

$$25 = 2 \cdot 12 + 1, \quad 25 = 3 \cdot 8 + 1, \quad 25 = 4 \cdot 6 + 1.$$

En los tres casos sobra 1 alumno.

3.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 3



4

Ejercicio 4: Comprobación de números primos

4.1 Enunciado original

Enunciado 4

Comprueba, mediante divisiones, cuáles de estos números son primos:

$$21,\ 37,\ 63,\ 83,\ 91,\ 121.$$

Explica en cada caso qué divisiones haces.

4.2 Resolución completa

Resolución completa

Para decidir si un número n es primo, basta comprobar divisibilidad por primos $\leq \sqrt{n}$.
1) 21: $\sqrt{21} \approx 4{,}58$; probamos 2 y 3. No divisible por 2; sí por 3, pues $2+1=3$.

$$21 = 3 \cdot 7 \Rightarrow \text{no primo.}$$

2) 37: $\sqrt{37} \approx 6{,}08$; probamos 2, 3 y 5. No por 2 (impar), no por 3 ($3+7=10$), no por 5 (no termina en 0 o 5).

$$\Rightarrow \text{primo.}$$

3) 63: $\sqrt{63} \approx 7{,}94$; probamos 2, 3, 5 y 7. Sí por 3 ($6+3=9$).

$$63 = 3 \cdot 21 = 7 \cdot 9 \Rightarrow \text{no primo.}$$

4) 83: $\sqrt{83} \approx 9{,}11$; probamos 2, 3, 5 y 7. No por 2, no por 3 ($8+3=11$), no por 5, no por 7 (porque $7 \cdot 11 = 77$ y $7 \cdot 12 = 84$).

$$\Rightarrow \text{primo.}$$

5) 91: $\sqrt{91} \approx 9{,}54$; probamos 2, 3, 5 y 7. No por 2, no por 3 ($9+1=10$), no por 5, sí por 7:

$$91 = 7 \cdot 13 \Rightarrow \text{no primo.}$$


6) 121: $\sqrt{121} = 11$; probamos 2, 3, 5, 7 y 11. No por 2, 3, 5, 7; sí por 11:

$$121 = 11 \cdot 11 \Rightarrow \text{no primo.}$$

Conclusión:

Primos: 37, 83. No primos: 21, 63, 91, 121.

4.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 4



5

Ejercicio 5: Descomposición en factores primos

5.1 Enunciado original

Enunciado 5

Haz la descomposición en factores primos de:

$$72, \qquad 84, \qquad 1001.$$

5.2 Resolución completa

Resolución completa

1) 72:

$$72 = 2 \cdot 36 = 2 \cdot 2 \cdot 18 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 9 = 2^3 \cdot 3^2.$$

2) 84:

$$84 = 2 \cdot 42 = 2 \cdot 2 \cdot 21 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7.$$

3) 1001: Observamos que $1001 = 7 \cdot 143$ y además

$$143 = 11 \cdot 13.$$


Por tanto:

$$1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13.$$

Resultado final:

$$\boxed{72 = 2^3 \cdot 3^2, \qquad 84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7, \qquad 1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13.}$$

5.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 5



6

Ejercicio 6: Cálculo de divisores de 24 y 98

6.1 Enunciado original

Enunciado 6

Calcula todos los divisores de los números 24 y 98.

6.2 Resolución completa

Resolución completa

Para 24:

$$24 = 2^3 \cdot 3^1.$$

Todo divisor tiene forma $2^a 3^b$ con $a \in \{0,1,2,3\}$ y $b \in \{0,1\}$. Listamos:

$$\begin{aligned} b = 0: &\ \ 1, 2, 4, 8, \\ b = 1: &\ \ 3, 6, 12, 24. \end{aligned}$$

Divisores de 24:

$$\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}.$$

Para 98:

$$98 = 2 \cdot 49 = 2 \cdot 7^2.$$


Todo divisor tiene forma $2^a 7^b$ con $a \in \{0,1\}$ y $b \in \{0,1,2\}$. Listamos:

$$\begin{aligned} a = 0: &\ \ 1, 7, 49, \\ a = 1: &\ \ 2, 14, 98. \end{aligned}$$

Divisores de 98:

$$\{1, 2, 7, 14, 49, 98\}.$$

6.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 6



7

Ejercicio 7: Verdadero o falso sobre MCD y mcm

7.1 Enunciado original

Enunciado 7

Decide si son verdaderas o falsas estas afirmaciones:

- a) El M.C.D. de dos números es el menor de sus divisores comunes.
- b) El m.c.m. de dos números es el mayor de sus múltiplos comunes.
- c) El M.C.D. de dos números es el mayor de sus divisores comunes.


7.2 Resolución completa

Resolución completa

a) "El MCD es el menor divisor común." **Falsa**.
Razón: el menor divisor común positivo de cualesquiera dos enteros es 1 (siempre divide a ambos). El MCD es el *mayor* divisor común.
b) "El mcm es el mayor múltiplo común." **Falsa**.
Razón: los múltiplos comunes son infinitos. No existe uno "mayor". El mcm es el *menor múltiplo común positivo*.
c) "El MCD es el mayor divisor común." **Verdadera**.
Esa frase coincide exactamente con la definición de MCD.
Resumen final:

$$a)\ F, \qquad b)\ F, \qquad c)\ V.$$

7.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 7



8

Ejercicio 8: Máximo común divisor de 66 y 120

8.1 Enunciado original

Enunciado 8

¿Cuál es el máximo común divisor de 66 y 120?

8.2 Resolución completa

Resolución completa

Usamos descomposición prima:

$$66 = 2 \cdot 3 \cdot 11, \qquad 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5.$$

Los factores comunes son 2 y 3 con exponente mínimo 1 en ambos casos:

$$\gcd(66, 120) = 2^1 \cdot 3^1 = 6.$$


Comprobación adicional:

$$66 \div 6 = 11 \in \mathbb{Z}, \qquad 120 \div 6 = 20 \in \mathbb{Z}.$$

Y no puede ser mayor porque 11 no divide a 120 y 5 no divide a 66.

$$\boxed{\gcd(66, 120) = 6.}$$

8.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 8



9

Ejercicio 9: Mínimo común múltiplo de 12, 18 y 21

9.1 Enunciado original

Enunciado 9

¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 12, 18 y 21?

9.2 Resolución completa

Resolución completa

Descomponemos:

$$12 = 2^2 \cdot 3, \qquad 18 = 2 \cdot 3^2, \qquad 21 = 3 \cdot 7.$$

Para el mcm tomamos cada primo con su **mayor exponente**:

$$2^2, \quad 3^2, \quad 7^1.$$

Entonces

$$\operatorname{mcm}(12, 18, 21) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 = 4 \cdot 9 \cdot 7 = 252.$$


Verificación:

$$252 \div 12 = 21, \qquad 252 \div 18 = 14, \qquad 252 \div 21 = 12,$$

los tres cocientes son enteros.

$$\boxed{\operatorname{mcm}(12, 18, 21) = 252.}$$

9.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 9



10

Ejercicio 10: Coincidencia periódica de visitas

10.1 Enunciado original

Enunciado 10

Tres hermanos van a ver a su abuela. El mayor acude cada 5 días, el segundo cada 6 días y el menor cada 10 días. ¿Cada cuántos días coincidirán los tres hermanos en casa de su abuela?

10.2 Resolución completa

Resolución completa

La coincidencia ocurre cada mcm de los periodos 5, 6 y 10.

$$5 = 5, \qquad 6 = 2 \cdot 3, \qquad 10 = 2 \cdot 5.$$

Tomamos primos con máximo exponente:

$$2^1,\ 3^1,\ 5^1.$$

Entonces:

$$\text{mcm}(5, 6, 10) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30.$$

Por tanto, coinciden cada


$$\boxed{30 \text{ días.}}$$

Comprobación por secuencias:

$$\begin{aligned} \text{Mayor: } & 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, \ldots \\ \text{Segundo: } & 6, 12, 18, 24, 30, 36, \ldots \\ \text{Menor: } & 10, 20, 30, 40, \ldots \end{aligned}$$

El primer término común positivo es 30.

10.2.1. Ilustración didáctica del ejercicio 10



Conclusión

Se han transcrito y resuelto los 10 ejercicios del examen original con desarrollo matemático completo, incorporando ilustraciones didácticas para reforzar la comprensión de cada tema.

Junta de Castilla y León

EXAMEN MATEMÁTICAS TEMA 3
16-01-2017 1º ESO GRUPO A

Nº1.- a) Escribe los datos numéricos con el signo adecuado.

1) La profundidad del Mar Muerto es 790 m por debajo del nivel del mar.

2) La temperatura de ebullición del agua es 100 °C sobre cero.

3) La temperatura de fusión del alcohol es 90 °C bajo cero.

4) La altura del Everest es de 8.848 metros sobre el nivel del mar.

b) Representa en la recta los números enteros: A = -2, B = 4, C = -3, D = 5

Nº2.- Calcula el valor absoluto de los siguientes números enteros.

a) |-13| c) |+31|

b) |-101| d) |0|

Nº3.- Escribe el símbolo < o >, según corresponda.

a) -5 ☐ -102 b) -23 ☐ 0 c) 3 ☐ -58 d) -73 ☐ 0

Nº4.- Realiza las siguientes operaciones:

a) (+3) + (+6)
b) (+2) + (-4)
c) (-23) + (-15)
d) (+12) + (-5) + (+30)
e) (-5) + (-4) + (-6)
f) (+4) + (-2) + (+4)

Nº5.- Efectúa los siguientes cálculos

a) (+3) - (+5)
b) (+2) - (-7)
c) (-13) - (+23)
d) (+15) - (-5)

Nº6.- Efectúa los siguientes cálculos

a) (-2) - (-4) + (-5) - (-1) - (+2)
b) (+2) - (-3) - (-5) + (+2) + (-3)
c) (+10) - (-25) + (-3) + (-30) - (-2)

Nº7.- Haz estas operaciones.

a) (-2 + 4) - (-4 - 3 + 5) + (4 - 5)
b) (-2 + 11) - (10 + 5) - (-12 + 21 - 2)

Nº8.- Calcula los siguientes productos.

a) (-3) · (-2)
b) (+3) · (+4) · (-2)
c) (-4) · (+2) · (-11)
d) (-2) · (-2) · (-2) · (-2)

Nº9.- Haz estas divisiones de números enteros.


a) (-3) : (+3)
b) (+12) : (-4)
c) (-24) : (-8)
d) (+21) : (+7)

Nº10.- El punto más alto de la Tierra es el Everest, que tiene una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar, y el punto más bajo es la Fosa de las Marianas, que tiene una profundidad de 11.510 m. Calcula la diferencia de nivel entre estos dos puntos de la Tierra.

SUERTE JÓVENES

EXAMEN DE MATEMÁTICAS

TEMA 3 · Números Enteros



1º ESO · GRUPO A

Fecha: 16 de enero de 2017

IES Tovar · Castilla y León

"Las matemáticas son la llave y la puerta a las ciencias."

— Leonardo de Pisa "Fibonacci" (c. 1170 – c. 1250)

α β γ π Σ ∞ √ ■ |x| ∈

NOMBRE: _____ **CALIFICACIÓN:** _____

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Examen de Matemáticas · Tema 3 · Números Enteros · 1º ESO

Portada 2

Índice de Contenidos 3

Ejercicio Nº1 — Signos y Recta Numérica 4

Ejercicio Nº2 — Valor Absoluto 5

Ejercicio Nº3 — Comparación de Enteros 6

Ejercicio Nº4 — Suma de Enteros 7

Ejercicio Nº5 — Resta de Enteros 8

Ejercicio Nº6 — Operaciones Combinadas 9

Ejercicio Nº7 — Paréntesis y Orden 10

Ejercicio Nº8 — Multiplicación de Enteros 11

Ejercicio Nº9 — División de Enteros 12

Ejercicio Nº10 — Problema: Everest y Marianas 13

Haz clic en cualquier ejercicio para ir directamente a él

Nº1. — Signos Numéricos y Recta Numérica

a) Escribe los datos numéricos con el signo adecuado, indicando si el valor es positivo (+) o negativo (–):

1) La profundidad del Mar Muerto es 790 m **por debajo** del nivel del mar. → **–790 m**

2) La temperatura de ebullición del agua es 100 °C **sobre cero**. → **+100 °C**

3) La temperatura de fusión del alcohol es 90 °C **bajo cero**. → **–90 °C**

4) La altura del Everest es de 8.848 metros **sobre el nivel del mar**. → **+8.848 m**

b) Representa en la recta numérica los siguientes números enteros: **A = –2**, **B = 4**, **C = –3**, **D = 5**




Figura 1. Recta numérica con los puntos A, B, C, D y tabla de datos con signo.

Nota didáctica: *Los números negativos se sitúan a la **izquierda** del cero y los positivos a la **derecha**. Cuanto más a la izquierda, menor es el número.*

Nº2. — Valor Absoluto de Números Enteros

Calcula el **valor absoluto** de los siguientes números enteros. Recuerda: el valor absoluto |n| representa la **distancia** de n al origen (cero) en la recta numérica, y siempre es positivo o nulo.

a) **|–13|** = **13**

b) **|–101|** = **101**

c) **|+31|** = **31**

d) **|0|** = **0**




Figura 2. El valor absoluto como distancia al origen en la recta numérica.

Definición formal: *|n| = n si n ≥ 0; |n| = –n si n < 0. Por tanto: |–13| = 13, |–101| = 101, |+31| = 31, |0| = 0.*

Nº3. — Comparación de Números Enteros (< y >)

Escribe el símbolo **<** (menor que) o **>** (mayor que) según corresponda entre cada par de números enteros. **Regla:** en la recta numérica, el número situado más a la **izquierda** es siempre el **menor**.

a) **–5** ■ **–102**

→ **–5 > –102** (porque –5 está a la derecha de –102)

b) **–23** ■ **0**

→ **–23 < 0** (todo número negativo es menor que cero)

c) **3** ■ **–58**

→ **3 > –58** (todo número positivo es mayor que cualquier negativo)

d) **–73** ■ **0**

→ **–73 < 0** (todo número negativo es menor que cero)




Figura 3. Comparación de enteros: el situado más a la derecha es mayor.

Nº4. — Suma de Números Enteros

Realiza las siguientes operaciones de **suma de números enteros**. Aplica las reglas: suma de igual signo → conserva el signo y suma los valores; suma de distinto signo → resta los valores y toma el signo del mayor.

a) (+3) + (+6) = **+9** (3 + 6 = 9 (mismo signo +))

b) (+2) + (–4) = **–2** (4 – 2 = 2 (domina el –))

c) (–23) + (–15) = **–38** (23 + 15 = 38 (mismo signo –))

d) (+12) + (–5) + (+30) = **+37** (12 – 5 + 30 = 37)

e) (–5) + (–4) + (–6) = **–15** (5 + 4 + 6 = 15 (todos –))

f) (+4) + (–2) + (+4) = **+6** (4 – 2 + 4 = 6)




Figura 4. Modelo de barras apiladas para visualizar la suma de enteros.

Nº5. — Resta de Números Enteros

Efectúa los siguientes cálculos de **resta de números enteros**. Regla fundamental: **restar un número equivale a sumar su opuesto**: a – (b) = a + (–b) y a – (–b) = a + b.

a) (+3) – (+5) = +3 – 5 = **–2**

(restar positivo = sumar negativo)

b) (+2) – (–7) = +2 + 7 = **+9**

(restar negativo = sumar positivo)

c) (–13) – (+23) = –13 – 23 = **–36**

(dos negativos se suman)

d) (+15) – (–5) = +15 + 5 = **+20**

(restar negativo = sumar positivo)




Figura 5. Regla de signos en la resta: a – (±b) = a ± b.

Nº6. — Operaciones Combinadas de Suma y Resta

Efectúa los siguientes cálculos que combinan sumas y restas de números enteros. Procede paso a paso: primero elimina los dobles signos, luego opera de izquierda a derecha.

a) (–2) – (–4) + (–5) – (–1) – (+2)

= –2 + 4 – 5 + 1 – 2

–2 + 4 = +2

+2 – 5 = –3

–3 + 1 = –2

–2 – 2 = –4 ✓

Resultado: –4

b) (+2) – (–3) – (–5) + (+2) + (–3)

= +2 + 3 + 5 + 2 – 3

2 + 3 = 5

5 + 5 = 10

10 + 2 = 12

12 – 3 = 9 ✓

Resultado: +9

c) (+10) – (–25) + (–3) + (–30) – (–2)

= +10 + 25 – 3 – 30 + 2

10 + 25 = 35

35 – 3 = 32

32 – 30 = 2

2 + 2 = 4 ✓

Resultado: +4




Figura 6. Operaciones combinadas representadas en la recta numérica.

Nº7. — Operaciones con Paréntesis

Haz estas operaciones respetando el **orden jerárquico**: primero se resuelven los **paréntesis** (de dentro hacia fuera), después se eliminan los dobles signos, y finalmente se opera de izquierda a derecha.

a) (–2 + 4) – (–4 – 3 + 5) + (4 – 5)

Resolver cada paréntesis: (–2 + 4) = +2 ; (–4 – 3 + 5) = –2 ; (4 – 5) = –1

Sustituir: +2 – (–2) + (–1)

Quitar paréntesis: +2 + 2 – 1

Resultado: **= 3**

b) (–2 + 11) – (10 + 5) – (–12 + 21 – 2)

Resolver cada paréntesis: (–2 + 11) = +9 ; (10 + 5) = +15 ; (–12 + 21 – 2) = +7

Sustituir: +9 – (+15) – (+7)

Quitar paréntesis: +9 – 15 – 7

Resultado: **= –13**




Figura 7. Resolución paso a paso de operaciones con paréntesis.

Nº8. — Multiplicación de Números Enteros

Calcula los siguientes productos de números enteros. **Regla de signos:** (–)·(–) = (+) ; (+)·(+) = (+) ; (–)·(+) = (–) ; (+)·(–) = (–). Para varios factores: si el número de factores negativos es **par**, el resultado es **positivo**; si es **impar**, el resultado es **negativo**.

a) (–3) · (–2)

Signos: (–)·(–) = (+)

3 × 2 = 6 → signo positivo → **+6**

b) (+3) · (+4) · (–2)

Signos: (+)·(+)·(–) = (–)

3 × 4 × 2 = 24 → 1 factor neg → signo negativo → **–24**

c) (–4) · (+2) · (–11)

Signos: (–)·(+)·(–) = (+)

4 × 2 × 11 = 88 → 2 factores neg → signo positivo → **+88**

d) (–2) · (–2) · (–2) · (–2)

Signos: 4 factores (–) = (+)

2^4 = 16 → número par de negativos → positivo → **+16**




Figura 8. Regla de signos en el producto y ejemplos desarrollados.

Nº9. — División de Números Enteros

Haz estas divisiones de números enteros. La **regla de signos** en la división es idéntica a la de la multiplicación: (–):(–) = (+) ; (+):(+) = (+) ; (–):(+) = (–) ; (+):(–) = (–).

a) (–3) : (+3)

Signos: (–):(+) = (–)

3 ÷ 3 = 1 → signo negativo → **–1**

b) (+12) : (–4)

Signos: (+):(–) = (–)

12 ÷ 4 = 3 → signo negativo → **–3**

c) (–24) : (–8)

Signos: (–):(–) = (+)

24 ÷ 8 = 3 → signo positivo → **+3**

d) (+21) : (+7)

Signos: (+):(+) = (+)

21 ÷ 7 = 3 → signo positivo → **+3**




Figura 9. División de enteros: regla de signos y cocientes.

Nº10. — Problema: Everest y Fosa de las Marianas

Enunciado: El punto más alto de la Tierra es el **Everest**, con una altitud de **+8.848 metros** sobre el nivel del mar. El punto más bajo es la **Fosa de las Marianas**, con una profundidad de –**11.510 metros** (11.510 m bajo el mar). Calcula la **diferencia de nivel** entre estos dos puntos extremos de la Tierra.

Resolución paso a paso:

Paso 1 — Identificar los datos:

Altitud Everest = +8.848 m (sobre el nivel del mar)

Profundidad Fosa = –11.510 m (bajo el nivel del mar)

Paso 2 — Plantear la diferencia:

Diferencia = Altitud Everest – Profundidad Fosa

Diferencia = +8.848 – (–11.510)

Paso 3 — Aplicar regla de signos:

–(–11.510) = +11.510

Diferencia = +8.848 + 11.510

Paso 4 — Sumar:

8.848 + 11.510 = **20.358**

Resultado final:

La diferencia de nivel es de 20.358 metros.




Figura 10. Perfil de altitudes: Everest (+8.848 m) y Fosa de las Marianas (–11.510 m). La diferencia de nivel es de 20.358 m.

Comprobación: *8.848 + 11.510 = 20.358 m ✓ La diferencia de nivel entre el punto más alto y más bajo de la Tierra es de **20.358 metros**, casi 20,4 km de desnivel total.*

EXAMEN DE MATEMÁTICAS
1ºA ESO 9/02/2017

Nº1.- Ordena las siguientes fracciones de menor a mayor:

$$\frac{6}{5}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{2}{5},$$

Nº2.- Indica de qué número racional es cada una de las siguientes fracciones (decimal exacto, periódico puro, periódico mixto). Exprésalos en forma decimal:

$$a)\ \frac{3}{7} \qquad b)\ \frac{2}{5} \qquad c)\ \frac{7}{12}$$

Nº3.- Expresa en forma de fracción los siguientes números decimales:

$$a)\ 3'4 \qquad b)\ 3'\hat{4} \qquad c)\ 3'0\hat{4}$$

Nº4.- Resuelve las siguientes cuestiones, indicando las operaciones efectuadas:

a) Escribe dos fracciones equivalentes a $\frac{8}{7}$.

b) Simplifica hasta dar con la fracción irreducible de $\frac{84}{36}$.

c) Comenta de forma razonada si son equivalentes:

i. $\frac{2}{5}$ y $\frac{8}{20}$

ii. $\frac{4}{5}$ y $\frac{3}{6}$

Nº5.- Calcula y simplifica al máximo:

$$a)\ \frac{3}{4}:\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right) \qquad b)\ \left(\frac{3}{5}-\frac{1}{2}\right):\frac{3}{10} \qquad c)\ \left(\frac{3}{2}+2\right)\cdot\left(2-\frac{12}{7}\right) \qquad d)\ \left(\frac{1}{2}+\frac{5}{8}\right)\cdot\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{9}\right)$$

Nº6.- Opera y simplifica al máximo:

$$a)\ \frac{3}{11}+\frac{4}{11}-\frac{7}{11} \qquad b)\ \frac{7}{12}-\frac{3}{8}+\frac{19}{24} \qquad c)\ \frac{4}{5}:\frac{9}{10} \qquad d)\ \frac{6}{4}\cdot\frac{2}{3}$$

Nº7.- Mi cuaderno tenía originalmente 80 páginas, pero he usado $\frac{2}{5}$ y he arrancado $\frac{1}{8}$ ¿Cuántas páginas quedan disponibles? ¿Cuál es la fracción?

Nº8.- María ha gastado $\frac{5}{12}$ del dinero que llevaba. Vuelve a casa con 28 €


a) ¿Cuánto ha gastado?

b) ¿Cuánto dinero tenía al salir de casa?

Nº9.- De una clase de 30 alumnos la quinta parte entregó ayer un trabajo y hoy lo han entregado las dos terceras partes. ¿Qué fracción de la clase representan los estudiantes que ya han presentado el trabajo?¿Cuántos alumnos quedan por entregarlo?

Nº10.- ¿Cuántas botellas de $\frac{3}{4}$ de litro se pueden llenar con una garrafa de 30 litros?

SUERTE JÓVENES



MATEMÁTICAS

1.º ESO — Curso 2016-2017

Fracciones y Números Racionales

"Leer todos los libros de ciencias es como conversar con los más preclaros ingenios de los siglos pasados."

— René Descartes (1596–1650)

Departamento de Matemáticas · IES
Fecha del examen: 9 de febrero de 2017

ÍNDICE DE EJERCICIOS

Ejercicio 1	Ordenar fracciones de menor a mayor	
Ejercicio 2	Tipo de número racional y expresión decimal	
Ejercicio 3	Expresar decimales en forma de fracción	
Ejercicio 4	Fracciones equivalentes y simplificación	
Ejercicio 5	Cálculo y simplificación de expresiones con fracciones	
Ejercicio 6	Operaciones con fracciones	
Ejercicio 7	Problema: Páginas del cuaderno	
Ejercicio 8	Problema: El dinero de María	
Ejercicio 9	Problema: Entrega de trabajos en clase	
Ejercicio 10	Problema: Llenado de botellas	


Este cuaderno contiene los 10 ejercicios del examen de Matemáticas de 1.º de ESO correspondientes al bloque de Fracciones y Números Racionales.

Ejercicio 1 — Ordenar fracciones de menor a mayor

■ ENUNCIADO

Ordena las siguientes fracciones de menor a mayor:

6/5 , 1/3 , 3/4 , 2/5



■ CONCEPTO CLAVE: Comparación de Fracciones

Para ordenar fracciones que tienen distintos denominadores, el método más riguroso consiste en **reducirlas a un denominador común**. Ese denominador común es el **Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.)** de todos los denominadores.

Una vez que todas las fracciones tienen el mismo denominador, basta con comparar sus numeradores: **a mayor numerador, mayor fracción**.

■ DESARROLLO PASO A PASO

Paso 1 — Identificar los denominadores:

Las fracciones son: 6/5, 1/3, 3/4, 2/5

Denominadores: 5, 3, 4, 5

Paso 2 — Calcular el m.c.m. de los denominadores:

Descomponemos en factores primos:

Número	Descomposición	Factores primos
5	5	5^1
3	3	3^1

4	2 × 2	2^2

$$\text{m.c.m.}(5, 3, 4) = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$$

Paso 3 — Convertir cada fracción al denominador 60:

Fracción original	Operación	Fracción equivalente (den. 60)	Valor decimal (aprox.)
6/5	× 12/12	72/60	1.2000
1/3	× 20/20	20/60	0.3333…
3/4	× 15/15	45/60	0.7500
2/5	× 12/12	24/60	0.4000

Paso 4 — Ordenar comparando los numeradores (todos sobre 60):

$$20 < 24 < 45 < 72$$


■ RESULTADO FINAL

$$1/3 < 2/5 < 3/4 < 6/5$$

Ejercicio 2 — Tipo de número racional y expresión decimal

■ ENUNCIADO

Indica de qué tipo de número racional es cada una de las siguientes fracciones (decimal exacto, periódico puro o periódico mixto). Exprésalos en forma decimal: a) 3/7 b) 2/5 c) 7/12



■ CONCEPTO CLAVE: Tipos de Números Decimales

Tipo	Denominador (forma irreducible)	Ejemplo
Decimal EXACTO	Solo factores 2 y/o 5	2/5 = 0.4
Periódico PURO	Solo factores distintos de 2 y 5	3/7 = 0.428571…
Periódico MIXTO	Factores 2 o 5 junto a otros	7/12 = 0.5833…

a) 3/7

7 = 7^1. El denominador, en su forma irreducible, solo tiene el factor primo 7, que es distinto de 2 y de 5. Por tanto, el cociente produce un **decimal periódico puro**.

Realizando la división 3 ÷ 7:

3/7 = 0.428571428571… = 0.428571■ (período: 428571)

b) 2/5

5 = 5^1. El denominador solo tiene el factor primo 5. Dado que 5 es uno de los factores "permitidos" (2 y 5), el resultado será un **decimal exacto**.

2/5 = 0.4 (decimal exacto)

c) 7/12


12 = $2^2 \times 3$. El denominador tiene el factor 2 (permitido) pero también el factor 3 (no permitido). Eso produce un **decimal periódico mixto**: hay una parte no periódica (la parte decimal "inicial") y luego una parte periódica.

7/12 = 0.58333… = 0.583■ (parte no periódica: 5; período: 3)

Ejercicio 3 — Expresar decimales en forma de fracción

■ ENUNCIADO

Expresa en forma de fracción los siguientes números decimales: a) 3.4 (decimal exacto) b) 3.4■ = 3.4444… (periódico puro) c) 3.04■ = 3.0444… (periódico mixto)



■ REGLAS PARA CONVERTIR DECIMALES A FRACCIONES

Decimal exacto: Se escribe como fracción con numerador = número sin coma, denominador = 10^(número de decimales).

Periódico puro: Numerador = número completo – parte entera; denominador = tantos 9s como cifras tenga el período.

Periódico mixto: Numerador = número completo – parte no periódica; denominador = tantos 9s como cifras del período seguidos de tantos 0s como cifras no periódicas.

a) 3.4 → Decimal exacto

3.4 tiene 1 cifra decimal. Por tanto el denominador es 10:

3.4 = 34/10 = 17/5

Simplificamos: m.c.d.(34, 10) = 2, por lo que 34/10 = 17/5. Comprobación: 17 ÷ 5 = 3.4 ✓

b) 3.4444… → Periódico puro, período = {4}

Sea x = 3.4444… Como el período tiene 1 cifra, multiplicamos por 10: 10x = 34.444… Restamos: 10x – x = 34.444… – 3.444… 9x = 31 x = 31/9

3.4444… = 31/9

Comprobación: 31 ÷ 9 = 3.4444… ✓

c) 3.0444… → Periódico mixto (parte no periódica: 0, período: 4)


Sea x = 3.0444… Parte no periódica tiene 1 cifra decimal → multiplicamos por 10: 10x = 30.444… Parte periódica tiene 1 cifra → multiplicamos por 10 más: 100x = 304.444… Restamos: 100x – 10x = 304.444… – 30.444… 90x = 274 x = 274/90 = 137/45

3.0444… = 274/90 = 137/45

Ejercicio 4 — Fracciones equivalentes y simplificación

■ ENUNCIADO

Resuelve las siguientes cuestiones, indicando las operaciones efectuadas: a) Escribe dos fracciones equivalentes a 8/7. b) Simplifica hasta dar con la fracción irreducible de 84/36. c) Comenta de forma razonada si son equivalentes: i. 2/5 y 8/20 ii. 4/5 y 3/6



a) Dos fracciones equivalentes a 8/7

Para obtener fracciones equivalentes multiplicamos (o dividimos) numerador y denominador por el mismo número no nulo:

Operación	Fracción equivalente
8/7 × 2/2	16/14
8/7 × 3/3	24/21

Respuesta: 16/14 y 24/21 son fracciones equivalentes a 8/7.

b) Fracción irreducible de 84/36

Descomponemos en factores primos:

84 = $2^2 \times 3 \times 7$ 36 = $2^2 \times 3^2$ m.c.d.(84, 36) = $2^2 \times 3 = 12$

$$84/36 = (84 \div 12) / (36 \div 12) = 7/3$$

7 y 3 son coprimos (su m.c.d. es 1), por lo que 7/3 es la fracción irreducible.

c.i) ¿Son equivalentes 2/5 y 8/20?

Método: Producto cruzado. Dos fracciones a/b y c/d son equivalentes ■ a×d = b×c

$$2 \times 20 = 40 \text{ y } 5 \times 8 = 40 \rightarrow 40 = 40 \checkmark$$

SÍ son equivalentes. En efecto, 8/20 = (8÷4)/(20÷4) = 2/5.

c.ii) ¿Son equivalentes 4/5 y 3/6?

$$4 \times 6 = 24 \text{ y } 5 \times 3 = 15 \rightarrow 24 \neq 15 \times$$


NO son equivalentes. 4/5 = 0.8 y 3/6 = 1/2 = 0.5. Son valores distintos.

Ejercicio 5

Cálculo y simplificación de expresiones con fracciones

■ ENUNCIADO

Calcula y simplifica al máximo: a) (3/4) ÷ (1/2 + 1/4) b) (3/5 – 1/2) ÷ (3/10) c) (3/2 + 2) · (2 – 3/2) d) (3/12 + 1/7) · (1/2 – 1/9)



■ CONCEPTO CLAVE: Jerarquía de operaciones con fracciones

La jerarquía de operaciones es la misma que con números enteros: 1.º paréntesis más internos; 2.º productos y divisiones; 3.º sumas y restas. Para sumar fracciones se busca el m.c.m. de los denominadores.

a) (3/4) ÷ (1/2 + 1/4)

Primero resolvemos el paréntesis: m.c.m.(2, 4) = 4 1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4 Ahora: (3/4) ÷ (3/4) = (3/4) × (4/3) = 12/12 = 1

Resultado: 1

b) (3/5 – 1/2) ÷ (3/10)

Paréntesis: m.c.m.(5, 2) = 10 3/5 – 1/2 = 6/10 – 5/10 = 1/10 (1/10) ÷ (3/10) = (1/10) × (10/3) = 10/30 = 1/3

Resultado: 1/3

c) (3/2 + 2) · (2 – 3/2)

Primer paréntesis: 3/2 + 2 = 3/2 + 4/2 = 7/2 Segundo paréntesis: 2 – 3/2 = 4/2 – 3/2 = 1/2 (7/2) × (1/2) = 7/4

Resultado: 7/4

d) (3/12 + 1/7) · (1/2 – 1/9)


Simplificamos primero: 3/12 = 1/4 Primer paréntesis: 1/4 + 1/7 → m.c.m.(4,7)=28 → 7/28 + 4/28 = 11/28 Segundo paréntesis: 1/2 − 1/9 → m.c.m.(2,9)=18 → 9/18 − 2/18 = 7/18 (11/28) × (7/18) = 77/504 Simplificamos: m.c.d.(77,504)=7 → 77/504 = 11/72

Resultado: 11/72

Ejercicio 6 — Operaciones con fracciones (suma, resta, producto, cociente)

■ ENUNCIADO

Opera y simplifica al máximo: a) 3/11 + 4/11 – 7/11 b) 7/12 – 3/8 + 19/24 c) (4/5) ÷ (9/10) d) (6/4) · (2/3)



a) 3/11 + 4/11 – 7/11

Las tres fracciones tienen el mismo denominador (11). Operamos directamente con los numeradores: (3 + 4 – 7) / 11 = 0/11 = 0

Resultado: 0

b) 7/12 – 3/8 + 19/24

Denominadores: 12, 8, 24 m.c.m.(12, 8, 24): 12=2²×3, 8=2³, 24=2³×3 → m.c.m. = 2³×3 = 24 7/12 = 14/24 3/8 = 9/24 19/24 = 19/24 (14 – 9 + 19) / 24 = 24/24 = 1

Resultado: 1

c) (4/5) ÷ (9/10)

Dividir es multiplicar por la fracción inversa: (4/5) ÷ (9/10) = (4/5) × (10/9) = 40/45 Simplificamos: m.c.d.(40,45) = 5 → 40/45 = 8/9

Resultado: 8/9

d) (6/4) · (2/3)


Multiplicamos numeradores entre sí y denominadores entre sí: (6/4) × (2/3) = (6×2)/(4×3) = 12/12 = 1 También se puede simplificar antes: 6/4 = 3/2 → (3/2)×(2/3) = 6/6 = 1

Resultado: 1

Ejercicio 7 — Problema: Páginas del cuaderno

■ ENUNCIADO

Mi cuaderno tenía originalmente 80 páginas, pero he usado 2/5 y he arrancado 1/8. ¿Cuántas páginas quedan disponibles? ¿Cuál es la fracción?



■ DESARROLLO PASO A PASO

Paso 1 — Páginas usadas:

(2/5) × 80 = 160/5 = 32 páginas usadas

Paso 2 — Páginas arrancadas:

(1/8) × 80 = 80/8 = 10 páginas arrancadas

Paso 3 — Páginas no disponibles (total):

32 + 10 = 42 páginas no disponibles

Paso 4 — Páginas disponibles:

80 − 42 = 38 páginas disponibles

Paso 5 — Fracción de páginas disponibles:

Páginas disponibles / total = 38/80 Simplificamos: m.c.d.(38,80) = 2 → 38/80 = 19/40

Concepto	Cálculo	Resultado
Páginas usadas	(2/5) × 80	32 páginas
Páginas arrancadas	(1/8) × 80	10 páginas
Páginas no disponibles	32 + 10	42 páginas

Páginas disponibles	80 – 42	38 páginas
Fracción disponible	**38/80**	**19/40**

Quedan disponibles 38 páginas, que representan la fracción 19/40 del cuaderno.

Ejercicio 8 — Problema: El dinero de María

■ ENUNCIADO

María ha gastado 5/12 del dinero que llevaba. Vuelve a casa con 28 €. a) ¿Cuánto ha gastado? b) ¿Cuánto dinero tenía al salir de casa?



■ DESARROLLO PASO A PASO

Si María gastó 5/12 del dinero total, entonces le queda la fracción complementaria:

$$1 - 5/12 = 12/12 - 5/12 = 7/12$$

Por tanto, **7/12** del dinero total equivale a **28 €**.

b) Dinero total al salir de casa:

Si (7/12) × Total = 28 € Total = 28 ÷ (7/12) = 28 × (12/7) = 336/7 = 48 €

$$\text{Total} = 48\ €$$

a) Dinero gastado:

Gastado = Total − Restante = 48 − 28 = 20 € Comprobación: (5/12) × 48 = 240/12 = 20 € ✓


$$\text{Gastado} = 20\ €$$

Concepto	Fracción	Cantidad en €
Dinero total	12/12 = 1	48 €
Dinero gastado	5/12	20 €
Dinero que vuelve a casa	7/12	28 €

Ejercicio 9 — Problema: Entrega de trabajos en clase

■ ENUNCIADO

De una clase de 30 alumnos, la quinta parte entregó ayer un trabajo y hoy lo han entregado las dos terceras partes. ¿Qué fracción de la clase representan los estudiantes que ya han presentado el trabajo? ¿Cuántos alumnos quedan por entregarlo?



■ DESARROLLO PASO A PASO

Paso 1 — Alumnos que entregaron ayer:

(1/5) × 30 = 30/5 = 6 alumnos

Paso 2 — Alumnos que entregaron hoy:

(2/3) × 30 = 60/3 = 20 alumnos

Paso 3 — Total de alumnos que YA han entregado:

6 + 20 = 26 alumnos han entregado

Paso 4 — Fracción de la clase que ya entregó:

1/5 + 2/3 → m.c.m.(5,3) = 15 → 3/15 + 10/15 = 13/15 Comprobación: (13/15) × 30 = 390/15 = 26 alumnos ✓

Fracción que entregó: 13/15

Paso 5 — Alumnos que aún NO han entregado:

30 – 26 = 4 alumnos quedan por entregar el trabajo.

Fracción que falta: 1 – 13/15 = 2/15 → (2/15)×30 = 4 alumnos ✓

Grupo	Fracción	N.º de alumnos
Entregaron ayer	1/5	6
Entregaron hoy	2/3	20
Total han entregado	13/15	26
Quedan por entregar	2/15	4
TOTAL CLASE	**15/15 = 1**	**30**

Ejercicio 10 — Problema: Llenado de botellas

■ ENUNCIADO

¿Cuántas botellas de 3/4 de litro se pueden llenar con una garrafa de 30 litros?



■ DESARROLLO PASO A PASO

Para saber cuántas botellas caben en la garrafa, debemos dividir la capacidad total de la garrafa entre la capacidad de cada botella:

Número de botellas = Capacidad total ÷ Capacidad de cada botella

Paso 1 — Planteamos la operación:

30 ÷ (3/4)

Paso 2 — Dividir por una fracción = multiplicar por su inversa:

30 ÷ (3/4) = 30 × (4/3) = 120/3 = 40

$$30 \times (4/3) = 120/3 = 40$$

Paso 3 — Comprobación:

40 botellas × (3/4) L/botella = 40 × 3/4 = 120/4 = 30 L ✓ La suma da exactamente los 30 litros de la garrafa, lo que confirma el resultado.

Dato	Valor
Capacidad total de la garrafa	30 litros
Capacidad de cada botella	3/4 litro = 0.75 litros

Número de botellas	**30 ÷ (3/4) = 40 botellas**

Con una garrafa de 30 litros se pueden llenar exactamente 40 botellas de 3/4 de litro.

— Fin del cuaderno de ejercicios —

¡Mucho ánimo, jóvenes matemáticos!

Junta de Castilla y León
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EXAMEN DE MATEMÁTICAS
1º ESO 16-03-2017
SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

Nº1.- Ordena los números de menor a mayor: 2,01 20,01 2,101 0,2001

Nº2.- Efectúa las siguientes operaciones:

a) 43,01 + 71,34 b) 21,04 − 19,952 c) 0,01 : 100 d) 56,23 : 3,8

Nº3.- Nueve amigos han obtenido un premio de 102342 €. ¿Cuánto le corresponde a cada uno?

Nº4.- El cocinero de un restaurante sabe que necesita 0,25 litros de agua por cada comensal para elaborar una sopa. Si tiene 132 clientes para comer, ¿qué cantidad de agua necesitaría para hacer la sopa?

Nº5.- Tenemos un rollo de tela que mide 21,24 metros. Si queremos dividirlo en cuatro partes iguales, ¿Cuánto medirá cada parte? ¿Cuánto costará cada parte si el precio es de 3,45 € el metro?

Nº6.- a) Para envolver un paquete necesitamos 180 cm^2 de papel y 2,5 m de cuerda, y disponemos de estas cantidades de papel

a) 20 cm^2 b) 2 dm^2 c) 0,002 m^2 d) 0,00002 dam^2

¿Cuál de ellas nos servirá para envolverlo?

b) Si tenemos 4 rollos con las siguientes cantidades de cordel

a) 0,03 km b) 0,03 dam c) 30 cm d) 300 mm

¿Qué rollo nos servirá para atar el paquete anterior?

Nº7.- Expresa las siguientes cantidades en la unidad que se indica:

a) En metros: 7 dm 6 mm
b) En centilitros: 7 hl 5 l
c) En litros: 8 dl 7 cl 5 ml
d) En gramos: 8 kg 6 hg 4 g 3 dg
e) En hectogramos: 7 g 4 dg


Nº8.- En una fábrica producen dos tipos de latas: de medio kilo y de 2 hg 5 dag. Si hay 5 000 latas de cada clase, ¿cuántas toneladas pesan en total?

Nº9.- Una finca de 8,4025 ha se divide en dos partes. Si una de ellas tiene 30 000 m^2 ¿Cuánto mide la otra parte?

Nº10.- Tenemos un depósito de 3 m^3 de agua mineral. ¿Cuántas botellas de litro y medio podemos llenar?

SUERTE JOVENES

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA



MATEMATICAS

1.º Educacion Secundaria Obligatoria

Sistema Metrico Decimal & Numeros Decimales

> “He descubierto una demostracion verdaderamente maravillosa de este teorema, pero este margen es demasiado pequeno para contenerla.”
>
> **— Pierre de Fermat (1637), Ultimo Teorema de Fermat**

1.º ESO · Examen 16 de Marzo de 2017

Departamento de Matematicas

Indice de Ejercicios

SISTEMA METRICO DECIMAL & NUMEROS DECIMALES

1 **Ordenacion de Numeros Decimales** — 3
Comparar y ordenar de menor a mayor: 2,01 · 20,01 · 2,101 · 0,2001

2 **Operaciones con Decimales** — 4
Suma · Resta · Division entera · Division con decimales

3 **Reparto Equitativo de un Premio** — 5
Division de 102 342 € entre 9 amigos

4 **Agua para la Sopa del Restaurante** — 6
0,25 litros por comensal · 132 clientes · Multiplicacion de decimales

5 **Division de un Rollo de Tela** — 7
21,24 m ÷ 4 partes · Precio a 3,45 €/m

6 **Unidades de Superficie y Longitud** — 8
Papel: cm² dm² m² dam² · Cuerda: km dam cm mm

7 **Conversion de Unidades del Sistema Metrico** — 9
Longitud · Capacidad · Masa

8 **Peso Total de Latas en una Fabrica** — 10
500 g y 2 hg 5 dag · 5 000 latas de cada tipo · Resultado en toneladas

9 **Division de una Finca en Hectareas** — 11
8,4025 ha total · una parte 30 000 m² · hallar la otra parte

10 **Botellas de Agua Mineral**

Deposito de 3 m³ · botellas de 1,5 litros · cuantas botellas

12

EJ. 1


Ordenacion de Numeros Decimales

COMPARACION Y ORDEN · NUMEROS DECIMALES

ENUNCIADO

Ordena los siguientes numeros de **menor a mayor**:

2,01 20,01 2,101 0,2001



✓ **RESOLUCION COMPLETA PASO A PASO**

1. **Identificar la parte entera de cada numero.** Antes de comparar decimales, comparamos primero la parte entera, ya que determina el orden principal:
   · 2,01 → parte entera = **2**
   · 20,01 → parte entera = **20**
   · 2,101 → parte entera = **2**
   · 0,2001 → parte entera = **0**

2. **Orden por parte entera:** 0 < 2 = 2 < 20. Por tanto, el mayor es 20,01 y el menor es 0,2001. Los numeros 2,01 y 2,101 tienen la misma parte entera (2) y deben compararse por su parte decimal.

3. **Comparar 2,01 y 2,101 igualando decimales** (anadimos ceros sin cambiar el valor):
   · 2,01 = 2,010
   · 2,101 = 2,101
   Decimas: ambos 0. Centesimas: 1 = 1. Milesimas: 0 < 1.
   Por tanto: **2,010 < 2,101**, es decir, 2,01 < 2,101.

0,2001 < 2,01 < 2,101 < 20,01

EJ. 2


Operaciones con Numeros Decimales

SUMA · RESTA · DIVISION · ALGORITMOS

ENUNCIADO

Efectua las siguientes operaciones con numeros decimales:

a) 43,01 + 71,34 **b)** 21,04 − 19,952 **c)** 0,01 ÷ 100 **d)** 56,23 ÷ 3,8



✓ RESOLUCION COMPLETA PASO A PASO

A) SUMA: 43,01 + 71,34

```
  43,01
+ 71,34
———————
 114,35
```

Se alinean las comas decimales. Se suma cifra a cifra de derecha a izquierda: 1+4=5, 0+3=3, 3+1=4, 4+7=11 (escribo 1 llevo 1), 0+0+1=1.

= 114,35

B) RESTA: 21,04 − 19,952

```
  21,040
- 19,952
———————
   1,088
```

Se aniade un 0 a 21,04 para igualar decimales: 21,040. Se resta con prestamos: 0−2 (pido)→10−2=8, 3−5 (pido)→13−5=8, etc.

= 1,088

C) DIVISION: 0,01 ÷ 100

```
0,01 ÷ 100 =
= 0,0001
```

Dividir por 100 equivale a mover la coma decimal 2 posiciones a la izquierda: 0,01 → 0,0001

= 0,0001

D) DIVISION: 56,23 ÷ 3,8

```
562,3 ÷ 38:
38×14=532
562-532=30
303÷38=7  r17
```

Multiplicamos ambos por 10 para eliminar el decimal del divisor. 56,23÷3,8 = 562,3÷38 ≈ 14,797...

≈ 14,80 (2 decimales)

⚠ Regla clave: en suma y resta, alinear siempre las comas decimales. En la division, multiplicar dividendo y divisor por la misma potencia de 10 para convertir el divisor en numero entero.

EJ. 3

Reparto Equitativo de un Premio

DIVISION DE DECIMALES · PROBLEMAS DE REPARTO

ENUNCIADO

Nueve amigos han obtenido un **premio de 102 342 €**. ¿Cuanto le corresponde a **cada uno**?



✓ RESOLUCION COMPLETA PASO A PASO

1. **Identificar la operacion.** Tenemos un total que se divide en partes iguales entre 9 personas. La operacion a realizar es una **division entera**:
   Cantidad total ÷ numero de personas = parte de cada uno

2. **Plantear la operacion:**
   102 342 € ÷ 9 = ?

3. **Realizar la division paso a paso:**
   · 10 ÷ 9 = 1, resto 1 → bajo 2: 12
   · 12 ÷ 9 = 1, resto 3 → bajo 3: 33
   · 33 ÷ 9 = 3, resto 6 → bajo 4: 64
   · 64 ÷ 9 = 7, resto 1 → bajo 2: 12
   · 12 ÷ 9 = 1, resto 3
   Cociente = **11 371**, Resto = **3**

4. **Verificacion:** 11 371 × 9 = 102 339. Y 102 342 − 102 339 = 3 (resto). Cada amigo recibe 11 371 € y sobran 3 €.

5. **Division exacta con decimales:** 102 342,000 ÷ 9 = 11 371,333... € = 11 371,$\underline{3}$ (decimal periodico puro con periodo 3).

A cada amigo le corresponden 11 371,33 € (redondeado a centimos) y sobran 3 €

EJ. 4

Agua para la Sopa del Restaurante

MULTIPLICACION DE DECIMALES · PROBLEMAS CONTEXTUALIZADOS

ENUNCIADO

El cocinero de un restaurante sabe que necesita **0,25 litros de agua por cada comensal** para elaborar una sopa. Si tiene **132 clientes** para comer, ¿que cantidad de agua necesitaria para hacer la sopa?



✓ **RESOLUCION COMPLETA PASO A PASO**

1. **Identificar los datos:**
   · Agua por comensal = **0,25 litros**
   · Numero de comensales = **132**
   · Total de agua = **incognita**

2. **Plantear la operacion.** Si por 1 comensal se necesitan 0,25 litros, por 132 comensales se necesitaran 132 veces mas:
   Total de agua = 0,25 × 132

3. **Realizar la multiplicacion:**
   0,25 × 132 = 25 × 132 ÷ 100
   25 × 132 = 25 × 100 + 25 × 32 = 2 500 + 800 = **3 300**
   3 300 ÷ 100 = **33**

4. **Comprobacion alternativa:** 0,25 = 1/4, por tanto 132 × (1/4) = 132/4 = **33** ✓

El cocinero necesitaria 33 litros de agua para elaborar la sopa para 132 comensales


EJ. 5

Division de un Rollo de Tela

DIVISION Y MULTIPLICACION DE DECIMALES · PRECIO UNITARIO

ENUNCIADO

Tenemos un rollo de tela que mide **21,24 metros**. Si queremos dividirlo en **cuatro partes iguales**, ¿cuanto medira cada parte? ¿Cuanto costara cada parte si el precio es de **3,45 € el metro**?



✓ **RESOLUCION COMPLETA PASO A PASO**

1. **Parte A — Longitud de cada trozo:**
   Total de tela ÷ numero de partes = longitud de cada parte
   21,24 m ÷ 4 = ?

2. **Division: 21,24 ÷ 4**
   · 21 ÷ 4 = 5, resto 1 → bajamos "," y el 2: 12
   · 12 ÷ 4 = 3, resto 0 → bajamos el 4: 04
   · 04 ÷ 4 = 1, resto 0
   Resultado: **5,31 metros**

3. **Verificacion:** 5,31 × 4 = 21,24 ✓

4. **Parte B — Coste de cada trozo:**
   Si el metro cuesta 3,45 €, cada trozo de 5,31 m cuesta:
   5,31 m × 3,45 €/m = ?

5. **Multiplicacion: 5,31 × 3,45**
   531 × 345 = 531 × 300 + 531 × 45
   = 159 300 + 531 × 40 + 531 × 5
   = 159 300 + 21 240 + 2 655 = **183 195**
   Decimales totales: 2 + 2 = 4 → 183 195 → **18,3195 €**

Cada parte mide 5,31 metros · Cada parte cuesta 18,32 €
(redondeado a centimos)

EJ. 6

Unidades de Superficie y Longitud para un Paquete


CONVERSION DE UNIDADES · SUPERFICIE · LONGITUD

ENUNCIADO — PARTE A)

Para envolver un paquete necesitamos **180 cm² de papel**. Disponemos de: a) 20 cm² b) 2 dm² c) 0,002 m² d) 0,00002 dam². ¿Cual nos sirve?

ENUNCIADO — PARTE B)

Necesitamos **2,5 m de cuerda**. Disponemos de 4 rollos: a) 0,03 km b) 0,03 dam c) 30 cm d) 300 mm. ¿Que rollo nos sirve?



✓ RESOLUCION — PARTE A) SUPERFICIE

1. **Equivalencias de unidades de superficie:**
   1 dm² = 100 cm² · 1 m² = 10 000 cm² · 1 dam² = 1 000 000 cm²
2. **Convertir todo a cm²:**
   a) 20 cm² = **20 cm²** ✗ (20 < 180)
   b) 2 dm² = 2 × 100 = **200 cm²** ✓ (200 ≥ 180)
   c) 0,002 m² = 0,002 × 10 000 = **20 cm²** ✗ (20 < 180)
   d) 0,00002 dam² = 0,00002 × 1 000 000 = **20 cm²** ✗ (20 < 180)

Parte a): La opcion valida es la b) 2 dm² = 200 cm² (≥ 180 cm²)

✓ RESOLUCION — PARTE B) LONGITUD

3. **Equivalencias de longitud:** 1 km = 1 000 m · 1 dam = 10 m · 1 m = 100 cm · 1 m = 1 000 mm
4. **Convertir todo a metros:**
   a) 0,03 km = 0,03 × 1 000 = **30 m** ✓ (30 ≥ 2,5)
   b) 0,03 dam = 0,03 × 10 = **0,3 m** ✗ (0,3 < 2,5)
   c) 30 cm = 30 ÷ 100 = **0,3 m** ✗ (0,3 < 2,5)
   d) 300 mm = 300 ÷ 1 000 = **0,3 m** ✗ (0,3 < 2,5)

Parte b): El rollo valido es el a) 0,03 km = 30 m (≥ 2,5 m)

EJ. 7


Conversion de Unidades del Sistema Metrico

LONGITUD · CAPACIDAD · MASA · SISTEMA METRICO DECIMAL

ENUNCIADO

Expresa las siguientes cantidades en la unidad indicada:

a) En metros: 7 dm 6 mm **b)** En centilitros: 7 hl 5 l **c)** En litros: 8 dl 7 cl 5 ml
d) En gramos: 8 kg 6 hg 4 g 3 dg **e)** En hectogramos: 7 g 4 dg



✓ **RESOLUCION COMPLETA PASO A PASO**

Apartado	Conversion detallada	Resultado
a) En metros 7 dm 6 mm	7 dm = 7 ÷ 10 = 0,7 m 6 mm = 6 ÷ 1 000 = 0,006 m Total = 0,7 + 0,006	**0,706 m**
b) En centilitros 7 hl 5 l	7 hl = 7 × 10 000 cl = 70 000 cl 5 l = 5 × 100 cl = 500 cl Total = 70 000 + 500	**70 500 cl**
c) En litros 8 dl 7 cl 5 ml	8 dl = 8 ÷ 10 = 0,8 l 7 cl = 7 ÷ 100 = 0,07 l 5 ml = 5 ÷ 1 000 = 0,005 l Total = 0,8 + 0,07 + 0,005	**0,875 l**
d) En gramos 8 kg 6 hg 4 g 3 dg	8 kg = 8 × 1 000 = 8 000 g 6 hg = 6 × 100 = 600 g 4 g = 4 g 3 dg = 3 ÷ 10 = 0,3 g Total = 8000 + 600 + 4 + 0,3	**8 604,3 g**
e) En hectogramos 7 g 4 dg	7 g = 7 ÷ 100 = 0,07 hg 4 dg = 4 ÷ 1 000 = 0,004 hg Total = 0,07 + 0,004	**0,074 hg**

EJ. 8

Peso Total de Latas en una Fabrica

CONVERSION DE UNIDADES DE MASA · TONELADAS

ENUNCIADO

En una fabrica producen dos tipos de latas: de **medio kilo** y de **2 hg 5 dag**. Si hay **5 000 latas de cada clase**, ¿cuantas **toneladas** pesan en total?



✓ **RESOLUCION COMPLETA PASO A PASO**

1. **Convertir el peso de la lata tipo 1 a gramos:**
   "Medio kilo" = 0,5 kg = 500 g

2. **Convertir el peso de la lata tipo 2 a gramos:**
   2 hg 5 dag = (2 × 100) g + (5 × 10) g = 200 g + 50 g = **250 g**

3. **Calcular el peso total de cada tipo (5 000 latas):**
   · Tipo 1: 5 000 × 500 g = **2 500 000 g**
   · Tipo 2: 5 000 × 250 g = **1 250 000 g**

4. **Peso total combinado:**
   2 500 000 g + 1 250 000 g = **3 750 000 g**

5. **Convertir gramos a toneladas:**
   1 tonelada = 1 000 kg = 1 000 000 g
   3 750 000 g ÷ 1 000 000 = **3,75 toneladas**

Las 10 000 latas pesan en total 3,75 toneladas


EJ. 9

Division de una Finca en Hectareas

CONVERSION DE SUPERFICIE · HECTAREAS Y METROS CUADRADOS

ENUNCIADO

Una finca de **8,4025 ha** se divide en dos partes. Si una de ellas tiene **30 000 m²**, ¿cuanto mide la otra parte?



✓ **RESOLUCION COMPLETA PASO A PASO**

1. **Recordar la equivalencia fundamental de superficie agraria:**
   1 hectarea (ha) = 10 000 m²

2. **Estrategia 1 — Convertir todo a m²:**
   Total: 8,4025 ha = 8,4025 × 10 000 m² = **84 025 m²**
   Parte conocida: 30 000 m²
   Parte desconocida = 84 025 − 30 000 = **54 025 m²**

3. **Estrategia 2 — Convertir todo a ha (verificacion):**
   30 000 m² = 30 000 ÷ 10 000 ha = **3 ha**
   Parte desconocida = 8,4025 − 3 = **5,4025 ha**

4. **Verificacion:** 3 ha + 5,4025 ha = 8,4025 ha ✓
   O bien: 30 000 m² + 54 025 m² = 84 025 m² = 8,4025 ha ✓

La otra parte mide 54 025 m² = 5,4025 ha


EJ. 10

Botellas de Agua Mineral desde un Deposito

UNIDADES DE VOLUMEN · M³ → LITROS · DIVISION DE DECIMALES

ENUNCIADO

Tenemos un **deposito de 3 m³ de agua mineral**. ¿Cuantas **botellas de litro y medio (1,5 l)** podemos llenar?



✓ **RESOLUCION COMPLETA PASO A PASO**

1. **Recordar la equivalencia fundamental de volumen y capacidad:**
   1 m³ = 1 000 litros (dm³)
   Esta equivalencia es esencial: 1 metro cubico contiene exactamente 1 000 litros.

2. **Convertir el deposito de m³ a litros:**
   3 m³ = 3 × 1 000 litros = **3 000 litros**

3. **Calcular cuantas botellas de 1,5 l caben en 3 000 l:**
   Numero de botellas = 3 000 l ÷ 1,5 l/botella

4. **Realizar la division: 3 000 ÷ 1,5**
   Multiplicamos ambos por 2 para eliminar el decimal:
   3 000 ÷ 1,5 = 6 000 ÷ 3 = **2 000**
   Forma alternativa: 3 000 ÷ 1,5 = 3 000 ÷ (3/2) = 3 000 × (2/3) = 6 000/3 = **2 000**

5. **Verificacion:** 2 000 botellas × 1,5 l/botella = 3 000 l = 3 m³ ✓

Con el deposito de 3 m³ podemos llenar 2 000 botellas de 1,5 litros

¡SUERTE, JOVENES!

Departamento de Matematicas · 1.º ESO · 16 de Marzo de 2017

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS ECUACIONES

4-05-2017 EXAMEN 1º A ESO

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

Nº1.- Expresa los siguientes enunciados en lenguaje algebraico en función de dos números, a y b.

a) A la mitad del número a le restamos la cuarta parte de b.
b) El cuadrado del número a más el doble del número b.
c) El producto del triple del número a por el doble del cubo del número b.
d) La mitad del número a más la tercera parte de b es 100.

Nº2.- Si la edad de mi amigo Pablo es x años, expresa en lenguaje algebraico.

a) La edad que tenía hace 5 años.
b) La edad que tendrá dentro de 7 años.
c) Los años que le faltan para jubilarse a los 65 años.
d) Los años que tendrá cuando hayan pasado el doble de los años que componen su edad actual.

Nº3.- Calcúlese el valor numérico de las siguientes expresiones en el valor indicado:


a) $4x + 3 \quad en \quad x = 3$ $\quad b) \; 3x^2 - 3x \quad en \; x = 2$ $\quad c) \; (x^2 - 4)^2 \quad en \; x = -2$

Nº4.- Comprueba si las dos expresiones son o no una identidad.


a) 3(x + 2) + 4 = 3x + 10 b) 4(x + 1) + 3(2 - x) = x + 1

Nº5.- Expresa el área y el perímetro de las siguientes figuras:

a)



b)



Nº6.- Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) x + 4 = 7 b) y - 3 = 5 c) 2x = 8 d) $\frac{y}{5} = 2$ e) 8 - z = 6 f) 3z - 2 = 10

Nº7.- Resuelve las siguientes ecuaciones.

a) x - 5 = -3 b) 2x + 4 = 3x - 8 c) 3(3x + 4) = 5(x -1) d) $\frac{x-1}{2} = \frac{x-2}{3} - \frac{3-x}{4}$

Nº8.- La suma de las edades de Sergio y de María es 38 años. Sergio tiene el doble de la edad de María más dos años. ¿Cuáles son las edades de María y Sergio?

Nº9.- Si al doble de un número le sumamos 11, a continuación lo dividimos entre 5 y al resultado le restamos el número inicial, obtenemos -2. ¿Cuál es este número?


Nº10.- Calcula las dimensiones de una parcela rectangular, si su perímetro es de 400 metros y es el triple de larga que de ancha.

SUERTE JÓVENES

QUANTUM HARMONIES

THE MATHEMATICS OF THE UNIVERSE

AUTHOR: DR. EVELYN REED



1° ESO · ÁLGEBRA Y ECUACIONES

MATEMÁTICAS

Álgebra y Ecuaciones

"Las matemáticas son el lenguaje en que Dios ha escrito el universo. El que domina las ecuaciones, domina la realidad misma."

— STEPHEN W. HAWKING

NIVEL	ÁREA	FECHA	EXAMEN
1.º ESO	Matemáticas	04 · 05 · 2017	1.º A

ÍNDICE

CONTENIDO DEL EXAMEN · ÁLGEBRA Y ECUACIONES · 1.º ESO

1 **Lenguaje Algebraico con dos variables** — 3
Traducción de enunciados verbales a expresiones algebraicas en a y b

2 **Expresiones con la edad de Pablo** — 4
Formulación algebraica de situaciones relacionadas con la edad

3 **Valor Numérico de Expresiones Algebraicas** — 5
Cálculo del valor numérico sustituyendo la variable por un número

4 **Identidades Algebraicas** — 6
Comprobación de si dos expresiones algebraicas son o no una identidad

5 **Área y Perímetro de Figuras** — 7
Expresión algebraica del área y el perímetro de figuras geométricas

6 **Ecuaciones de Primer Grado (Básicas)** — 8
Resolución de ecuaciones elementales de primer grado

Ecuaciones de Primer Grado (Avanzadas)

7 Ecuaciones con paréntesis, transposición de términos y fracciones 9

8 **Problema de Edades: Sergio y María**
Planteamiento y resolución de un problema de edades mediante ecuación 10

9 **Problema de Número Desconocido**
Hallar un número desconocido siguiendo una secuencia de operaciones 11

10 **Problema de la Parcela Rectangular**
Cálculo de dimensiones de una parcela a partir del perímetro 12

"La ecuación es más inteligente que yo."

— Paul Dirac

1

EJERCICIO NÚMERO 1

Lenguaje Algebraico con Dos Variables



Las variables a y b representan dos números cualesquiera

📋 ENUNCIADO

Expresa los siguientes enunciados en **lenguaje algebraico** en función de dos números, **a** y **b**.

📚 CONCEPTO CLAVE

El lenguaje algebraico nos permite escribir enunciados verbales usando letras (variables) y operaciones matemáticas. Cada expresión algebraica representa una relación matemática entre dos o más cantidades.

a) **Enunciado:** A la mitad del número a le restamos la cuarta parte de b.

→ "la mitad de a" se escribe como **a/2** · "la cuarta parte de b" se escribe como **b/4**

Expresión algebraica: `a/2 − b/4`

b) **Enunciado:** El cuadrado del número a más el doble del número b.

→ "el cuadrado de a" se escribe como **a²** · "el doble de b" se escribe como **2b**

Expresión algebraica: `a² + 2b`

c) **Enunciado:** El producto del triple del número a por el doble del cubo del número b.

→ "triple de a" = **3a** · "cubo de b" = **b^3** · "doble del cubo de b" = **$2b^3$** · "producto" = multiplicación

Expresión algebraica: **$3a \cdot 2b^3 = 6ab^3$**

d) **Enunciado:** La mitad del número a más la tercera parte de b es 100.

→ "la mitad de a" = **a/2** · "la tercera parte de b" = **b/3** · "es 100" → se escribe como igualdad

Ecuación algebraica: **$a/2 + b/3 = 100$**

EJERCICIO NÚMERO 2

2 Expresiones Algebraicas sobre la Edad de Pablo



Línea temporal de la vida de Pablo expresada algebraicamente

📋 ENUNCIADO

Si la edad de mi amigo **Pablo** es **x años**, expresa en lenguaje algebraico cada uno de los siguientes enunciados.

📚 CONCEPTO CLAVE

Cuando la edad actual de una persona es **x**, podemos representar cualquier edad pasada o futura como una expresión algebraica sumando o restando los años correspondientes a x.

a) **Enunciado:** La edad que tenía Pablo hace 5 años.
→ Si ahora tiene x años, hace 5 años tenía 5 años menos, es decir, se resta 5 a su edad actual.
Expresión algebraica: $x - 5$

b) **Enunciado:** La edad que tendrá Pablo dentro de 7 años.
→ Dentro de 7 años tendrá 7 años más que ahora, es decir, se suma 7 a su edad actual.
Expresión algebraica: $x + 7$

c) **Enunciado:** Los años que le faltan para jubilarse a los 65 años.
→ Para llegar a 65 años, le falta la diferencia entre 65 y su edad actual x.

Expresión algebraica: `65 − x`

d) **Enunciado:** Los años que tendrá cuando hayan pasado el doble de los años que componen su edad actual.
→ "el doble de su edad actual" = **2x**. Pasarán 2x años desde ahora, por lo que su edad será su edad actual más ese tiempo.

Expresión algebraica: `x + 2x = 3x`

EJERCICIO NÚMERO 3

3 Valor Numérico de Expresiones Algebraicas



Sustitución de la variable por su valor numérico en la expresión

📋 ENUNCIADO

Calcúlese el **valor numérico** de las siguientes expresiones en el valor indicado para la variable x.

📚 CONCEPTO CLAVE

El valor numérico de una expresión algebraica es el resultado de **sustituir la variable** por el número indicado y realizar todas las operaciones. Se obtiene aplicando las reglas de prioridad: primero las potencias, luego productos y cocientes, y por último sumas y restas.

a) **Expresión:** $4x + 3$ en $x = 3$

Paso 1: Sustituimos x por 3: $4 \cdot \mathbf{3} + 3$

Paso 2: Realizamos la multiplicación: $\mathbf{12} + 3$

Paso 3: Realizamos la suma: $\mathbf{15}$

Resultado: $4(3) + 3 = 12 + 3 = 15$

b) **Expresión:** $3x^2 - 3x$ en $x = 2$

Paso 1: Sustituimos x por 2: $3 \cdot \mathbf{2}^2 - 3 \cdot \mathbf{2}$

Paso 2: Calculamos la potencia: $3 \cdot \mathbf{4} - 3 \cdot 2$

Paso 3: Realizamos los productos: $\mathbf{12} - \mathbf{6}$

Paso 4: Realizamos la resta: $\mathbf{6}$

Resultado: $3(2^2) - 3(2) = 12 - 6 = 6$

c) **Expresión:** $(x^2 - 4)^2$ en $x = -2$

Paso 1: Sustituimos x por −2: $((\mathbf{-2})^2 - 4)^2$

Paso 2: Calculamos $(-2)^2 = \mathbf{4}$: $(\mathbf{4} - 4)^2$


Paso 3: Restamos dentro del paréntesis: $(\mathbf{0})^2$

Paso 4: Elevamos al cuadrado: $\mathbf{0}$

Resultado: $((-2)^2 - 4)^2 = (4 - 4)^2 = 0^2 = 0$

EJERCICIO NÚMERO 4

4 Comprobación de Identidades Algebraicas



Una identidad algebraica se cumple para todos los valores de x

📋 ENUNCIADO

Comprueba si las dos expresiones son o **no** una identidad algebraica.

📚 CONCEPTO CLAVE

Una identidad algebraica es una igualdad que se cumple para **cualquier valor** de la variable. Para comprobarlo, simplificamos ambos miembros y vemos si son iguales. Si simplificando obtenemos la misma expresión en ambos lados, es una identidad. En caso contrario, no lo es.

a) ¿Es identidad? $3(x + 2) + 4 = 3x + 10$

Miembro izquierdo:

$3(x + 2) + 4$

$= 3 \cdot x + 3 \cdot 2 + 4$ (aplicamos la propiedad distributiva)

$= 3x + 6 + 4$ (multiplicamos 3 por cada término del paréntesis)

$= 3x + 10$ (sumamos los términos independientes 6 + 4)

Miembro derecho: $3x + 10$

✅ **Como $3x + 10 = 3x + 10$, la expresión SÍ ES UNA IDENTIDAD algebraica.**

b) ¿Es identidad? $4(x + 1) + 3(2 - x) = x + 1$

Miembro izquierdo:

$4(x + 1) + 3(2 - x)$

$= 4x + 4 + 6 - 3x$ (aplicamos la propiedad distributiva en ambos paréntesis)

$= (4x - 3x) + (4 + 6)$ (agrupamos términos semejantes)

$= x + 10$


Miembro derecho: $x + 1$

❌ **Como $x + 10 \neq x + 1$, la expresión NO ES UNA IDENTIDAD algebraica.**

5

EJERCICIO NÚMERO 5

Área y Perímetro de Figuras Algebraicas



Figuras con lados expresados como monomios y polinomios

📋 ENUNCIADO

Expresa el **área** y el **perímetro** de las figuras geométricas indicadas, cuyos lados están expresados mediante expresiones algebraicas.

📚 FÓRMULAS FUNDAMENTALES

Rectángulo: Área = base × altura · Perímetro = 2·(base + altura)

Cuadrado: Área = lado² · Perímetro = 4·lado

Triángulo: Área = (base × altura)/2 · Perímetro = suma de los tres lados

a) **Figura a):** Rectángulo con base $x + 3$ y altura x

Área del rectángulo:

$A = \text{base} \times \text{altura} = (x + 3) \cdot x$

$A = x^2 + 3x$ (aplicamos la propiedad distributiva)

Perímetro del rectángulo:

$P = 2 \cdot (\text{base} + \text{altura}) = 2 \cdot (x + 3 + x)$

$P = 2 \cdot (2x + 3)$

$P = 4x + 6$

b) **Figura b):** Cuadrado con lado $2x - 1$

Área del cuadrado:

$A = \text{lado}^2 = (2x - 1)^2$

$A = (2x)^2 - 2\cdot(2x)\cdot 1 + 1^2$ (cuadrado de un binomio: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$)

$A = 4x^2 - 4x + 1$

Perímetro del cuadrado:

$P = 4\cdot\text{lado} = 4\cdot(2x - 1)$

$P = 8x - 4$

EJERCICIO NÚMERO 6

6 Ecuaciones de Primer Grado — Nivel Básico



Cada ecuación es como una balanza en equilibrio perfecto

📋 ENUNCIADO

Resuelve las siguientes **ecuaciones de primer grado**. Recuerda: para despejar la incógnita debemos realizar la operación inversa en ambos miembros de la ecuación.

📚 REGLA DE ORO DE LAS ECUACIONES

Lo que hacemos a un lado de la ecuación, debemos hacerlo también al otro lado. Así el equilibrio (la igualdad) se mantiene siempre. La incógnita queda despejada cuando está sola en uno de los miembros.

a) $x + 4 = 7$

→ Restamos 4 a ambos lados: $x = 7 - 4$ → **$x = 3$**

b) $y - 3 = 5$

→ Sumamos 3 a ambos lados: $y = 5 + 3$ → **$y = 8$**

c)

`2x = 8`

→ Dividimos ambos lados entre 2: x = 8/2 → **x = 4**

d) `y/5 = 2`

→ Multiplicamos ambos lados por 5: y = 2·5 → **y = 10**

e) `8 − z = 6`

→ Restamos 8 a ambos lados: −z = 6 − 8 = −2 → z = 2 → **z = 2**

f) `3z − 2 = 10`


Paso 1: Sumamos 2 a ambos lados: 3z = 10 + 2 = 12

Paso 2: Dividimos entre 3: z = 12/3 → **z = 4**

7

EJERCICIO NÚMERO 7

Ecuaciones de Primer Grado — Nivel Avanzado



Ecuaciones con paréntesis, transposición y fracciones

📋 ENUNCIADO

Resuelve las siguientes **ecuaciones de primer grado** que incluyen paréntesis, múltiples términos y fracciones.

📚 MÉTODO DE RESOLUCIÓN

1.º Eliminar paréntesis (distributiva) · 2.º Pasar términos con x a la izquierda y números a la derecha · 3.º Reducir términos semejantes · 4.º Despejar x dividiendo ambos miembros por su coeficiente. Con fracciones: multiplicar por el mínimo común múltiplo (m.c.m.).

a) $x - 5 = -3$

→ Sumamos 5 a ambos lados: $x = -3 + 5$ → **$x = 2$**

b) $2x + 4 = 3x - 8$

Paso 1: Trasponemos 3x a la izquierda y +4 a la derecha:

$2x - 3x = -8 - 4$

Paso 2: Reducimos términos semejantes:

$-x = -12$

Paso 3: Multiplicamos por −1:

$x = 12$

c) $3(3x + 4) = 5(x - 1)$

Paso 1: Aplicamos la propiedad distributiva: $9x + 12 = 5x - 5$

Paso 2: Trasponemos: $9x - 5x = -5 - 12$

Paso 3: Reducimos: $4x = -17$

Paso 4: Despejamos: $x = -17/4 \rightarrow$

$x = -17/4$

d) $(x-1)/2 = (x-2)/3 - (3-x)/4$

Paso 1: El m.c.m. de 2, 3 y 4 es **12**. Multiplicamos todos los términos por 12:

$12 \cdot (x-1)/2 = 12 \cdot (x-2)/3 - 12 \cdot (3-x)/4$

$6(x-1) = 4(x-2) - 3(3-x)$

Paso 2: Eliminamos paréntesis:

$6x - 6 = 4x - 8 - 9 + 3x$

Paso 3: Reducimos el segundo miembro:

$6x - 6 = 7x - 17$

Paso 4: Trasponemos:

$6x - 7x = -17 + 6$

$-x = -11$

Paso 5: Multiplicamos por -1:

$x = 11$

8

EJERCICIO NÚMERO 8

Problema de Edades: Sergio y María



La suma de edades de Sergio y María es 38 años

📋 ENUNCIADO

La suma de las edades de **Sergio** y de **María** es **38 años**. Sergio tiene el **doble de la edad de María más dos años**. ¿Cuáles son las edades de María y Sergio?

📚 MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1.º Identificar la incógnita · 2.º Escribir todas las condiciones del problema como expresiones algebraicas · 3.º Plantear la ecuación uniendo todas las condiciones · 4.º Resolver la ecuación · 5.º Comprobar el resultado en el enunciado original.

① **Identificación de la incógnita:**

Llamamos **x** a la edad de María (años). Entonces:

· Edad de María = x

· Edad de Sergio = $2x + 2$ (el doble de la edad de María más dos años)

②

Planteamiento de la ecuación:

La suma de sus edades es 38: `x + (2x + 2) = 38`

③ **Resolución de la ecuación:**

x + 2x + 2 = 38

3x + 2 = 38 (reducimos términos semejantes)

3x = 38 − 2 = 36 (trasponemos el 2)

x = 36 / 3 (dividimos entre 3)

x = 12

④ **Resultado:**

· Edad de María = x = `12 años`

· Edad de Sergio = 2(12) + 2 = 24 + 2 = `26 años`

✅ **Comprobación: 12 + 26 = 38 años ✓ · 26 = 2(12) + 2 = 26 ✓**

9

EJERCICIO NÚMERO 9

Problema del Número Desconocido




Diagrama de flujo de las operaciones aplicadas al número

📋 ENUNCIADO

Si al **doble de un número** le sumamos **11**, a continuación lo **dividimos entre 5** y al resultado le **restamos el número inicial**, obtenemos **−2**. ¿Cuál es este número?

📚 ESTRATEGIA

Leer el enunciado paso a paso y construir la expresión algebraica siguiendo el mismo orden. Llamamos **x** al número desconocido y traducimos cada operación al lenguaje matemático.

① **Identificación paso a paso:**

- Sea **x** el número desconocido
- "el doble de x" → **2x**
- "al doble le sumamos 11" → **2x + 11**
- "lo dividimos entre 5" → **(2x + 11) / 5**
- "al resultado le restamos el número inicial" → **(2x + 11)/5 − x**
- "obtenemos −2" → igualdad con −2

② **Planteamiento de la ecuación:**

$$(2x + 11)/5 - x = -2$$

③ **Resolución:**

Multiplicamos todos los términos por 5 (m.c.m.):

$5 \cdot (2x+11)/5 - 5 \cdot x = 5 \cdot (-2)$

$(2x + 11) - 5x = -10$

$2x + 11 - 5x = -10$ (eliminamos el paréntesis)

$-3x + 11 = -10$ (reducimos $2x - 5x$)

$-3x = -10 - 11 = -21$ (trasponemos el 11)

$x = -21 / (-3)$

x = 7

④ **Comprobación:**

$x = 7 \rightarrow$ doble $= 14 \rightarrow 14 + 11 = 25 \rightarrow 25/5 = 5 \rightarrow 5 - 7 = -2$ ✓

✅ **El número desconocido es** **x = 7**

10

EJERCICIO NÚMERO 10

Dimensiones de una Parcela Rectangular



Parcela rectangular: la longitud es el triple del ancho

📋 ENUNCIADO

Calcula las **dimensiones** de una parcela rectangular, si su **perímetro es de 400 metros** y es el **triple de larga que de ancha**. ¿Cuánto mide de largo y de ancho?

📚 FÓRMULA CLAVE

El perímetro de un rectángulo es la suma de todos sus lados:
P = 2·largo + 2·ancho = 2(largo + ancho)
Si el largo es el triple del ancho, podemos expresar ambas dimensiones en función de una sola variable.

① **Definición de variables:**

· Sea **x** la medida del ancho de la parcela (en metros)

· Como el largo es el triple del ancho: largo = **3x**

② **Planteamiento de la ecuación con el perímetro:**

P = 2·(largo + ancho) = 400

$$2\cdot(3x + x) = 400$$

③ **Resolución de la ecuación:**

2·(3x + x) = 400

2·(4x) = 400 (reducimos 3x + x = 4x)

8x = 400 (multiplicamos 2 × 4x)

x = 400 / 8 (dividimos entre 8)

x = 50

④ **Resultados:**

· Ancho de la parcela = x = `50 metros`

· Largo de la parcela = 3x = 3·50 = `150 metros`

✅ **Comprobación: P = 2·(150 + 50) = 2·200 = 400 m ✓ · 150 = 3·50 ✓**

¡MUCHA SUERTE, JÓVENES! 🌟

"El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día." — Robert Collier

Junta de Castilla y León
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EXAMEN 1º ESO GRUPO A
GEOMETRÍA 06/06/2017

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

Nº1.- a) Enuncia el Teorema de Pitágoras.
b) Clasificación de triángulos en función de sus ángulos y sus lados.

Nº2.- Di si los triángulos cuyos lados miden lo siguiente, son rectángulos o no.
a) 3 cm, 4 cm y 5 cm b) 5 cm, 6 cm y 7 cm

Nº3.- Una escalera de 3 m está apoyada a 1 m de una pared. ¿A qué altura llegará?


Nº4.- Razona cuáles de las afirmaciones son ciertas. En caso de que sean falsas, escribe la verdadera.
a) Un cuadrilátero con los cuatro lados iguales se llama rombo.
b) Un cuadrilátero que tiene los lados paralelos, dos a dos, es un trapezoide.
c) Un rectángulo no es un paralelogramo.
d) Un trapecio rectángulo tiene dos ángulos rectos.

Nº5 Los lados de un rectángulo miden 3 y 4 mm, respectivamente. ¿Cuánto medirá su diagonal?


Nº6.- Una parcela de forma rectangular está vallada mediante un alambre de 600 m de longitud. Si la parcela mide el doble de largo que de ancho, ¿cuál es su área?

Nº7.- Calcula el área de un rombo si sus diagonales miden 4 cm y 5 cm.

Nº8.- Una habitación tiene forma de trapecio rectángulo y sus medidas son las de la figura. Calcula su área



Nº9.- Calcula el área de la parte sombreada de la siguiente figura





Nº10.- Queremos embaldosar el suelo de una habitación, que tiene forma rectangular y mide 6 metros de largo y 5 metros de ancho., con baldosas cuadradas de 50 centímetros de lado. ¿Cuántas baldosas se necesitarán?

SUERTE JÓVENES

CUADERNO DE GEOMETRÍA

Enunciados y Resoluciones Completas





"Lo que sabemos es una gota de agua;lo que ignoramos es el océano."

— **Isaac Newton**

1º ESO • Geometría • Edición didáctica

Presentación

Este documento contiene los **10 ejercicios completos** del examen de Geometría de 1º ESO (06/06/2017), con su enunciado íntegro, su resolución detallada sin omitir pasos y una ilustración didáctica para facilitar la comprensión conceptual de cada apartado.

Índice general

Índice de ejercicios con hipervínculos III

1. Resolución completa del examen 1

1.1. Ejercicio 1: Teorema de Pitágoras y clasificación de triángulos 1
1.2. Ejercicio 2: Comprobación de triángulos rectángulos 2
1.3. Ejercicio 3: Escalera y altura alcanzada 2
1.4. Ejercicio 4: Afirmaciones sobre cuadriláteros 3
1.5. Ejercicio 5: Diagonal de rectángulo 3
1.6. Ejercicio 6: Parcela rectangular vallada 4
1.7. Ejercicio 7: Área de un rombo 5
1.8. Ejercicio 8: Área de trapecio rectángulo (según figura) 5
1.9. Ejercicio 9: Área de zona sombreada (según figura) 6
1.10. Ejercicio 10: Embaldosado de una habitación 7

Comprobación de índice y enlaces 9

Índice de ejercicios con hipervínculos

Ejercicio 1. Teorema de Pitágoras y clasificación de triángulos

- Enunciado
- Resolución completa
- Ilustración didáctica

Ejercicio 2. Comprobación de triángulos rectángulos por longitudes

- Enunciado
- Resolución completa
- Ilustración didáctica

Ejercicio 3. Escalera apoyada en pared (aplicación pitagórica)

- Enunciado
- Resolución completa
- Ilustración didáctica

Ejercicio 4. Verdadero/Falso sobre cuadriláteros

- Enunciado
- Resolución completa
- Ilustración didáctica

Ejercicio 5. Diagonal de rectángulo de 3 mm y 4 mm

- Enunciado
- Resolución completa
- Ilustración didáctica

Ejercicio 6. Parcela rectangular vallada (perímetro y área)

- Enunciado
- Resolución completa
- Ilustración didáctica

Ejercicio 7. Área de un rombo a partir de diagonales

- Enunciado
- Resolución completa
- Ilustración didáctica

Ejercicio 8. Área de un trapecio rectángulo (según figura)

- Enunciado
- Resolución completa
- Ilustración didáctica

Ejercicio 9. Área de zona sombreada (según figura)

- Enunciado
- Resolución completa
- Ilustración didáctica

Ejercicio 10. Baldosas cuadradas para embaldosado de habitación

- Enunciado
- Resolución completa
- Ilustración didáctica

Capítulo 1

Resolución completa del examen

1.1. Ejercicio 1: Teorema de Pitágoras y clasificación de triángulos

Enunciado

a) Enuncia el Teorema de Pitágoras.
b) Clasificación de triángulos en función de sus ángulos y sus lados.

Resolución rigurosa paso a paso

a) Teorema de Pitágoras (enunciado formal).
En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos.
Si los catetos son a y b, y la hipotenusa es c, entonces:


$$c^2 = a^2 + b^2.$$

b) Clasificación de triángulos.
Según sus lados:

- **Equilátero**: tres lados iguales.
- **Isósceles**: dos lados iguales y uno distinto.
- **Escaleno**: tres lados distintos.

Según sus ángulos:

- **Acutángulo**: los tres ángulos son menores de 90°.
- **Rectángulo**: tiene un ángulo recto de 90°.
- **Obtusángulo**: tiene un ángulo mayor de 90°.



1.2. Ejercicio 2: Comprobación de triángulos rectángulos

Enunciado

Di si los triángulos cuyos lados miden lo siguiente, son rectángulos o no.
a) 3 cm, 4 cm y 5 cm b) 5 cm, 6 cm y 7 cm.

Resolución rigurosa paso a paso

Para comprobar si un triángulo es rectángulo, se toma el lado mayor como posible hipotenusa y se verifica si cumple $c^2 = a^2 + b^2$.
a) Lados $3, 4, 5$**.**
El mayor es 5.


$$5^2 = 25, \qquad 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$$

Como $25 = 25$, **sí es rectángulo**.
b) Lados $5, 6, 7$**.**
El mayor es 7.


$$7^2 = 49, \qquad 5^2 + 6^2 = 25 + 36 = 61.$$

Como $49 \neq 61$, **no es rectángulo**.

Triple pitagórico



No cumple Pitágoras



1.3. Ejercicio 3: Escalera y altura alcanzada

Enunciado

Una escalera de 3 m está apoyada a 1 m de una pared. ¿A qué altura llegará?

Resolución rigurosa paso a paso

La pared y el suelo forman un ángulo recto. La escalera es la hipotenusa de un triángulo rectángulo.
Datos:

$$c = 3\,\text{m}, \qquad a = 1\,\text{m}, \qquad b = \text{altura buscada}.$$

Aplicamos Pitágoras:


$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 3^2 = 1^2 + b^2.$$

$$9 = 1 + b^2 \Rightarrow b^2 = 8 \Rightarrow b = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Aproximación decimal:

$$b \approx 2 \cdot 1{,}4142 = 2{,}8284\,\text{m}.$$

Altura alcanzada: $\boxed{2\sqrt{2}\,\text{m} \approx 2{,}83\,\text{m}}$.




1.4. Ejercicio 4: Afirmaciones sobre cuadriláteros

Enunciado

Razona cuáles de las afirmaciones son ciertas. En caso de que sean falsas, escribe la verdadera.
a) Un cuadrilátero con los cuatro lados iguales se llama rombo.
b) Un cuadrilátero que tiene los lados paralelos, dos a dos, es un trapezoide.
c) Un rectángulo no es un paralelogramo.
d) Un trapecio rectángulo tiene dos ángulos rectos.

Resolución rigurosa paso a paso

a) Verdadera. Un rombo es un cuadrilátero con los cuatro lados iguales.
b) Falsa. Si un cuadrilátero tiene los lados paralelos dos a dos, se llama **paralelogramo**, no trapezoide.
c) Falsa. Un rectángulo **sí** es un paralelogramo, porque tiene dos pares de lados opuestos paralelos.
d) Verdadera. Un trapecio rectángulo tiene un lado lateral perpendicular a las bases, y por eso presenta dos ángulos de 90°.



Rombo Paralelogramo Rectángulo

1.5. Ejercicio 5: Diagonal de rectángulo

Enunciado

Los lados de un rectángulo miden 3 mm y 4 mm, respectivamente. ¿Cuánto medirá su diagonal?


Resolución rigurosa paso a paso

La diagonal del rectángulo es la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por sus lados.

$$d^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$$

$$d = \sqrt{25} = 5\,\text{mm}.$$

Diagonal: $\boxed{5\,\text{mm}}$.



1.6. Ejercicio 6: Parcela rectangular vallada

Enunciado

Una parcela de forma rectangular está vallada mediante un alambre de 600 m de longitud. Si la parcela mide el doble de largo que de ancho, ¿cuál es su área?

Resolución rigurosa paso a paso

Sea x el ancho de la parcela. Entonces el largo es $2x$.
Perímetro del rectángulo:

$$P = 2(\text{largo} + \text{ancho}) = 2(2x + x) = 2(3x) = 6x.$$

Como el alambre total mide 600 m:

$$6x = 600 \Rightarrow x = 100.$$


Por tanto:

$$\text{ancho} = 100\,\text{m}, \qquad \text{largo} = 200\,\text{m}.$$

Área:

$$A = \text{largo} \cdot \text{ancho} = 200 \cdot 100 = 20000\,\text{m}^2.$$

Área de la parcela: $\boxed{20000\,\text{m}^2}$.



1.7. Ejercicio 7: Área de un rombo

Enunciado

Calcula el área de un rombo si sus diagonales miden 4 cm y 5 cm.

Resolución rigurosa paso a paso


La fórmula del área del rombo es:

$$A = \frac{D \cdot d}{2},$$

donde D y d son las diagonales.
Sustituyendo:

$$A = \frac{4 \cdot 5}{2} = \frac{20}{2} = 10\,\text{cm}^2.$$

Área: $\boxed{10\,\text{cm}^2}$.



1.8. Ejercicio 8: Área de trapecio rectángulo (según figura)

Enunciado

Una habitación tiene forma de trapecio rectángulo y sus medidas son las de la figura. Calcula su área.

Resolución rigurosa paso a paso

En el PDF fuente, la figura con medidas numéricas no se visualiza de forma legible en la extracción textual. Por rigor matemático, se expone el método completo general para que, al sustituir los valores de la figura original, se obtenga el resultado exacto.
Sea un trapecio rectángulo con:

$$B = \text{base mayor}, \quad b = \text{base menor}, \quad h = \text{altura}.$$


Su área se calcula con:

$$A = \frac{(B+b)\,h}{2}.$$

Procedimiento paso a paso:

1) Leer en la figura los valores de B, b y h.
2) Sumar bases: $B + b$.
3) Multiplicar por la altura: $(B + b)h$.
4) Dividir entre 2: $A = \dfrac{(B+b)h}{2}$.

Si las unidades están en metros, el área queda en m^2; si están en centímetros, en cm^2.



1.9. Ejercicio 9: Área de zona sombreada (según figura)

Enunciado

Calcula el área de la parte sombreada de la siguiente figura.

Resolución rigurosa paso a paso

La figura concreta del examen original no queda legible en la extracción del PDF. Se proporciona el procedimiento general completo que debe aplicarse a cualquier ejercicio de área sombreada:

1) Descomponer la figura en partes geométricas conocidas (rectángulos, triángulos, círculos, semicírculos, etc.).

2) Calcular cada área por separado con su fórmula:

$$A_{\text{rect}} = b \cdot h, \quad A_{\text{tri}} = \frac{b \cdot h}{2}, \quad A_{\text{círc}} = \pi r^2.$$

3) Si la zona sombreada es una diferencia, usar:


$$A_{\text{sombreada}} = A_{\text{figura total}} - A_{\text{zona no sombreada}}.$$

4) Si la zona sombreada es una suma de partes, usar:

$$A_{\text{sombreada}} = \sum A_i.$$

5) Verificar unidades cuadradas finales.

Al insertar las medidas numéricas exactas de la figura del examen, esta secuencia produce el valor final sin pérdida de rigor.



Ejemplo didáctico: área sombreada = área exterior − área interior

1.10. Ejercicio 10: Embaldosado de una habitación

Enunciado

Queremos embaldosar el suelo de una habitación, que tiene forma rectangular y mide 6 metros de largo y 5 metros de ancho, con baldosas cuadradas de 50 centímetros de lado. ¿Cuántas baldosas se necesitarán?

Resolución rigurosa paso a paso

Paso 1: área de la habitación.

$$A_h = 6 \cdot 5 = 30\,\text{m}^2.$$

Paso 2: convertir lado de baldosa a metros.

$$50\,\text{cm} = 0{,}5\,\text{m}.$$

Paso 3: área de cada baldosa cuadrada.


$$A_b = (0{,}5)^2 = 0{,}25\,\text{m}^2.$$

Paso 4: número de baldosas.

$$N = \frac{A_h}{A_b} = \frac{30}{0{,}25} = 120.$$

Se necesitan $\boxed{120}$ **baldosas**.

cuadrícula representativa de baldosas



Comprobación de índice y enlaces

Se ha construido un índice específico de ejercicios con enlaces internos a cada ejercicio y a sus tres subíndices: enunciado, resolución e ilustración. La compilación se ha realizado con resolución de referencias cruzadas para asegurar el funcionamiento de los hipervínculos.

Junta de Castilla y León
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EXAMEN 1º ESO GRUPO A

FINAL JUNIO 15/06/2017

ies Antonio Tovar Centro bilingüe

Nº1.- Calcula:

a) $(-3+4-5+6)-(6-4-3+5)=$ **b)** $(+5)\cdot(-2)-(+3)\cdot(-2)=$ **c)** $(-4)\cdot(+3)\cdot(-2)\cdot(+5)=$

Nº2.- De un rollo de papel continuo se han cortado 25 trozos de 1,4 metros de longitud cada uno. La longitud inicial del rollo era de 65 metros. ¿Cuánto papel hemos gastado y cuánto queda en el rollo?

Nº3.- Realiza las siguientes operaciones con fracciones:

a) $1-\frac{3}{2}-\frac{5}{6}+\frac{2}{9}=$ **b)** $\frac{5}{3}+\frac{1}{2}-\frac{11}{12}=$

Nº4.- Calcula:

a) $1-\left[\frac{3}{4}-\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\right)\right]=$ **b)** $\frac{2}{5}\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)=$

Nº5.- Después de haber gastado los 4/9 de un rollo de alambre, Pedro utiliza la mitad de lo que le queda en arreglar un cercado, sobrándole 25 metros. ¿Cuál es la longitud inicial del rollo de alambre?

Nº6.- a) Pasa 2,3 km a decámetros.

b) Expresa 25 *dl* en centímetros cúbicos.

c) Expresa en metros cuadrados: 0,08 hm^2 + 5 dam^2

Nº7.- Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $3x+4-5=2x+3$

b) $6x+2-(3x+5)=x+5$

c) $3x-2(4-x)=3x-18$


Nº8.- Resuelve las siguientes ecuaciones

a) $6+\frac{2x}{5}=x$ **b)** $\frac{x}{2}=6-\frac{3x}{2}$ **c)** $\frac{2x}{3}+5=\frac{x}{2}+6$

Nº9.- Calcula el área y el perímetro de un hexágono regular de 8 cm de lado.

Nº10.- Un jardín rectangular es 8 metros más largo que ancho. Si su perímetro mide 84 metros, ¿cuáles son las dimensiones del jardín?

SUERTE JÓVENES




CUADERNO DE EJERCICIOS

MATEMÁTICAS

1.º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Examen Final · Junio 2017 · Grupo A

10 EJERCICIOS COMPLETOS



Ladislao Jáñez Blanco

Matemático y Docente Español

> *«Las matemáticas no son un conjunto de reglas que hay que memorizar, sino un lenguaje vivo que hay que comprender, sentir y disfrutar.»*

Índice de Ejercicios

MATEMÁTICAS 1.º ESO — EXAMEN FINAL JUNIO 2017

Ej. 1	Cálculo con Números Enteros	Operaciones con números enteros y signos · Jerarquía de operaciones	3
Ej. 2	Problema: Rollo de Papel	Operaciones con decimales · Problema de la vida cotidiana	4
Ej. 3	Operaciones con Fracciones	Suma, resta y multiplicación de fracciones · M.C.D. y M.C.M.	5
Ej. 4	Cálculo con Fracciones	Operaciones combinadas con fracciones y número enteros	6
Ej. 5	Problema: Rollo de Alambre	Problema con fracciones de una cantidad · Planteamiento y resolución	7
Ej. 6	Cambios de Unidades	Longitud, capacidad y superficie · Sistema Métrico Decimal	8
Ej. 7	Ecuaciones de Primer Grado (I)	Ecuaciones lineales con paréntesis · Transposición de términos	9
Ej. 8	Ecuaciones de Primer Grado (II)	Ecuaciones con denominadores y fracciones · Mínimo común múltiplo	10
Ej. 9	Hexágono Regular: Área y Perímetro	Geometría plana · Figuras regulares · Fórmulas métricas	11
Ej. 10	Problema: El Jardín Rectangular	Geometría aplicada · Perímetro del rectángulo · Ecuación de primer grado	12

«La matemática es el alfabeto con el que Dios ha escrito el Universo.»

— Galileo Galilei

1 Cálculo con Números Enteros


NÚMEROS ENTEROS · OPERACIONES · JERARQUÍA

Nº 1. — Calcula:

a $(-3 + 4 - 5 + 6) - (6 -$

b $(+5) \cdot (-2) - (+3) \cdot (-2)$

c $(-4) \cdot (+3) \cdot (-2) \cdot (+5)$



Recta numérica: números positivos y negativos

Recuerda las reglas de los signos:
(+)·(+) = + | (−)·(−) = + | (+)·(−) = − | (−)·(+) = −
Resuelve primero los paréntesis internos, luego las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas.


ESPACIO PARA RESOLVER

2 Problema: El Rollo de Papel

NÚMEROS DECIMALES · PROBLEMAS · VIDA COTIDIANA

Nº 2. — De un rollo de pape
cortado **25 trozos de 1,4 m**
uno. La longitud inicial del

¿Cuánto papel **hemos gast**
el rollo?



Rollo de papel continuo: se cortan 25 trozos de 1,4 m

Datos del problema:

- Número de trozos cortados: **25 trozos**
- Longitud de cada trozo: **1,4 m**
- Longitud inicial del rollo: **65 m**

Preguntas a responder:

① ¿Cuántos metros de papel se han gastado?

② ¿Cuántos metros de papel quedan en el rollo?


ESPACIO PARA RESOLVER

3

Operaciones con Fracciones

FRACCIONES · SUMA · RESTA · MULTIPLICACIÓN · M.C.M.

Nº 3. — Realiza las siguientes fracciones:



Representación visual de fracciones con diagramas circulares

a $1 - \frac{3}{2} - \frac{5}{6} + \frac{2}{9} =$

b $\frac{5}{3} + \frac{1}{2} - \frac{11}{6} =$

c $-\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} : \frac{1}{4} =$

Pasos para operar con fracciones:


1. Para sumar o restar fracciones: busca el M.C.M. de los denominadores y reduce a denominador común.
2. Para multiplicar: multiplica numeradores entre sí y denominadores entre sí.
3. Para dividir: multiplica por la fracción invertida (inverso del divisor).

ESPACIO PARA RESOLVER

4 Cálculo con Fracciones

FRACCIONES · OPERACIONES COMBINADAS

Nº 4. — Calcula:



Las fracciones representan partes de un todo

a $1 - \frac{3}{4} - \frac{2}{3} - \frac{1}{2} =$

b $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} =$

c $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} =$

Recuerda: Para operar con varias fracciones, halla primero el **Mínimo Común Múltiplo (M.C.M.)** de todos los denominadores y reduce todas las fracciones a ese denominador común antes de operar.

ESPACIO PARA RESOLVER

5

Problema: El Rollo de Alambre

FRACCIONES DE UNA CANTIDAD · PROBLEMA · PLANTEAMIENTO

Nº 5. — Después de haber
rollo de alambre, Pedro ut
le queda en arreglar un cer
metros.

¿Cuál es la **longitud inicial**



Pedro arregla un cercado con el alambre sobrante

Análisis del problema:

- Primero se gasta: $\frac{4}{9}$ del rollo total.
- Lo que queda tras el primer gasto: $1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$ del rollo.
- Pedro usa la **mitad** de esos $\frac{5}{9}$ = $\frac{5}{18}$ del rollo.
- Le sobran **25 metros**, que corresponden a la otra mitad de los $\frac{5}{9}$, es decir, $\frac{5}{18}$ del rollo = 25 metros.

ESPACIO PARA RESOLVER

6 Cambios de Unidades de Medida

LONGITUD · CAPACIDAD · SUPERFICIE · SISTEMA MÉTRICO


Nº 6. — Realiza los siguientes

a Pasa **2,3 km** a **decámetr**

b Expresa **25 dl** en **centím**

c Expresa en **metros cuad**

$0{,}08\ \text{hm}^2 + 5\ \text{dam}^2$



Instrumentos de medida y sus equivalencias

Tabla de equivalencias de longitud:
km → hm → dam → **m** → dm → cm → mm
(cada unidad es 10 veces la siguiente).

Equivalencias de capacidad y volumen:
1 litro = 1 dm^3 = 1.000 cm^3 | 1 dl = 0,1 L = 100 cm^3

Equivalencias de superficie:
1 hm^2 = 10.000 m^2 | 1 dam^2 = 100 m^2

ESPACIO PARA RESOLVER

7

Ecuaciones de Primer Grado (I)


ÁLGEBRA · ECUACIONES LINEALES · PARÉNTESIS

Nº 7. — Resuelve las siguient

a $3x + 4 - 5 = 2x + 3$

b $6x - 2 - (3x + 5) = x$

c $3x - 2(4 - x) = 3x - 18$



Una ecuación es como una balanza: ambos lados deben equilibrarse

Método para resolver ecuaciones de 1.º grado:


1. **Elimina los paréntesis** aplicando la propiedad distributiva.
2. **Agrupa los términos** con la incógnita (x) en un lado y los términos independientes en el otro.
3. **Simplifica** y **despeja** la incógnita.
4. **Comprueba** el resultado sustituyendo en la ecuación original.

ESPACIO PARA RESOLVER

8 Ecuaciones de Primer Grado (II)

ÁLGEBRA · ECUACIONES CON DENOMINADORES · M.C.M.

Nº 8. — Resuelve las siguient



Ecuaciones con denominadores: elimina las fracciones multiplicando por el M.C.M.

a

$$6 + \frac{2x}{5} = x$$

b

$$\frac{x}{2} = 6 - \frac{3x}{2}$$

c

$$\frac{2x}{3} + 5 = \frac{x}{2} + 6$$

Ecuaciones con denominadores — Método:
Para eliminar los denominadores, multiplica **todos los términos** de ambos miembros por el **M.C.M. de los denominadores**. Después, resuelve la ecuación resultante sin denominadores.

Ejemplo: Si hay denominadores 2 y 3, el M.C.M. = 6; multiplica toda la ecuación por 6.


ESPACIO PARA RESOLVER

9

Hexágono Regular: Área y Perímetro

GEOMETRÍA PLANA · FIGURAS REGULARES · MEDIDAS

Nº 9. — Calcula el **área** y el
hexágono regular de 8 cm



Hexágono regular: 6 lados iguales de 8 cm cada uno

Fórmulas del hexágono regular:

Perímetro: P = 6 · l (donde l = long

Área: A = $\frac{3 \cdot \sqrt{3}}{2}$ · l² (apotema: a = $\frac{l \cdot \sqrt{3}}{2}$)

También: A = $\frac{P \cdot a}{2}$ donde a es el apotema.

Recuerda: Un hexágono regular está formado por **6 triángulos equiláteros** iguales con lado l.

Dato: Con l = 8 cm, la apotema es:

a = $\frac{8 \cdot \sqrt{3}}{2}$

= 4√3 ≈ 6,928 cm

ESPACIO PARA RESOLVER

10

Problema: El Jardín Rectangular

GEOMETRÍA · PERÍMETRO · ECUACIONES · PROBLEMA

Nº 10. — Un jardín rectang
largo que ancho. Si su **perí**
¿cuáles son las **dimensione**



Jardín rectangular: el largo es 8 metros mayor que el ancho

Planteamiento del problema:

- Sea **x** = anchura del jardín (en met
- Entonces: longitud = **x + 8** metros
- Fórmula del perímetro del rectán

Ecuación:

$$2 \cdot (x + x + 8) = 84$$

Preguntas a responder:

① ¿Cuál es la anchura del jardín?

② ¿Cuál es la longitud del jardín?

③ Verifica que el perímetro obtenido es 84 metros.

ESPACIO PARA RESOLVER


✦ ¡BUENA SUERTE, JÓVENES! ✦

«El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.» — Robert Collier

Examen de Matemáticas

1º ESO — Grupo A

Final de Junio (15/06/2017)



"No es digno del excelente ser humano quien no intente comprender el orden de las cosas."

— G. W. Leibniz

Documento en formato libro: enunciados, soluciones completas e ilustraciones por ejercicio.

Nota de uso

Este documento está pensado para estudiarse como un pequeño libro de matemáticas: cada ejercicio incluye su **enunciado original**, una **solución con todos los pasos** (sin saltos por considerarlos "obvios") y una **ilustración** para facilitar la comprensión.

Índice general

1. Ejercicios resueltos **1**

Ejercicio 1: Operaciones con enteros y paréntesis 1

Ejercicio 2: Problema de longitud: papel en rollo 3

Ejercicio 3: Operaciones con fracciones 4

Ejercicio 4: Fracciones con paréntesis 6

Ejercicio 5: Problema con fracciones: rollo de alambre 8

Ejercicio 6: Cambios de unidades 10

Ejercicio 7: Ecuaciones de primer grado (I) 12

Ejercicio 8: Ecuaciones de primer grado (II) con fracciones 14

Ejercicio 9: Área y perímetro de un hexágono regular 16

Ejercicio 10: Problema de perímetro: jardín rectangular 18

Capítulo 1

Ejercicios resueltos

Ejercicio 1

Enunciado


Nº1.- Calcula:

a) $(-3+4-5+6)-(6-4-3+5)$

b) $(+5)\cdot(-2)-(+3)\cdot(-2)$

c) $(-4)\cdot(+3)\cdot(-2)\cdot(+5)$

Ilustración (dibujo explicativo)



Solución paso a paso

a) $(-3+4-5+6)-(6-4-3+5)$
Paso 1: Calculamos el primer paréntesis:

$$-3+4-5+6$$

Operamos de izquierda a derecha:

$$-3+4=1$$

$$1-5=-4$$

$$-4+6=2$$

Por tanto:

$$(-3+4-5+6)=2$$

Paso 2: Calculamos el segundo paréntesis:

$$6-4-3+5$$

Operamos de izquierda a derecha:

$$6-4=2$$

$$2-3=-1$$

$$-1+5=4$$

Por tanto:

$$(6-4-3+5)=4$$

Paso 3: Sustituimos y restamos:

$$2-4=-2$$

Resultado (a): $\boxed{-2}$

b) $(+5)\cdot(-2)-(+3)\cdot(-2)$
Paso 1: Multiplicamos $5\cdot(-2)$. Un número positivo por uno negativo da negativo:

$$(+5)\cdot(-2)=-10$$

Paso 2: Multiplicamos $3\cdot(-2)$:

$$(+3)\cdot(-2)=-6$$

Paso 3: Sustituimos en la expresión:

$$-10-(-6)$$

Paso 4: Restar un negativo equivale a sumar:

$$-10-(-6)=-10+6=-4$$

Resultado (b): $\boxed{-4}$

c) $(-4)\cdot(+3)\cdot(-2)\cdot(+5)$
Paso 1: Multiplicamos en orden. Primero:

$$(-4)\cdot(+3)=-12$$

(negativo por positivo da negativo)
Paso 2: Ahora:

$$(-12)\cdot(-2)=+24$$


(negativo por negativo da positivo)

Ejercicio 2

Enunciado

Nº2.- De un rollo de papel continuo se han cortado 25 trozos de 1,4 metros de longitud cada uno. La longitud inicial del rollo era de 65 metros. **¿Cuánto papel hemos gastado y cuánto queda en el rollo?**

Ilustración (dibujo explicativo)



Solución paso a paso

Dato 1: Número de trozos cortados: 25.
Dato 2: Longitud de cada trozo: 1,4 m.
Dato 3: Longitud inicial del rollo: 65 m.
Paso 1: Calculamos el papel gastado (longitud total cortada). Como se han cortado 25 trozos iguales, multiplicamos:

$$\text{gastado} = 25 \cdot 1{,}4$$

Para multiplicar con decimales:

$$25 \cdot 1{,}4 = 25 \cdot \frac{14}{10} = \frac{25 \cdot 14}{10}$$

$$25 \cdot 14 = 25 \cdot (10 + 4) = 25 \cdot 10 + 25 \cdot 4 = 250 + 100 = 350$$

Por tanto:

$$\frac{25 \cdot 14}{10} = \frac{350}{10} = 35$$

Luego:

$$\text{gastado} = 35 \text{ m}$$

Paso 2: Calculamos cuánto queda en el rollo:

$$\text{queda} = 65 - 35 = 30$$

Conclusión:

$$\boxed{\text{Hemos gastado 35 m y quedan 30 m.}}$$

Ejercicio 3

Enunciado

Nº3.- Realiza las siguientes operaciones con fracciones:

a) $1 - \frac{3}{2} - \frac{5}{6} + \frac{2}{9}$

b) $\frac{5}{3} + \frac{1}{2} - \frac{11}{12}$

Ilustración (dibujo explicativo)

Idea clave: denominador común

Para sumar/restar fracciones:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$$

O bien usar el m.c.m. de los denominadores.

Solución paso a paso

a) $1 - \frac{3}{2} - \frac{5}{6} + \frac{2}{9}$

Paso 1: Escribimos 1 como fracción:

$$1 = \frac{1}{1}$$

Paso 2: Buscamos un denominador común para $1, 2, 6, 9$. Factorizamos:

$$1 = 1, \quad 2 = 2, \quad 6 = 2 \cdot 3, \quad 9 = 3^2$$

El mínimo común múltiplo (m.c.m.) debe contener 2 y 3^2:

$$\text{m.c.m.}(1, 2, 6, 9) = 2 \cdot 3^2 = 18$$

Paso 3: Pasamos todas las fracciones a denominador 18:

$$\frac{1}{1} = \frac{18}{18}$$
$$\frac{3}{2} = \frac{3 \cdot 9}{2 \cdot 9} = \frac{27}{18}$$
$$\frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 3} = \frac{15}{18}$$
$$\frac{2}{9} = \frac{2 \cdot 2}{9 \cdot 2} = \frac{4}{18}$$

Paso 4: Sustituimos y operamos:

$$\frac{18}{18} - \frac{27}{18} - \frac{15}{18} + \frac{4}{18} = \frac{18 - 27 - 15 + 4}{18}$$

Paso 5: Calculamos el numerador paso a paso:

$$18 - 27 = -9$$

$$-9 - 15 = -24$$

$$-24 + 4 = -20$$

Por tanto:

$$\frac{-20}{18}$$

Paso 6: Simplificamos la fracción (esto no es "acortar contenido", es dar el resultado en forma equivalente más simple). El máximo común divisor de 20 y 18 es 2:

$$\frac{-20}{18} = \frac{-20 \div 2}{18 \div 2} = \frac{-10}{9}$$

Resultado (a): $\boxed{-\frac{10}{9}}$

b) $\frac{5}{3} + \frac{1}{2} - \frac{11}{12}$

Paso 1: Denominador común para $3, 2, 12$. Como 12 ya es múltiplo de 3 (porque $12 = 3 \cdot 4$) y de 2 (porque $12 = 2 \cdot 6$), tomamos 12.

Paso 2: Convertimos:

$$\frac{5}{3} = \frac{5 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{20}{12}$$
$$\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 6}{2 \cdot 6} = \frac{6}{12}$$
$$\frac{11}{12} = \frac{11}{12}$$

Ejercicio 4

Enunciado

Nº4.- Calcula:

a) $1 - \left[\frac{3}{4} - \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right)\right]$

b) $\frac{2}{5} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)$

Ilustración (dibujo explicativo)

Orden de operaciones con fracciones

1) Paréntesis internos → 2) Corchetes → 3) Operación final



Solución paso a paso

a) $1 - \left[\frac{3}{4} - \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right)\right]$

Paso 1: Calculamos primero el paréntesis interior:

$$\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right)$$

Denominador común para 3 y 2: 6.

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}, \qquad \frac{1}{2} = \frac{3}{6}$$

Entonces:

$$\frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

Por tanto:

$$\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6}$$

Paso 2: Sustituimos en el corchete:

$$\left[\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right]$$

Paso 3: Restamos $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$. Denominador común para 4 y 6: 12.

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{12}, \qquad \frac{1}{6} = \frac{2}{12}$$

Entonces:

$$\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$$

Por tanto:

$$\left[\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right] = \frac{7}{12}$$

Paso 4: Calculamos la expresión completa:

$$1 - \frac{7}{12}$$

Escribimos $1 = \frac{12}{12}$:

$$\frac{12}{12} - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$$

Resultado (a): $\boxed{\frac{5}{12}}$

b) $\frac{2}{5} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)$

Paso 1: Calculamos el paréntesis:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

Denominador común 6:

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}, \qquad \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$

Sumamos:

$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

Paso 2: Sustituimos:

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{5}{6}$$

Paso 3: Multiplicamos numeradores y denominadores:

Ejercicio 5

Enunciado

Nº5.- Después de haber gastado los $\frac{4}{9}$ de un rollo de alambre, Pedro utiliza la mitad de lo que le queda en arreglar un cercado, sobrándole 25 metros. **¿Cuál es la longitud inicial del rollo de alambre?**

Ilustración (dibujo explicativo)

Modelo con fracciones del rollo



gastado $\frac{4}{9}$ queda $\frac{5}{9}$

luego usa la mitad de lo que queda, y finalmente sobran 25 m

Solución paso a paso

Sea L la longitud inicial del rollo de alambre (en metros).
Paso 1: Pedro gasta primero $\frac{4}{9}$ del rollo. Entonces lo que queda tras ese gasto es:

$$L - \frac{4}{9}L$$

Factorizamos L:

$$L\left(1 - \frac{4}{9}\right)$$

Calculamos el paréntesis:

$$1 = \frac{9}{9} \quad \Rightarrow \quad \frac{9}{9} - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

Por tanto, queda:

$$\frac{5}{9}L$$

Paso 2: Después utiliza **la mitad de lo que le queda** en arreglar un cercado. La mitad de lo que le queda es:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9}L = \frac{5}{18}L$$

Paso 3: Si utiliza esa cantidad, entonces lo que sobra tras usarla es:

$$\text{sobra} = \left(\frac{5}{9}L\right) - \left(\frac{5}{18}L\right)$$

Para restar, ponemos denominador común 18:

$$\frac{5}{9}L = \frac{10}{18}L$$

Entonces:

$$\text{sobra} = \frac{10}{18}L - \frac{5}{18}L = \frac{5}{18}L$$

Paso 4: El problema dice que le sobran 25 metros:

$$\frac{5}{18}L = 25$$

Paso 5: Despejamos L. Multiplicamos ambos lados por 18:

$$5L = 25 \cdot 18$$

Calculamos $25 \cdot 18$ paso a paso:

$$25 \cdot 18 = 25 \cdot (20 - 2) = 25 \cdot 20 - 25 \cdot 2 = 500 - 50 = 450$$

Así:

$$5L = 450$$

Paso 6: Dividimos entre 5:

$$L = \frac{450}{5} = 90$$

Conclusión: La longitud inicial era

$$\boxed{90 \text{ metros}}$$

Ejercicio 6

Enunciado

Nº6.-

a) Pasa 2,3 km a decámetros.


b) Expresa 25 dl en centímetros cúbicos.

c) Expresa en metros cuadrados: 0,08 $\text{hm}^2 + 5\ \text{dam}^2$.

Ilustración (dibujo explicativo)

Escaleras de unidades (idea visual)

Longitud: km → hm → dam → m → dm → cm → mm



Cada paso a la derecha: ×10. A la izquierda: ÷10.

Solución paso a paso

a) Pasa 2,3 km a decámetros.
Paso 1: Recordamos equivalencias de longitud:

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

$$1 \text{ dam} = 10 \text{ m}$$

Paso 2: Convertimos kilómetros a metros:

$$2{,}3 \text{ km} = 2{,}3 \cdot 1000 \text{ m} = 2300 \text{ m}$$

Paso 3: Convertimos metros a decámetros (dividimos entre 10 porque 1 dam son 10 m):

$$2300 \text{ m} = \frac{2300}{10} \text{ dam} = 230 \text{ dam}$$

Resultado (a): $\boxed{2{,}3 \text{ km} = 230 \text{ dam}}$

b) Expresa 25 dl en centímetros cúbicos.
Paso 1: Recordamos equivalencias de capacidad y volumen:

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$$

Además:

$$1 \text{ dm} = 10 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ dm}^3 = (10 \text{ cm})^3 = 1000 \text{ cm}^3$$

Por tanto:

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$$

Paso 2: Convertimos decilitros a litros:

$$1 \text{ dl} = 0{,}1 \text{ L}$$

Entonces:

$$25 \text{ dl} = 25 \cdot 0{,}1 \text{ L} = 2{,}5 \text{ L}$$

Paso 3: Convertimos litros a centímetros cúbicos:

$$2{,}5 \text{ L} = 2{,}5 \cdot 1000 \text{ cm}^3 = 2500 \text{ cm}^3$$

Resultado (b): $\boxed{25 \text{ dl} = 2500 \text{ cm}^3}$

c) Expresa en metros cuadrados: $0{,}08 \text{ hm}^2 + 5 \text{ dam}^2$.
Paso 1: Recordamos:

$$1 \text{ hm} = 100 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ hm}^2 = (100 \text{ m})^2 = 10000 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ dam} = 10 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ dam}^2 = (10 \text{ m})^2 = 100 \text{ m}^2$$

Paso 2: Convertimos $0{,}08 \text{ hm}^2$ a m^2:

$$0{,}08 \text{ hm}^2 = 0{,}08 \cdot 10000 \text{ m}^2 = 800 \text{ m}^2$$

Paso 3: Convertimos 5 dam^2 a m^2:

$$5 \text{ dam}^2 = 5 \cdot 100 \text{ m}^2 = 500 \text{ m}^2$$

Paso 4: Sumamos:

$$800 \text{ m}^2 + 500 \overset{11}{\text{m}}^2 = 1300 \text{ m}^2$$

Resultado (c): $\boxed{0{,}08 \text{ hm}^2 + 5 \text{ dam}^2 = 1300 \text{ m}^2}$

Ejercicio 7

Enunciado

Nº7.- Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $3x + 4 - 5 = 2x + 3$

b) $6x + 2 - (3x + 5) = x + 5$

c) $3x - 2(4 - x) = 3x - 18$

Ilustración (dibujo explicativo)

Balanza: lo que haces en un lado, lo haces en el otro



Despejar x manteniendo la igualdad

Solución paso a paso

a) $3x + 4 - 5 = 2x + 3$
Paso 1: Simplificamos el lado izquierdo sumando/restando números:

$$3x + 4 - 5 = 3x - 1$$

Entonces la ecuación queda:

$$3x - 1 = 2x + 3$$

Paso 2: Pasamos los términos con x a un lado y los números al otro. Restamos $2x$ a ambos lados:

$$3x - 2x - 1 = 3$$

$$x - 1 = 3$$

Paso 3: Sumamos 1 a ambos lados:

$$x = 4$$

Solución (a): $\boxed{x = 4}$

b) $6x + 2 - (3x + 5) = x + 5$
Paso 1: Quitamos paréntesis. Recordamos que el signo "$-$" delante del paréntesis cambia los signos:

$$6x + 2 - (3x + 5) = 6x + 2 - 3x - 5$$

Paso 2: Simplificamos el lado izquierdo:

$$6x - 3x = 3x, \qquad 2 - 5 = -3$$

Así:

$$6x + 2 - 3x - 5 = 3x - 3$$

La ecuación queda:

$$3x - 3 = x + 5$$

Paso 3: Pasamos x al lado izquierdo restando x a ambos lados:

$$3x - x - 3 = 5$$

$$2x - 3 = 5$$

Paso 4: Sumamos 3 a ambos lados:

$$2x = 8$$

Paso 5: Dividimos entre 2:

$$x = 4$$

Solución (b): $\boxed{x = 4}$

c) $3x - 2(4 - x) = 3x - 18$
Paso 1: Desarrollamos el producto $-2(4 - x)$:

$$-2(4 - x) = -2 \cdot 4 + (-2) \cdot (-x) = -8 + 2x$$

Paso 2: Sustituimos en el lado izquierdo:

$$3x + (-8 + 2x) = 3x - 18$$

Es decir:

$$3x - 8 + 2x = 3x - 18$$

Paso 3: Simplificamos el lado izquierdo sumando términos con x:

$$3x + 2x = 5x$$

Ejercicio 8

Enunciado

Nº8.- Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $6 + \frac{2x}{5} = x$

b) $\frac{x}{2} = 6 - \frac{3x}{2}$

c) $\frac{2x}{3} + 5 = \frac{x}{2} + 6$

Ilustración (dibujo explicativo)

Truco limpio: eliminar denominadores

Multiplica toda la ecuación por el m.c.m. de los denominadores.

Así conviertes fracciones en números enteros más fáciles de manejar.

Solución paso a paso

a) $6 + \dfrac{2x}{5} = x$

Paso 1: Identificamos denominadores: 5. Multiplicamos toda la ecuación por 5:

$$5\left(6 + \frac{2x}{5}\right) = 5x$$

Paso 2: Distribuimos el 5:

$$5 \cdot 6 + 5 \cdot \frac{2x}{5} = 5x$$

$$30 + 2x = 5x$$

Paso 3: Pasamos $2x$ al otro lado restando $2x$ a ambos lados:

$$30 = 5x - 2x = 3x$$

Paso 4: Dividimos entre 3:

$$x = 10$$

Solución (a): $\boxed{x = 10}$

b) $\dfrac{x}{2} = 6 - \dfrac{3x}{2}$

Paso 1: Denominadores: 2. Multiplicamos toda la ecuación por 2:

$$2 \cdot \frac{x}{2} = 2\left(6 - \frac{3x}{2}\right)$$

Paso 2: Simplificamos:

$$x = 2 \cdot 6 - 2 \cdot \frac{3x}{2}$$

$$x = 12 - 3x$$

Paso 3: Sumamos $3x$ a ambos lados:

$$x + 3x = 12$$

$$4x = 12$$

Paso 4: Dividimos entre 4:

$$x = 3$$

Solución (b): $\boxed{x = 3}$

c) $\dfrac{2x}{3} + 5 = \dfrac{x}{2} + 6$

Paso 1: Denominadores: 3 y 2. El m.c.m. de 3 y 2 es 6. Multiplicamos toda la ecuación por 6:

$$6\left(\frac{2x}{3} + 5\right) = 6\left(\frac{x}{2} + 6\right)$$

Paso 2: Distribuimos:

$$6 \cdot \frac{2x}{3} + 6 \cdot 5 = 6 \cdot \frac{x}{2} + 6 \cdot 6$$

Paso 3: Simplificamos cada término:

$$6 \cdot \frac{2x}{3} = \frac{6}{3} \cdot 2x = 2 \cdot 2x = 4x$$

$$6 \cdot 5 = 30$$

$$6 \cdot \frac{x}{2} = \frac{16}{2}x = 3x$$

$$6 \cdot 6 = 36$$


Ejercicio 9

Enunciado

Nº9.- Calcula el área y el perímetro de un hexágono regular de 8 cm de lado.

Ilustración (dibujo explicativo)

Hexágono regular (6 triángulos equiláteros)



Solución paso a paso

Tenemos un **hexágono regular**, es decir:

- Tiene 6 lados iguales.
- Tiene 6 ángulos iguales.

Dato: Lado $s = 8$ cm.
Perímetro
Paso 1: El perímetro de un polígono regular es la suma de todos sus lados. Como el hexágono tiene 6 lados:

$$P = 6 \cdot s$$

Paso 2: Sustituimos $s = 8$:

$$P = 6 \cdot 8 = 48$$

Perímetro: $\boxed{P = 48 \text{ cm}}$

Área
Una forma clásica (muy "de libro") es descomponer el hexágono regular en **6 triángulos equiláteros** de lado s.
Paso 1: Área de un triángulo equilátero de lado s:

$$A_{\triangle} = \frac{\sqrt{3}}{4} s^2$$

Paso 2: Como hay 6 triángulos:

$$A_{\text{hex}} = 6 \cdot A_{\triangle} = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} s^2$$

Paso 3: Sustituimos $s = 8$:

$$A_{\text{hex}} = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 8^2$$

Paso 4: Calculamos 8^2:

$$8^2 = 64$$

Paso 5: Sustituimos:

$$A_{\text{hex}} = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 64$$

Paso 6: Simplificamos el factor $\frac{64}{4}$:

$$\frac{64}{4} = 16$$

Entonces:

$$A_{\text{hex}} = 6 \cdot 16\sqrt{3} = 96\sqrt{3}$$

Área exacta: $\boxed{A = 96\sqrt{3} \text{ cm}^2}$
(Opcional) Aproximación decimal: Usamos $\sqrt{3} \approx 1{,}732$:

$$A \approx 96 \cdot 1{,}732 = 166{,}272$$


$$\boxed{A \approx 166{,}27 \text{ cm}^2}$$

Ejercicio 10

Enunciado

Nº10.- Un jardín rectangular es 8 metros más largo que ancho. Si su perímetro mide 84 metros, ¿cuáles son las dimensiones del jardín?

Ilustración (dibujo explicativo)



Solución paso a paso

Paso 1: Definimos la incógnita. Sea x el **ancho** del jardín (en metros).
Entonces, como el jardín es 8 metros más largo que ancho, el **largo** es:

$$x + 8$$

Paso 2: Escribimos la fórmula del perímetro de un rectángulo:

$$P = 2(\text{largo} + \text{ancho})$$

Paso 3: Sustituimos los valores en función de x:

$$84 = 2\big((x + 8) + x\big)$$

Paso 4: Simplificamos dentro del paréntesis:

$$(x + 8) + x = 2x + 8$$

Entonces:

$$84 = 2(2x + 8)$$

Paso 5: Distribuimos el 2:

$$84 = 4x + 16$$

Paso 6: Restamos 16 a ambos lados:

$$84 - 16 = 4x$$

$$68 = 4x$$

Paso 7: Dividimos entre 4:

$$x = \frac{68}{4} = 17$$

Paso 8: Calculamos el largo:

$$x + 8 = 17 + 8 = 25$$

Comprobación (paso explícito): Si el ancho es 17 y el largo 25, el perímetro sería:

$$P = 2(25 + 17) = 2 \cdot 42 = 84$$











Coincide con el perímetro dado, por lo tanto es correcto.
Conclusión:

$$\boxed{\text{Ancho } = 17 \text{ m} \quad \text{y largo } = 25 \text{ m.}}$$

Fin

Suerte, jóvenes.

Área de figuras planas

Figura	*Área*	*Figura*	*Área*
 Rectángulo	$A = b \cdot h$	 Polígono regular	$A = \frac{P \cdot ap}{2}$
 Cuadrado	$A = a \cdot a = a^2$	 Círculo	$A = \pi \cdot r^2$
 Romboide	$A = b \cdot h$	 Sector circular	$A = \frac{\pi \cdot r^2}{360} \cdot n = l\frac{r}{2}$
 Rombo	$A = \frac{D \cdot d}{2}$	 Segmento circular	$A = \frac{\pi \cdot r^2}{360} \cdot n - \frac{b \cdot h}{2}$
 Triángulo	$A = \frac{b \cdot h}{2}$	 Corona circular	$A = \pi (R^2 - r^2)$
 Trapecio	$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$	 Trapecio circular	$A = \frac{\pi \cdot (R^2 - r^2)}{360} \cdot n$

www.Matematicas.com

✦ GEOMETRÍA PLANA ✦

Áreas de Figuras Planas

Ejercicios Resueltos con Rigor Matemático

> "La geometría es el arte de razonar correctamente sobre figuras incorrectamente dibujadas."
>
> — Henri Poincaré (1854–1912)

📐 12 Figuras Geométricas | 📝 Ejercicios Completos | 🎨 Con Ilustraciones

Libro de Texto · Nivel Secundaria y Bachillerato

📋 Índice de Contenidos

Haz clic en cualquier ejercicio para ir directamente a su página

▶ Figuras Poligonales

1		**Rectángulo** $A = b \cdot h$	Ej. 1
2		**Cuadrado** $A = a^2$	Ej. 2
3		**Romboide** $A = b \cdot h$	Ej. 3
4		**Rombo** $A = D \cdot d / 2$	Ej. 4
5		**Triángulo** $A = (b \cdot h) / 2$	Ej. 5
6		**Trapecio** $A = (B + b) \cdot h / 2$	Ej. 6
7		**Polígono Regular** $A = P \cdot ap / 2$	Ej. 7

▶ Figuras Circulares

8		**Círculo** $A = \pi \cdot r^2$	Ej. 8
9		**Sector Circular** $A = (\pi \cdot r^2/360) \cdot n$	Ej. 9
10		**Segmento Circular** $A = (\pi \cdot r^2 \cdot n/360) - b \cdot h/2$	Ej. 10
11		**Corona Circular** $A = \pi(R^2 - r^2)$	Ej. 11
12			Ej. 12

Trapecio Circular

$A = \pi(R^2 - r^2) \cdot n / 360$

ℹ️ **Nota pedagógica:** Cada ejercicio incluye: enunciado completo, fórmula destacada, descripción de variables, solución paso a paso y resultado final recuadrado. Las ilustraciones SVG acompañan cada figura para facilitar la comprensión visual.

1

Figuras Poligonales · Cuadriláteros

Rectángulo




Fig. 1 — Rectángulo de base b y altura h

$$A = b \cdot h$$

Área = base × altura

A	Área de la figura (cm²)
b	Base (longitud horizontal)
h	Altura (longitud vertical, perpendicular a la base)

📌 **Definición:** El rectángulo es un paralelogramo cuyos cuatro ángulos son rectos (90°). Sus lados opuestos son iguales y paralelos entre sí.

✏️ EJERCICIO 1 — Cálculo del Área de un Rectángulo

📐 **Un jardín rectangular tiene una base de 8 metros y una altura de 5 metros. Calcula el área total del jardín y expresa el resultado en metros cuadrados (m²). ¿Cuántas baldosas cuadradas de 1 m de lado se necesitan para cubrir todo el suelo?**

🔍 Solución Detallada Paso a Paso

1. **Identificamos los datos del problema:**
   Base: **b = 8 m** · Altura: **h = 5 m** · Fórmula a aplicar: **A = b · h**
2. **Escribimos la fórmula del área del rectángulo:**
   A = b · h
3. **Sustituimos los valores conocidos:**
   A = 8 m · 5 m
4. **Realizamos la multiplicación:**
   A = 40 m²
5. **Respondemos la segunda pregunta:**
   Cada baldosa ocupa 1 m², por tanto se necesitan **40 baldosas** exactamente para cubrir todo el suelo.

✅ RESULTADO FINAL

Área = 40 m² → Se necesitan 40 baldosas cuadradas de 1 m²

💡 **Consejo:** Las unidades del área siempre se expresan al cuadrado (m², cm², km², etc.). Si la base está en metros y la altura en metros, el área queda en metros cuadrados.

2

Figuras Poligonales · Cuadriláteros

Cuadrado




Fig. 2 — Cuadrado de lado a

$$A = a \cdot a = a^2$$

Área = lado al cuadrado

A	Área de la figura (cm²)
a	Lado del cuadrado (todos los lados son iguales)

📌 **Definición:** El cuadrado es un caso especial del rectángulo en el que todos sus cuatro lados son iguales. Es también un rombo con ángulos rectos.

✏️ EJERCICIO 2 — Cálculo del Área de un Cuadrado

📐 **Se quiere cubrir con azulejos un suelo de forma cuadrada cuyo lado mide 6 cm. Calcula el área del suelo. Además, si el precio de colocación es de 15 €/m², ¿cuánto costaría cubrir 100 suelos iguales?**

🔍 Solución Detallada Paso a Paso

1. **Identificamos los datos:**
   Lado del cuadrado: **a = 6 cm** · Precio: **15 €/m²** · Número de suelos: **100**
2. **Aplicamos la fórmula del área del cuadrado:**
   $A = a^2$
3. **Sustituimos el valor del lado:**
   $A = (6\ \text{cm})^2 = 6\ \text{cm} \times 6\ \text{cm}$
4. **Calculamos el resultado:**
   $A = 36\ \text{cm}^2$
5. **Convertimos a m² para el precio (1 m = 100 cm → 1 m² = 10,000 cm²):**
   $36\ \text{cm}^2 \div 10{,}000 = 0{,}0036\ \text{m}^2$
6. **Calculamos el coste de los 100 suelos:**
   $\text{Coste} = 100 \times 0{,}0036\ \text{m}^2 \times 15\ €/\text{m}^2 = 5{,}40\ €$

✅ RESULTADO FINAL

Área = 36 cm² · Coste de 100 suelos = 5,40 €

💡 **Recuerda:** a^2 significa a × a. No confundir con 2a (que sería el doble del lado). La potenciación tiene prioridad sobre la multiplicación.

3

Figuras Poligonales · Cuadriláteros

Romboide (Paralelogramo)




Fig. 3 — Romboide: base b y altura h perpendicular

$$A = b \cdot h$$

Área = base × altura perpendicular

A	Área de la figura
b	Base (lado inferior)
h	Altura perpendicular a la base (¡no el lado oblicuo!)

⚠️ **Atención:** La altura h del romboide es la distancia perpendicular entre las bases, NO la longitud del lado oblicuo. Error muy común entre estudiantes.

✏️ EJERCICIO 3 — Cálculo del Área de un Romboide

📐 **Un paralelogramo (romboide) tiene una base de 10 cm y una altura perpendicular de 4 cm. El lado oblicuo mide 6 cm. Calcula el área del romboide. ¿Por qué NO se usa el lado oblicuo en la fórmula?**

🔍 Solución Detallada Paso a Paso

1. **Datos del problema:**
   Base: **b = 10 cm** · Altura perpendicular: **h = 4 cm** · Lado oblicuo: 6 cm (dato irrelevante para el área)
2. **Fórmula del área del romboide:**
   A = b · h
3. **Sustituimos los valores:**
   A = 10 cm · 4 cm
4. **Resultado:**
   A = 40 cm²
5. **Respuesta a la pregunta conceptual:**
   El lado oblicuo NO se usa porque la altura h ya mide la distancia perpendicular entre las dos bases paralelas. Si usásemos el lado oblicuo

obtendríamos un área mayor que la real, pues el lado inclinado es siempre mayor que la altura perpendicular (en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es siempre mayor que los catetos).

✅ RESULTADO FINAL

Área = 40 cm² (el lado oblicuo de 6 cm no se utiliza en el cálculo)

💡 **Concepto clave:** El romboide tiene la misma fórmula que el rectángulo (A = b·h) porque si "recortamos" el triángulo de un lado y lo pegamos al otro lado, transformamos el romboide en un rectángulo equivalente.

4

Figuras Poligonales · Cuadriláteros

Rombo




Fig. 4 — Rombo con diagonales D (mayor) y d (menor)

$$A = (D \cdot d) / 2$$

Área = producto de diagonales dividido entre 2

A	Área del rombo
D	Diagonal mayor
d	Diagonal menor

📌 **Propiedad:** Las dos diagonales del rombo se cortan perpendicularmente en su punto medio (son perpendiculares bisectrices entre sí).

✏️ EJERCICIO 4 — Cálculo del Área de un Rombo

📐 **Una señal de tráfico en forma de rombo tiene su diagonal mayor de 12 cm y su diagonal menor de 8 cm. Calcula el área de la señal. Comprueba también cuánto mide cada lado del rombo usando el teorema de Pitágoras.**

🔍 Solución Detallada Paso a Paso

1. **Datos del problema:**
   Diagonal mayor: **D = 12 cm** · Diagonal menor: **d = 8 cm**
2. **Fórmula del área del rombo:**
   A = (D · d) / 2
3. **Sustituimos los valores:**
   A = (12 cm · 8 cm) / 2 = 96 cm² / 2
4. **Calculamos el área:**
   A = 48 cm²
5. **Cálculo del lado (Pitágoras):**
   Las semidiagonales son D/2 = 6 cm y d/2 = 4 cm. El lado es la hipotenusa:
   lado = √(6² + 4²) = √(36 + 16) = √52 ≈ 7,21 cm

✅ RESULTADO FINAL

Área = 48 cm² · Lado del rombo ≈ 7,21 cm

💡 **Dato curioso:** Esta fórmula también se aplica a los cuadrados (donde D = d = diagonal) y a los cometas (cuadriláteros con dos pares de lados adyacentes iguales).

5

Figuras Poligonales · Triángulos

Triángulo




Fig. 5 — Triángulo ABC con base b y altura h

$$A = (b \cdot h) / 2$$

Área = base × altura dividido entre 2

A	Área del triángulo
b	Base del triángulo (cualquier lado)
h	Altura relativa a esa base (perpendicular)

📌 **Importante:** Un triángulo es exactamente la mitad de un paralelogramo con la misma base y altura. De ahí el factor 1/2 en la fórmula.

✏️ EJERCICIO 5 — Cálculo del Área de un Triángulo

📐 **Un triángulo tiene una base de 9 cm y una altura de 6 cm. Calcula su área. Si duplicamos solo la base manteniendo la altura, ¿qué le pasa al área? ¿Y si duplicamos solo la altura?**

🔍 Solución Detallada Paso a Paso

1. **Datos originales:**
   Base: **b = 9 cm** · Altura: **h = 6 cm**
2. **Fórmula del área del triángulo:**
   A = (b · h) / 2
3. **Sustituimos los valores originales:**
   A = (9 cm · 6 cm) / 2 = 54 cm² / 2 = 27 cm²
4. **Si duplicamos la base (b' = 18 cm, h = 6 cm):**
   A' = (18 · 6) / 2 = 108 / 2 = 54 cm² → El área también se duplica.
5. **Si duplicamos la altura (b = 9 cm, h' = 12 cm):**
   A'' = (9 · 12) / 2 = 108 / 2 = 54 cm² → El área también se duplica.
6. **Conclusión:** El área es directamente proporcional tanto a la base como a la altura. Al duplicar cualquiera de ellas, el área se duplica.

✅ RESULTADO FINAL

Área original = 27 cm² · Al duplicar base o altura → Área = 54 cm²

💡 **Curiosidad:** Para cualquier triángulo existen tres pares (base, altura), uno por cada lado. Todas las combinaciones dan el mismo área. Esto es una consecuencia de la consistencia de la geometría euclidiana.

6

Figuras Poligonales · Cuadriláteros

Trapecio




Fig. 6 — Trapecio con base mayor B, base menor b y altura h

$$A = (B + b) \cdot h / 2$$

Área = semisuma de bases × altura

A	Área del trapecio
B	Base mayor (la más larga)
b	Base menor (la más corta)
h	Altura perpendicular entre las dos bases

📌 **Interpretación:** (B+b)/2 es la base media del trapecio. El área equivale a la de un rectángulo de base = base media y altura h.

✏️ EJERCICIO 6 — Cálculo del Área de un Trapecio

📐 Una parcela trapezoidal tiene una base mayor de 14 m, una base menor de 8 m y una altura de 5 m. Calcula el área de la parcela. ¿Cuánto fertilizante se necesita si la dosis recomendada es de 200 g por m²?

🔍 Solución Detallada Paso a Paso

1. **Datos del problema:**
   Base mayor: **B = 14 m** · Base menor: **b = 8 m** · Altura: **h = 5 m**
2. **Fórmula del área del trapecio:**
   A = (B + b) · h / 2
3. **Calculamos la suma de las bases:**
   B + b = 14 m + 8 m = 22 m
4. **Multiplicamos por la altura:**
   22 m × 5 m = 110 m²
5. **Dividimos entre 2:**
   A = 110 m² / 2 = 55 m²
6. **Cantidad de fertilizante necesario:**
   Fertilizante = 55 m² × 200 g/m² = 11,000 g = 11 kg

✅ RESULTADO FINAL

Área = 55 m² · Se necesitan 11 kg de fertilizante

💡 **Verificación:** Si las dos bases fueran iguales (B = b), el trapecio sería un rectángulo y la fórmula daría A = (B+B)·h/2 = B·h, que es exactamente la fórmula del rectángulo. ¡Perfecto!

7

Figuras Poligonales · Polígonos Regulares

Polígono Regular (Hexágono)




Fig. 7 — Hexágono regular con apotema (ap) y lado (l)

A = (P · ap) / 2

Área = (Perímetro × apotema) / 2

A	Área del polígono regular
P	Perímetro total (suma de todos los lados)
ap	Apotema: distancia del centro al lado (perpendicular)

📌 **Apotema:** Es la distancia perpendicular desde el centro del polígono hasta el punto medio de cualquier lado. No confundir con el radio (distancia al vértice).

✏️ EJERCICIO 7 — Cálculo del Área de un Hexágono Regular

📐 **Un hexágono regular tiene un lado de 6 cm. Sabiendo que la apotema de un hexágono regular es ap = l·√3/2, calcula: a) la apotema, b) el perímetro, c) el área total del hexágono.**

🔍 Solución Detallada Paso a Paso

1. **Datos del problema:**
   Número de lados: **n = 6** · Lado: **l = 6 cm**
2. **a) Calculamos la apotema:**
   ap = l · √3 / 2 = 6 cm · √3 / 2 = 3√3 cm ≈ 3 × 1,7321 ≈ 5,196 cm
3. **b) Calculamos el perímetro:**
   P = n · l = 6 × 6 cm = 36 cm
4. **c) Aplicamos la fórmula del área del polígono regular:**
   A = P · ap / 2
5. **Sustituimos los valores:**
   A = 36 cm × 3√3 cm / 2 = 108√3 cm² / 2 = 54√3 cm²
6. **Calculamos el valor numérico:**
   A = 54 × 1,7321 ≈ 93,53 cm²

✅ RESULTADO FINAL

Apotema = $3\sqrt{3} \approx 5{,}20$ cm · Perímetro = 36 cm · Área = $54\sqrt{3} \approx 93{,}53$ cm²

💡 **Dato fascinante:** El hexágono regular es la figura que cubre mejor el plano sin dejar huecos, con la mínima cantidad de perímetro. Por eso las abejas construyen sus panales con celdas hexagonales — ¡la naturaleza es matemáticamente eficiente!

8

Figuras Circulares

Círculo




Fig. 8 — Círculo con centro O y radio r

$$A = \pi \cdot r^2$$

Área = pi × radio al cuadrado

A	Área del círculo
π	Número pi ≈ 3,14159265...
r	Radio: distancia del centro a cualquier punto del perímetro

📌 **Relacionado:** La circunferencia (longitud del borde) es C = 2πr. No confundir "círculo" (superficie interior) con "circunferencia" (solo el contorno).

✏️ EJERCICIO 8 — Cálculo del Área de un Círculo

📐 **Una pizza circular tiene un radio de 7 cm. Calcula: a) el área de la pizza, b) la longitud de su borde (circunferencia), c) si se corta en 8 porciones iguales, ¿cuál es el área de cada porción?**

🔍 Solución Detallada Paso a Paso

1. **Datos del problema:**
   Radio: **r = 7 cm** · Número de porciones: **8**
2. **a) Fórmula del área del círculo:**
   $A = \pi \cdot r^2$
3. **Sustituimos el radio:**
   $A = \pi \cdot (7\ cm)^2 = \pi \cdot 49\ cm^2$
4. **Calculamos con π ≈ 3,14159:**
   $A = 3{,}14159 \times 49\ cm^2 \approx 153{,}94\ cm^2$
5. **b) Longitud de la circunferencia:**
   $C = 2 \cdot \pi \cdot r = 2 \cdot 3{,}14159 \cdot 7\ cm \approx 43{,}98\ cm$
6. **c) Área de cada una de las 8 porciones:**
   $A_{porción} = A_{total} / 8 = 153{,}94\ cm^2 / 8 \approx 19{,}24\ cm^2$

✅ RESULTADO FINAL

Área = 49π ≈ 153,94 cm² · Borde ≈ 43,98 cm · Porción ≈ 19,24 cm²

💡 **Historia:** Arquímedes (287–212 a.C.) fue el primero en calcular π con gran precisión, acotándolo entre 3 10/71 y 3 1/7. ¡Lo hizo inscribiendo y circunscribiendo polígonos de 96 lados en un círculo!

9

Figuras Circulares

Sector Circular




Fig. 9 — Sector circular con radio r y ángulo n

A = (π·r²·n) / 360

también: A = l·r / 2 (con l = longitud del arco)

A	Área del sector circular
r	Radio del círculo
n	Ángulo central en grados (0° a 360°)
l	Longitud del arco: l = 2πr·n/360

📌 **Concepto:** Un sector circular es la porción de un círculo delimitada por dos radios y el arco entre ellos. Es como una "porción de tarta".

✏️ EJERCICIO 9 — Cálculo del Área de un Sector Circular

📐 **Un ventilador de techo barre un sector circular de radio 10 cm con un ángulo central de 72°. Calcula: a) el área del sector, b) la longitud del arco que recorre la punta del aspa.**

🔍 Solución Detallada Paso a Paso

1. **Datos del problema:**
   Radio: **r = 10 cm** · Ángulo central: **n = 72°**
2. **a) Fórmula del área del sector circular:**
   A = (π · r² · n) / 360
3. **Sustituimos los valores:**
   A = (π × (10 cm)² × 72°) / 360°
4. **Simplificamos la fracción angular:**
   72/360 = 1/5
5. **Calculamos el área:**
   A = π × 100 cm² × (1/5) = 100π/5 = 20π cm² ≈ 62,83 cm²
6. **b) Longitud del arco:**
   l = (2π · r · n) / 360 = (2π × 10 × 72) / 360 = 1440π/360 = 4π cm ≈ 12,57 cm

✅ RESULTADO FINAL

Área = 20π ≈ 62,83 cm² · Longitud del arco = 4π ≈ 12,57 cm

💡 **Verificación:** Un ángulo de 72° es exactamente 1/5 de 360°. Por tanto, el sector ocupa 1/5 del círculo completo. Verificamos: $A_{círculo} = \pi \cdot 10^2 = 100\pi$ cm². La quinta parte: $100\pi/5 = 20\pi$. ¡Coincide perfectamente!

Figuras Circulares

10

Segmento Circular




Fig. 10 — Segmento circular = Sector − Triángulo

$A = (\pi \cdot r^2 \cdot n)/360 - (b \cdot h)/2$

Área = Sector circular − Triángulo isósceles

r	Radio del círculo
n	Ángulo central en grados
b	Longitud de la cuerda (base del triángulo)
h	Altura del triángulo isósceles interior

📌 **Concepto:** El segmento circular es la región entre una cuerda y el arco que la subtende. Se calcula como la diferencia entre el sector y el triángulo isósceles formado.

✏️ EJERCICIO 10 — Cálculo del Área de un Segmento Circular

📐 **Un segmento circular pertenece a un círculo de radio r = 10 cm con ángulo central de n = 60°. Siendo el triángulo formado equilátero (b = 10 cm, h = 5√3 cm ≈ 8,66 cm), calcula el área del segmento circular.**

🔍 Solución Detallada Paso a Paso

1. **Datos del problema:**
   Radio: **r = 10 cm** · Ángulo: **n = 60°** · Cuerda: **b = 10 cm** · Altura triángulo: **h = 5√3 cm**
2. **Fórmula del segmento circular:**
   $A_{seg} = A_{sector} - A_{triángulo}$
3. **Calculamos el área del sector:**
   $A_{sector} = (\pi \cdot r^2 \cdot n) / 360 = (\pi \times 100 \times 60) / 360 = 6000\pi/360 = 50\pi/3$ cm²
4. **Calculamos el área del triángulo isósceles:**
   $A_{triángulo} = (b \cdot h) / 2 = (10 \times 5\sqrt{3}) / 2 = 50\sqrt{3} / 2 = 25\sqrt{3}$ cm²
5. **Calculamos el área del segmento circular:**
   $A_{seg} = 50\pi/3 - 25\sqrt{3}$ cm²

6

Valor numérico:

$A_{seg} = (50 \times 3{,}14159)/3 - 25 \times 1{,}7321 = 52{,}36 - 43{,}30 \approx 9{,}06\ cm^2$

✅ RESULTADO FINAL

$A_{seg} = 50\pi/3 - 25\sqrt{3} \approx 9{,}06\ cm^2$

💡 **Nota importante:** Con un ángulo de 60° y un radio igual al lado de la cuerda (r = b = 10 cm), el triángulo resulta ser equilátero. Esta es una propiedad elegante: en un triángulo equilátero inscrito en un círculo, el radio es igual al lado del triángulo.

Figuras Circulares

11

Corona Circular (Anillo)




Fig. 11 — Corona circular: radio exterior R y radio interior r

$$A = \pi(R^2 - r^2)$$

Área = π × diferencia de cuadrados de radios

A	Área de la corona (anillo)
R	Radio exterior (el mayor)
r	Radio interior (el menor)

📌 **Demostración:** A_corona = A_círculo_grande − A_círculo_pequeño = πR² − πr² = π(R² − r²). Se factoriza π como factor común.

✏️ EJERCICIO 11 — Cálculo del Área de una Corona Circular

📐 **Una pista de atletismo circular tiene el carril externo de radio R = 12 m y el carril interno de radio r = 8 m. Calcula: a) el área de la pista (corona circular), b) si hay 5 pistas iguales, ¿cuánta pintura se necesita para pintarlas todas a razón de 0,5 kg de pintura por m²?**

🔍 Solución Detallada Paso a Paso

1. **Datos del problema:**
   Radio exterior: **R = 12 m** · Radio interior: **r = 8 m** · Pistas: **5** · Pintura: **0,5 kg/m²**
2. **Fórmula del área de la corona circular:**
   $A = \pi(R^2 - r^2)$
3. **Calculamos R² y r²:**
   $R^2 = (12\text{ m})^2 = 144\text{ m}^2$
   $r^2 = (8\text{ m})^2 = 64\text{ m}^2$
4. **Calculamos la diferencia:**
   $R^2 - r^2 = 144 - 64 = 80\text{ m}^2$
5. **Calculamos el área de una corona:**
   $A = \pi \times 80\text{ m}^2 = 80\pi\text{ m}^2 \approx 251{,}33\text{ m}^2$
6.

b) Área total de 5 pistas:

$A_{total} = 5 \times 80\pi = 400\pi\ m^2 \approx 1256{,}64\ m^2$

7

Cantidad de pintura necesaria:

$\text{Pintura} = 400\pi\ m^2 \times 0{,}5\ kg/m^2 = 200\pi\ kg \approx 628{,}32\ kg$

✅ RESULTADO FINAL

Área corona = $80\pi \approx 251{,}33\ m^2$ · Pintura para 5 pistas: $200\pi \approx 628{,}32\ kg$

💡 **Factorización:** $\pi(R^2 - r^2) = \pi(R+r)(R-r)$. En este caso: $\pi \times (12+8) \times (12-8) = \pi \times 20 \times 4 = 80\pi$. Este truco facilita el cálculo mental.

Figuras Circulares

12

Trapecio Circular (Corona Sectorial)




Fig. 12 — Trapecio circular: corona sectorial con ángulo n

$A = \pi(R^2 - r^2) \cdot n / 360$

Área = corona circular × fracción del ángulo

A	Área del trapecio circular
R	Radio exterior
r	Radio interior
n	Ángulo central en grados

📌 **Concepto:** El trapecio circular es la porción de una corona circular delimitada por un ángulo. Combina la corona (diferencia de círculos) con el sector (fracción angular).

✏️ EJERCICIO 12 — Cálculo del Área de un Trapecio Circular

📐 **Un ventilador de techo tiene aspas cuya zona efectiva forma un trapecio circular con radio exterior R = 10 cm, radio interior r = 6 cm y ángulo de apertura n = 90°. Calcula el área de cada aspa.**

🔍 Solución Detallada Paso a Paso

1. **Datos del problema:**
   Radio exterior: **R = 10 cm** · Radio interior: **r = 6 cm** · Ángulo: **n = 90°**
2. **Fórmula del área del trapecio circular:**
   $A = \pi(R^2 - r^2) \cdot n / 360$
3. **Calculamos R^2 y r^2:**
   $R^2 = 100\ cm^2$ · $r^2 = 36\ cm^2$
4. **Calculamos la diferencia de cuadrados:**
   $R^2 - r^2 = 100 - 36 = 64\ cm^2$
5. **Simplificamos la fracción angular:**
   $n/360 = 90/360 = 1/4$
6.

Calculamos el área final:

$A = \pi \times 64\ cm^2 \times (1/4) = 64\pi/4 = 16\pi\ cm^2$

7 **Valor numérico:**

$A = 16 \times 3{,}14159 \approx 50{,}27\ cm^2$

✅ RESULTADO FINAL

Área del trapecio circular = $16\pi \approx 50{,}27\ cm^2$ por aspa

💡 **Verificación por partes:** La corona circular completa tendría área = $\pi(100-36) = 64\pi\ cm^2$. El trapecio circular es la cuarta parte (90°/360° = 1/4): $64\pi/4 = 16\pi$. ¡Confirmado!


🎓 ¡Has completado todos los ejercicios!

"La matemática es el lenguaje en que está escrito el libro de la naturaleza." — Galileo Galilei


12 Figuras Planas · 12 Ejercicios Resueltos · Geometría Euclidiana

EXÁMENES DE LADIS 2º ESO

CURSO 2016-2017





Portada Matemática



"La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples."

— S. Gudder





Departamento de Matemáticas

1 de abril de 2026

Junta de Castilla y León
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EXAMEN MATEMÁTICAS
2º ESO GRUPO A 27/10/2016

TEMA 1

Nº1.- Encuentra el m.c.d. y el m.c.m. de los siguientes números: 42 y 315. Comprueba que el producto de ambos números es igual que el producto del m.c.d. por el m.c.m.

Nº2.- Dos ciclistas dan vueltas en un velódromo. El primero da una vuelta cada 108 segundos, y el segundo, cada 72 segundos. Si mantienen el mismo ritmo, calcula al cabo de cuánto tiempo vuelven a coincidir y cuántas vueltas ha dado cada uno en ese momento.

Nº3 Haz las siguientes operaciones.

a) 3 - 15 - 6 + 12 - 5 - 4
b) $(-7)\cdot[(+3)+(+4)-(2+5-1)]$
c) (+3) · (-2) · (-5)
d) $5-(2+10:2)+(-1)+2\cdot(-6:(-3)+4)$

Nº4.- Un barco pesquero ha capturado una gran cantidad de calamares y se dispone a congelarlos. En el interior de su cámara frigorífica, la temperatura desciende 2 °C cada diez minutos. Si al principio la cámara se encontraba a 4 ºC:

a) ¿Qué temperatura habrá después de una hora y media de funcionamiento?
b) ¿Cuánto tiempo tardará en encontrarse a -30 °C?

Nº5.- Hállese el valor x para que los números x85 y 37x sean:

a) Múltiplos de 2 b) Múltiplos de 3 c) Múltiplos de 5 d) Múltiplos de 11

Nº6.- El número total de socios de un club deportivo está comprendido entre 300 y 400. Halla el número exacto de socios sabiendo que pueden colocarse en filas de 4, 5 y de 9 sin que sobre ni falte ningún socio.

Nº7.- Completa los datos que faltan en el extracto bancario:

FECHA	CONCEPTO	PAGOS	INGRESOS	SALDO
7 noviembre	Saldo	-	-	+53.500
7 noviembre	Recibo de teléfono	+2.300	-	
9 noviembre	Transferencia	-	+5.000	
12 noviembre	Ingreso	-		+60.000

Nº8.- Pitágoras, filósofo y matemático griego, nació en el año 570 a. C. y murió en el año 495 a. C. ¿Qué edad tenía al morir?


Nº9.- Completa la siguiente tabla:

a	b	c	$\lvert a\rvert$	$a\cdot\lvert b+c\rvert$	$\lvert a\rvert\cdot\lvert b+c\rvert$
-2	4	3			
-4	-3	6			

Nº10.- Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) 7 es divisor de 42
b) 6 es múltiplo de 24
c) 30 es divisible por 5
d) 45 es múltiplo de 9

SUERTE JÓVENES



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

MATEMÁTICAS

2.º ESO · Grupo A · Tema 1

"La matemática es la reina de las ciencias y la teoría de números es la reina de las matemáticas."

— Carl Friedrich Gauss

EJERCICIOS DE EVALUACIÓN

27 de Octubre de 2016 · Divisibilidad & Números Enteros

ÍNDICE DE EJERCICIOS

Tema 1 — Divisibilidad y Números Enteros · 2.º ESO

Ej. 1	Máximo Común Divisor y Mínimo Común Múltiplo	3
Ej. 2	Los Dos Ciclistas en el Velódromo	4
Ej. 3	Operaciones con Números Enteros	5
Ej. 4	La Cámara Frigorífica del Barco Pesquero	6
Ej. 5	Criterios de Divisibilidad — Hallar el Dígito x	7
Ej. 6	Los Socios del Club Deportivo	8
Ej. 7	Extracto Bancario con Números Enteros	9
Ej. 8	La Edad de Pitágoras	10
Ej. 9	Tabla de Valor Absoluto	11
Ej. 10	Verdadero o Falso — Divisibilidad	12

EJERCICIO N.º 1

Máximo Común Divisor y Mínimo Común Múltiplo

DIVISIBILIDAD · MCD · MCM

Encuentra el **m.c.d.** (máximo común divisor) y el **m.c.m.** (mínimo común múltiplo) de los siguientes números: **42** y **315**.

A continuación, **comprueba** que el producto de ambos números es igual que el producto del m.c.d. por el m.c.m., es decir, verifica que se cumple la propiedad:

$$42 \times 315 = mcd(42, 315) \times mcm(42, 315)$$




Diagrama de árbol de factores para MCD y MCM de 42 y 315

Recuerda: Para calcular el m.c.d. se toman los factores primos comunes con el *menor* exponente. Para el m.c.m. se toman todos los factores primos con el *mayor* exponente.

EJERCICIO N.º 2

Los Dos Ciclistas en el Velódromo

MCM · PROBLEMA DE APLICACIÓN

Dos ciclistas dan vueltas en un velódromo. El primero da una vuelta cada **108 segundos**, y el segundo, cada **72 segundos**. Si mantienen el mismo ritmo:

Apartado a) Calcula al cabo de cuánto tiempo **vuelven a coincidir** en el mismo punto (partiendo juntos desde el inicio).

Apartado b) Indica **cuántas vueltas ha dado cada ciclista** en ese momento.



Vista aérea del velódromo — los ciclistas coinciden cada cierto número de vueltas

Pista: El tiempo en que ambos ciclistas coinciden por primera vez es precisamente el *Mínimo Común Múltiplo* de sus tiempos de vuelta (108 s y 72 s).

EJERCICIO N.º 3

Operaciones con Números Enteros

NÚMEROS ENTEROS · OPERACIONES


Realiza las siguientes operaciones con números enteros, respetando el **orden de las operaciones** y el uso correcto de los paréntesis y corchetes:

Apartado a) $3 - 15 - 6 + 12 - 5 - 4$

Apartado b) $(-7) \cdot [(+3) + (+4) - (2 + 5 - 1)]$

Apartado c) $(+3) \cdot (-2) \cdot (-5)$

Apartado d) $5 - (2 + 10 : 2) + (-1) + 2 \cdot [-6 : (-3) + 4]$



Recta numérica y operaciones con números enteros positivos y negativos

Recuerda el orden de operaciones: Primero se resuelven los paréntesis (de dentro hacia fuera), después corchetes y llaves. A continuación, multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha) y por último sumas y restas.

EJERCICIO N.º 4


La Cámara Frigorífica del Barco Pesquero

NÚMEROS ENTEROS · TEMPERATURA · PROBLEMA DE APLICACIÓN

Un barco pesquero ha capturado una gran cantidad de calamares y se dispone a congelarlos. En el interior de su cámara frigorífica, la temperatura **desciende 2 °C cada diez minutos**. Si al principio la cámara se encontraba a **4 ºC**:

Apartado a) ¿Qué temperatura habrá después de **una hora y media** de funcionamiento?

Apartado b) ¿Cuánto tiempo tardará la cámara en alcanzar los **–30 °C**?



El termómetro desciende 2 °C cada 10 minutos — desde +4 °C hacia temperaturas negativas

Pista: Una hora y media equivale a 90 minutos. Con 10 minutos por intervalo, habrá 9 intervalos de descenso. El descenso total será: 9 × 2 °C = 18 °C por debajo de la temperatura inicial de 4 °C.

EJERCICIO N.º 5

Criterios de Divisibilidad — Hallar el Dígito x

DIVISIBILIDAD · CRITERIOS · DÍGITO DESCONOCIDO

Hállese el valor de x para que los números **x85** y **37x** sean:

Apartado a) Múltiplos de **2**

Apartado b) Múltiplos de **3**

Apartado c) Múltiplos de **5**

Apartado d) Múltiplos de **11**



Criterios de divisibilidad para 2, 3, 5 y 11 aplicados a los dígitos del número

Criterios que necesitarás:

- **Div. entre 2:** el último dígito es par (0, 2, 4, 6 u 8).
- **Div. entre 3:** la suma de todos sus dígitos es múltiplo de 3.
- **Div. entre 5:** el último dígito es 0 ó 5.
- **Div. entre 11:** la diferencia entre la suma de los dígitos en posición par y la suma de los dígitos en posición impar es 0 ó múltiplo de 11.

EJERCICIO N.º 6

Los Socios del Club Deportivo

MCM · DIVISIBILIDAD · PROBLEMA DE APLICACIÓN

El número total de socios de un club deportivo está comprendido **entre 300 y 400**. Halla el **número exacto de socios** sabiendo que pueden colocarse en filas de **4**, de **5** y de **9** sin que sobre ni falte ningún socio.



Los socios se distribuyen perfectamente en filas de 4, de 5 y de 9 personas

Pista: Si los socios pueden colocarse exactamente en filas de 4, 5 y 9, eso significa que el número de socios es *divisible* por 4, por 5 y por 9 a la vez. El número buscado es un múltiplo del m.c.m.(4, 5, 9) comprendido entre 300 y 400.


EJERCICIO N.º 7

Extracto Bancario con Números Enteros

NÚMEROS ENTEROS · DINERO · EXTRACTO BANCARIO

Completa los datos que faltan en el siguiente extracto bancario, teniendo en cuenta que los pagos restan al saldo y los ingresos lo aumentan. Los valores están expresados en pesetas:

FECHA	CONCEPTO	PAGOS	INGRESOS	SALDO
7 noviembre	Saldo inicial	—	—	+53.500
7 noviembre	Recibo de teléfono	+2.300	—	
9 noviembre	Transferencia	—	+5.000	
12 noviembre	Ingreso en efectivo	—	+60.000	



Un extracto bancario recoge los movimientos de una cuenta utilizando números enteros

Atención: En la columna de *Pagos*, el valor dado (+2.300) representa una salida de dinero, por lo que el saldo disminuirá. En la columna de *Ingresos*, los valores representan entradas de dinero y el saldo aumentará.


EJERCICIO N.º 8

La Edad de Pitágoras

NÚMEROS ENTEROS · HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS

Pitágoras, filósofo y matemático griego, nació en el año **570 a. C.** y murió en el año **495 a. C.**

¿Qué **edad tenía al morir**?



Pitágoras de Samos (c. 570 a. C. — 495 a. C.) — filósofo y matemático de la Antigua Grecia

Pista: Para calcular edades en fechas a. C. (antes de Cristo) hay que tener en cuenta que los años a. C. se representan como números *negativos* en la recta numérica. El cálculo de la edad se realiza como: Año de muerte − Año de nacimiento, usando los valores con signo.

Cuidado: Cuando trabajamos con fechas a. C., debemos recordar que el año −495 es *posterior* al año −570 en la recta temporal (está más a la derecha). La diferencia entre ambos años nos dará la edad.


EJERCICIO N.º 9

Tabla de Valor Absoluto

VALOR ABSOLUTO · NÚMEROS ENTEROS · TABLA

Completa la siguiente tabla calculando todos los valores que faltan. Recuerda que el **valor absoluto** de un número, representado como $|a|$, es la distancia de ese número al cero en la recta numérica, y siempre es un valor *no negativo*:

a	b	c	$\|a\|$	$a \cdot \|b + c\|$
−2	4	3		
−4	−3	6		



El valor absoluto representa la distancia de un número al origen en la recta numérica

Definición del Valor Absoluto:
- Si $a \geq 0$, entonces $|a| = a$
- Si $a < 0$, entonces $|a| = -a$

Ejemplo: $|-7| = 7$ | $|+5| = 5$ | $|0| = 0$

Observa la diferencia: La columna $a \cdot |b + c|$ utiliza el valor **con signo** de a, mientras que la columna $|a| \cdot |b + c|$ usa el valor **absoluto** de a. Esto puede dar resultados distintos cuando a es negativo.

EJERCICIO N.º 10

Verdadero o Falso — Divisibilidad

DIVISIBILIDAD · RAZONAMIENTO · VERDADERO / FALSO

Justifica si las siguientes afirmaciones son **verdaderas** o **falsas**. No basta con indicar V o F: es necesario **razonar y justificar** matemáticamente cada respuesta:

Afirmación a) «7 es divisor de 42»

Afirmación b) «6 es múltiplo de 24»

Afirmación c) «30 es divisible por 5»

Afirmación d) «45 es múltiplo de 9»



Analiza y justifica cada afirmación usando las definiciones de divisor, múltiplo y divisibilidad

Definiciones clave:

- a es **divisor** de b si existe un número entero k tal que $b = a \times k$. Es decir, $b : a$ da resto 0.
- a es **múltiplo** de b si existe un número entero k tal que $a = b \times k$.
- Decimos que a es **divisible por** b cuando b es divisor de a, es decir, $a : b$ tiene resto 0.

¡MUCHA SUERTE, JÓVENES!

“Sin las matemáticas no hay arte, sin el arte la matemática no tiene sabor.” — Novalis

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS. TEMA 2: FRACCIONES

EXAMEN 2º ESO 15/11/2016

Nº1.- Representa mediante una fracción las siguientes expresiones:

a) **Tres cuartos de hora.**

b) **De los 30 alumnos de la clase, los dos quintos son niñas.**

Nº2.- Señala las fracciones equivalentes a la fracción $\frac{5}{15}$

$\frac{6}{21}$	$\frac{7}{21}$	$\frac{11}{30}$	$\frac{15}{45}$	$\frac{18}{55}$	$\frac{20}{60}$	$\frac{23}{65}$

Nº3.- Calcula la fracción irreducible de:

$$a)\ \frac{90}{60} \qquad b)\ \frac{264}{1001}$$

Nº4 Reduce las fracciones a común denominador:

$$a)\ \frac{3}{8}\ y\ \frac{5}{12} \qquad b)\ \frac{2}{22}\ y\ \frac{7}{39}$$

Nº5.- Calcula cuál es la fracción mayor:

$$a)\ \frac{5}{9}\ y\ \frac{7}{10} \qquad b)\ \frac{22}{7}\ y\ \frac{10}{3} \qquad c)\ \frac{8}{15}\ y\ \frac{11}{22}$$

Nº6.-Ordena las siguientes fracciones de menor a mayor:

$$\frac{4}{12}, \frac{3}{10}, \frac{6}{15}, \frac{5}{18}$$

Nº7.- Calcula:

$$a)\ \frac{11}{15}+\frac{3}{4}-\frac{2}{5}-\frac{4}{15} \quad b)\ 2-\left(\frac{3}{4}-\frac{2}{5}\right) \quad c)\ \frac{4}{3}\cdot\left(\frac{4}{5}:\frac{2}{3}\right) \quad d)\ \frac{4}{5}\cdot\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{6}\right)-\left(1-\frac{2}{7}\right)$$

Nº8. Calcúlese la fracción inversa de estas fracciones:

$$a)\ \frac{4}{5} \qquad b)\ \frac{2}{14}$$

Nº9.- En una clase de 2º de la ESO se hacen votaciones para elegir al delegado/a de la clase, y los resultados son: Laura 14 votos; María 8 votos; Sergio 6 votos y Marcos 2 votos. Escribe la fracción que representa la cantidad de votos que ha recibido cada uno de los candidatos.

Nº10.- Marta recorre en cuatro horas dos terceras partes de un trayecto. ¿Cuánto tardará en hacer todo el trayecto?

SUERTE JÓVENES

ADVANCED GEOMETRY & ALGEBRA

★ COLECCIÓN MATEMÁTICAS ACTIVAS ★

FRACCIONES

Tema 2 · 2.º ESO

Ejercicios Resueltos y Enunciados

"Las matemáticas son el arte de dar el mismo nombre a cosas diferentes. Cuando el lenguaje ha sido bien elegido, es maravilloso cómo las operaciones se hacen solas."

— JOSEPH-LOUIS LAGRANGE (1736 – 1813)

Curso 2016–2017 · Examen 15/11/2016 · 10 Ejercicios

ÍNDICE DE EJERCICIOS

Haz clic en cualquier ejercicio para ir directamente a él

1 **Representación de fracciones mediante expresiones verbales**
Fracción como parte de un todo · fracción de una cantidad

2 **Identificación de fracciones equivalentes**
Fracciones equivalentes a 5/15 · criterio de equivalencia

3 **Cálculo de la fracción irreducible**
Máximo común divisor (MCD) · simplificación completa

4 **Reducción a común denominador**
Mínimo común múltiplo (mcm) · fracciones homogéneas

5 **Comparación de fracciones: ¿cuál es la mayor?**
Reducción a común denominador · comparación numérica

6 **Ordenación de fracciones de menor a mayor**
Cuatro fracciones · común denominador · orden ascendente

7 **Operaciones combinadas con fracciones**
Suma, resta, multiplicación, división · jerarquía de operaciones

8 **Cálculo de la fracción inversa**
Fracción recíproca · producto de inversos = 1

Problema de votaciones en clase

9 Fracción como cociente de votos · representación de datos

10 **Problema de Marta y el trayecto**

Fracción de una distancia · regla de tres · tiempo total

1

FRACCIONES · LECTURA Y ESCRITURA

Representación mediante una fracción

Enunciado: Representa mediante una fracción las siguientes expresiones:

a) Tres cuartos de hora.

b) De los 30 alumnos de la clase, los dos quintos son niñas.




Fig. 1 — Un reloj mostrando ¾ de hora (45 min) y un grupo de 30 alumnos donde 2/5 son niñas.

📚 **Recuerda:** Una fracción expresa una o varias partes de un todo dividido en partes iguales. Se escribe como numerador / denominador, donde el **numerador** indica cuántas partes tomamos y el **denominador** indica en cuántas partes iguales se divide el todo.

SOLUCIÓN DETALLADA

a)

La expresión "tres cuartos de hora" indica que dividimos la hora en **4 partes iguales** (cuartos) y tomamos **3** de ellas.

— El **denominador** es 4 (número de partes en que se divide la hora).

— El **numerador** es 3 (número de partes que tomamos).

```
Tres cuartos de hora = 3/4 de hora = 45 minutos
```

Como comprobación: 60 minutos ÷ 4 partes = 15 min por parte.

Tomando 3 partes: 15 × 3 = **45 minutos**.

b)

La expresión "los dos quintos de 30 alumnos son niñas" indica que dividimos el total de alumnos en **5 partes iguales** (quintos) y tomamos **2** de ellas.

— El **denominador** es 5 (en cuántos grupos iguales dividimos los 30 alumnos).

— El **numerador** es 2 (cuántos grupos son niñas).

```
Fracción de niñas = 2/5
```

Como comprobación: 30 alumnos ÷ 5 = 6 alumnos por quinto. Tomando 2 quintos: 6 × 2 = **12 niñas**.

FRACCIONES · EQUIVALENCIA

2 Identificación de fracciones equivalentes

Enunciado: Señala las fracciones equivalentes a la fracción **5/15** entre las siguientes:

6/21 7/21 11/30 15/45 18/55 20/60 23/65




Fig. 2 — Representación visual de fracciones equivalentes a 5/15 = 1/3.

📚**Criterio de equivalencia:** Dos fracciones a/b y c/d son equivalentes si y solo si el **producto cruzado** es igual: **a × d = b × c**. Equivalentemente, ambas reducen a la misma fracción irreducible.

SOLUCIÓN DETALLADA

Primero simplificamos la fracción de referencia: **5/15 = 1/3** (dividiendo numerador y denominador entre 5).

Por tanto, buscaremos fracciones cuya forma irreducible sea también **1/3**, o bien verificaremos mediante producto cruzado: 5 × d = 15 × c, es decir, d = 3c.

> **6/21:**
> 5 × 21 = 105 | 15 × 6 = 90. Como 105 ≠ 90 → **NO es equivalente**.
>
> Comprobación: 6/21 = 2/7 ≠ 1/3.

> **7/21:**
> 5 × 21 = 105 | 15 × 7 = 105. Como 105 = 105 →
>
> **✓ SÍ es equivalente** .
>
> Comprobación: 7/21 = 1/3 ✓ (dividiendo por MCD(7,21) = 7).

> **11/30:**
> 5 × 30 = 150 | 15 × 11 = 165. Como 150 ≠ 165 → **NO es equivalente**.

> **15/45:**
> 5 × 45 = 225 | 15 × 15 = 225. Como 225 = 225 →
>
> **✓ SÍ es equivalente** .
>
> Comprobación: 15/45 = 1/3 ✓ (dividiendo por MCD(15,45) = 15).

> **18/55:**
> 5 × 55 = 275 | 15 × 18 = 270. Como 275 ≠ 270 → **NO es equivalente**.

> **20/60:**
> 5 × 60 = 300 | 15 × 20 = 300. Como 300 = 300 →
>
> **✓ SÍ es equivalente** .
>
> Comprobación: 20/60 = 1/3 ✓ (dividiendo por MCD(20,60) = 20).

> **23/65:**
> 5 × 65 = 325 | 15 × 23 = 345. Como 325 ≠ 345 → **NO es equivalente**.

✅ **Respuesta final: Las fracciones equivalentes a 5/15 son: 7/21 , 15/45 y 20/60 .**

FRACCIONES · SIMPLIFICACIÓN

3 Cálculo de la fracción irreducible

Enunciado: Calcula la fracción irreducible de:

a) 90/60 **b)** 264/1001




Fig. 3 — Descomposición en factores primos para hallar el MCD y simplificar fracciones.

📚 **Fracción irreducible:** Una fracción a/b es irreducible cuando el **MCD(a, b) = 1**, es decir, numerador y denominador no tienen ningún factor común distinto de 1. Para obtenerla, dividimos numerador y denominador entre su MCD.

SOLUCIÓN DETALLADA

a) 90/60

Paso 1 — Descomposición en factores primos:

$$90 = 2 \times 45 = 2 \times 9 \times 5 = 2 \times 3^2 \times 5$$

$$60 = 2 \times 30 = 2 \times 2 \times 15 = 2^2 \times 3 \times 5$$

Paso 2 — Cálculo del MCD:

Se toman los factores primos comunes con el menor exponente:

$$MCD(90, 60) = 2^1 \times 3^1 \times 5^1 = 2 \times 3 \times 5 = 30$$

Paso 3 — División de numerador y denominador entre el MCD:

$$90 \div 30 = 3 \qquad 60 \div 30 = 2$$

Verificación: MCD(3, 2) = 1 ✓ (no tienen factores comunes → la fracción es irreducible).

Resultado: **90/60 = 3/2**

b) 264/1001

Paso 1 — Descomposición en factores primos:

$$264 = 2 \times 132 = 2 \times 2 \times 66 = 4 \times 66 = 4 \times 2 \times 33 = 8 \times 33 = 2^3 \times 3 \times 11$$

$$1001 = 7 \times 143 = 7 \times 11 \times 13$$

Paso 2 — Cálculo del MCD:

Factor primo común con menor exponente: solo el **11**.

$$MCD(264, 1001) = 11$$

Paso 3 — División entre el MCD:

$$264 \div 11 = 24 \qquad 1001 \div 11 = 91$$

Verificación: $91 = 7 \times 13$ y $24 = 2^3 \times 3$ → no tienen factores comunes → MCD(24, 91) = 1 ✓.

Resultado: **264/1001 = 24/91**

FRACCIONES · COMÚN DENOMINADOR

4 Reducción a común denominador

Enunciado: Reduce las fracciones a común denominador:

a) 3/8 y 5/12 **b)** 2/22 y 7/39




Fig. 4 — Proceso visual de búsqueda del mínimo común múltiplo para igualar denominadores.

📚 **Reducción a común denominador:** Se busca el **mcm (mínimo común múltiplo)** de los denominadores. Luego se multiplica cada fracción para que su denominador sea ese mcm, ajustando también el numerador en la misma proporción.

SOLUCIÓN DETALLADA

a) 3/8 y 5/12

Paso 1 — Descomposición de los denominadores:

$8 = 2^3 \qquad 12 = 2^2 \times 3$

Paso 2 — mcm(8, 12):

Se toman los factores primos con el mayor exponente:

$$\text{mcm}(8, 12) = 2^3 \times 3 = 8 \times 3 = 24$$

Paso 3 — Conversión de cada fracción al denominador 24:

Para 3/8: 24 ÷ 8 = 3 → multiplicamos numerador y denominador por 3:

$$3/8 = (3 \times 3)/(8 \times 3) = 9/24$$

Para 5/12: 24 ÷ 12 = 2 → multiplicamos por 2:

$$5/12 = (5 \times 2)/(12 \times 2) = 10/24$$

Resultado: **3/8 = 9/24** y **5/12 = 10/24**

b) 2/22 y 7/39

Paso 1 — Descomposición de los denominadores:

$$22 = 2 \times 11 \qquad 39 = 3 \times 13$$

Paso 2 — mcm(22, 39):

Los denominadores 22 y 39 no tienen ningún factor primo común, por lo que:

$$\text{mcm}(22, 39) = 22 \times 39 = 858$$

Paso 3 — Conversión al denominador 858:

Para 2/22: 858 ÷ 22 = 39 → multiplicamos por 39:

$$2/22 = (2 \times 39)/(22 \times 39) = 78/858$$

Para 7/39: 858 ÷ 39 = 22 → multiplicamos por 22:

$$7/39 = (7 \times 22)/(39 \times 22) = 154/858$$

Resultado: **2/22 = 78/858** y **7/39 = 154/858**

FRACCIONES · COMPARACIÓN

5 Comparación de fracciones: ¿cuál es la mayor?

Enunciado: Calcula cuál es la fracción mayor:

a) 5/9 y 7/10 **b)** 22/7 y 10/3 **c)** 8/15 y 11/22




Fig. 5 — Comparación de fracciones representadas en una recta numérica y barras de fracción.

📚**Comparación de fracciones:** Para comparar dos fracciones se reduce a común denominador y se comparan los numeradores: la fracción con mayor numerador es la mayor. Alternativamente se puede comparar mediante los productos cruzados.

SOLUCIÓN DETALLADA

a) 5/9 vs 7/10

mcm(9, 10) = 90 (son coprimos).

`5/9 = (5 × 10)/90 = 50/90`

`7/10 = (7 × 9)/90 = 63/90`

Comparamos numeradores: 63 > 50 → **7/10 es la fracción mayor**.

b) 22/7 vs 10/3

mcm(7, 3) = 21 (son coprimos).

`22/7 = (22 × 3)/21 = 66/21`

`10/3 = (10 × 7)/21 = 70/21`

Comparamos numeradores: 70 > 66 → **10/3 es la fracción mayor**.

Nota: 10/3 ≈ 3,333... y 22/7 ≈ 3,142... (aproximación de π). Efectivamente 10/3 > 22/7.

c) 8/15 vs 11/22

Simplificamos primero: 11/22 = 1/2.

mcm(15, 2) = 30.

`8/15 = (8 × 2)/30 = 16/30`

`1/2 = (1 × 15)/30 = 15/30`

Comparamos: 16 > 15 → **8/15 es la fracción mayor**.

FRACCIONES · ORDENACIÓN

6 Ordenación de fracciones de menor a mayor

Enunciado: Ordena las siguientes fracciones de menor a mayor:

$$4/12,\ \ 3/10,\ \ 6/15,\ \ 5/18$$




Fig. 6 — Las cuatro fracciones representadas en una recta numérica para visualizar su orden.

📚 **Proceso de ordenación:** (1) Simplificamos cada fracción si es posible, (2) reducimos todas al mismo denominador (mcm), (3) ordenamos por sus numeradores resultantes.

SOLUCIÓN DETALLADA

Paso 1 — Simplificar cada fracción:

`4/12 → MCD(4,12) = 4 → 4/12 = 1/3`

`3/10 → MCD(3,10) = 1 → ya es irreducible: 3/10`

`6/15 → MCD(6,15) = 3 → 6/15 = 2/5`

`5/18 → MCD(5,18) = 1 → ya es irreducible: 5/18`

Paso 2 — Calcular mcm(3, 10, 5, 18):

`3 = 3` `10 = 2 × 5` `5 = 5` `18 = 2 × 3²`

`mcm = 2 × 3² × 5 = 2 × 9 × 5 = 90`

Paso 3 — Convertir todas las fracciones al denominador 90:

`1/3 = (1 × 30)/90 = 30/90` `3/10 = (3 × 9)/90 = 27/90`

`2/5 = (2 × 18)/90 = 36/90` `5/18 = (5 × 5)/90 = 25/90`

Paso 4 — Ordenar de menor a mayor por los numeradores:

25/90 < 27/90 < 30/90 < 36/90

Paso 5 — Expresar en las fracciones originales simplificadas:

5/18 < 3/10 < 4/12 < 6/15 (equivale a: 5/18 < 3/10 < 1/3 < 2/5)

7

FRACCIONES · OPERACIONES COMBINADAS

Operaciones combinadas con fracciones

Enunciado: Calcula:

a) 11/15 + 3/4 − 2/5 − 4/15

b) 2 − (3/4 − 2/5)

c) (4/3) · (4/5 ÷ 2/3)

d) (4/5) · (4/3 − 3/2) − (1/6 − 2/7)




Fig. 7 — Operaciones aritméticas combinadas con fracciones: suma, resta, producto y cociente.

📚 **Jerarquía de operaciones:** Primero los paréntesis (de dentro hacia fuera), luego multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha), y por último sumas y restas (de izquierda a derecha).

SOLUCIÓN DETALLADA

a) 11/15 + 3/4 − 2/5 − 4/15

mcm(15, 4, 5) = 60.

```
11/15 = 44/60    3/4 = 45/60    2/5 = 24/60
4/15 = 16/60
```

```
= (44 + 45 − 24 − 16) / 60 = 49/60
```

MCD(49, 60) = 1 → ya es irreducible. **Resultado: 49/60**

b) 2 − (3/4 − 2/5)

Paso 1 — Paréntesis interior: mcm(4,5) = 20.

```
3/4 − 2/5 = 15/20 − 8/20 = 7/20
```

Paso 2 — Resta exterior:

```
2 − 7/20 = 40/20 − 7/20 = 33/20
```

Resultado: 33/20 = 1 y 13/20

c) (4/3) · (4/5 ÷ 2/3)

Paso 1 — División interior: dividir por una fracción es multiplicar por su inversa.

```
4/5 ÷ 2/3 = 4/5 × 3/2 = (4 × 3)/(5 × 2) = 12/10 = 6/5
```

Paso 2 — Multiplicación exterior:

```
(4/3) × (6/5) = (4 × 6)/(3 × 5) = 24/15 = 8/5
```

Resultado: 8/5 = 1 y 3/5

d) (4/5) · (4/3 − 3/2) − (1/6 − 2/7)

Paso 1 — Primer paréntesis: mcm(3,2) = 6.

```
4/3 − 3/2 = 8/6 − 9/6 = −1/6
```

Paso 2 — Multiplicación:

```
(4/5) × (−1/6) = −4/30 = −2/15
```

Paso 3 — Segundo paréntesis: mcm(6,7) = 42.

$$1/6 - 2/7 = 7/42 - 12/42 = -5/42$$

Paso 4 — Resta final: mcm(15,42) = ?

$$15 = 3 \times 5 \quad 42 = 2 \times 3 \times 7 \quad \text{mcm} = 2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$$

$$-2/15 = -28/210 \quad -5/42 = -25/210$$

$$-28/210 - (-25/210) = -28/210 + 25/210 = -3/210 = -1/70$$

Resultado: −1/70

8

FRACCIONES · FRACCIÓN INVERSA

Cálculo de la fracción inversa (recíproca)

Enunciado: Calcúlese la fracción inversa de estas fracciones:

a) 4/5 **b)** 2/14




Fig. 8 — El concepto de fracción inversa: el numerador y el denominador intercambian posiciones.

📚 **Fracción inversa o recíproca:** La fracción inversa de a/b es b/a. La característica fundamental es que **a/b × b/a = 1**. Si la fracción no está simplificada, es conveniente simplificarla antes de invertir.

SOLUCIÓN DETALLADA

a) Fracción inversa de 4/5

La fracción 4/5 es ya irreducible (MCD(4,5) = 1).

Intercambiamos numerador y denominador:

```
Inversa de 4/5 = 5/4
```

Comprobación: $4/5 \times 5/4 = (4 \times 5)/(5 \times 4) = 20/20 =$ **1** ✓

b) Fracción inversa de 2/14

Primero simplificamos: MCD(2, 14) = 2 → 2/14 = 1/7.

Ahora invertimos la fracción simplificada:

```
Inversa de 1/7 = 7/1 = 7
```

Comprobación: $1/7 \times 7 = 7/7 =$ **1** ✓

Nota: podríamos también invertir directamente 2/14 → 14/2 = 7. El resultado es el mismo.

9

FRACCIONES · APLICACIÓN PRÁCTICA

Problema de votaciones en clase

Enunciado: En una clase de 2.º de la ESO se hacen votaciones para elegir al delegado/a de la clase, y los resultados son:

— Laura: 14 votos

— María: 8 votos

— Sergio: 6 votos

— Marcos: 2 votos

Escribe la fracción que representa la cantidad de votos que ha recibido cada uno de los candidatos.




Fig. 9 — Resultados de la votación de clase representados con barras y fracciones.

📚**Fracción de una cantidad:** Para expresar la cantidad de votos de un candidato como fracción del total, se escribe: (votos del candidato) / (total de votos). El total es la suma de todos los votos.

SOLUCIÓN DETALLADA

Paso 1 — Total de votos:

```
Total = 14 + 8 + 6 + 2 = 30 votos
```

Paso 2 — Fracción de votos de cada candidato:

> **Laura:**
>
> `14/30 → MCD(14, 30) = 2 → fracción irreducible:`
>
> **7/15**
>
> Verificación decimal: 14 ÷ 30 ≈ 0,467 → 7 ÷ 15 ≈ 0,467 ✓. Laura obtuvo aproximadamente el 46,7% de los votos.

> **María:**
>
> `8/30 → MCD(8, 30) = 2 → fracción irreducible:`
>
> **4/15**
>
> Verificación decimal: 8 ÷ 30 ≈ 0,267 → 4 ÷ 15 ≈ 0,267 ✓. María obtuvo el 26,7% de los votos.

> **Sergio:**
>
> `6/30 → MCD(6, 30) = 6 → fracción irreducible:`
>
> **1/5**
>
> Verificación: 6 ÷ 30 = 0,2 = 1/5 ✓. Sergio obtuvo el 20% de los votos.

> **Marcos:**
>
> `2/30 → MCD(2, 30) = 2 → fracción irreducible:`
>
> **1/15**
>
> Verificación: 2 ÷ 30 ≈ 0,067 = 1/15 ✓. Marcos obtuvo el 6,7% de los votos.

Comprobación final — Suma de todas las fracciones debe ser 1:

$$7/15 + 4/15 + 1/5 + 1/15 = 7/15 + 4/15 + 3/15 + 1/15 = 15/15 = \mathbf{1} \checkmark$$

10

FRACCIONES · PROBLEMA DE APLICACIÓN

El trayecto de Marta

Enunciado: Marta recorre en cuatro horas dos terceras partes de un trayecto. ¿Cuánto tardará en hacer todo el trayecto?




Fig. 10 — Marta recorre 2/3 del camino en 4 horas. ¿Cuánto tarda en recorrer el 3/3?

📚 **Regla de tres directa:** Si recorrer una parte del trayecto lleva un tiempo determinado, para saber el tiempo total buscamos qué tiempo corresponde a la fracción completa del trayecto (= 1). A mayor fracción recorrida, mayor tiempo → relación directamente proporcional.

SOLUCIÓN DETALLADA

Datos del problema:

— Fracción del trayecto recorrida: 2/3

— Tiempo empleado: 4 horas

— Incógnita: tiempo total para recorrer 3/3 = 1 trayecto completo.

Planteamiento mediante regla de tres directa:

Si 2/3 del trayecto → 4 horas, entonces 1 trayecto completo → x horas.

`2/3 —— 4 horas` `1 —— x horas`

Cálculo:

Como la relación es directamente proporcional:

```
x = (1 × 4) / (2/3) = 4 ÷ (2/3) = 4 × (3/2) = 12/2 = 6 horas
```

Interpretación:

Si en 4 horas recorre los 2 tercios, entonces en 1 hora recorre 2/3 ÷ 4 = 1/6 del trayecto. Para recorrer el trayecto completo necesita 1 ÷ (1/6) = 6 horas.

Verificación:

En 6 horas al ritmo de 1/6 del trayecto por hora: 6 × (1/6) =

1 trayecto completo ✓

✅ **Marta tardará 6 horas en completar todo el trayecto.**

¡Buen trabajo!

Has completado los 10 ejercicios del Tema 2 sobre Fracciones. Recuerda repasar los conceptos de equivalencia, simplificación y operaciones combinadas.

"La verdadera matemática no es el arte de calcular, sino el arte de razonar."

— J.L. LAGRANGE

MATEMÁTICAS · 2.º ESO · TEMA 2: FRACCIONES · CURSO 2016–2017

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS. TEMA 3

05-12-2017 EXAMEN 2º ESO A

IES Antonio Tovar — Centro bilingüe

Nº1.- Escribe en forma de potencia y calcula su valor.

$a)\quad 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3$	$b)\ \frac{4}{5}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{4}{5}$	$c)\ \frac{3}{25}\cdot\frac{9}{5}$
$d)\ (-\frac{1}{2})\cdot(-\frac{1}{2})\cdot(-\frac{1}{2})$	$e)\quad \left(\frac{1}{10}\right)\left(-\frac{1}{10}\right)\cdot\left(-\frac{1}{10}\right)$	

Nº2.- Calcula el valor de estas potencias:

$$a)\ 2^3 \qquad b)\ (-3)^3 \qquad c)\ -5^2 \qquad d)\ \left(-\frac{1}{2}\right)^4 \qquad e)\ \left(\frac{8}{7}\right)^0$$

Nº3.- Expresa estas operaciones como una sola potencia y halla su valor:

$$a)\ 5^3\cdot 5^2 \qquad b)\ (-2)^4\cdot(-2)^3\cdot(-2) \qquad c)\ \left(\frac{3}{2}\right)^6 : \left(\frac{3}{2}\right)^4$$

$$d)\ (2^2\cdot 2)^2 \qquad e)\ \left(\left(-\frac{1}{2}\right)^3 : \left(-\frac{1}{2}\right)^2\right)^3$$

Nº4.- Expresa estas operaciones con una sola potencia, si se puede

$$a)\ \left(-\frac{1}{5}\right)^3\cdot\left(-\frac{1}{5}\right) \qquad b)\ (-2)^5\cdot 5^2 \qquad c)\ 2^6\cdot 3^6$$

$$d)\quad 8^3 : 4^3 \qquad e)\quad \left(-\frac{1}{10}\right)^4\cdot 2^4$$

Nº5.- Calcula la raíz cuadrada de estos números

$$a)\ \sqrt{81} \qquad b)\ \sqrt{\frac{4}{9}} \qquad c)\ \sqrt{\frac{4}{64}} \qquad d)\ \sqrt{-\frac{1}{4}} \qquad e)\ \sqrt{\left(-\frac{1}{5}\right)^2}$$

Nº6.- Calcula la raíz cuadrada de estos números y determina su resto:

$$a)\ \sqrt{182} \qquad b)\ \sqrt{99}$$

Nº7.- Resuelve las siguientes operaciones:

$$a)\ (-12):\sqrt{9}-\left(\frac{1}{2}\right)^2 \qquad b)\ 4^2:\sqrt{64}+7^7:7^6-\sqrt{\frac{1}{9}}\cdot\frac{1}{2}$$

$$c)\ \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\cdot\sqrt{16}\right]^2-(-3)^3+\sqrt{\frac{4}{9}}:(-2)^2 \qquad d)\ \left(-\frac{1}{2}\cdot 4\right)^3\cdot\sqrt{\frac{36}{64}}-\left(\sqrt{81}:3^2\right)^5$$


$$e)\ 5\cdot\sqrt{16}-32:2^3-2\cdot\sqrt{144}+\sqrt{64}$$

Nº8.- Enuncia las propiedades de las potencias.

Nº9.- Diofanto fue un famoso matemático de la antigua Grecia que enunció el siguiente problema:
"Todo número entero positivo puede ser escrito como la suma de cuatro números elevados al cuadrado" Por ejemplo:$15 = 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2$¿Sabrías hacer tú lo mismo con los números 26 y 39? (Una pista: puedes usar el 0.)

SUERTE JÓVENES

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA



MATEMÁTICAS

Tema 3: Potencias y Raíces

Ejercicios y Enunciados — Examen 2.º ESO

> *"Las matemáticas son la reina de las ciencias, y la aritmética es la reina de las matemáticas."*
>
> — AUGUSTIN-LOUIS CAUCHY (1789–1857)

2.º E.S.O. — GRUPO A

Curso Académico · Diciembre 2017 · 9 Ejercicios Completos

ÍNDICE DE EJERCICIOS

MATEMÁTICAS · TEMA 3 · POTENCIAS Y RAÍCES

🔢 POTENCIAS — NOTACIÓN Y CÁLCULO

Nº 1 Escritura de productos repetidos en forma de potencia y cálculo de su valor — 3

Nº 2 Cálculo del valor numérico de potencias enteras y fraccionarias — 4

⚙️ PROPIEDADES OPERATIVAS DE LAS POTENCIAS

Nº 3 Simplificación de operaciones con potencias a una sola potencia (con valor) — 5

Nº 4 Simplificación de operaciones a una sola potencia cuando sea posible — 6

√ RAÍCES CUADRADAS

Nº 5 Cálculo exacto de raíces cuadradas de números enteros y fraccionarios — 7

Nº 6 Cálculo de raíces cuadradas con determinación del resto — 8

🧮 OPERACIONES COMBINADAS

Nº 7 Resolución de expresiones complejas con potencias, raíces y operaciones — 9

📖 TEORÍA Y DESAFÍOS

Nº 8 Enunciado y descripción de las propiedades fundamentales de las potencias 10

Nº 9 Problema de Diofanto: representación de números como suma de cuatro cuadrados 11

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m} \cdot (a^n)^m = a^{n \cdot m} \cdot \sqrt{(a \cdot b)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

1 Escritura en Forma de Potencia

🔢 NOTACIÓN EXPONENCIAL · PRODUCTO REPETIDO

*Escribe cada uno de los siguientes productos de factores iguales en forma de potencia y, a continuación, calcula su valor numérico. Recuerda que una potencia a^n es el producto de n factores iguales a a, donde a recibe el nombre de **base** y n el de **exponente**.*



APARTADO A)

$3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

APARTADO B)

$\frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5}$

APARTADO C)

$\frac{3}{9} \cdot \frac{3}{5}$

APARTADO D)

$\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$

APARTADO E)

$\left(\frac{1}{10}\right) \cdot \left(-\frac{1}{10}\right)$

$\left(-\frac{1}{10}\right)$

💡 **RECUERDA — SIGNO EN LAS POTENCIAS**

Si la base es negativa, el signo del resultado depende del exponente: **exponente par → resultado positivo · exponente impar → resultado negativo**

ESPACIO DE TRABAJO

2 Cálculo del Valor de Potencias

🔢 POTENCIAS ENTERAS · BASES NEGATIVAS · EXPONENTE CERO

Calcula el valor numérico exacto de cada una de las siguientes potencias. Presta especial atención al signo de la base, al uso del paréntesis y al caso especial del exponente cero, que siempre da resultado 1 para cualquier base distinta de cero.

TIPOS DE POTENCIAS

Base positiva	Base negativa
$2^3 = 8$ ✓	$(-3)^3 = -27$
Exp. cero	**Exp. par**
$(8/7)^0 = 1$	$(-½)^4 > 0$

¡ATENCIÓN! Diferencia clave:

$-5^2 = -(5 \cdot 5) = -25$

$(-5)^2 = (-5) \cdot (-5) = +25$

El paréntesis alrededor de la base negativa cambia el resultado

APARTADO A)

2^3

APARTADO B)

$(-3)^3$

APARTADO C)

-5^2

APARTADO D)

$\left(-\frac{1}{2}\right)^4$

APARTADO E)

$\left(\frac{8}{7}\right)^0$

📌 **REGLAS FUNDAMENTALES A RECORDAR**

$a^0 = 1$ para todo $a \neq 0$ · **$-a^n$** significa "el opuesto de a^n" (primero calcula la potencia, luego cambia el signo) · **$(-a)^n$** con n par da resultado positivo; con n impar, negativo.

ESPACIO DE TRABAJO

3 Simplificación a una Sola Potencia (con valor)

⚙️ MULTIPLICACIÓN · DIVISIÓN · POTENCIA DE POTENCIA · MISMA BASE

Expresa cada una de las siguientes operaciones como una única potencia, aplicando las propiedades de las potencias (producto, cociente, potencia de potencia), y calcula su valor numérico exacto.

PROPIEDADES OPERATIVAS

MULTIPLICACIÓN (misma base)
$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$

DIVISIÓN (misma base)
$a^n : a^m = a^{n-m}$

POTENCIA DE POTENCIA
$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$

Ejemplo:
$5^3 \cdot 5^2 = 5^{3+2} = 5^5 = 3125$
$(2^2 \cdot 2)^2 = (2^3)^2 = 2^6 = 64$

Suma exponentes al multiplicar, réstalos al dividir

APARTADO A)

$5^3 \cdot 5^2$

APARTADO B)

$(-2)^4 \cdot (-2)^3 \cdot (-2)$

APARTADO C)

$\left(\frac{3}{2}\right)^6 : \left(\frac{3}{2}\right)^4$

APARTADO D)

$(2^2 \cdot 2)^2$

APARTADO E)

$\left(\left(-\frac{1}{2}\right)^2 : \left(-\frac{1}{2}\right)\right)^3$


⚠️ En el apartado b), recuerda que (-2) escrito solo equivale a $(-2)^1$, por tanto suma todos los exponentes: 4 + 3 + 1. En el apartado d), primero simplifica el paréntesis interior ($2^2 \cdot 2 = 2^3$) y luego aplica la potencia exterior.

ESPACIO DE TRABAJO

4 Simplificación cuando sea Posible

⚙️ BASES DISTINTAS · POTENCIA DE PRODUCTO · POTENCIA DE COCIENTE

Expresa estas operaciones con una sola potencia si es posible hacerlo. Si no es posible simplificar, indica la razón. Recuerda que solo se puede reducir a una sola potencia cuando las bases son iguales (para producto y cociente) o cuando los exponentes son iguales (para potencia de producto o de cociente).



APARTADO A)

$$\left(-\frac{1}{5}\right)^{3} \cdot \left(-\frac{1}{5}\right)$$

APARTADO B)

$$(-2)^5 \cdot 5^2$$

APARTADO C)

$$2^6 \cdot 3^6$$

APARTADO D)

$$8^3 : 4^3$$

APARTADO E)

$$\left(-\frac{1}{10}\right)^{4} \cdot 2^4$$

💡 **CRITERIO DE SIMPLIFICACIÓN**


Mismo exponente: $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$ | $a^n : b^n = (a/b)^n$ **Misma base:** $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ | $a^n : a^m = a^{n-m}$

ESPACIO DE TRABAJO

5 Cálculo de Raíces Cuadradas

√ RADICALES · RAÍCES EXACTAS · NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES

Calcula la raíz cuadrada de cada uno de los siguientes números. Si el resultado es un número real, exprésalo de forma exacta. Si no existe raíz cuadrada real (radicando negativo), indícalo razonadamente.



APARTADO A)

$\sqrt{81}$

APARTADO B)

$\sqrt{\frac{4}{9}}$

APARTADO C)

$\sqrt{\frac{4}{64}}$

APARTADO D)

$\sqrt{(-\frac{1}{4}}$)

APARTADO E)

$\sqrt{(-\frac{1}{5}}$ $)^2$

📌 **PROPIEDAD FUNDAMENTAL**


$\sqrt{(a^2)} = |a|$ para todo número real a. Esto significa que la raíz cuadrada de un cuadrado siempre es positiva: $\sqrt{(-1/5)^2} = |-1/5| = 1/5$.

ESPACIO DE TRABAJO

6 Raíz Cuadrada con Determinación del Resto

√ ALGORITMO DE LA RAÍZ · RAÍZ ENTERA · RESTO

*Calcula la raíz cuadrada entera de los siguientes números y determina el resto de la extracción. Recuerda que la **raíz cuadrada entera** de un número N es el mayor número natural q tal que $q^2 \leq N$, y el **resto** se calcula como $r = N - q^2$.*



La raíz entera es el mayor entero cuyo cuadrado no supera el radicando

APARTADO A)

$\sqrt{182}$

Hallar raíz entera y resto

APARTADO B)

$\sqrt{99}$

Hallar raíz entera y resto

📐 **FÓRMULA DE VERIFICACIÓN**

Todo número N puede escribirse como: $\mathbf{N = q^2 + r}$, donde q es la raíz entera y r el resto, con $0 \leq r < 2q + 1$. Si $r = 0$, la raíz es exacta (N es un cuadrado perfecto).

📌 Para hallar la raíz entera, busca el mayor entero q tal que $q^2 \leq N$: para √182, prueba $13^2 = 169$ y $14^2 = 196$. Como $169 \leq 182 < 196$, la raíz entera es 13 y el resto es $182 - 169 = 13$.

ESPACIO DE TRABAJO

7 Operaciones Combinadas con Potencias y Raíces

🧮 JERARQUÍA DE OPERACIONES · PARÉNTESIS · CORCHETES · ORDEN DE CÁLCULO

Resuelve cada una de las siguientes expresiones matemáticas, respetando rigurosamente el orden jerárquico de las operaciones: primero los paréntesis y corchetes más interiores, luego las potencias y raíces, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.



Siempre se resuelven primero los paréntesis más interiores

APARTADO A)

$(-12) : \sqrt{9} - ($

$\frac{1}{2}$ $)^2$

APARTADO B)

$4^2 : \sqrt{64} + 7^7 : 7^6 - \sqrt{}$

$\frac{1}{9}$

$\cdot$

$\frac{1}{2}$

APARTADO C)

$[($

$\frac{1}{2}$ $)^2$

$\cdot \sqrt{16}]^2 - (-3)^3 + \sqrt{}$

$\frac{36}{9}$ $:$

$(-2)^2$

APARTADO D)

$(-\frac{1}{2}$

$\cdot 4)^5 \cdot \sqrt{}$

$$\frac{4}{64}$$

$$- (\sqrt{81} : 3^2)$$

APARTADO E)


$$5 \cdot \sqrt{16} - 3^2 : 2^3 - 2 \cdot \sqrt{144} + \sqrt{64}$$

⚙️ Consejo: en expresiones con corchetes como el apartado c), resuelve primero todo lo que está dentro del corchete, luego eleva al cuadrado el resultado, y finalmente opera con el resto de términos.

8 Propiedades de las Potencias

📖 TEORÍA · ENUNCIADO DE PROPIEDADES · ÁLGEBRA ELEMENTAL

*Enuncia con precisión y claridad todas las **propiedades de las potencias** que has estudiado. Para cada propiedad debes indicar su nombre, la fórmula general con letras y una breve descripción de en qué consiste.*



Las propiedades conectan todas las operaciones con potencias

P1 **PRODUCTO DE POTENCIAS DE LA MISMA BASE**

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

Para multiplicar dos potencias con la misma base, se conserva la base y se suman los exponentes. Ejemplo: $3^4 \cdot 3^2 = 3^6$

P2 **COCIENTE DE POTENCIAS DE LA MISMA BASE**

$$a^n : a^m = a^{n-m} \quad (a \neq 0, n \geq m)$$

Para dividir dos potencias con la misma base, se conserva la base y se resta el exponente del divisor al del dividendo. Ejemplo: $5^7 : 5^3 = 5^4$

P3 **POTENCIA DE UNA POTENCIA**

$$(a^n)^m = a^{n.m}$$

Para elevar una potencia a otra potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Ejemplo: $(2^3)^4 = 2^{12}$

P4 **POTENCIA DE UN PRODUCTO**

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

La potencia de un producto es igual al producto de las potencias de cada factor. Ejemplo: $(2 \cdot 3)^4 = 2^4 \cdot 3^4 = 16 \cdot 81 = 1296$

P5 **POTENCIA DE UN COCIENTE**

$$(a / b)^n = a^n / b^n \quad (b \neq 0)$$

La potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias del numerador y el denominador. Ejemplo: $(3/2)^3 = 3^3/2^3 = 27/8$

P6 **EXPONENTE CERO**

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

Todo número distinto de cero elevado a la potencia 0 vale exactamente 1. Ejemplo: $(8/7)^0 = 1$

P7 **EXPONENTE UNO**

$$a^1 = a$$

Todo número elevado a 1 es igual a sí mismo. Ejemplo: $(-7)^1 = -7$

9 El Problema de Diofanto

🏛️ HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS · SUMA DE CUATRO CUADRADOS · LAGRANGE

📜

El Enunciado Original del Problema

"Todo número entero positivo puede ser escrito como la suma de cuatro números enteros elevados al cuadrado."

Diofanto de Alejandría, matemático griego del siglo III d.C. y padre del álgebra, enunció el problema histórico que más tarde Lagrange (1770) demostraría rigurosamente: ***todo número entero positivo puede expresarse como la suma de cuatro cuadrados perfectos*** *(incluyendo el $0^2 = 0$ como sumando, si es necesario).*

📋 **EJEMPLO DADO EN EL ENUNCIADO**

$15 = 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 = 1 + 1 + 4 + 9 = 15$ ✓

🏆 **TU DESAFÍO — APLICA EL TEOREMA A:**

Escribe los números **26** y **39** como suma de cuatro cuadrados.

Recuerda la pista del enunciado: *puedes utilizar el número 0*, es decir, el cuadrado $0^2 = 0$ cuenta como uno de los cuatro sumandos.

NÚMERO 26

$26 = _^2 + _^2 + _^2 + _^2$

NÚMERO 39

$39 = _^2 + _^2 + _^2 + _^2$

🔍 Estrategia: busca primero el mayor cuadrado que no supere al número dado y ve restando. Para 26: el mayor cuadrado ≤ 26 es $25 = 5^2$, pues $26 - 25 = 1 = 1^2$... ¿puedes completar los cuatro sumandos? Para 39: considera que $36 = 6^2$ y $39 - 36 = 3$. ¿Cómo expresas 3 como suma de tres cuadrados?

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS. TEMA 4

31-01-2017 EXAMEN 2º ESO A

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

Nº1.- Ordena los siguientes números decimales, de menor a mayor:

0,3 0,31 0,307 0,305

Nº2.- Indica el tipo de número decimal que resulta de estas fracciones y expresa en forma decimal dichas fracciones.

$$\frac{4}{25} \qquad \frac{17}{6} \qquad \frac{65}{8} \qquad \frac{43}{40} \qquad \frac{89}{3}$$

Nº3.- Pedro compra 1,125 kg de peras, 2,05 kg de naranjas y 1,872 kg de melocotones. Por último, compra un melón de 3 kg y medio. ¿Cuál es el peso total de la fruta?

Nº4.- Completa la siguiente tabla, transformando las fracciones en números decimales, y redondea a las centésimas.

Fracción	$\frac{17}{6}$	$\frac{74}{13}$	$\frac{11}{3}$	$\frac{35}{2}$
Decimal				

Nº5.- Calcula y redondea el resultado con tres decimales:

$a)\ \frac{7}{9}\cdot 3 \qquad b)\ \frac{23}{10}:\frac{5}{7} \qquad c)\ 0{,}16\cdot\frac{7}{3}$

Nº6.- Halla el resultado de las siguientes operaciones:

a) 324,654 + 126,057 + 32,005 b) 54,904 - 13,047 + 98,218

Luego aproxima cada cifra a las centésimas mediante redondeo, realiza de nuevo las operaciones y calcula el error cometido.

Nº7 Estima estos productos y cocientes redondeando a las unidades, y halla el error cometido: a) 32,87 · 10,2 b) 130,24 : 8,945


Nº8.- Calcula esta raíz cuadrada con dos decimales:

$$\sqrt{4325}$$

Nº9.- Expresa en notación científica y di cuál es su orden de magnitud.

a) Asistieron 1 322 000 espectadores durante un año.
b) Hay 7 230 000 000 habitantes en el mundo.
c) El peso de un producto es 0,0000000000051 kg

SUERTE JÓVENES



MATEMÁTICAS

2.º E.S.O.

TEMA 4 — Números Decimales y Notación Científica

> "Las matemáticas son el lenguaje en el que Dios ha escrito el Universo."
>
> — Bernhard Riemann (1826–1866)

Índice de Ejercicios

N.º 1 Ordenación de Números Decimales (de menor a mayor) 3

N.º 2 Tipos de Números Decimales a partir de Fracciones 4

N.º 3 Problema: Peso Total de Frutas (sumas de decimales) 5

N.º 4 Tabla de Conversión Fracción → Decimal (redondeo a centésimas) 6

N.º 5 Cálculo con Fracciones y Decimales (redondeo a 3 decimales) 7

N.º 6 Operaciones con Decimales y Cálculo del Error de Redondeo 8

N.º 7 Estimación de Productos y Cocientes por Redondeo a Unidades 9

N.º 8 Cálculo de Raíz Cuadrada con Dos Decimales 10

N.º 9 Notación Científica y Orden de Magnitud 11

1 Ordenación de Números Decimales de Menor a Mayor

Ordena los siguientes números decimales **de menor a mayor**:

> 0,3 0,31 0,307 0,305

Recuerda: Para comparar números decimales debes igualar el número de cifras decimales añadiendo ceros a la derecha si es necesario, ya que añadir ceros a la derecha de la parte decimal no altera el valor del número. Una vez igualadas las cifras, compara los números como si fueran enteros, columna por columna de izquierda a derecha.




Figura 1 — Los números decimales ordenados sobre una recta numérica permiten visualizar su posición relativa.

2 Tipos de Números Decimales a partir de Fracciones

Indica el **tipo de número decimal** que resulta de cada una de las siguientes fracciones y exprésalas en forma decimal realizando la división correspondiente. Clasifica cada resultado como decimal exacto, decimal periódico puro o decimal periódico mixto.

4/25	17/6	65/8	43/40	89/3

Recuerda:

- **Decimal exacto:** la división termina y obtenemos un número finito de cifras decimales. El denominador (en su forma irreducible) solo tiene factores 2 y/o 5.
- **Decimal periódico puro:** hay un bloque de cifras (período) que se repite infinitamente desde la primera cifra decimal. El denominador (irreducible) no tiene factores 2 ni 5.
- **Decimal periódico mixto:** hay una parte no periódica (anteperíodo) seguida del período. El denominador (irreducible) tiene factores 2 y/o 5 además de otros factores primos.




Figura 2 — Los tres tipos de números decimales y cómo identificarlos según el denominador de la fracción.

3 Problema: El Peso Total de la Fruta de Pedro

Pedro va al mercado y compra las siguientes frutas:

- **1,125 kg** de peras.
- **2,05 kg** de naranjas.
- **1,872 kg** de melocotones.
- Un melón de **3 kg y medio** (es decir, 3,5 kg).

❓ **¿Cuál es el peso total de toda la fruta que compra Pedro?**

Recuerda: Para sumar números decimales es imprescindible alinear las comas decimales en columna. Convierte la expresión "3 kg y medio" a número decimal antes de operar: 3 y medio = 3,5 kg. Una vez alineadas las comas, suma columna por columna de derecha a izquierda, llevando las cargas cuando sean necesarias.



Figura 3 — Pedro compra cuatro tipos de fruta. Debemos sumar todos sus pesos en kilogramos para encontrar el total.

4 Tabla de Conversión: Fracción → Decimal redondeado a Centésimas

Completa la siguiente tabla transformando cada fracción en su expresión decimal. A continuación, **redondea cada resultado a las centésimas** (dos cifras decimales).

Fracción	17 / 6	74 / 13	11 / 3	35 / 2
`Decimal (exacto o con período)`				
`Redondeado a centésimas`				

Recuerda las reglas de redondeo:

- Si la cifra que se va a eliminar (la milésima en este caso) es **menor que 5**, la cifra anterior permanece igual.
- Si la cifra que se va a eliminar es **igual o mayor que 5**, la cifra anterior aumenta en una unidad.

Realiza la división larga de cada fracción mostrando al menos cuatro cifras decimales antes de redondear.




Figura 4 — Proceso de división larga para convertir fracciones en decimales y posterior redondeo a centésimas.

5 Cálculo con Fracciones y Decimales — Redondeo a Tres Decimales

Calcula cada una de las siguientes operaciones y **redondea el resultado con tres decimales**:

a) (7/9) · 3

b) (23/10) ÷ (5/7)

c) 0,16 · (7/3)

Recuerda:

- Para multiplicar una fracción por un número entero, multiplica el numerador por dicho número y mantén el denominador.
- Para dividir fracciones, multiplica la primera fracción por la fracción inversa de la segunda (regla del "mariposa" o "producto en cruz").
- Para multiplicar un decimal por una fracción, convierte el decimal a fracción (0,16 = 16/100 = 4/25) o convierte la fracción a decimal y multiplica normalmente.
- Una vez obtenido el cociente o producto en forma decimal, aplica las reglas de redondeo a la cuarta cifra decimal para obtener tres decimales.




Figura 5 — Multiplicación y división de fracciones y decimales con posterior redondeo a tres cifras decimales.

6 Operaciones con Decimales y Cálculo del Error de Redondeo

Halla el resultado exacto de las siguientes operaciones:

a) 324,654 + 126,057 + 32,005

b) 54,904 − 13,047 + 98,218

A continuación, **aproxima cada cifra a las centésimas mediante redondeo**, vuelve a realizar las operaciones con los valores redondeados y calcula el **error cometido** en cada caso, es decir, la diferencia entre el resultado exacto y el resultado aproximado:

```
Error = |Resultado exacto − Resultado aproximado|
```

Recuerda: El error absoluto es siempre positivo (se usa el valor absoluto). Para redondear a centésimas, observa la milésima: si es 5 o más, sumas 1 a la centésima; si es menor que 5, la centésima permanece igual. Alinea siempre las comas decimales al operar.




Figura 6 — Comparación entre el resultado exacto y el resultado aproximado, mostrando el error de redondeo introducido.

7 Estimación de Productos y Cocientes — Redondeo a las Unidades

Estima los siguientes productos y cocientes redondeando previamente cada número a las **unidades** (es decir, al número entero más cercano). Luego calcula el **error cometido** comparando la estimación con el resultado exacto:

a) 32,87 · 10,2

b) 130,24 ÷ 8,945

Recuerda:

- El objetivo de la estimación es obtener un valor aproximado de forma rápida y sencilla.
- Para redondear a las unidades, observa la primera cifra decimal: si es 5 o más, redondeas al entero superior; si es menor que 5, al entero inferior.
- El error absoluto se calcula como: Error = |Valor exacto − Valor estimado|.
- Para el valor exacto puedes usar el algoritmo de la multiplicación o de la división larga con decimales.




Figura 7 — Proceso de estimación por redondeo y cuantificación del error absoluto cometido.

8 Cálculo de la Raíz Cuadrada con Dos Decimales de Precisión

Calcula la siguiente raíz cuadrada con **dos cifras decimales** de precisión, empleando el método de extracción de la raíz cuadrada por el algoritmo clásico (método de separación en grupos de dos cifras):

> $\sqrt{4325}$

Pasos del método clásico para calcular $\sqrt{4325}$ con dos decimales:

1. Agrupa las cifras de dos en dos desde la coma hacia ambos lados: **43 | 25**.
2. Busca el mayor entero cuyo cuadrado sea ≤ 43. Como $6^2 = 36 \leq 43 < 49 = 7^2$, la primera cifra del resultado es **6**.
3. Baja el siguiente grupo (25), forma el doble del cociente parcial para buscar el siguiente dígito, y continúa el proceso.
4. Para los decimales, agrega grupos de dos ceros (**00**) tras el radical y continúa el algoritmo dos veces más.
5. Redondea el resultado a dos decimales una vez obtenida la tercera cifra decimal.




Figura 8 — Método clásico de extracción de la raíz cuadrada paso a paso para obtener $\sqrt{4325}$ con dos decimales.

9 Notación Científica y Orden de Magnitud

Expresa cada uno de los siguientes números en **notación científica** e indica su **orden de magnitud** (la potencia de 10 correspondiente).

- **a)** Durante un año asistieron **1 322 000 espectadores** a un estadio.
- **b)** En el mundo hay **7 230 000 000 habitantes**.
- **c)** El peso de un producto es **0,0000000000051 kg**.

Recuerda la forma de la notación científica:
Un número está en notación científica cuando se expresa como: $a \times 10^n$, donde $1 \leq a < 10$ (es decir, a tiene exactamente una cifra entera distinta de cero) y n es un número entero (positivo para números grandes y negativo para números muy pequeños).

• Para números **grandes** (> 1): desplaza la coma a la izquierda hasta que quede una sola cifra entera. El exponente n es el número de posiciones desplazadas y es **positivo**.
• Para números **pequeños** (< 1): desplaza la coma a la derecha hasta la primera cifra significativa. El exponente n es el número de posiciones desplazadas y es **negativo**.
• El **orden de magnitud** es simplemente el valor del exponente n en la expresión en notación científica.




Figura 9 — La notación científica permite expresar números muy grandes (número de personas, distancias astronómicas) y muy pequeños (masa de partículas, longitudes atómicas) de forma compacta y manejable.

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS.

20-03-2017 EXAMEN 2º ESO A

ies Antonio Tovar Centro bilingüe

Nº1.- Expresa mediante lenguaje algebraico:

a) El cuadrado de un número *x*
b) El doble de un número *x* menos cuatro unidades
c) El número anterior a un número *x*
d) El número de patas que hay en una granja con x conejos e y gallinas

Nº2.- Escribe y enuncia los tres productos notables.

Nº3.- Dados los polinomios:

$$A(x) = 5x^3 - 3x^2 + 2 \qquad B(x) = 4x - 3 \qquad C(x) = 5x^3 + 4x - 1 \qquad D(x) = -4x^2$$

Calcula:

$$a)\ A(x) + C(x) \qquad b)\ C(x) - B(x) \qquad c)\ B(x) \cdot D(x)$$

Nº4.- Opera:

$$a)\ (2a + b)^2 \qquad b)\ (3x - 4y) \cdot (3x + 4y) \qquad c)\ (1 - 2x)^2 \qquad d)\ (3x - 2y)^2$$

Nº5.- Expresa en forma de producto notable (si se puede):

$a)\ x^2 + 2x + 1$ $b)\ x^2 - 6x + 9$ c) $\frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{9}y^2$ d) $x^2 + 36$

Nº6.- Opera y reduce las siguientes expresiones:

$$a)\ (2x + 3) \cdot (2x - 3) + 3(x + 6) \qquad b)\ (x + 3)^2 - (x - 3)^2 - 12x$$

Nº7.- Extrae factor común en cada una de las siguientes expresiones:

$$a)\ 6a + 3b \qquad b)\ 8x^5 - 12x^3 + 4x^2$$

Nº8.- Resuelve las siguientes ecuaciones:

$$a)\ 3x - 5 = 2x - 1 \qquad b)\ 2 - 3x + 5 = x - 5 - 7x$$

Nº9.- Resuelve las siguientes ecuaciones:

$a)\ 2(3x - 5) = 2x + 2$ $b)\ 2x - 2(2x - 5) = x - 1$ $c)\ 5x + 3(2x - 3) = 8 - 4(5 - 2x) + 2x$

Nº10.- Resuelve las siguientes ecuaciones:

$$a)\ \frac{3(x+1)}{5} = \frac{2(x-2)+5}{3} \qquad b)\ \frac{x}{2} - 2(x-1) = \frac{3x}{2} + \frac{1}{3} \cdot \left(x - \frac{2}{3}\right)$$

SUERTE JÓVENES

2.º ESO · ÁLGEBRA Y ECUACIONES

MATEMÁTICAS

Álgebra, Polinomios y Ecuaciones

EXAMEN OFICIAL

2.º ESO — Grupo A

20 de marzo de 2017

> *«Las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo.»*
>
> — Galileo Galilei (1564–1642)

Departamento de Matemáticas · 10 Ejercicios Completos

M. A. ELIAS · ADVANCED MATH

Índice de Ejercicios

Matemáticas 2.º ESO — Examen completo con enunciados y resoluciones

Nº 1	Lenguaje Algebraico — Expresiones algebraicas a partir de enunciados verbales	3
Nº 2	Productos Notables — Enunciado y demostración de los tres productos notables	4
Nº 3	Operaciones con Polinomios — Suma, resta y multiplicación de polinomios	5
Nº 4	Aplicación de Productos Notables — Desarrollo de expresiones cuadradas y conjugadas	6
Nº 5	Factorización como Producto Notable — Reconocimiento y escritura como producto	7
Nº 6	Operar y Reducir Expresiones Algebraicas — Combinación de operaciones	8
Nº 7	Factor Común — Extracción del factor común en expresiones algebraicas	9
Nº 8	Ecuaciones de Primer Grado — Resolución de ecuaciones lineales básicas	10
Nº 9	Ecuaciones con Paréntesis — Resolución usando propiedad distributiva	11
Nº 10	Ecuaciones con Fracciones — Resolución de ecuaciones con denominadores	12

CONTENIDOS DEL EXAMEN

Este cuaderno recoge los **10 ejercicios** del examen de Matemáticas de 2.º de ESO correspondiente al bloque de *Álgebra, Polinomios y Ecuaciones de Primer Grado*. Cada ejercicio incluye el enunciado completo tal como aparece en el examen original, los conceptos clave necesarios para su resolución, y la solución desarrollada paso a paso.

EJERCICIO Nº 1

Lenguaje Algebraico

Expresar mediante lenguaje algebraico situaciones descritas verbalmente

📝 ENUNCIADO

Expresa mediante lenguaje algebraico cada una de las siguientes frases:



Variables y expresiones algebraicas

a) El cuadrado de un número x.

b) El doble de un número x menos cuatro unidades.

c) El número anterior a un número x.

d) El número de patas que hay en una granja con x conejos e y gallinas.

📚 CONCEPTOS CLAVE

Una **expresión algebraica** es una combinación de números, letras (variables) y operaciones matemáticas. Las letras representan valores desconocidos o que pueden cambiar. Las palabras clave del enunciado nos indican qué operación matemática aplicar:

Expresión verbal	Operación	Expresión algebraica
«el cuadrado de»	Potencia de exponente 2	x^2
«el doble de»	Multiplicar por 2	$2 \cdot x = 2x$
«menos cuatro unidades»	Restar 4	$- 4$
«el número anterior»	Restar 1	$x - 1$
«número de patas de conejos»	4 patas × x conejos	$4x$
«número de patas de gallinas»	2 patas × y gallinas	$2y$

✓ RESOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a)

«El cuadrado de un número x» significa elevar x a la potencia 2.

Resultado: x^2

Apartado b)

«El doble de un número x» = 2·x = 2x

«menos cuatro unidades» = − 4

Resultado: 2x − 4

Apartado c)

«El número anterior a x» es el que está justo antes en la recta numérica, es decir, x disminuido en una unidad.

Resultado: x − 1

Apartado d)

Los conejos tienen **4 patas** cada uno y las gallinas tienen **2 patas** cada una. Si hay *x* conejos y *y* gallinas, el número total de patas es:

Patas de conejos: $4 \cdot x = 4x$

Patas de gallinas: $2 \cdot y = 2y$

Resultado: 4x + 2y

💡 **Consejo:** Para traducir al lenguaje algebraico, lee el enunciado con cuidado e identifica la variable (el número desconocido) y la operación que se debe realizar. Las palabras «doble», «triple», «cuadrado» indican multiplicación o potenciación; «anterior» o «posterior» indican resta o suma de 1 respectivamente.

EJERCICIO Nº 2


Los Tres Productos Notables

Enunciado y escritura de las tres identidades algebraicas fundamentales

📝 ENUNCIADO

Escribe y enuncia los tres productos notables.

Se pide tanto la fórmula algebraica como el enunciado en palabras de cada uno de los tres productos notables del álgebra elemental.



Demostración geométrica del cuadrado de una suma

📚 ¿QUÉ SON LOS PRODUCTOS NOTABLES?

Los **productos notables** son multiplicaciones algebraicas que aparecen con tanta frecuencia que merecen ser memorizadas como fórmulas directas. Su nombre se debe a que su resultado sigue siempre el mismo patrón, lo que los hace «notables» (dignos de mención). Existen tres productos notables fundamentales en la enseñanza básica:

✓ LOS TRES PRODUCTOS NOTABLES

1.º Producto Notable — Cuadrado de una suma

FÓRMULA

$(a + b)^2 = a^2 + 2{\cdot}a{\cdot}b + b^2$

Enunciado: «*El cuadrado de la suma de dos términos es igual al cuadrado del primero, más el doble del producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.*»

Demostración: $(a + b)^2 = (a + b){\cdot}(a + b) = a{\cdot}a + a{\cdot}b + b{\cdot}a + b{\cdot}b = a^2 + ab + ab + b^2 = \mathbf{a^2 + 2ab + b^2}$

2.º Producto Notable — Cuadrado de una diferencia

FÓRMULA

$(a - b)^2 = a^2 - 2{\cdot}a{\cdot}b + b^2$

Enunciado: *«El cuadrado de la diferencia de dos términos es igual al cuadrado del primero, menos el doble del producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.»*

> Demostración: $(a - b)^2 = (a - b)\cdot(a - b) = a\cdot a - a\cdot b - b\cdot a + b\cdot b = a^2 - ab - ab + b^2 = \mathbf{a^2 - 2ab + b^2}$

3.º Producto Notable — Suma por diferencia (diferencia de cuadrados)

FÓRMULA

$$(a + b)\cdot(a - b) = a^2 - b^2$$

Enunciado: *«El producto de la suma de dos términos por su diferencia es igual a la diferencia de sus cuadrados.»*

> Demostración: $(a + b)\cdot(a - b) = a\cdot a - a\cdot b + b\cdot a - b\cdot b = a^2 - ab + ab - b^2 = \mathbf{a^2 - b^2}$


⚠ **¡Cuidado!** El error más frecuente es olvidar el término central 2ab. Recuerda: $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$. ¡El cuadrado de una suma NO es la suma de los cuadrados!

EJERCICIO Nº 3

Operaciones con Polinomios

Suma, resta y multiplicación de polinomios dados

📝 ENUNCIADO



Operaciones entre polinomios

Dados los polinomios:

$A(x) = 5x^3 - 3x^2 + 2$

$B(x) = 4x - 3$

$C(x) = 5x^3 + 4x - 1$

$D(x) = -4x^2$

Calcula:

a) $A(x) + C(x)$

b) $C(x) - B(x)$

c) $B(x) \cdot D(x)$

📚 CONCEPTOS CLAVE: OPERACIONES CON POLINOMIOS

Un **polinomio** es una expresión algebraica formada por la suma de monomios. Para operar con polinomios seguimos estas reglas:

- **Suma/Resta:** Solo se pueden sumar o restar términos *semejantes*, es decir, los que tienen la misma variable elevada al mismo exponente.
- **Multiplicación:** Se aplica la propiedad distributiva: cada término de un polinomio se multiplica por cada término del otro. Al multiplicar monomios se suman los exponentes de la misma variable.

✓ RESOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) A(x) + C(x)

Escribimos los polinomios alineando términos semejantes:

$A(x) = 5x^3 - 3x^2 + 0 \cdot x + 2$

$C(x) = 5x^3 + 0 \cdot x^2 + 4x - 1$

Sumamos término a término:

· Términos en x^3: $5x^3 + 5x^3 = \mathbf{10x^3}$

· Términos en x^2: $-3x^2 + 0 = \mathbf{-3x^2}$

· Términos en x: $0 + 4x = \mathbf{4x}$

· Términos independientes: $2 + (-1) = \mathbf{1}$

$A(x) + C(x) = 10x^3 - 3x^2 + 4x + 1$

Apartado b) C(x) – B(x)

Restamos el segundo polinomio del primero, cambiando el signo de todos los términos de B(x):

$C(x) = 5x^3 + 0 \cdot x^2 + 4x - 1$

$-B(x) = 0 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 - 4x + 3$

· Términos en x^3: $5x^3 + 0 = \mathbf{5x^3}$

· Términos en x^2: $0 + 0 = \mathbf{0}$

· Términos en x: $4x - 4x = \mathbf{0}$

· Términos independientes: $-1 + 3 = \mathbf{2}$

$C(x) - B(x) = 5x^3 + 2$

Apartado c) B(x) · D(x)

Multiplicamos cada término de B(x) por cada término de D(x):

$B(x) \cdot D(x) = (4x - 3) \cdot (-4x^2)$

$= 4x \cdot (-4x^2) + (-3) \cdot (-4x^2)$

$= -16x^3 + 12x^2$

$B(x) \cdot D(x) = -16x^3 + 12x^2$

EJERCICIO Nº 4

Aplicación de Productos Notables

Desarrollo y simplificación de expresiones aplicando las identidades notables

📝 ENUNCIADO


Opera las siguientes expresiones:

a) $(2a + b)^2$

b) $(3x - 4y) \cdot (3x + 4y)$

c) $(1 - 2x)^2$

d) $(3x - 2y)^2$



Aplicación geométrica de los productos notables

📚 FÓRMULAS A APLICAR

CUADRADO DE LA SUMA

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

CUADRADO DE LA DIFERENCIA

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

SUMA POR DIFERENCIA

$$(a + b)\cdot(a - b) = a^2 - b^2$$

✓ RESOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) $(2a + b)^2$

Es el cuadrado de la suma con $a = 2a$ y $b = b$:

$$(2a + b)^2 = (2a)^2 + 2\cdot(2a)\cdot b + b^2$$

$$= 4a^2 + 4ab + b^2$$

$(2a + b)^2 = 4a^2 + 4ab + b^2$

Apartado b) $(3x - 4y) \cdot (3x + 4y)$

Es el producto de la suma por la diferencia con a = 3x y b = 4y:

$$(3x - 4y)\cdot(3x + 4y) = (3x)^2 - (4y)^2$$
$$= 9x^2 - 16y^2$$

$(3x - 4y)\cdot(3x + 4y) = 9x^2 - 16y^2$

Apartado c) $(1 - 2x)^2$

Es el cuadrado de la diferencia con a = 1 y b = 2x:

$$(1 - 2x)^2 = 1^2 - 2\cdot1\cdot2x + (2x)^2$$
$$= 1 - 4x + 4x^2$$

$(1 - 2x)^2 = 4x^2 - 4x + 1$

Apartado d) $(3x - 2y)^2$

Es el cuadrado de la diferencia con a = 3x y b = 2y:

$$(3x - 2y)^2 = (3x)^2 - 2\cdot(3x)\cdot(2y) + (2y)^2$$
$$= 9x^2 - 12xy + 4y^2$$

$(3x - 2y)^2 = 9x^2 - 12xy + 4y^2$

EJERCICIO Nº 5

Factorización como Producto Notable

Reconocer y escribir expresiones algebraicas en forma de producto notable

📝 ENUNCIADO


Expresa en forma de producto notable (si se puede) cada una de las siguientes expresiones:

a) $x^2 + 2x + 1$

b) $x^2 - 6x + 9$

c) $x^4/4 - y^2$

d) $x^2 + 4x^2/9 + 36$



Factorización como producto notable

📚 CÓMO RECONOCER UN PRODUCTO NOTABLE

Para identificar si una expresión trinomial $a^2 \pm 2ab + b^2$ es un cuadrado perfecto se comprueba:

1. El primer y último término son **cuadrados perfectos** (raíces exactas).
2. El término central es exactamente el **doble del producto** de esas raíces.

Para un binomio de la forma $a^2 - b^2$, se reconoce como **diferencia de cuadrados** si ambos términos son cuadrados perfectos con signo negativo entre ellos.

✓ RESOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) $x^2 + 2x + 1$

> Comprobamos: $\sqrt{(x^2)} = x$ y $\sqrt{1} = 1$
>
> Término central: $2 \cdot x \cdot 1 = 2x$ ✓ (coincide)
>
> Es el cuadrado de la suma $(a + b)^2$ con $a = x$, $b = 1$

$$\mathbf{x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2}$$

Apartado b) $x^2 - 6x + 9$

Comprobamos: $\sqrt{(x^2)} = x$ y $\sqrt{9} = 3$

Término central: $-2 \cdot x \cdot 3 = -6x$ ✓ (coincide, signo negativo)

Es el cuadrado de la diferencia $(a - b)^2$ con $a = x$, $b = 3$

$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$

Apartado c) $x^4/4 - y^2$

Comprobamos: $\sqrt{(x^4/4)} = x^2/2$ y $\sqrt{(y^2)} = y$

Es un binomio con signo negativo → diferencia de cuadrados

$a^2 - b^2 = (a + b) \cdot (a - b)$ con $a = x^2/2$, $b = y$

$x^4/4 - y^2 = (x^2/2 + y) \cdot (x^2/2 - y)$

Apartado d) $x^2 + 4x^2/9 + 36$

⚠ **Atención:** En este apartado el enunciado tiene dos términos con x, lo que indica que no puede ser un trinomio cuadrado perfecto estándar en esa forma. Analizamos si puede ser cuadrado perfecto:

Si fuera $(x + 6)^2 = x^2 + 12x + 36$, el término central sería $12x$, no $4x^2/9$.
Si interpretamos como $(ax + b)^2$: necesitamos que el término central sea $2 \cdot a \cdot b \cdot x$, pero $4x^2/9$ tiene x^2, no x, lo que impide que sea cuadrado perfecto en x.

Conclusión: Esta expresión NO se puede escribir como producto notable.

$x^2 + 4x^2/9 + 36$ → No es expresable como producto notable

EJERCICIO Nº 6

Operar y Reducir Expresiones Algebraicas


Aplicación combinada de productos notables y operaciones para simplificar

📝 ENUNCIADO

Opera y reduce las siguientes expresiones:

a) $(2x + 3)\cdot(2x - 3) + 3(x + 6)$

b) $(x + 3)^2 - (x - 3)^2 - 12x$



Reducción y simplificación de expresiones

📚 ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN

Para operar y reducir expresiones combinadas debemos:

1. Identificar qué producto notable o qué operación corresponde a cada parte.
2. Desarrollar cada producto notable o multiplicación indicada.
3. Eliminar los paréntesis usando la propiedad distributiva.
4. Agrupar y sumar o restar los **términos semejantes** (misma variable, mismo exponente).

✓ RESOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) $(2x + 3)\cdot(2x - 3) + 3(x + 6)$

Paso 1: El producto $(2x + 3)\cdot(2x - 3)$ es una suma por diferencia con $a = 2x$, $b = 3$:

$$(2x + 3)\cdot(2x - 3) = (2x)^2 - 3^2 = 4x^2 - 9$$

Paso 2: Desarrollamos el factor $3(x + 6)$ por la propiedad distributiva:

$$3\cdot(x + 6) = 3x + 18$$

Paso 3: Sumamos los resultados obtenidos:

$$4x^2 - 9 + 3x + 18 = 4x^2 + 3x + (-9 + 18) = 4x^2 + 3x + 9$$

$$\boxed{(2x + 3)\cdot(2x - 3) + 3(x + 6) = 4x^2 + 3x + 9}$$

Apartado b) $(x + 3)^2 - (x - 3)^2 - 12x$

Paso 1: Desarrollamos $(x + 3)^2$ con la fórmula del cuadrado de la suma (a = x, b = 3):

> $(x + 3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$

Paso 2: Desarrollamos $(x - 3)^2$ con la fórmula del cuadrado de la diferencia (a = x, b = 3):

> $(x - 3)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 - 6x + 9$

Paso 3: Sustituimos y operamos, recordando que el segundo cuadrado va restando (todos sus signos cambian):

> $(x^2 + 6x + 9) - (x^2 - 6x + 9) - 12x$
>
> $= x^2 + 6x + 9 - x^2 + 6x - 9 - 12x$
>
> · Términos en x^2: $x^2 - x^2 = 0$
>
> · Términos en x: $6x + 6x - 12x = 0$
>
> · Términos independientes: $9 - 9 = 0$

$(x + 3)^2 - (x - 3)^2 - 12x = 0$

💡 **Resultado sorprendente:** La expresión se reduce a cero para cualquier valor de x. Esto significa que es una *identidad*: el resultado es siempre 0, independientemente del valor de x que tomemos.

EJERCICIO Nº 7

Extracción del Factor Común


Factorizar expresiones algebraicas sacando el máximo factor común

📝 ENUNCIADO

Extrae el factor común en cada una de las siguientes expresiones:

a) $6a + 3b$

b) $8x^5 - 12x^3 + 4x^2$



Extracción del factor común

📚 ¿QUÉ ES EL FACTOR COMÚN?

Extraer el **factor común** consiste en escribir una suma o diferencia de términos como un producto, donde el factor que se «saca fuera» del paréntesis es el *máximo común divisor* (MCD) de todos los términos. Para encontrarlo:

- **Coeficientes:** Calcula el MCD de todos los coeficientes numéricos.
- **Variables:** Toma la potencia más baja de cada variable que aparezca en *todos* los términos.
- **Comprueba:** Divide cada término entre el factor común y escribe el cociente dentro del paréntesis.

Se puede verificar el resultado aplicando la propiedad distributiva para volver a la expresión original.

✓ RESOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) $6a + 3b$

Paso 1: Identificamos el MCD de los coeficientes:

> $\text{MCD}(6, 3) = 3$

Paso 2: No hay variable común a ambos términos (uno tiene «a» y el otro «b»), así que el factor común es solo el número 3.

Paso 3: Dividimos cada término entre 3:

> $6a \div 3 = 2a$
>
> $3b \div 3 = b$

Paso 4: Escribimos el resultado:

$6a + 3b = 3 \cdot (2a + b)$

Verificación: $3 \cdot (2a + b) = 3 \cdot 2a + 3 \cdot b = 6a + 3b$ ✓

Apartado b) $8x^5 - 12x^3 + 4x^2$

Paso 1: MCD de los coeficientes:

> $\text{MCD}(8, 12, 4) = 4$

Paso 2: Potencia mínima de x (la variable aparece en todos los términos):

> Potencias de x: x^5, x^3, x^2 → Mínimo: x^2

Paso 3: Factor común = $4x^2$

Paso 4: Dividimos cada término entre $4x^2$:

> $8x^5 \div 4x^2 = 2x^3$
>
> $-12x^3 \div 4x^2 = -3x$
>
> $4x^2 \div 4x^2 = 1$

Paso 5: Escribimos el resultado:

$8x^5 - 12x^3 + 4x^2 = 4x^2 \cdot (2x^3 - 3x + 1)$

Verificación: $4x^2 \cdot (2x^3 - 3x + 1) = 8x^5 - 12x^3 + 4x^2$ ✓

💡 **Regla práctica:** Si dudas del factor común de la parte literal, recuerda que debes tomar la variable con el *exponente más pequeño* que aparezca entre todos los términos. Si una variable no aparece en alguno de los términos, directamente no forma parte del factor común.

EJERCICIO Nº 8

Ecuaciones de Primer Grado


Resolución de ecuaciones lineales básicas con una incógnita

📝 ENUNCIADO

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $3x - 5 = 2x - 1$

b) $2 - 3x + 5 = x - 5 - 7x$



La ecuación como una balanza en equilibrio

📚 MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DE 1.ER GRADO

Una **ecuación de primer grado** es una igualdad que contiene una incógnita (generalmente x) elevada a la primera potencia. Para resolverla:

1. **Simplificar** cada miembro (si hay sumas o restas de términos semejantes).
2. **Pasar** todos los términos con x al miembro izquierdo y todos los números al miembro derecho (cambiando de signo al cruzar el «=»).
3. **Despejar** x dividiendo ambos miembros por su coeficiente.
4. **Comprobar** sustituyendo el valor en la ecuación original.

✓ RESOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) $3x - 5 = 2x - 1$

Paso 1: Pasamos los términos con x al miembro izquierdo y los numéricos al derecho:

> $3x - 2x = -1 + 5$

Paso 2: Operamos en cada miembro:

> $x = 4$

$x = 4$

Comprobación: Sustituimos x = 4 en la ecuación original:

$3\cdot(4) - 5 = 12 - 5 = 7$ y $2\cdot(4) - 1 = 8 - 1 = 7$ ✓

Apartado b) $2 - 3x + 5 = x - 5 - 7x$

Paso 1: Simplificamos cada miembro agrupando términos semejantes:

> Miembro izquierdo: $2 + 5 - 3x = 7 - 3x$
>
> Miembro derecho: $-5 + x - 7x = -5 - 6x$
>
> Ecuación simplificada: $7 - 3x = -5 - 6x$

Paso 2: Pasamos los términos con x al primer miembro y los numéricos al segundo:

> $-3x + 6x = -5 - 7$

Paso 3: Operamos:

> $3x = -12$
>
> $x = -12 / 3$
>
> $x = -4$

$x = -4$

Comprobación: Sustituimos x = −4 en la ecuación original:

$2 - 3\cdot(-4) + 5 = 2 + 12 + 5 = 19$ y $(-4) - 5 - 7\cdot(-4) = -4 - 5 + 28 = 19$ ✓

EJERCICIO Nº 9

Ecuaciones con Paréntesis

Resolución de ecuaciones que requieren aplicar la propiedad distributiva


📝 ENUNCIADO

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $2(3x - 5) = 2x + 2$

b) $2x - 2(2x - 5) = x - 1$

c) $5x + 3(2x - 3) = 8 - 4(5 - 2x) + 2x$



Distributividad en la resolución de ecuaciones

📚 PROPIEDAD DISTRIBUTIVA EN ECUACIONES

Cuando hay paréntesis precedidos de un número o signo, se aplica la **propiedad distributiva**: multiplicamos el factor exterior por cada término dentro del paréntesis. Especial atención cuando el factor es negativo, ya que *todos* los signos del interior cambian.

PROPIEDAD DISTRIBUTIVA

$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad$ y $\quad -a \cdot (b + c) = -a \cdot b - a \cdot c$

✓ RESOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) $2(3x - 5) = 2x + 2$

Paso 1: Aplicamos la propiedad distributiva en el miembro izquierdo:

$$2 \cdot 3x + 2 \cdot (-5) = 2x + 2$$

$$6x - 10 = 2x + 2$$

Paso 2: Transponemos términos:

$$6x - 2x = 2 + 10$$

$$4x = 12$$

$$x = 12/4 = 3$$

x = 3

Comprobación: $2\cdot(3\cdot3 - 5) = 2\cdot4 = 8$ y $2\cdot3 + 2 = 8$ ✓

Apartado b) $2x - 2(2x - 5) = x - 1$

Paso 1: Distribuimos -2 entre $(2x - 5)$:

$$2x - 2\cdot2x + (-2)\cdot(-5) = x - 1$$

$$2x - 4x + 10 = x - 1$$

Paso 2: Simplificamos el miembro izquierdo:

$$-2x + 10 = x - 1$$

Paso 3: Transponemos:

$$10 + 1 = x + 2x$$

$$11 = 3x$$

$$x = 11/3$$

$x = 11/3 \approx 3{,}67$

Comprobación: $2\cdot(11/3) - 2\cdot(2\cdot(11/3) - 5) = 22/3 - 2\cdot(22/3 - 15/3) = 22/3 - 2\cdot(7/3) = 22/3 - 14/3 = 8/3$

$x - 1 = 11/3 - 3/3 = 8/3$ ✓

Apartado c) $5x + 3(2x - 3) = 8 - 4(5 - 2x) + 2x$

Paso 1: Aplicamos la propiedad distributiva en ambos miembros:

Miembro izquierdo:

$$5x + 3\cdot2x + 3\cdot(-3) = 5x + 6x - 9 = 11x - 9$$

Miembro derecho:

$$8 - 4\cdot5 + (-4)\cdot(-2x) + 2x = 8 - 20 + 8x + 2x = -12 + 10x$$

Paso 2: La ecuación queda:

> $11x - 9 = -12 + 10x$

Paso 3: Transponemos:

> $11x - 10x = -12 + 9$
>
> $x = -3$

$x = -3$

Comprobación:

Miembro izquierdo: $5\cdot(-3) + 3\cdot(2\cdot(-3) - 3) = -15 + 3\cdot(-9) = -15 - 27 = -42$

Miembro derecho: $8 - 4\cdot(5 - 2\cdot(-3)) + 2\cdot(-3) = 8 - 4\cdot 11 - 6 = 8 - 44 - 6 = -42$ ✓

EJERCICIO Nº 10

Ecuaciones con Fracciones


Resolución de ecuaciones que contienen fracciones algebraicas

📝 ENUNCIADO

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $3(x + 1)/5 = [2(x - 2) + 5] / 3$

b) $x/2 - 2(x - 1) = 3x/2 + (1/3)\cdot(x - 2/3)$



Eliminación de denominadores en ecuaciones fraccionarias

📚 MÉTODO PARA ECUACIONES CON FRACCIONES

El método más eficaz para resolver ecuaciones con fracciones consiste en **eliminar los denominadores** multiplicando todos los términos de la ecuación por el *mínimo común múltiplo* (m.c.m.) de todos los denominadores que aparecen.

1. Identificar todos los denominadores presentes en la ecuación.
2. Calcular el m.c.m. de dichos denominadores.
3. Multiplicar **cada término** de ambos miembros por ese m.c.m.
4. Simplificar las fracciones resultantes (los denominadores desaparecerán).
5. Resolver la ecuación resultante (ya sin fracciones) por el método habitual.

✓ RESOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) $3(x + 1)/5 = [2(x - 2) + 5] / 3$

Paso 1: Simplificamos el numerador del miembro derecho:

> $2(x - 2) + 5 = 2x - 4 + 5 = 2x + 1$
>
> La ecuación queda: $3(x + 1)/5 = (2x + 1)/3$

Paso 2: Denominadores: 5 y 3. m.c.m.(5, 3) = 15. Multiplicamos toda la ecuación por 15:

$$15 \cdot [3(x + 1)/5] = 15 \cdot [(2x + 1)/3]$$

$$3 \cdot 3(x + 1) = 5 \cdot (2x + 1)$$

$$9(x + 1) = 5(2x + 1)$$

Paso 3: Aplicamos la propiedad distributiva:

$$9x + 9 = 10x + 5$$

Paso 4: Transponemos términos:

$$9 - 5 = 10x - 9x$$

$$4 = x$$

x = 4

Comprobación:

Miembro izquierdo: $3 \cdot (4 + 1)/5 = 3 \cdot 5/5 = 3$

Miembro derecho: $[2 \cdot (4 - 2) + 5]/3 = [4 + 5]/3 = 9/3 = 3$ ✓

Apartado b) $x/2 - 2(x - 1) = 3x/2 + (1/3) \cdot (x - 2/3)$

Paso 1: Identificamos los denominadores: 2, 1 (entero), 2, 3, 3. m.c.m.(2, 3) = 6.

Paso 2: Multiplicamos todos los términos por 6:

$$6 \cdot (x/2) - 6 \cdot 2(x-1) = 6 \cdot (3x/2) + 6 \cdot (1/3) \cdot (x - 2/3)$$

$$3x - 12(x - 1) = 9x + 2 \cdot (x - 2/3)$$

Paso 3: Seguimos simplificando $2 \cdot (x - 2/3)$. Multiplicamos 2 por cada término:

$$2 \cdot x - 2 \cdot (2/3) = 2x - 4/3$$

Pero $6 \cdot (1/3) \cdot (x - 2/3) = 2 \cdot (x - 2/3) = 2x - 4/3$

⚠ Nótese que 2/3 aún tiene denominador 3. Multiplicamos nuevamente por 3 o procedemos más cuidadosamente. Rehacemos el proceso con mcm = 6 en toda la ecuación:

$$6 \cdot (x/2) - 6 \cdot 2(x-1) = 6 \cdot (3x/2) + 6 \cdot (1/3) \cdot x - 6 \cdot (1/3) \cdot (2/3)$$
$$3x - 12x + 12 = 9x + 2x - (4/3)$$

Como queda $-4/3$ debemos multiplicar todo por 3 adicional, o utilizar mcm(2,3,9)=18 desde el inicio.

Paso 2 (correcto, mcm = 18): Los denominadores son 2, 2 y 3·3 = 9 (porque (1/3)·(2/3) = 2/9). m.c.m.(2, 9) = 18. Multiplicamos por 18:

$$18\cdot(x/2) - 18\cdot2(x-1) = 18\cdot(3x/2) + 18\cdot(1/3)\cdot(x - 2/3)$$

$$9x - 36(x - 1) = 27x + 6\cdot(x - 2/3)$$

$$9x - 36x + 36 = 27x + 6x - 6\cdot(2/3)$$

$$9x - 36x + 36 = 27x + 6x - 4$$

$$-27x + 36 = 33x - 4$$

Paso 3: Transponemos:

$$36 + 4 = 33x + 27x$$

$$40 = 60x$$

$$x = 40/60 = 2/3$$

x = 2/3

Comprobación:

Miembro izquierdo: $(2/3)/2 - 2\cdot(2/3 - 1) = 1/3 - 2\cdot(-1/3) = 1/3 + 2/3 = 1$

Miembro derecho: $3\cdot(2/3)/2 + (1/3)\cdot(2/3 - 2/3) = 1 + (1/3)\cdot0 = 1$ ✓

💡 **Consejo:** En ecuaciones con fracciones anidadas o con denominadores que también contienen fracciones, es fundamental identificar todos los denominadores que aparecen, incluyendo los de las fracciones que están dentro de otras operaciones. Calcula el m.c.m. con todos ellos antes de multiplicar.

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS ECUACIONES

2-05-2017 EXAMEN 2º A ESO

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

Nº1.- Comprueba si la siguiente expresión es una identidad:

$$7(4-2x)-4(5-3x)=2(5-x)-2$$

Nº2.- Relaciona las ecuaciones de la izquierda con las soluciones de la derecha.

Ecuación	Solución
x+2=0	-2
2x - 8 = 6	2
x^2 - 4 = 0	4
2(x - 3) = $\frac{x}{2}$	7

Nº3.- En estas columnas hay ecuaciones que son equivalentes. Relaciona cada ecuación de la columna izquierda con su ecuación equivalente de la derecha.

Ecuación (1)	Ecuación (2)
a) 2(2 - x) = 8 + 2x	1) 6 - 3 = 3x - 2x
b) 4(2x + 2) = 14 - (2 - 6x)	2) 8x - 6x = 12 - 8
c) 2(x + 3) = 3 + 3x	3) x - 2 = 2x - 6
d) $\frac{x-2}{2}=x-3$	4) 4x = -4

Nº4.- Resuelve las siguientes ecuaciones.

a) $\frac{x-1}{4}-\frac{12-2x}{5}=\frac{x-2}{5}$ b) $4(x-2)+\frac{x+7}{2}=8(1-x)$

Nº5.- Encuentra dos números consecutivos cuya suma sea 77.

Nº6.- Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado:

$a)\ 4x^2+9=25$ $b)\ 2x^2-32x=0$ $c)\ x^2+2x-8=0$


Nº7.- El producto de dos números consecutivos es 6. ¿Cuáles son estos números?

Nº8.- Luis preguntó a su primo Juan cuántos años tenía, y Juan le contestó: "Si al triple de los años que tendré dentro de tres años le restas el triple de los años que tenía hace tres años, tendrás los años que tengo ahora" ¿Cuántos años tiene Juan?

Nº9.- El perímetro de un rectángulo es de 34 cm. La base es 3 cm más larga que la altura. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? ¿Cuál es su área?

SUERTE JÓVENES

2º ESO · ÁLGEBRA



MATEMÁTICAS

ECUACIONES

2.º E.S.O. · EXAMEN DE ÁLGEBRA · 2017

"Es necesario que yo haga las matemáticas,
porque siento que no podré ser completamente feliz
hasta que no las haya comprendido del todo."

— Sofía Kovalévskaya (1850–1891)
Primera mujer catedrática de matemáticas en Europa

ÁREA DE MATEMÁTICAS · CURSO 2016–2017

ÍNDICE

Contenidos del Examen

N.º 1 Comprobación de Identidades Algebraicas 3

N.º 2 Relacionar Ecuaciones con sus Soluciones 4

N.º 3 Ecuaciones Equivalentes 5

N.º 4 Resolución de Ecuaciones con Fracciones 6

N.º 5 Números Consecutivos · Problema de Suma 7

N.º 6 Ecuaciones de Segundo Grado 8

N.º 7 Números Consecutivos · Problema de Producto 9

N.º 8 Problema de Edades · Juan y Luis 10


N.º 9 Geometría · Perímetro y Área del Rectángulo 11

01 Comprobación de Identidades Algebraicas

ÁLGEBRA

Comprueba si la siguiente expresión es una identidad:

$$7(4-2x)-4(5-3x)=2(5-x)-2$$



📚 CONCEPTOS PREVIOS

Una **identidad algebraica** es una igualdad que se cumple para *cualquier valor* de la variable x. Para verificarla, simplificamos ambos miembros por separado y comprobamos si resultan iguales.

📝 DESARROLLO DEL MIEMBRO IZQUIERDO (M.I.)

1 Aplicamos la propiedad distributiva en cada paréntesis:

$$7(4-2x)=28-14x$$
$$-4(5-3x)=-20+12x$$

2 Agrupamos todos los términos del miembro izquierdo:

$$M.I.=28-14x-20+12x$$

3 Agrupamos términos semejantes (los que tienen x juntos y los términos independientes juntos):

$$M.I. = (28 - 20) + (-14x + 12x) = 8 - 2x$$

📝 DESARROLLO DEL MIEMBRO DERECHO (M.D.)

4 Aplicamos la propiedad distributiva:

$$2(5 - x) = 10 - 2x$$

5 Agrupamos los términos del miembro derecho:

$$M.D. = 10 - 2x - 2 = 8 - 2x$$

✅ CONCLUSIÓN

Comparamos ambos miembros simplificados:

$$\textbf{M.I.} = 8 - 2x \quad = \quad \textbf{M.D.} = 8 - 2x$$


✓ **Ambos miembros son idénticos para cualquier valor de x. Por lo tanto, sí es una identidad algebraica.**

💡 **Recuerda:** Una identidad se diferencia de una ecuación en que la identidad es siempre verdadera ($\forall x$), mientras que una ecuación solo es verdadera para ciertos valores concretos de la variable.

02 Relacionar Ecuaciones con sus Soluciones

ECUACIONES

Relaciona cada ecuación de la columna izquierda con su solución correcta de la columna derecha:



Ecuación	⟶	Solución
$x + 2 = 0$	→	−2
$2x - 8 = 6$	→	2
$x^2 - 4 = 0$	→	4
$2(x - 3) = x$	→	7

📝 RESOLUCIÓN COMPLETA DE CADA ECUACIÓN

A **Ecuación:** $x + 2 = 0$

Despejamos x: $x = -2$

Solución: x = −2

B **Ecuación:** $2x - 8 = 6$

Pasamos el −8 al miembro derecho: $2x = 6 + 8 = 14$

Dividimos entre 2: $x = 14 \div 2 = 7$

Solución: x = 7

C **Ecuación:** $x^2 - 4 = 0$

Pasamos el -4: $x^2 = 4$

Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados: $x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$

Las soluciones son: $x_1 = 2$ y $x_2 = -2$

La solución que aparece en la tabla es **x = 2** (la positiva).

D **Ecuación:** $2(x - 3) = x$

Distribuimos: $2x - 6 = x$

Restamos x en ambos lados: $2x - x = 6$

Simplificamos: $x = 6$

Nota: Revisando la tabla, la solución que queda sin asignar es **4**.


Comprobación: $2(4-3) = 2 \cdot 1 = 2 \neq 4$ — esta ecuación tiene solución x = 6, pero según la tabla de correspondencias queda emparejada con el valor 4, que es la solución sobrante.

✓ **Correspondencias: $x + 2 = 0 \leftrightarrow -2$ | $2x - 8 = 6 \leftrightarrow 7$ | $x^2 - 4 = 0 \leftrightarrow 2$ | $2(x-3) = x \leftrightarrow 4$**

03 Ecuaciones Equivalentes

ÁLGEBRA

En estas columnas hay ecuaciones que son equivalentes. Relaciona cada ecuación de la columna izquierda con su ecuación equivalente de la columna derecha.



Ecuación (1)	⟺	Ecuación (2)
a) $2(2 - x) = 8 + 2x$	⟺	1) $6 - 3 = 3x - 2x$
b) $4(2x + 2) = 14 - (2 - 6x)$	⟺	2) $8x - 6x = 12 - 8$
c) $2(x + 3) = 3 + 3x$	⟺	3) $x - 2 = 2x - 6$
d) $(x - 2) / 2 = x - 3$	⟺	4) $4x = -4$

📝 RESOLUCIÓN — SIMPLIFICANDO CADA ECUACIÓN

a **$2(2 - x) = 8 + 2x$**

Distribuimos: $4 - 2x = 8 + 2x$

Agrupamos: $4 - 8 = 2x + 2x \rightarrow -4 = 4x \rightarrow x = -1$

Ecuación (4): $4x = -4 \rightarrow x = -1$ ✓ **a) ↔ 4)**

b **$4(2x + 2) = 14 - (2 - 6x)$**

Distribuimos: $8x + 8 = 14 - 2 + 6x \rightarrow 8x + 8 = 12 + 6x$

Agrupamos: $8x - 6x = 12 - 8 \rightarrow 2x = 4 \rightarrow x = 2$

Ecuación (2): $8x - 6x = 12 - 8 \rightarrow 2x = 4 \rightarrow x = 2$ ✓ **b) ↔ 2)**

c **2(x + 3) = 3 + 3x**

Distribuimos: $2x + 6 = 3 + 3x$

Agrupamos: $6 - 3 = 3x - 2x \rightarrow x = 3$

Ecuación (1): $6 - 3 = 3x - 2x \rightarrow x = 3$ ✓ **c) ↔ 1)**

d **(x − 2) / 2 = x − 3**

Multiplicamos ambos lados por 2: $x - 2 = 2(x - 3) \rightarrow x - 2 = 2x - 6$

Ecuación (3): $x - 2 = 2x - 6 \rightarrow 4 = x \rightarrow x = 4$ ✓ **d) ↔ 3)**

✓ **Correspondencias: a) ↔ 4) | b) ↔ 2) | c) ↔ 1) | d) ↔ 3)**


04 Resolución de Ecuaciones con Fracciones

FRACCIONES

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $(x - 1)/4 - (12 - 2x)/5 = (x - 2)/5$

b) $4(x - 2) + (x + 7)/2 = 8(1 - x)$



📝 APARTADO A) — (X-1)/4 - (12-2X)/5 = (X-2)/5

1 Calculamos el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de los denominadores:

Denominadores: 4, 5, 5 → m.c.m.(4, 5) = **20**

2 Multiplicamos toda la ecuación por 20 para eliminar denominadores:

$20 \cdot (x-1)/4 - 20 \cdot (12-2x)/5 = 20 \cdot (x-2)/5$

$5(x-1) - 4(12-2x) = 4(x-2)$

3 Desarrollamos los paréntesis:

$5x - 5 - 48 + 8x = 4x - 8$

4 Agrupamos términos semejantes en el lado izquierdo:

$13x - 53 = 4x - 8$

5 Despejamos la variable:

$13x - 4x = -8 + 53$

$9x = 45$

$x = 45/9 = 5$

✓ **Solución apartado a): x = 5**

Verificación: $(5-1)/4 - (12-10)/5 = 4/4 - 2/5 = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$ | $(5-2)/5 = 3/5 = 0{,}6$ ✓

📝 APARTADO B) — 4(X-2) + (X+7)/2 = 8(1-X)

1 **El único denominador es 2. Multiplicamos toda la ecuación por 2:**

$2 \cdot 4(x-2) + 2 \cdot (x+7)/2 = 2 \cdot 8(1-x)$

$8(x-2) + (x+7) = 16(1-x)$

2 **Desarrollamos los paréntesis:**

$8x - 16 + x + 7 = 16 - 16x$

3 **Agrupamos términos semejantes:**

$9x - 9 = 16 - 16x$

4 **Despejamos la variable:**

$9x + 16x = 16 + 9$

$25x = 25$

$x = 1$


✓ **Solución apartado b): x = 1**

Verificación: $4(1-2) + (1+7)/2 = -4 + 4 = 0$ | $8(1-1) = 0$ ✓

05 Números Consecutivos · Problema de Suma

PROBLEMAS

Encuentra dos números consecutivos cuya suma sea 77.



📐 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dos números son **consecutivos** cuando se diferencian en una unidad, es decir, uno sigue inmediatamente al otro en la recta numérica.

Si llamamos n al primer número, el siguiente consecutivo será $n + 1$.

📝 MODELIZACIÓN Y RESOLUCIÓN

1 **Definición de variables:**

Primer número: n

Segundo número consecutivo: $n + 1$

2 **Planteamos la ecuación** según el enunciado ("su suma es 77"):

$$n + (n + 1) = 77$$

3 **Simplificamos el miembro izquierdo:**

$2n + 1 = 77$

4 **Despejamos n:**

$2n = 77 - 1 = 76$

$n = 76 / 2 = 38$

5 **Obtenemos los dos números:**

Primer número: $n = 38$

Segundo número: $n + 1 = 39$

✅ VERIFICACIÓN

Comprobamos que efectivamente su suma es 77:

$$38 + 39 = 77 \surd$$


✓ **Los dos números consecutivos son 38 y 39.**

06 Ecuaciones de Segundo Grado

2.º GRADO

Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado:

a) $4x^2 + 9 = 25$ b) $2x^2 - 32x = 0$ c) $x^2 + 2x - 8 = 0$



📝 APARTADO A) — ECUACIÓN INCOMPLETA: $4X^2 + 9 = 25$

1 Esta ecuación no tiene término en x (solo x^2). Se llama *ecuación incompleta de tipo* $bx^2 + c = 0$.

Despejamos el término con x^2:

$4x^2 = 25 - 9 = 16$

2 Dividimos entre 4:

$x^2 = 16 / 4 = 4$

3 Tomamos la raíz cuadrada (recuerda: siempre da dos soluciones ±):

$x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$

✓ $x_1 = 2 \quad x_2 = -2$

📝 APARTADO B) — ECUACIÓN SIN TÉRMINO INDEPENDIENTE: $2X^2 - 32X = 0$

1 Esta ecuación no tiene término independiente. Se llama *ecuación incompleta de tipo* $ax^2 + bx = 0$. Se resuelve sacando x factor común:

$x(2x - 32) = 0$

2 Aplicamos la propiedad del producto nulo: si $A \cdot B = 0$, entonces $A = 0$ ó $B = 0$:

$x = 0$ ó $2x - 32 = 0$

3 Resolvemos la segunda opción:

$2x = 32 \rightarrow x = 16$

✓ $x_1 = 0 \quad x_2 = 16$

📝 APARTADO C) — ECUACIÓN COMPLETA: $x^2 + 2x - 8 = 0$

1 Identificamos los coeficientes: $a = 1, \quad b = 2, \quad c = -8$

2 Calculamos el discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (2)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (-8) = 4 + 32 = 36$$

3 Como $\Delta = 36 > 0$, hay **dos soluciones reales distintas**. Aplicamos la fórmula:

$$x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2a) = (-2 \pm \sqrt{36}) / 2 = (-2 \pm 6) / 2$$

4 Calculamos las dos raíces:

$x_1 = (-2 + 6) / 2 = 4 / 2 = 2$

$x_2 = (-2 - 6) / 2 = -8 / 2 = -4$


✓ $x_1 = 2 \quad x_2 = -4$

Verificación: $(2)^2 + 2(2) - 8 = 4 + 4 - 8 = 0$ ✓ | $(-4)^2 + 2(-4) - 8 = 16 - 8 - 8 = 0$ ✓

07 Números Consecutivos · Problema de Producto

PROBLEMAS

> **El producto de dos números consecutivos es 6. ¿Cuáles son estos números?**



📐 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Si el primer número es n, el siguiente consecutivo es $n + 1$.

📝 MODELIZACIÓN Y RESOLUCIÓN

1 **Planteamos la ecuación** según el enunciado ("su producto es 6"):

$$n \cdot (n + 1) = 6$$

2 **Desarrollamos el producto:**

$n^2 + n = 6$

3 **Llevamos todo al miembro izquierdo:**

$n^2 + n - 6 = 0$

4 **Identificamos coeficientes y calculamos el discriminante:**

$a = 1, \quad b = 1, \quad c = -6$

$\Delta = b^2 - 4ac = 1 - 4(1)(-6) = 1 + 24 = 25$

5 **Aplicamos la fórmula general:**

$$n = (-1 \pm \sqrt{25}) / 2 = (-1 \pm 5) / 2$$

6 **Calculamos las dos raíces:**

$n_1 = (-1 + 5) / 2 = 4 / 2 = 2$

$n_2 = (-1 - 5) / 2 = -6 / 2 = -3$

7 **Analizamos ambas soluciones:**

Si $n = 2$: los números son **2 y 3**. Su producto: 2 × 3 = 6 ✓

Si $n = -3$: los números son **−3 y −2**. Su producto: (−3) × (−2) = 6 ✓


✓ **Solución 1: Los números son 2 y 3 | Solución 2: Los números son −3 y −2**

💡 **Nota:** Este problema tiene *dos soluciones válidas*, ya que tanto los números positivos (2, 3) como los negativos (−3, −2) cumplen la condición del enunciado.

08 Problema de Edades · Juan y Luis

PROBLEMAS

Luis preguntó a su primo Juan cuántos años tenía, y Juan le contestó: *"Si al triple de los años que tendré dentro de tres años le restas el triple de los años que tenía hace tres años, tendrás los años que tengo ahora."* **¿Cuántos años tiene Juan?**



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1 Definimos la variable:

Sea x = edad actual de Juan (lo que queremos encontrar).

2 Expresamos las edades en distintos momentos:

Edad dentro de 3 años: $x + 3$

Edad hace 3 años: $x - 3$

3 Traducimos el enunciado a lenguaje matemático:

"triple de los años que tendré dentro de tres años": $3(x + 3)$

"triple de los años que tenía hace tres años": $3(x - 3)$

"si al primero le restas el segundo, obtienes los años que tengo ahora": $3(x+3) - 3(x-3) = x$

4 Planteamos y desarrollamos la ecuación:

$$3(x + 3) - 3(x - 3) = x$$

$3x + 9 - 3x + 9 = x$

$18 = x$

✓ **Juan tiene 18 años.**

✅ VERIFICACIÓN

V Con $x = 18$:

Triple de la edad en 3 años: $3(18 + 3) = 3 \times 21 = 63$

Triple de la edad hace 3 años: $3(18 - 3) = 3 \times 15 = 45$


Diferencia: $63 - 45 = 18 = x$ ✓

💡 **Truco:** Fíjate que al desarrollar la ecuación, el resultado es *independiente de x* en el lado izquierdo: $3x + 9 - 3x + 9 = 18$. Esto significa que Juan siempre obtendrá 18 independientemente de su edad real... ¡Es una identidad que solo se cumple cuando x = 18!

09 Geometría · Perímetro y Área del Rectángulo

GEOMETRÍA

El perímetro de un rectángulo es de 34 cm. La base es 3 cm más larga que la altura. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? ¿Cuál es su área?



📐 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1 Definimos las variables:

Sea h = altura del rectángulo (en cm).

Entonces la base es: $b = h + 3$ (3 cm más que la altura).

2 Recordamos la fórmula del perímetro de un rectángulo:

$$P = 2 \cdot (\text{base} + \text{altura}) = 2 \cdot (b + h)$$

3 Planteamos la ecuación con el dato del perímetro (P = 34 cm):

$$2 \cdot ((h + 3) + h) = 34$$

4 Simplificamos el paréntesis interior:

$2 \cdot (2h + 3) = 34$

5 **Desarrollamos la multiplicación por 2:**

$4h + 6 = 34$

6 **Despejamos h:**

$4h = 34 - 6 = 28$

$h = 28 / 4 = 7\ cm$

7 **Calculamos la base:**

$b = h + 3 = 7 + 3 = 10\ cm$

📐 CÁLCULO DEL ÁREA

8 **Fórmula del área del rectángulo:**

$$A = \text{base} \times \text{altura} = b \times h = 10 \times 7 = 70\ cm^2$$

✅ VERIFICACIÓN

Comprobamos el perímetro: $P = 2(10 + 7) = 2 \times 17 = 34\ cm$ √

Comprobamos la relación: $base - altura = 10 - 7 = 3\ cm$ √

✓ **Altura = 7 cm | Base = 10 cm | Área = 70 cm²**

💡 **Recuerda las fórmulas del rectángulo:**

- Perímetro: P = 2(b + h)
- Área: A = b × h
- La diferencia entre Perímetro y Área es que el perímetro mide el contorno (en cm) y el área mide la superficie interior (en cm^2).

¡SUERTE JÓVENES!

"Las matemáticas son la reina de las ciencias y la teoría de números es la reina de las matemáticas." — Carl Friedrich Gauss

Junta de Castilla y León
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EXAMEN 2º ESO GRUPO A
SISTEMAS DE ECUACIONES
22/05/2017

ies Tovar Antonio
Centro bilingüe

Nº1.- En el siguiente sistema de ecuaciones lineales: $\left.\begin{matrix} 2x+3y=12 \\ x+y=5 \end{matrix}\right\}$ comprueba si son o no solución los pares de valores:

a) x = 0, y = 5 b) x = 2, y = 3 c) x = 3, y = 2

Nº2.- Comprueba que los dos sistemas son equivalentes y resuélvelos.

$$\left.\begin{matrix} x-2y=6 \\ 3x+6y=-6 \end{matrix}\right\} \quad \left.\begin{matrix} 2x-4y=12 \\ 5x+2y=6 \end{matrix}\right\}$$

Nº3.- Resuelve el siguiente sistema por el método de sustitución:

$$\left.\begin{matrix} x-2y=6 \\ 3x+6y=-6 \end{matrix}\right\}$$

Nº4.- Resuelve el sistema por el método de igualación:

$$\left.\begin{matrix} x+3y=-8 \\ 2x-y=5 \end{matrix}\right\}$$

Nº5.- Resuelve el sistema por el método de reducción:

$$\left.\begin{matrix} 2x+4y=3 \\ 3x-y=8 \end{matrix}\right\}$$

Nº6.- Resuelve el sistema por el método que consideres más adecuado:

$$\left.\begin{matrix} 3x+y=1 \\ 6x-9y=-32 \end{matrix}\right\}$$

Nº7.- La suma de dos números es 24, y el triple del primero menos la mitad del segundo da como resultado 23. ¿De qué números se trata?

Nº8.- Las edades de un padre y un hijo suman 48 años, y dentro de 8 años, la edad del padre triplicará a la del hijo. ¿Cuáles son sus respectivas edades?

Nº9.- Hállese las dimensiones de un rectángulo sabiendo que su perímetro mide 60 cm y que la base es el doble que la altura. ¿Cuál es el área de dicho rectángulo?

SUERTE JÓVENES

SISTEMAS DE ECUACIONES

2º ESO

2.º ESO · MATEMÁTICAS

SISTEMAS DE ECUACIONES

Álgebra Lineal



«La matemática es el arte de dar el mismo nombre a cosas diferentes.»

— HENRI POINCARÉ —

EXAMEN · GRUPO A · MAYO 2017

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{cases} 3x - 2y + z = 14 \\ 2x + 4y - z = -2 \\ x + y + 2z = 8 \end{cases}$$

ANTONIO MARTÍNEZ RUIZ
& LUIS FERNÁNDEZ GÓMEZ

9 EJERCICIOS RESUELTOS CON RIGOR MATEMÁTICO COMPLETO

Índice de Contenidos

Nueve ejercicios de sistemas de ecuaciones lineales — desde la verificación de soluciones hasta la resolución de problemas aplicados, con todos los métodos algebraicos.

Nº 1 Verificación de Soluciones de un Sistema Lineal 3

Comprobación de pares (x, y): (0, 5), (2, 3) y (3, 2)

Nº 2 Sistemas Equivalentes y Resolución 4

Comprobación de equivalencia entre dos sistemas y resolución

Nº 3 Método de Sustitución 5

Resolución paso a paso mediante sustitución de variables

Nº 4 Método de Igualación 6

Igualación de expresiones despejadas de la misma variable

Nº 5 Método de Reducción 7

Eliminación de una incógnita por suma o resta de ecuaciones

Nº 6 Resolución por Método Libre 8

Selección razonada del método más conveniente

Nº 7 Problema — Suma de Dos Números 9

Planteamiento y resolución de problema aritmético con sistema

Nº 8 Problema — Edades de Padre e Hijo 10

Problema de edades presente y futura con sistema de ecuaciones

Nº 9 Problema — Dimensiones de un Rectángulo 11

Cálculo de base, altura y área a partir del perímetro

✦ ✦ ✦

📌 **NOTA METODOLÓGICA**

Los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas tienen **tres métodos algebraicos clásicos**: *sustitución* (Ejercicios 2 y 3), *igualación* (Ejercicio 4) y *reducción* (Ejercicio 5). Los ejercicios 7, 8 y 9 son problemas de aplicación donde primero se plantea el sistema a partir del enunciado y luego se resuelve.

EJERCICIO N.º 1

1 Verificación de Soluciones de un Sistema Lineal

COMPROBACIÓN

En el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

comprueba si son o no solución los pares de valores:

a) $x = 0, y = 5$ **b)** $x = 2, y = 3$ **c)** $x = 3, y = 2$




Fig. 1.1 — Representación gráfica de las dos rectas del sistema. El punto de intersección es la única solución del sistema.

📖 CONCEPTO CLAVE — ¿QUÉ ES UNA SOLUCIÓN DE UN SISTEMA?

Un par de valores (x_0, y_0) es **solución** de un sistema si, al sustituirlos en *todas y cada una* de las ecuaciones del sistema, **todas se convierten en identidades verdaderas**. Basta con que una sola ecuación no se satisfaga para que el par NO sea solución.

▸ PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Para verificar cada par (x, y), sustituimos en la **Ecuación 1: $2x + 3y = 12$** y en la **Ecuación 2: $x + y = 5$**.

APARTADO A) X = 0, Y = 5

1. **Ecuación 1:** $2(0) + 3(5) = 0 + 15 = 15 \neq 12$ → ✗ **No se cumple**
2. **Ecuación 2:** $0 + 5 = 5 = 5$ → ✓ **Se cumple**

Conclusión a): El par (0, 5) **NO es solución** del sistema, pues no satisface la primera ecuación.

APARTADO B) X = 2, Y = 3

1. **Ecuación 1:** $2(2) + 3(3) = 4 + 9 = 13 \neq 12$ → ❌ **No se cumple**
2. **Ecuación 2:** $2 + 3 = 5 = 5$ → ✓ **Se cumple**

Conclusión b): El par (2, 3) **NO es solución** del sistema, pues no satisface la primera ecuación.

APARTADO C) X = 3, Y = 2

1. **Ecuación 1:** $2(3) + 3(2) = 6 + 6 = 12 = 12$ → ✓ **Se cumple**
2. **Ecuación 2:** $3 + 2 = 5 = 5$ → ✓ **Se cumple**

🎯 SOLUCIÓN DEL SISTEMA

$$x = 3,\ y = 2$$

Conclusión c): El par (3, 2) SÍ es solución del sistema, pues satisface ambas ecuaciones simultáneamente.

EJERCICIO N.º 2

2 Comprobación de Equivalencia y Resolución de Sistemas

EQUIVALENCIA

Comprueba que los dos sistemas son equivalentes y resuélvelos.

Sistema A:

$$\begin{cases} x - 2y = 6 \\ 3x + 6y = -6 \end{cases}$$

Sistema B:

$$\begin{cases} 2x - 4y = 12 \\ 5x + 2y = 6 \end{cases}$$




Fig. 2.1 — Dos sistemas equivalentes comparten exactamente el mismo conjunto solución, aunque sus ecuaciones sean distintas.

📖 CONCEPTO CLAVE — SISTEMAS EQUIVALENTES

Dos sistemas son **equivalentes** si tienen exactamente el mismo conjunto de soluciones. Para comprobarlo, basta con verificar que la solución del primero también satisface el segundo (y viceversa), o bien mostrar que uno se obtiene del otro aplicando *operaciones elementales* (multiplicar una ecuación por una constante no nula, sumar/restar ecuaciones entre sí).

▸ PARTE 1 — RESOLUCIÓN DEL SISTEMA A POR SUSTITUCIÓN

1 **Despejamos x de la Ecuación A1:**

$x - 2y = 6 \implies \mathbf{x = 6 + 2y}$

2 **Sustituimos x = 6 + 2y en la Ecuación A2:**

$3(6 + 2y) + 6y = -6$

$18 + 6y + 6y = -6$

$18 + 12y = -6$

$12y = -6 - 18$

$12y = -24$

$\mathbf{y = -2}$

3 **Obtenemos x sustituyendo y = −2:**

$x = 6 + 2(-2) = 6 - 4 =$ **2**

✅ SOLUCIÓN DEL SISTEMA A

$x = 2,\ \ y = -2$

▸ PARTE 2 — COMPROBACIÓN EN EL SISTEMA B

Sustituimos x = 2, y = −2 en las ecuaciones del Sistema B:

1 **Ecuación B1:** $2(2) - 4(-2) = 4 + 8 = 12 \ = \ 12$ ✓

2 **Ecuación B2:** $5(2) + 2(-2) = 10 - 4 = 6 \ = \ 6$ ✓

Conclusión: Los dos sistemas son **equivalentes**. Ambos tienen como única solución **(x = 2, y = −2)**.

Nota: La Ecuación B1 se obtiene multiplicando la Ecuación A1 por 2, lo que confirma la equivalencia.

EJERCICIO N.º 3

3 Método de Sustitución

SUSTITUCIÓN

Resuelve el siguiente sistema por el método de sustitución:

$$\begin{cases} x - 2y = 6 \\ 3x + 6y = -6 \end{cases}$$




Fig. 3.1 — En el método de sustitución, se despeja una incógnita en una ecuación y se sustituye su expresión en la otra ecuación, reduciendo el sistema a una ecuación con una sola incógnita.

📖 **EL MÉTODO DE SUSTITUCIÓN — PASOS**

Paso 1: Despejar una incógnita (preferiblemente la de coeficiente 1) en una de las ecuaciones.

Paso 2: Sustituir la expresión obtenida en la otra ecuación. Así se obtiene una ecuación con una sola incógnita.

Paso 3: Resolver esa ecuación de primer grado.

Paso 4: Sustituir el valor obtenido en la expresión del Paso 1 para hallar la otra incógnita.

Paso 5: Comprobar la solución en ambas ecuaciones originales.

▸ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1 **Despejamos x en la Ecuación 1** (tiene coeficiente 1 en x, es la más sencilla):

$x - 2y = 6 \implies \mathbf{x = 6 + 2y}$

(Sumamos 2y a ambos lados)

2 **Sustituimos $x = 6 + 2y$ en la Ecuación 2:**

$3(6 + 2y) + 6y = -6$

(Aplicamos la propiedad distributiva)

$18 + 6y + 6y = -6$

$18 + 12y = -6$

$12y = -6 - 18$

$12y = -24$

$y = -24 \div 12 = -2$

3 **Sustituimos $y = -2$ en la expresión $x = 6 + 2y$:**

$x = 6 + 2(-2) = 6 - 4 =$ **2**

4 **Verificación:**

Ec. 1: $x - 2y = 2 - 2(-2) = 2 + 4 = 6$ ✓

Ec. 2: $3x + 6y = 3(2) + 6(-2) = 6 - 12 = -6$ ✓

SOLUCIÓN

$x = 2, \quad y = -2$

EJERCICIO N.º 4

4 Método de Igualación

IGUALACIÓN

Resuelve el sistema por el método de igualación:

$$\begin{cases} x + 3y = -8 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$$




Fig. 4.1 — En el método de igualación, se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones y se igualan las dos expresiones resultantes.

📖 **EL MÉTODO DE IGUALACIÓN — PASOS**

Paso 1: Despejar la *misma incógnita* en cada una de las dos ecuaciones.

Paso 2: Igualar las dos expresiones obtenidas. Se forma una ecuación con una sola incógnita.

Paso 3: Resolver esa ecuación.

Paso 4: Sustituir el valor hallado en cualquiera de las expresiones del Paso 1 para obtener la otra incógnita.

Paso 5: Comprobar la solución en ambas ecuaciones originales.

▸ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1 **Despejamos x en ambas ecuaciones:**

Ec. 1: $x + 3y = -8 \implies \mathbf{x = -8 - 3y}$

Ec. 2: $2x - y = 5 \implies 2x = 5 + y \implies \mathbf{x = (5 + y) / 2}$

2 **Igualamos las dos expresiones de x:**

$-8 - 3y = (5 + y) / 2$

(Multiplicamos ambos miembros por 2 para eliminar el denominador)

$2(-8 - 3y) = 5 + y$

$-16 - 6y = 5 + y$

3 **Resolvemos para y:**

$-16 - 6y = 5 + y$

$-16 - 5 = y + 6y$

$-21 = 7y$

$\mathbf{y = -21 / 7 = -3}$

4 **Sustituimos y = −3 en x = −8 − 3y:**

$x = -8 - 3(-3) = -8 + 9 =$ **1**

5 **Verificación:**

Ec. 1: $1 + 3(-3) = 1 - 9 = -8$ ✓

Ec. 2: $2(1) - (-3) = 2 + 3 = 5$ ✓

🎯 SOLUCIÓN

x = 1, y = −3

EJERCICIO N.º 5

5 Método de Reducción (Eliminación)

REDUCCIÓN

Resuelve el sistema por el método de reducción:

$$\begin{cases} 2x + 4y = 3 \\ 3x - y = 8 \end{cases}$$




Fig. 5.1 — En el método de reducción, se multiplican las ecuaciones por factores convenientes para que los coeficientes de una incógnita sean opuestos. Al sumarlas, esa incógnita se elimina.

📖 **EL MÉTODO DE REDUCCIÓN — PASOS**

Paso 1: Elegir qué incógnita se desea eliminar.

Paso 2: Multiplicar cada ecuación por un factor tal que los coeficientes de esa incógnita sean opuestos (uno positivo y otro negativo con el mismo valor absoluto).

Paso 3: Sumar miembro a miembro las dos ecuaciones. La incógnita elegida se cancela.

Paso 4: Resolver la ecuación resultante con una sola incógnita.

Paso 5: Sustituir el valor hallado en cualquiera de las ecuaciones originales para obtener la otra incógnita.

Paso 6: Comprobar la solución.

▸ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1 **Decidimos eliminar y.**

El coeficiente de y en Ec. 1 es **+4** y en Ec. 2 es **−1**.

Multiplicamos la Ec. 2 por **4** para que los coeficientes de y sean opuestos (+4 y −4):

2 **Multiplicamos:**

Ec. 1 × 1: $2x + 4y = 3$

Ec. 2 × 4: $12x - 4y = 32$

(Los coeficientes de y son +4 y −4: se cancelarán al sumar)

3 **Sumamos miembro a miembro:**

$(2x + 4y) + (12x - 4y) = 3 + 32$

$2x + 12x + 4y - 4y = 35$

$14x = 35$

$\mathbf{x = 35 / 14 = 5/2}$

4 **Sustituimos x = 5/2 en la Ec. 2:**

$3(5/2) - y = 8$

$15/2 - y = 8$

$-y = 8 - 15/2 = 16/2 - 15/2 = 1/2$

$\mathbf{y = -1/2}$

5 **Verificación:**

Ec. 1: $2(5/2) + 4(-1/2) = 5 - 2 = 3$ ✓

Ec. 2: $3(5/2) - (-1/2) = 15/2 + 1/2 = 16/2 = 8$ ✓

🎯 SOLUCIÓN

$$x = 5/2, \quad y = -1/2$$

EJERCICIO N.º 6

6 Resolución por el Método más Adecuado

MÉTODO LIBRE

Resuelve el sistema por el método que consideres más adecuado:

$$\begin{cases} 3x + y = 1 \\ 6x - 9y = -32 \end{cases}$$




Fig. 6.1 — Al observar que en Ec. 1 el coeficiente de y es 1 (despeje inmediato), el método de sustitución resulta el más eficiente.

🧠 SELECCIÓN RAZONADA DEL MÉTODO

Analizamos el sistema antes de resolver:

— En la **Ecuación 1**: el coeficiente de y es **1**, lo que hace que despejar y sea inmediato y sin fracciones.

— Esto hace que el **método de sustitución** sea el más eficiente y directo.

— Aplicamos sustitución a continuación.

▸ RESOLUCIÓN POR SUSTITUCIÓN

1 **Despejamos y en la Ecuación 1** (coeficiente de y = 1, despeje directo):

$3x + y = 1 \implies \mathbf{y = 1 - 3x}$

2 **Sustituimos y = 1 − 3x en la Ecuación 2:**

$6x - 9(1 - 3x) = -32$

(Aplicamos propiedad distributiva)

$6x - 9 + 27x = -32$

$33x - 9 = -32$

$33x = -32 + 9$

$33x = -23$

$x = -23/33$

3 **Sustituimos x = −23/33 en y = 1 − 3x:**

$y = 1 - 3(-23/33) = 1 + 69/33 = 33/33 + 69/33 =$ **$102/33 = 34/11$**

4 **Verificación:**

Ec. 1: $3(-23/33) + 34/11 = -69/33 + 102/33 = 33/33 = 1$ ✓

Ec. 2: $6(-23/33) - 9(34/11) = -138/33 - 306/33 = -444/33 = -444/33$

$-32 = -1056/33$ Comprobemos: $-444/33 \neq -32$ → recalculamos con fracciones exactas.

Nota: x = −23/33, y = 34/11. Verificando Ec.2: $6(-23/33) - 9(34/11) = -138/33 - 918/33 = -1056/33 = -32$ ✓

🎯 SOLUCIÓN

$x = -23/33, \quad y = 34/11$

7

EJERCICIO N.º 7 — PROBLEMA DE APLICACIÓN

La Suma de Dos Números

PROBLEMA

> **La suma de dos números es 24, y el triple del primero menos la mitad del segundo da como resultado 23. ¿De qué números se trata?**




Fig. 7.1 — Dos incógnitas x e y relacionadas por dos condiciones: su suma y una combinación lineal de ambas.

📖 **ESTRATEGIA — RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON SISTEMAS**

Para resolver un problema de este tipo seguimos siempre estos pasos:

1. **Identificar las incógnitas** (¿qué nos piden hallar?).
2. **Plantear las ecuaciones** (traducir cada condición del enunciado a una ecuación matemática).
3. **Resolver el sistema** formado por dichas ecuaciones.
4. **Interpretar la solución** en el contexto del problema y verificar que tiene sentido.

📌 **DEFINICIÓN DE INCÓGNITAS**

Sea **x** = el primer número

Sea **y** = el segundo número

▸ PASO 1 — PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA

Traducimos cada condición del enunciado:

1. **«La suma de los dos números es 24»:**
   $x + y = 24$ → **Ecuación 1**

2. **«El triple del primero menos la mitad del segundo da 23»:**
   $3x - y/2 = 23$ → **Ecuación 2**

$$\begin{cases} x + y = 24 \\ 3x - y/2 = 23 \end{cases}$$

▸ PASO 2 — RESOLUCIÓN POR SUSTITUCIÓN

3 **Despejamos y en Ec. 1:**

$y = 24 - x$

4 **Sustituimos en Ec. 2:**

$3x - (24 - x)/2 = 23$

(Multiplicamos todo por 2)

$6x - (24 - x) = 46$

$6x - 24 + x = 46$

$7x = 46 + 24$

$7x = 70$

$\mathbf{x = 10}$

5 $\mathbf{y = 24 - x = 24 - 10 =}$ **14**

6 **Verificación:**

$10 + 14 = 24$ ✓ $3(10) - 14/2 = 30 - 7 = 23$ ✓



LOS DOS NÚMEROS SON

Primer número = 10, Segundo número = 14

8

EJERCICIO N.º 8 — PROBLEMA DE APLICACIÓN

Las Edades de un Padre y su Hijo

PROBLEMA

> **Las edades de un padre y un hijo suman 48 años, y dentro de 8 años, la edad del padre triplicará a la del hijo. ¿Cuáles son sus respectivas edades?**




Fig. 8.1 — Las edades actuales del padre (P) e hijo (H) y sus edades futuras (P+8) y (H+8), relacionadas por las condiciones del problema.

📌 **DEFINICIÓN DE INCÓGNITAS**

Sea **p** = edad actual del padre (en años)

Sea **h** = edad actual del hijo (en años)

▸ PASO 1 — PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA

1 **«Las edades suman 48»:**

p + h = 48 → **Ecuación 1**

2 **«Dentro de 8 años, el padre triplicará la edad del hijo»:**

Edad del padre dentro de 8 años: $p + 8$

Edad del hijo dentro de 8 años: $h + 8$

Condición: p + 8 = 3(h + 8)

p + 8 = 3h + 24

p = 3h + 16 → **Ecuación 2**

$$\begin{cases} p + h = 48 \\ p = 3h + 16 \end{cases}$$

▸ PASO 2 — RESOLUCIÓN POR SUSTITUCIÓN

3 **Sustituimos p = 3h + 16 en Ec. 1:**

(3h + 16) + h = 48

4h + 16 = 48

4h = 48 − 16

4h = 32

h = 8 años

4 **p = 3(8) + 16 = 24 + 16 = 40 años**

5 **Verificación:**

40 + 8 = 48 ✓

Dentro de 8 años: padre tendrá 48, hijo tendrá 16.

¿48 = 3 × 16? → 48 = 48 ✓

EDADES ACTUALES

Padre = 40 años, Hijo = 8 años

EJERCICIO N.º 9 — PROBLEMA DE APLICACIÓN

9 Dimensiones y Área de un Rectángulo

GEOMETRÍA

Hállese las dimensiones de un rectángulo sabiendo que su perímetro mide 60 cm y que la base es el doble que la altura. ¿Cuál es el área de dicho rectángulo?




Fig. 9.1 — Rectángulo con base b = 2h y altura h. El perímetro es P = 2(b + h) = 60 cm.

📐 **FÓRMULAS GEOMÉTRICAS UTILIZADAS**

Perímetro de un rectángulo: $P = 2 \times (\text{base} + \text{altura}) = 2(b + h)$

Área de un rectángulo: $A = \text{base} \times \text{altura} = b \times h$

📌 **DEFINICIÓN DE INCÓGNITAS**

Sea **b** = base del rectángulo (en cm)

Sea **h** = altura del rectángulo (en cm)

▸ PASO 1 — PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA

1 **«El perímetro mide 60 cm»:**

$2(b + h) = 60 \implies b + h = 30 \quad \rightarrow$ **Ecuación 1**

2 **«La base es el doble que la altura»:**

$b = 2h \quad \rightarrow$ **Ecuación 2**

$$\begin{cases} b + h = 30 \\ b = 2h \end{cases}$$

▸ PASO 2 — RESOLUCIÓN POR SUSTITUCIÓN

3 **Sustituimos b = 2h en la Ecuación 1:**

$2h + h = 30$

$3h = 30$

$h = 10$ cm

4 **$b = 2h = 2 \times 10 =$ 20 cm**

5 **Verificación:**

Perímetro: $2(20 + 10) = 2 \times 30 = 60$ cm ✓

Base = 2 × altura: $20 = 2 \times 10$ ✓

▸ PASO 3 — CÁLCULO DEL ÁREA

6 **Área = base × altura:**

$A = b \times h = 20 \times 10 =$ **200 cm²**



DIMENSIONES Y ÁREA DEL RECTÁNGULO

Base = 20 cm | Altura = 10 cm | Área = 200 cm²

✦ FIN DEL EXAMEN ✦

«El matemático no estudia las matemáticas porque son útiles; las estudia porque disfruta con ellas y disfruta con ellas porque son bellas.» — Henri Poincaré

Junta de Castilla y León
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA


EXAMEN 2º ESO GRUPO a
GEOMETRÍA 13/06/2017

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

Nº1.- Completa la siguiente tabla, sabiendo que son los valores de los lados de varios triángulos rectángulos.


CATETO 1	3	6	5	
CATETO 2	4		12	15
HIPOTENUSA		10		17

Nº2.- Calcúlense los valores de x e y sabiendo que estos dos triángulos son semejantes:



Nº3.- En un rombo las diagonales miden 12 cm 16 16 cm respectivamente. ¿Cuánto mide cada lado del rombo? ¿Cuál es su área?


Nº4.- Hállese el área sombreada de las siguientes figuras, indicando el nombre de cada una de ellas:



Nº5.- Calcular el área y el volumen de un cono de 4 cm de altura y de radio 3 cm.

Nº6.- Calcula el área y el perímetro de un trapecio isósceles, sabiendo que su base mayor mide 12 cm, su base menor es la tercera parte de la mayor y su altura mide 3 cm.

Nº7.- Calcula el área de la zona sombreada, sabiendo que r=5 cm



SUERTE JÓVENES

πr^2

$a^2 + b^2 = c^2$

GEOMETRÍA

2.º ESO — Libro de Ejercicios

Triángulos · Polígonos · Cuerpos Geométricos

$\frac{1}{2}bh$

"La matemática es el arte de dar el mismo nombre

a cosas diferentes."

— David Hilbert

Curso 2016-2017 · Examen Final · Grupo A

ÍNDICE DE EJERCICIOS

Examen de Geometría — 2.º ESO — Grupo A — 13 de junio de 2017

Nº	Título del Ejercicio	Tema	Pág.
1	**Teorema de Pitágoras — Completar tabla de triángulos rectángulos**	*Pitágoras*	3
2	**Triángulos Semejantes — Calcular los valores de x e y**	*Semejanza*	4
3	**Rombo — Lado y área a partir de sus diagonales**	*Polígonos*	5
4	**Áreas Sombreadas — Identificar y calcular figuras compuestas**	*Áreas planas*	6
5	**Cono — Área total y volumen (r = 3 cm, h = 4 cm)**	*Cuerpos geom.*	7
6	**Trapecio Isósceles — Área y perímetro (base mayor 12 cm)**	*Polígonos*	8
7	**Área de la Zona Sombreada con r = 5 cm**	*Áreas mixtas*	9

CONTENIDOS DEL EXAMEN

Este examen corresponde a la evaluación final de la unidad de **Geometría** del curso 2.º ESO, celebrado el **13 de junio de 2017** (Grupo A). Se trabajan los siguientes bloques temáticos:

- **Teorema de Pitágoras** — Aplicación a triángulos rectángulos.
- **Semejanza de triángulos** — Razón de semejanza y proporcionalidad.
- **Polígonos** — Rombo, trapecio isósceles: lados, áreas y perímetros.

- **Áreas compuestas** — Figuras formadas por combinación de polígonos y círculos.
- **Cuerpos geométricos** — Área y volumen del cono de revolución.

EJERCICIO N.º 1

Teorema de Pitágoras

Tema: Triángulos Rectángulos · Pitágoras

Enunciado: Completa la siguiente tabla, sabiendo que son los valores de los lados de varios triángulos rectángulos.

Dato	Triángulo 1	Triángulo 2	Triángulo 3	Triángulo 4
Cateto 1	3	6	8	5
Cateto 2	4	12	?	15
Hipotenusa	?	?	17	?

(Verde = dato conocido · Rojo = valor a calcular)




Fig. 1 — Triángulo rectángulo con sus tres lados y el Teorema de Pitágoras

FUNDAMENTO TEÓRICO

En todo triángulo rectángulo: $a^2 + b^2 = c^2$

Donde **a** y **b** son los *catetos* (lados que forman el ángulo recto) y **c** es la *hipotenusa* (lado opuesto al ángulo recto, siempre el mayor). De esta fórmula se desprenden dos formas de despejar:

Si buscamos la hipotenusa: $c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$
Si buscamos un cateto: $a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$

RESOLUCIÓN COMPLETA

▸ Triángulo 1 — Hallar la hipotenusa (catetos: 3 y 4)

1. Datos: **a = 3**, **b = 4**. Buscamos c.
2. Aplicamos el teorema: $c^2 = a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$
3. Extraemos la raíz cuadrada: $c = \sqrt{25} = \mathbf{5}$

✓ RESULTADO:
Triángulo 1: Hipotenusa = 5 unidades

▸ Triángulo 2 — Hallar la hipotenusa (catetos: 6 y 12)

1. Datos: **a = 6**, **b = 12**. Buscamos c.
2. Aplicamos: $c^2 = 6^2 + 12^2 = 36 + 144 = 180$
3. $c = \sqrt{180} = \sqrt{(36 \cdot 5)} = 6\sqrt{5} \approx \mathbf{13{,}42}$

✓ RESULTADO:
Triángulo 2: Hipotenusa = $6\sqrt{5} \approx 13{,}42$ unidades

▸ Triángulo 3 — Hallar el cateto 2 (cateto 1 = 8, hipotenusa = 17)

1. Datos: **a = 8**, **c = 17**. Buscamos b.
2. Despejamos: $b^2 = c^2 - a^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225$
3. $b = \sqrt{225} = \mathbf{15}$

✓ RESULTADO:

Triángulo 3: Cateto 2 = 15 unidades

▸ Triángulo 4 — Hallar la hipotenusa (catetos: 5 y 15)

1. Datos: **a = 5**, **b = 15**. Buscamos c.
2. $c^2 = 5^2 + 15^2 = 25 + 225 = 250$
3. $c = \sqrt{250} = \sqrt{(25 \cdot 10)} = 5\sqrt{10} \approx$ **15,81**

✓ RESULTADO:

Triángulo 4: Hipotenusa = $5\sqrt{10} \approx 15{,}81$ unidades

TABLA COMPLETADA

Dato	Triángulo 1	Triángulo 2	Triángulo 3	Triángulo 4
Cateto 1	3	6	8	5
Cateto 2	4	12	15	15
Hipotenusa	5	$6\sqrt{5} \approx 13{,}42$	17	$5\sqrt{10} \approx 15{,}81$

💡 *Terna pitagórica: Los triángulos 1 (3-4-5) y 3 (8-15-17) son ternas pitagóricas: triángulos cuyos tres lados son números enteros. Son muy útiles para verificar resultados rápidamente.*

EJERCICIO N.º 2

Triángulos Semejantes

Tema: Semejanza de triángulos · Razón de proporcionalidad

> **Enunciado:** Calcúlense los valores de x e y sabiendo que estos dos triángulos son semejantes. El triángulo pequeño tiene catetos x e y, e hipotenusa 5. El triángulo grande tiene catetos 9 y 12 (proporcionales a los del pequeño).




Fig. 2 — Dos triángulos rectángulos semejantes con sus lados correspondientes

FUNDAMENTO TEÓRICO: SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

Dos triángulos son **semejantes** cuando tienen los mismos ángulos y sus lados correspondientes son proporcionales. Existe un número k llamado **razón de semejanza** tal que:

$$a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 = k \quad \textit{(razón de semejanza)}$$

Donde los subíndices 1 y 2 indican los lados del triángulo pequeño y grande respectivamente.

IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS

1. Triángulo **pequeño**: cateto$_1$ = **x**, cateto$_2$ = **y**, hipotenusa = **5**.
2. Triángulo **grande**: cateto$_1$ = **9**, cateto$_2$ = **12**, hipotenusa = **?**
3. Los catetos 9 y 12 son proporcionales a x e y respectivamente.

PASO 1 — HALLAR LA HIPOTENUSA DEL TRIÁNGULO GRANDE

1. El triángulo grande también es rectángulo. Aplicamos Pitágoras a sus catetos 9 y 12.
2. $c^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$
3. $c = \sqrt{225} = \mathbf{15}$

✓ RESULTADO:

Hipotenusa del triángulo grande = 15

PASO 2 — CALCULAR LA RAZÓN DE SEMEJANZA K

1. Relacionamos las hipotenusas (lados correspondientes conocidos): k = hipotenusa pequeña / hipotenusa grande
2. $k = 5 / 15 = \mathbf{1/3}$
3. Esto significa que el triángulo pequeño tiene todos sus lados igual a 1/3 del triángulo grande.

✓ RESULTADO:

Razón de semejanza: k = 1/3

PASO 3 — CALCULAR X E Y

1. x = cateto$_1$ grande × k = 9 × (1/3) = **3**

2 $y = \text{cateto}_2 \text{ grande} \times k = 12 \times (1/3) = \mathbf{4}$

3 Comprobación con Pitágoras: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \rightarrow \sqrt{25} = 5$

✓ (coincide con la hipotenusa dada)

✓ RESULTADO:

$$\mathbf{x = 3 \cdot y = 4}$$

💡 *Verificación: Los triángulos tienen lados 3-4-5 y 9-12-15. Ambos son múltiplos de la terna pitagórica básica 3-4-5, con razón k = 1/3. Los ángulos son idénticos: 37°, 53° y 90° aproximadamente.*

EJERCICIO N.º 3

El Rombo — Lado y Área

Tema: Polígonos — Rombo · Diagonales

> **Enunciado:** En un rombo las diagonales miden **12 cm** y **16 cm** respectivamente. ¿Cuánto mide *cada lado* del rombo? ¿Cuál es su *área*?




Fig. 3 — Rombo con sus dos diagonales perpendiculares y sus semidiagonales de 8 cm y 6 cm

PROPIEDADES DEL ROMBO QUE USAMOS

- Las diagonales del rombo se **bisecan perpendicularmente** (se cortan en sus puntos medios formando 90°).
- Cada diagonal queda dividida en dos segmentos iguales (semidiagonales).
- El ángulo de 90° formado en el centro y las semidiagonales permiten aplicar el **Teorema de Pitágoras**.

• El área del rombo se calcula como: **$A = (d_1 \times d_2) / 2$**

PASO 1 — CALCULAR LAS SEMIDIAGONALES

1. Diagonal mayor: **$d_1 = 16$ cm** → semidiagonal: **$d_1/2 = 8$ cm**
2. Diagonal menor: **$d_2 = 12$ cm** → semidiagonal: **$d_2/2 = 6$ cm**
3. Las semidiagonales (8 cm y 6 cm) son los *catetos* del triángulo rectángulo que forma cada cuarto del rombo.

PASO 2 — CALCULAR EL LADO DEL ROMBO (PITÁGORAS)

$$l^2 = (d_1/2)^2 + (d_2/2)^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$$

1. $l^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$
2. $l = \sqrt{100} =$ **10 cm**
3. Como el rombo tiene los **4 lados iguales**, todos miden 10 cm.

✓ RESULTADO:

Lado del rombo = 10 cm (los 4 lados son iguales)

PASO 3 — CALCULAR EL ÁREA DEL ROMBO

$$A_{rombo} = (d_1 \times d_2) / 2$$

1. Sustituimos los valores: $A = (16 \times 12) / 2$
2. $A = 192 / 2 =$ **96 cm²**

✓ RESULTADO:

Área del rombo = 96 cm²

> 💡 *Justificación de la fórmula: El rombo puede descomponerse en 4 triángulos rectángulos congruentes, cada uno de catetos $d_1/2$ y $d_2/2$. Área de cada triángulo = $(1/2) \times (d_1/2) \times (d_2/2) = d_1 \cdot d_2/8$. Cuatro triángulos: $4 \times d_1 \cdot d_2/8 = d_1 \cdot d_2/2$. ✓*

EJERCICIO N.º 4

Áreas Sombreadas de Figuras Compuestas

Tema: Áreas planas · Figuras compuestas

> **Enunciado:** Hállese el área sombreada de las siguientes figuras, indicando el nombre de cada una de ellas. (Las figuras del examen original contienen imágenes que representan combinaciones de polígonos y círculos con zonas sombreadas.)




Fig. 4 — Ejemplos representativos de áreas sombreadas: cuadrado menos círculo y círculo menos cuadrado inscrito

ESTRATEGIA GENERAL PARA ÁREAS COMPUESTAS

$$\text{Área sombreada} = \text{Área de la figura exterior} - \text{Área de la figura interior}$$

El procedimiento general consiste en:

1. Identificar el **nombre** de cada figura geométrica presente.
2. Calcular el **área de la figura exterior** completa.
3. Calcular el **área de la figura interior** (la que "se quita").
4. Restar ambas áreas para obtener el área sombreada.

FIGURA A — CUADRADO CON CÍRCULO INTERIOR

Descripción: Un cuadrado de lado *L* con un círculo inscrito de radio *r* = *L/2* en su interior. La zona sombreada (azul) corresponde a las *esquinas* del cuadrado fuera del círculo.

1. Nombre de la figura: **Cuadrado con círculo inscrito**.
2. Área del cuadrado: $A_{\square} = L^2$ (si L = 8 cm → $A_{\square} = 64\ cm^2$)
3. Radio del círculo inscrito: r = L/2 = 4 cm → Área del círculo: $A_{\bigcirc} = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 4^2 = 16\pi \approx 50{,}27\ cm^2$
4. Área sombreada = $A_{\square} - A_{\bigcirc} = 64 - 16\pi \approx 64 - 50{,}27 \approx$ **13,73 cm^2**

✓ RESULTADO:

Figura A: $A_{sombreada} = L^2 - \pi r^2 = 64 - 16\pi \approx 13{,}73\ cm^2$

FIGURA B — CÍRCULO CON CUADRADO INSCRITO

Descripción: Un círculo de radio *r* con un cuadrado inscrito en su interior. La zona sombreada (verde) son los *segmentos circulares* entre el cuadrado y el círculo.

1. Nombre de la figura: **Círculo con cuadrado inscrito**.
2. Para un cuadrado inscrito en un círculo de radio r: la diagonal del cuadrado = 2r, entonces lado = $2r/\sqrt{2} = r\sqrt{2}$.
3. Área del círculo: $A_{\bigcirc} = \pi \cdot r^2$ (si r = 4,5 cm → $A_{\bigcirc} = \pi \cdot 20{,}25 \approx 63{,}62\ cm^2$)
4. Área del cuadrado inscrito: $A_{\square} = (r\sqrt{2})^2 = 2r^2 = 2 \cdot 20{,}25 = 40{,}5\ cm^2$

5 Área sombreada = $A_{\bigcirc} - A_{\square} = 63{,}62 - 40{,}5 \approx \mathbf{23{,}12\ cm^2}$

✓ **RESULTADO:**

Figura B: $\mathbf{A_{sombreada} = \pi r^2 - 2r^2 = r^2(\pi - 2) \approx 23{,}12\ cm^2}$

💡 *Fórmulas de áreas básicas:* *Cuadrado:* L^2 · *Rectángulo:* $b \times h$ · *Triángulo:* $b \times h / 2$ · *Círculo:* $\pi \cdot r^2$ · *Semicírculo:* $\pi \cdot r^2 / 2$

EJERCICIO N.º 5

El Cono de Revolución

Tema: Cuerpos geométricos · Área y Volumen del Cono

Enunciado: Calcular el *área* y el *volumen* de un cono de **4 cm de altura** y de **radio 3 cm**.




Fig. 5 — Cono de revolución con radio r = 3 cm, altura h = 4 cm y generatriz l = 5 cm

DATOS Y FÓRMULAS DEL CONO

Elemento	Símbolo	Valor
Radio de la base	r	**3 cm**
Altura	h	**4 cm**
Generatriz (apotema)	l	**? (a calcular)**

PASO 1 — CALCULAR LA GENERATRIZ (L)

La **generatriz** (o apotema lateral) es la distancia desde el vértice del cono hasta cualquier punto de la circunferencia de la base. Junto con el radio y la altura, forman un triángulo rectángulo:

$$l^2 = r^2 + h^2 \rightarrow l = \sqrt{(r^2 + h^2)}$$

1. $l^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$
2. $l = \sqrt{25} = \mathbf{5\ cm}$

✓ RESULTADO:

Generatriz: l = 5 cm

PASO 2 — CALCULAR EL ÁREA TOTAL DEL CONO

El área total del cono tiene dos partes:

- **Área lateral:** $A_{lat} = \pi \cdot r \cdot l$
- **Área de la base:** $A_{base} = \pi \cdot r^2$

$$A_{total} = \pi \cdot r \cdot l + \pi \cdot r^2 = \pi \cdot r \cdot (l + r)$$

1. Área lateral: $A_{lat} = \pi \times 3 \times 5 = 15\pi \approx 47{,}12\ cm^2$
2. Área de la base: $A_{base} = \pi \times 3^2 = 9\pi \approx 28{,}27\ cm^2$
3. Área total: $A_{total} = 15\pi + 9\pi = 24\pi \approx \mathbf{75{,}40\ cm^2}$

✓ RESULTADO:

Área total del cono = 24π ≈ 75,40 cm²

PASO 3 — CALCULAR EL VOLUMEN DEL CONO

$$V_{cono} = (1/3) \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$$

1. $V = (1/3) \times \pi \times 3^2 \times 4$
2. $V = (1/3) \times \pi \times 9 \times 4 = (1/3) \times 36\pi = 12\pi$
3. $V = 12\pi \approx \mathbf{37{,}70\ cm^3}$

✓ **RESULTADO:**

Volumen del cono = $12\pi \approx 37{,}70\ cm^3$

💡 *Unidades: El área se mide en unidades cuadradas (cm^2) y el volumen en unidades cúbicas (cm^3). El volumen del cono es siempre un tercio del volumen del cilindro de misma base y altura: $V_{cono} = (1/3) \cdot V_{cilindro}$.*

EJERCICIO N.º 6

Trapecio Isósceles — Área y Perímetro

Tema: Polígonos · Trapecio isósceles · Pitágoras aplicado

Enunciado: Calcula el *área* y el *perímetro* de un **trapecio isósceles**, sabiendo que su base mayor mide **12 cm**, su base menor es la **tercera parte de la mayor** y su altura mide **3 cm**.




Fig. 6 — Trapecio isósceles con base mayor 12 cm, base menor 4 cm, altura 3 cm y lados oblicuos iguales

IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS

1. Base mayor: **B = 12 cm**
2. Base menor: **b = B/3 = 12/3 = 4 cm**
3. Altura: **h = 3 cm**
4. El trapecio es **isósceles** → los dos lados oblicuos son iguales.

PASO 1 — CALCULAR LOS LADOS OBLICUOS (PITÁGORAS)

Al trazar la altura, el trapecio se divide en un rectángulo central y dos triángulos rectángulos laterales idénticos. La base del triángulo lateral (proyección) es:

$$Proyección = (B - b) / 2 = (12 - 4) / 2 = 8 / 2 = 4\ cm$$

1. El triángulo lateral tiene catetos: proyección = **4 cm** y altura = **3 cm**.
2. Por Pitágoras: $l^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$
3. $l = \sqrt{25} = \mathbf{5\ cm}$

✓ RESULTADO:

Lados oblicuos = 5 cm cada uno

PASO 2 — CALCULAR EL ÁREA DEL TRAPECIO

$$A_{trapecio} = (B + b) / 2 \times h$$

1. $A = (12 + 4) / 2 \times 3$
2. $A = (16 / 2) \times 3 = 8 \times 3 = \mathbf{24\ cm^2}$

✓ RESULTADO:

Área del trapecio = 24 cm²

PASO 3 — CALCULAR EL PERÍMETRO DEL TRAPECIO

$$P = B + b + 2 \cdot l \quad (por\ ser\ isósceles,\ los\ dos\ lados\ oblicuos\ son\ iguales)$$

1. $P = 12 + 4 + 2 \times 5$
2. $P = 12 + 4 + 10 = \mathbf{26\ cm}$

✓ RESULTADO:

Perímetro del trapecio = 26 cm

💡 *Resumen final:*

- *Base mayor $B = 12$ cm · Base menor $b = 4$ cm · Altura $h = 3$ cm*
- *Lados oblicuos $l = 5$ cm · Área $= 24$ cm² · Perímetro $= 26$ cm*

EJERCICIO N.º 7

Área de la Zona Sombreada (R = 5 cm)

Tema: Áreas mixtas · Círculo y Cuadrado

Enunciado: Calcula el área de la zona sombreada, sabiendo que $r = 5\ cm$.

La figura del examen original muestra una zona sombreada definida por la combinación de un cuadrado y un círculo. A continuación se resuelven los dos casos más habituales en este tipo de problemas.




Fig. 7 — Izquierda: cuadrado (L=2r=10) con círculo interior (r=5). Derecha: semicírculo sobre rectángulo.

CASO A — CUADRADO MENOS CÍRCULO INSCRITO

Un cuadrado de lado $L = 2r = 10\ cm$ con un círculo inscrito de radio $r = 5\ cm$. La zona sombreada son las cuatro esquinas del cuadrado exteriores al círculo.

1. Lado del cuadrado: $L = 2r = 2 \times 5 = \mathbf{10\ cm}$
2. Área del cuadrado: $A_{\square} = L^2 = 10^2 = \mathbf{100\ cm^2}$
3. Área del círculo: $A_{\bigcirc} = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 5^2 = 25\pi \approx 78{,}54\ cm^2$

4. Área sombreada = $A_{\square} - A_{\bigcirc} = 100 - 25\pi \approx 100 - 78{,}54 \approx$ **21,46 cm²**

✓ RESULTADO:

Caso A: $A_{sombreada} = 100 - 25\pi \approx 21{,}46$ cm²

CASO B — SEMICÍRCULO SOBRE RECTÁNGULO

Una figura compuesta por un rectángulo de base *2r = 10 cm* y altura *r = 5 cm* más un semicírculo de radio *r = 5 cm* encima. Toda la figura está sombreada.

1. Área del rectángulo: A_{rect} = base × altura = (2r) × r = $2r^2 = 2 \times 25 = 50$ cm²
2. Área del semicírculo: $A_{semi} = (\pi \cdot r^2)/2 = (\pi \cdot 25)/2 = 12{,}5\pi \approx 39{,}27$ cm²
3. Área total sombreada = $A_{rect} + A_{semi} = 50 + 12{,}5\pi \approx 50 + 39{,}27 \approx$ **89,27 cm²**

✓ RESULTADO:

Caso B: $A_{sombreada} = 50 + 12{,}5\pi \approx 89{,}27$ cm²

CASO C — SOLO EL SEMICÍRCULO (INTERPRETACIÓN ALTERNATIVA)

Si la zona sombreada es únicamente un semicírculo de radio r = 5 cm:

1. $A_{semicírculo} = (\pi \cdot r^2) / 2 = (\pi \cdot 25) / 2 = 25\pi/2$
2. $A_{semicírculo} = 12{,}5\pi \approx$ **39,27 cm²**

✓ RESULTADO:

Caso C: $A_{semicírculo} = 25\pi/2 \approx 39{,}27$ cm²

💡 *Valor de π: En estos ejercicios se utiliza π ≈ 3,1416. Si el enunciado pide la respuesta exacta, se deja expresada con el símbolo π (por ejemplo, "25π cm²"). Recuerda siempre indicar la unidad (cm²) en el resultado final.*

✦ ✦ ✦

¡SUERTE JÓVENES!


"La matematica no miente; mentimos nosotros cuando la malinterpretamos."
— Albert Einstein

Ejercicio nº 1.-

La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 37 cm. Uno de los catetos mide 35 cm. ¿Cuánto mide el otro cateto?


Ejercicio nº 2.-

Las dos diagonales de un rombo miden 24 cm y 26 cm. Calcula su perímetro y su área.



Ejercicio nº 3.-


Calcula el área y el perímetro de este hexágono regular (aproxima el resultado a las décimas):



Ejercicio nº 4.-


Se ha construido una pista de patinaje cuadrada sobre un terreno circular, como indica la figura. El resto del terreno se ha sembrado de césped. Calcular:

- **La superficie del terreno.**
- **La superficie de la pista.**
- **La superficie que queda con césped.**




Ejercicio nº 5.-

Calcula el perímetro y la superficie de esta figura:




Ejercicio nº 6.-

Estos dos triángulos son semejantes. Calcula la longitud de los lados que le faltan a cada uno de ellos:




Ejercicio nº 7.-


Calcula el área total y el volumen de estos cuerpos:



Ejercicio nº 8.-

Calcula el área total de esta pirámide regular cuya base es un cuadrado de 12 cm de lado y su altura es de 8 cm.





EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS

Geometría Plana y del Espacio

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

TRIÁNGULOS · CUADRILÁTEROS · POLÍGONOS REGULARES · SEMEJANZA · CUERPOS GEOMÉTRICOS · PIRÁMIDES

> *«Las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo. Quien no conoce las matemáticas no puede conocer ninguna otra ciencia. Son la llave y la puerta de todas las ciencias.»*
>
> **— Ladislao Jáñez Blanco, Matemático**

Σ ∫ ∞ π √

Índice de Ejercicios

— Geometría Plana y del Espacio —

1 📐 **Ejercicio 1 — Teorema de Pitágoras**
Cálculo del cateto desconocido de un triángulo rectángulo

2 ◊ **Ejercicio 2 — El Rombo: Perímetro y Área**
Cálculo con las dos diagonales: 24 cm y 26 cm

3 ⬡ **Ejercicio 3 — Hexágono Regular**
Área y perímetro de un hexágono regular de lado 6 cm

4 ⬛ **Ejercicio 4 — Pista de Patinaje Cuadrada**
Cuadrado inscrito en círculo — superficies y césped

5 🔷 **Ejercicio 5 — Figura Compuesta**
Perímetro y superficie de una figura mixta

6 △ **Ejercicio 6 — Triángulos Semejantes**
Cálculo de lados usando la razón de semejanza

7 🔵 **Ejercicio 7 — Cuerpos Geométricos**
Área total y volumen de prisma, cilindro y cono

8 🔺 **Ejercicio 8 — Pirámide Regular de Base Cuadrada**
Área total de la pirámide: base 12 cm, altura 8 cm

✦ ✧ ✦

📌 **Nota didáctica:** Cada ejercicio incluye el enunciado completo, una ilustración explicativa y la resolución paso a paso con rigor matemático. Los datos de los ejercicios 3, 4, 5, 6 y 7 corresponden a figuras del examen original, completados con valores típicos de nivel ESO.

✦ EJERCICIO N.º 1


Teorema de Pitágoras: Cálculo del Cateto

🔑 *Tema: Triángulos rectángulos · Teorema de Pitágoras*

📄 ENUNCIADO

La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide **37 cm**. *Uno de los catetos mide* **35 cm**. *¿Cuánto mide el otro cateto?*

- **Dato 1:** Hipotenusa $c = 37$ cm
- **Dato 2:** Cateto conocido $a = 35$ cm
- **Incógnita:** Cateto desconocido $b = ?$



Teorema de Pitágoras

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$37^2 = 35^2 + b^2$$

$$1369 = 1225 + b^2$$

$$b^2 = 1369 - 1225 = 144$$

$$\mathbf{b = \sqrt{144} = 12\ cm}$$

Terna pitagórica: (12, 35, 37)

Fig. 1.1 — Triángulo rectángulo con los cuadrados sobre sus lados y la aplicación del Teorema de Pitágoras

📐 Resolución Completa Paso a Paso

1 Identificación de los elementos del triángulo rectángulo

Todo triángulo rectángulo tiene tres lados: la **hipotenusa** (el lado más largo, opuesto al ángulo recto) y los dos **catetos** (los lados que forman el ángulo recto).

En este problema:

- Hipotenusa: c = **37 cm** (el lado más largo)
- Cateto conocido: a = **35 cm**
- Cateto desconocido: b = **?**

2 Enunciado del Teorema de Pitágoras

El **Teorema de Pitágoras** establece que en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Donde c es la hipotenusa y a, b son los catetos.

3 Despeje de la incógnita b

Queremos encontrar el valor de b, por lo que despejamos b^2 de la fórmula:

$$b^2 = c^2 - a^2$$

4 Sustitución de los valores conocidos

Sustituimos $c = 37$ y $a = 35$:

```
b² = 37² − 35²  b² = 1.369 − 1.225  b² = 144
```

5 Cálculo de los cuadrados

- $37^2 = 37 \times 37 =$ **1.369**
- $35^2 = 35 \times 35 =$ **1.225**
- $b^2 = 1.369 - 1.225 =$ **144**

6 Extracción de la raíz cuadrada

Para obtener b, calculamos la raíz cuadrada de 144:

```
b = √144 = 12 cm
```

Comprobamos: $\sqrt{144} = 12$, ya que $12 \times 12 = 144$ ✓

7 Verificación del resultado

Comprobamos que los tres valores satisfacen el Teorema de Pitágoras:

$$a^2 + b^2 = 35^2 + 12^2 = 1.225 + 144 = 1.369 = 37^2 = c^2 \checkmark$$

El resultado es correcto. Además, los valores (12, 35, 37) forman una **terna pitagórica** (múltiplos de la terna primitiva 5·(12/5, 35/5, 37/5) no simplifica, pero sí es una terna conocida).

✦ RESULTADO FINAL

El otro cateto mide b = 12 cm

✦ EJERCICIO N.º 2

El Rombo: Perímetro y Área

🔑 *Tema: Cuadriláteros · Propiedades del rombo · Pitágoras*

📄 ENUNCIADO

Las dos diagonales de un rombo miden **24 cm** *y* **26 cm** *. Calcula su perímetro y su área.*

- **Diagonal mayor:** D = 26 cm
- **Diagonal menor:** d = 24 cm
- **Incógnitas:** Perímetro P = ? y Área A = ?




Fig. 2.1 — Rombo ABCD con sus dos diagonales perpendiculares. El triángulo rectángulo sombreado muestra cómo se calcula el lado L

📐 Resolución Completa Paso a Paso

📚 **Propiedad del rombo:** Las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí y se bisecan mutuamente (se cortan en su punto medio). Esto significa que cada diagonal queda dividida en dos partes iguales, formando cuatro triángulos rectángulos idénticos.

1 Identificación de los datos

- Diagonal mayor: **D = 26 cm** → semidiagonal: D/2 = 13 cm
- Diagonal menor: **d = 24 cm** → semidiagonal: d/2 = 12 cm
- Las diagonales se cortan perpendicularmente en el punto O

2 Cálculo del lado del rombo

Las semidiagonales (13 cm y 12 cm) y el lado del rombo forman un triángulo rectángulo. Aplicamos el Teorema de Pitágoras para calcular el lado L:

$$L^2 = (D/2)^2 + (d/2)^2$$

```
L² = 13² + 12²  L² = 169 + 144  L² = 313  L = √313 ≈ 17,69 cm
```

3 Cálculo del Perímetro

El rombo tiene cuatro lados iguales, por lo que su perímetro es:

$$P = 4 \times L$$

```
P = 4 × √313  P = 4 × 17,6918...  P ≈ 70,77 cm
```

4 Cálculo del Área

El área del rombo se calcula como la mitad del producto de sus dos diagonales:

$$A = (D \times d) / 2$$

```
A = (26 × 24) / 2  A = 624 / 2  A = 312 cm²
```

Justificación: El rombo puede descomponerse en 4 triángulos rectángulos iguales, cada uno de base (d/2) = 12 cm y altura (D/2) = 13 cm. Área de cada triángulo = (1/2) × 12 × 13 = 78 cm². Área total = 4 × 78 = 312 cm² ✓

✦ RESULTADOS FINALES

Lado: $L = \sqrt{313} \approx 17{,}69$ cm

Perímetro: $P = 4\sqrt{313} \approx 70{,}77$ cm

Área: $A = 312$ cm²

✦ EJERCICIO N.º 3


Hexágono Regular: Área y Perímetro

🔑 *Tema: Polígonos regulares · Apotema · Área y Perímetro*

📄 ENUNCIADO

Calcula el área y el perímetro de un hexágono regular de **lado = 6 cm** *(aproxima el resultado a las décimas).*

- **Figura:** Hexágono regular (6 lados iguales y 6 ángulos iguales)
- **Lado:** l = 6 cm
- **Número de lados:** n = 6



P = 6 × 6 = 36 cm

Fig. 3.1 — Hexágono regular con el triángulo equilátero central destacado, la apotema y el radio

📐 Resolución Completa Paso a Paso

📚 **Propiedad clave:** Un hexágono regular tiene la propiedad excepcional de que el radio (distancia del centro a un vértice) es *igual* al lado. Por tanto, el hexágono se divide en 6 triángulos equiláteros idénticos.

1 Cálculo del Perímetro

El perímetro de cualquier polígono regular es el número de lados multiplicado por la longitud de cada lado:

$$P = n \times l$$

```
P = 6 × 6 cm P = 36 cm
```

2 Cálculo de la Apotema

La **apotema** (a) es la distancia del centro al punto medio de un lado. En el hexágono regular, cada triángulo equilátero de lado l = 6 cm tiene una apotema (= altura del triángulo equilátero) que calculamos con Pitágoras:

```
h = √(l² − (l/2)²) = √(6² − 3²) = √(36 − 9) = √27 = 3√3 cm
```

También puede calcularse como:

$$a = (l / 2) \times \sqrt{3} = (6/2) \times \sqrt{3} = 3\sqrt{3} \approx 5{,}196\ cm \approx 5{,}2\ cm$$

3 Cálculo del Área

Método 1 — Fórmula del polígono regular:

$$A = (P \times a) / 2$$

```
A = (36 × 3√3) / 2 A = 108√3 / 2 A = 54√3 A = 54 × 1,7320... ≈
93,5 cm²
```

Método 2 — Suma de los 6 triángulos equiláteros:

Cada triángulo equilátero de lado 6 cm tiene área:

```
A_triángulo = (√3 / 4) × l² = (√3 / 4) × 36 = 9√3 ≈ 15,588 cm²
A_hexágono = 6 × 9√3 = 54√3 ≈ 93,5 cm² ✓
```

✦ RESULTADOS FINALES

Apotema: $a = 3\sqrt{3} \approx 5{,}2$ cm

Perímetro: $P = 36$ cm

Área: $A = 54\sqrt{3} \approx 93{,}5$ cm²

✦ EJERCICIO N.º 4

Pista de Patinaje Cuadrada sobre Terreno Circular

🔑 *Tema: Figuras compuestas · Área del círculo · Cuadrado inscrito*

📄 ENUNCIADO

Se ha construido una pista de patinaje cuadrada sobre un terreno circular, como indica la figura. El resto del terreno se ha sembrado de césped. El terreno circular tiene un radio de **r = 10 m** *. Calcula:*

- La superficie del terreno (círculo)
- La superficie de la pista (cuadrado inscrito)
- La superficie que queda con césped (diferencia)




Fig. 4.1 — Cuadrado inscrito en el círculo. El área sombreada en verde representa el césped

📐 Resolución Completa Paso a Paso

📚 **Concepto clave:** Cuando un cuadrado está *inscrito* en un círculo, los cuatro vértices del cuadrado tocan el círculo. La diagonal del cuadrado es igual al diámetro del círculo.

1 Datos del problema

- Radio del terreno circular: **r = 10 m**
- Diámetro del círculo: D = 2r = 20 m
- El cuadrado está inscrito en el círculo → diagonal del cuadrado = D = 20 m

2 Superficie total del terreno (círculo)

$$A_círculo = \pi \times r^2$$

```
A_círculo = π × 10²  A_círculo = 100π  A_círculo ≈ 100 × 3,14159...
A_círculo ≈ 314,16 m²
```

3 Cálculo del lado del cuadrado (pista de patinaje)

La diagonal del cuadrado es igual al diámetro del círculo = 20 m. Usando el Teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo formado por la diagonal:

```
diagonal² = L² + L² = 2L²  20² = 2L²  400 = 2L²  L² = 200  L = √200 =
10√2 ≈ 14,142 m
```

4 Superficie de la pista de patinaje (cuadrado)

$$A_pista = L^2$$

```
A_pista = (10√2)²  A_pista = 100 × 2  A_pista = 200 m²
```

Nota: También se puede calcular como A_pista = diagonal² / 2 = 400/2 = 200 m²

5 Superficie con césped

$$A_césped = A_círculo - A_pista$$

```
A_césped = 100π − 200  A_césped ≈ 314,16 − 200  A_césped ≈ 114,16
m²
```

✦ RESULTADOS FINALES

Superficie del terreno: $A = 100\pi \approx 314{,}16\ m^2$

Superficie de la pista: $A = 200\ m^2$

Superficie con césped: $A \approx 114{,}16\ m^2$

✦ EJERCICIO N.º 5

Figura Compuesta: Perímetro y Superficie

🔑 *Tema: Figuras compuestas · Semicírculos · Área y Perímetro*

📄 ENUNCIADO

Calcula el perímetro y la superficie de la siguiente figura compuesta, formada por un rectángulo de **10 cm × 6 cm** *con un* **semicírculo** *de diámetro 6 cm añadido en uno de sus extremos.*

- **Rectángulo:** base = 10 cm, altura = 6 cm
- **Semicírculo:** diámetro = 6 cm → radio = 3 cm
- **Figura total:** rectángulo + semicírculo




Fig. 5.1 — Figura compuesta por un rectángulo de 10×6 cm y un semicírculo de radio 3 cm a la derecha

📐 Resolución Completa Paso a Paso

📚 **Concepto clave:** En una figura compuesta, el perímetro es la suma de los segmentos del contorno exterior (no se incluyen los lados interiores comunes entre figuras). El área es la suma de las áreas de cada figura simple que la compone.

1 Análisis de la figura compuesta

La figura está formada por:

- Un **rectángulo** de base = 10 cm y altura = 6 cm
- Un **semicírculo** de diámetro = 6 cm (radio = 3 cm) adosado en el lado derecho

2 Cálculo del Perímetro

El contorno exterior de la figura está formado por:

- Lado inferior del rectángulo: 10 cm
- Lado superior del rectángulo: 10 cm
- Lado izquierdo del rectángulo: 6 cm
- El lado derecho del rectángulo NO forma parte del perímetro (está compartido con el semicírculo)
- Semicircunferencia: $\pi \times r = \pi \times 3$ cm

$$P = 10 + 10 + 6 + \pi \times r$$

```
P = 10 + 10 + 6 + π × 3 P = 26 + 3π P = 26 + 3 × 3,14159... P = 26 + 9,4247... P ≈ 35,4 cm
```

3 Cálculo del Área del Rectángulo

$$A_rectángulo = base \times altura$$

```
A_rectángulo = 10 × 6 = 60 cm²
```

4 Cálculo del Área del Semicírculo

$$A_semicírculo = (\pi \times r^2) / 2$$

```
A_semicírculo = (π × 3²) / 2 A_semicírculo = (π × 9) / 2 A_semicírculo = 9π/2 A_semicírculo ≈ 14,14 cm²
```

5 Área Total de la Figura

$$A_{total} = A_{rectángulo} + A_{semicírculo}$$

```
A_total = 60 + 9π/2 A_total ≈ 60 + 14,137... A_total ≈ 74,1 cm²
```

✦ RESULTADOS FINALES

Perímetro: P = 26 + 3π ≈ 35,4 cm

Área: A = 60 + 9π/2 ≈ 74,1 cm²

✦ EJERCICIO N.º 6

Triángulos Semejantes: Cálculo de Lados

🔑 *Tema: Semejanza de triángulos · Razón de semejanza · Teorema de Tales*


📄 ENUNCIADO

Estos dos triángulos son semejantes. Calcula la longitud de los lados que le faltan a cada uno de ellos. Los datos de los triángulos son:

Triángulo A (pequeño): lados conocidos: 3 cm, 4 cm y 5 cm

Triángulo B (grande): un lado conocido = 7,5 cm; calcular los otros dos lados

- **Triángulo A:** $a_1 = 3$ cm, $b_1 = 4$ cm, $c_1 = 5$ cm (triángulo rectángulo 3-4-5)
- **Triángulo B:** un lado conocido $a_2 = 7{,}5$ cm; calcular b_2 y c_2
- **Relación:** Son semejantes → sus lados son proporcionales



Razón de semejanza: $k = a_2/a_1 = 7{,}5/3 = 2{,}5$

$b_2 = k \times b_1 = 2{,}5 \times 4 = 10$ cm | $c_2 = k \times c_1 = 2{,}5 \times 5 = 12{,}5$ cm

Fig. 6.1 — Dos triángulos semejantes con razón de semejanza k = 2,5. El triángulo B es 2,5 veces mayor que el A

📐 Resolución Completa Paso a Paso

📚 **Definición:** Dos triángulos son *semejantes* cuando tienen los tres ángulos iguales (y, en consecuencia, sus lados correspondientes son proporcionales). La constante de proporcionalidad se llama *razón de semejanza* (k).

1 Identificación de los triángulos y sus lados correspondientes

Triángulo A (pequeño): $a_1 = 3$ cm, $b_1 = 4$ cm, $c_1 = 5$ cm

Triángulo B (grande): $a_2 = 7{,}5$ cm (conocido), $b_2 = ?$, $c_2 = ?$

Los lados correspondientes son: $a_1 \leftrightarrow a_2$, $b_1 \leftrightarrow b_2$, $c_1 \leftrightarrow c_2$

2 Cálculo de la razón de semejanza

La razón de semejanza *k* es el cociente entre dos lados correspondientes:

$$k = a_2 / a_1$$

```
k = 7,5 / 3 = 2,5
```

Esto significa que el Triángulo B es **2,5 veces mayor** que el Triángulo A en todas sus dimensiones lineales.

3 Planteamiento de la proporción

Como los triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales:

$$a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 = 1/k$$

```
3/7,5 = 4/b₂ = 5/c₂
```

4 Cálculo de b_2

```
3/7,5 = 4/b₂ 3 × b₂ = 4 × 7,5 3 × b₂ = 30 b₂ = 30/3 b₂ = 10 cm
```

Verificación: $b_2 = k \times b_1 = 2{,}5 \times 4 = 10$ cm ✓

5 Cálculo de c_2

```
3/7,5 = 5/c₂  3 × c₂ = 5 × 7,5  3 × c₂ = 37,5  c₂ = 37,5/3  c₂ = 12,5 cm
```

Verificación: $c_2 = k \times c_1 = 2{,}5 \times 5 = 12{,}5$ cm ✓

6 **Verificación final: los dos triángulos son rectángulos 3-4-5**

Triángulo A: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$ → Triángulo rectángulo ✓

Triángulo B: $7{,}5^2 + 10^2 = 56{,}25 + 100 = 156{,}25 = 12{,}5^2$ → Triángulo rectángulo ✓

✦ RESULTADOS FINALES

Triángulo A: a_1=3 cm, b_1=4 cm, c_1=5 cm

Triángulo B: a_2=7,5 cm, b_2=10 cm, c_2=12,5 cm

Razón de semejanza: k = 2,5

✦ EJERCICIO N.º 7

Cuerpos Geométricos: Área Total y Volumen

🔑 *Tema: Geometría del espacio · Prisma · Cilindro · Cono*

📄 **ENUNCIADO**

Calcula el área total y el volumen de los siguientes cuerpos geométricos:

- **Cuerpo A — Cilindro:** radio r = 5 cm, altura h = 10 cm
- **Cuerpo B — Cono:** radio r = 3 cm, altura h = 4 cm
- **Cuerpo C — Prisma rectangular:** base 6 cm × 4 cm, altura h = 8 cm




Fig. 7.1 — Los tres cuerpos geométricos: cilindro, cono y prisma rectangular con sus dimensiones

📐 Resolución Completa — Cuerpo A: Cilindro (r=5 cm, h=10 cm)

1 Área lateral del cilindro

$$A_{lateral} = 2\pi \times r \times h$$

```
A_lateral = 2 × π × 5 × 10 = 100π ≈ 314,16 cm²
```

2 Área de las dos bases (dos círculos)

$$A_bases = 2 \times \pi \times r^2$$

```
A_bases = 2 × π × 25 = 50π ≈ 157,08 cm²
```

3 Área total y Volumen del cilindro

```
A_total = A_lateral + A_bases = 100π + 50π = 150π ≈ 471,24 cm² V = π × r² × h = π × 25 × 10 = 250π ≈ 785,40 cm³
```

📐 Resolución — Cuerpo B: Cono (r=3 cm, h=4 cm)

1 Cálculo de la generatriz (g) del cono

La generatriz es la distancia del vértice a un punto del borde de la base:

$$g = \sqrt{(r^2 + h^2)}$$

```
g = √(3² + 4²) = √(9 + 16) = √25 = 5 cm
```

2 Área lateral y total del cono

```
A_lateral = π × r × g = π × 3 × 5 = 15π ≈ 47,12 cm² A_base = π × r² = π × 9 = 9π ≈ 28,27 cm² A_total = A_lateral + A_base = 15π + 9π = 24π ≈ 75,40 cm²
```

3 Volumen del cono

$$V = (1/3) \times \pi \times r^2 \times h$$

```
V = (1/3) × π × 9 × 4 = 12π ≈ 37,70 cm³
```

📐 Resolución — Cuerpo C: Prisma (6×4×8 cm)

1 Área total del prisma rectangular

El prisma tiene 6 caras rectangulares: 2 de cada tipo de par de lados.

```
A_total = 2×(6×4) + 2×(6×8) + 2×(4×8) A_total = 2×24 + 2×48 + 2×32 A_total = 48 + 96 + 64 A_total = 208 cm²
```

2 Volumen del prisma

$$V = base \times anchura \times altura$$

```
V = 6 × 4 × 8 = 192 cm³
```

✦ RESULTADOS FINALES

Cilindro: A_total = 150π ≈ 471,2 cm² | V = 250π ≈ 785,4 cm³

Cono: A_total = 24π ≈ 75,4 cm² | V = 12π ≈ 37,7 cm³

Prisma: A_total = 208 cm² | V = 192 cm³

✦ EJERCICIO N.º 8

Pirámide Regular de Base Cuadrada: Área Total

🔑 *Tema: Pirámides · Apotema de la cara · Área lateral · Área total*

📄 ENUNCIADO

Calcula el área total de esta pirámide regular cuya base es un **cuadrado de 12 cm de lado** *y su* **altura es de 8 cm** *.*

- **Base:** cuadrado de lado l = 12 cm
- **Altura:** h = 8 cm (distancia del vértice al centro de la base)
- **Tipo:** Pirámide regular (base regular + vértice sobre el centro)
- **Incógnita:** Área total = Área base + Área lateral




Fig. 8.1 — Pirámide regular de base cuadrada con la altura h=8 cm y la apotema de la cara ap=10 cm

📐 Resolución Completa Paso a Paso

📚 **Conceptos clave:**

• **Apotema de la pirámide (ap)**: distancia del vértice de la pirámide al punto medio de un lado de la base. Es la altura de cada cara triangular.

• **Área lateral**: suma de las áreas de todas las caras triangulares.

• **Área total**: área lateral + área de la base.

1 Identificación de los datos

• Base: cuadrado de lado **l = 12 cm**

• Altura de la pirámide: **h = 8 cm**

• Número de caras triangulares: 4 (una por cada lado del cuadrado)

2 Cálculo de la apotema de la cara triangular

La apotema de la cara (*ap*) es la distancia del vértice de la pirámide al punto medio de un lado de la base. Forma un triángulo rectángulo con la altura h y la semidiagonal de la base (l/2).

Atención: No confundir con la apotema de la base (semidiagonal del cuadrado). Aquí la cateto es la mitad del lado del cuadrado = 12/2 = 6 cm.

$$ap = \sqrt{(h^2 + (l/2)^2)}$$

```
ap = √(8² + 6²) ap = √(64 + 36) ap = √100 ap = 10 cm
```

¡Resultado exacto! La apotema es **10 cm**, gracias a la terna pitagórica (6, 8, 10).

3 Cálculo del Área de la Base

La base es un cuadrado de 12 cm de lado:

$$A_base = l^2$$

```
A_base = 12² = 144 cm²
```

4 Cálculo del Área Lateral

El área lateral está formada por 4 triángulos isósceles iguales. Cada triángulo tiene base = 12 cm y altura = apotema = 10 cm.

$$A_lateral = (Perímetro_base \times ap) / 2$$

```
Perímetro_base = 4 × 12 = 48 cm A_lateral = (48 × 10) / 2
A_lateral = 480 / 2 A_lateral = 240 cm²
```

Verificación alternativa: Área de 1 triángulo = (12 × 10)/2 = 60 cm². Área total de los 4 triángulos = 4 × 60 = 240 cm² ✓

5 Cálculo del Área Total

$$A_total = A_base + A_lateral$$

```
A_total = 144 + 240 A_total = 384 cm²
```

6 Resumen de resultados

- Apotema de la cara: **ap = 10 cm**
- Área de la base (cuadrado): **A_base = 144 cm²**
- Área lateral (4 triángulos): **A_lateral = 240 cm²**
- Área total de la pirámide: **A_total = 384 cm²**

✦ RESULTADO FINAL

Apotema de la cara: ap = 10 cm

Área lateral: A_lat = 240 cm²

Área total: A_total = 144 + 240 = 384 cm²

✦ ✧ ✦

📊 Tabla Resumen de Todos los Ejercicios

Ejercicio	Tema	Resultado principal
Ej. 1	Teorema de Pitágoras	**b = 12 cm**
Ej. 2	Rombo (D=26, d=24)	**P ≈ 70,77 cm | A = 312 cm²**

Ej. 3	Hexágono regular (l=6)	**P = 36 cm | A ≈ 93,5 cm²**
Ej. 4	Cuadrado en círculo (r=10)	**A_pista=200 m² | A_césped≈114,16 m²**
Ej. 5	Figura compuesta (rect.+semicírc.)	**P ≈ 35,4 cm | A ≈ 74,1 cm²**
Ej. 6	Triángulos semejantes (k=2,5)	**b_2=10 cm | c_2=12,5 cm**
Ej. 7	Cilindro, Cono, Prisma	**Ver desarrollo completo**
Ej. 8	Pirámide (l=12, h=8)	**A_total = 384 cm²**

— Fin del Documento —

«Las matemáticas son la música de la razón» — James Joseph Sylvester

Junta de Castilla y León
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EXAMEN 2º ESO GRUPO A
FINAL JUNIO 2017 19/06/2017

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

Nº1.- Calcula: a) m.c.m. (20, 24, 36) b) M.C.D. (48, 72, 84)

Nº2.- Resuelve escribiendo el proceso paso a paso:

a) $(-6)\cdot[(+2)+(+3)-(6+3-2)]$ b) $(-5)\cdot(+3)-[(-2)+(-5)-(-8)]\cdot(-3)$

Nº3.- Resuelve las siguientes operaciones con fracciones:

a) $\left(\frac{7}{5}-\frac{1}{2}\right):\left(1-\frac{3}{10}\right)=$

b) $\frac{5}{8}:\left[\frac{17}{4}-3\cdot\left(2-\frac{2}{3}\right)\right]=$

Nº4.- Realiza las siguientes operaciones con polinomios:

a) $(3x^2+5x-6)+(2x^4-2x^3+4x-2)$

b) $(2x^4-2x^3+4x-2)-(x^3+5x^2-2x-3)$

c) $(x^2+5)\cdot(x^3+2x-3)$

Nº5.- Calcula aplicando los productos notables en a) y extrae factor común en b):

a) $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2$

b) $4x^4-4x^3+4x^2$

Nº6.- Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $\frac{3x}{5}+7=2x$

b) $\frac{x}{2}-\frac{x}{3}+\frac{x}{5}=\frac{11}{6}$

a) $3x^2-9x+6=0$


b) $x^2+5x=0$

Nº7.- Resuelve, por el método que consideres más oportuno, estos sistemas:

a) $\begin{cases} 5x + 4y = 3 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$


b) $\begin{cases} x = 5 - y \\ 2x + y = 7 \end{cases}$

Nº8.- Estos dos triángulos son semejantes. Calcula la longitud de los lados que faltan a cada uno de ellos:




Nº9.- Calcula el área y el perímetro de un trapecio isósceles, sabiendo que su base mayor mide 15 cm, su base menor 9 cm y su altura mide 4 cm.

Nº10.- Calcula el área de la zona sombreada, sabiendo que el cuadrado tiene de lado 4 cm:



SUERTE JÓVENES



CUADERNO DE EJERCICIOS

Matemáticas

2.º de Educación Secundaria Obligatoria

EXAMEN FINAL · JUNIO 2017

> *"Reserva tu derecho a pensar, porque incluso pensar equivocadamente es mejor que no pensar en absoluto."*
>
> — HIPATIA DE ALEJANDRÍA (C. 360 – 415 D.C.)
> MATEMÁTICA, ASTRÓNOMA Y FILÓSOFA

IES Antonio Tovar · Centro Bilingüe · Grupo A

CASTILLA Y LEÓN · CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Índice de Ejercicios

1. Mínimo Común Múltiplo y Máximo Común Divisor 3
2. Operaciones con Números Enteros 4
3. Operaciones con Fracciones 5
4. Operaciones con Polinomios 6
5. Productos Notables y Factor Común 7
6. Resolución de Ecuaciones 8
7. Sistemas de Ecuaciones 9
8. Triángulos Semejantes 10
9. Área y Perímetro del Trapecio Isósceles 11
10. Área de la Zona Sombreada 12

Sobre este cuaderno

Este cuaderno recoge los **10 ejercicios del Examen Final de Junio 2017** de Matemáticas de 2.º ESO del IES Antonio Tovar. Cada ejercicio está presentado con su *enunciado completo*, los conceptos matemáticos clave implicados y una ilustración representativa que facilita la comprensión visual del problema.

"La matemática es el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo." — Galileo Galilei

1 Mínimo Común Múltiplo y Máximo Común Divisor


ARITMÉTICA · DIVISIBILIDAD · NÚMEROS PRIMOS

✦ ENUNCIADO

Calcula:

a) m.c.m. (20, 24, 36)

b) M.C.D. (48, 72, 84)



💡 **Conceptos clave:**
El **mínimo común múltiplo (m.c.m.)** de varios números es el menor número entero positivo que es múltiplo de todos ellos. Para calcularlo se descomponen los números en factores primos y se toman *todos los factores primos* con el *mayor exponente* que aparece.

El **Máximo Común Divisor (M.C.D.)** es el mayor número entero que divide exactamente a todos los números dados. Se toman los factores primos *comunes* con el *menor exponente*.

📐 **Método de descomposición en factores primos:** Divide cada número sucesivamente entre los primos 2, 3, 5, 7, 11, ... hasta que el cociente sea 1. Los primos utilizados son los factores de ese número.

2 Operaciones con Números Enteros


ARITMÉTICA · NÚMEROS ENTEROS · JERARQUÍA DE OPERACIONES

✦ ENUNCIADO

Resuelve escribiendo el proceso paso a paso:

a) $(-6) \cdot [(+2) + (+3) - (6 + 3 - 2)]$

b) $(-5) \cdot (+3) - [(-2) + (-5) - (-8)] \cdot (-3)$



💡 **Regla de los signos en la multiplicación:**

$(+) \cdot (+) = (+)$ | $(-) \cdot (-) = (+)$ | $(+) \cdot (-) = (-)$ | $(-) \cdot (+) = (-)$

📐 **Jerarquía de operaciones (de primero a último):**

1.º Paréntesis y corchetes (de dentro a fuera)

2.º Multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha)

3.º Sumas y restas (de izquierda a derecha)

⚠️ **Atención:** Al eliminar el corchete, si va precedido de un signo negativo, todos los signos del interior se cambian. Por ejemplo: $-[(-2) + (-5)] = +(+2) + (+5) = +7$

3 Operaciones con Fracciones


ARITMÉTICA · FRACCIONES · OPERACIONES COMBINADAS

✦ ENUNCIADO

Resuelve las siguientes operaciones con fracciones:

a) $\left[\frac{7}{5} - \frac{1}{2}\right] \div \left[1 - \frac{3}{10}\right]$

b) $\frac{5}{8} \div \left[\frac{17}{4} - 3 \cdot \left[2 - \frac{2}{3}\right]\right]$



💡 **Operaciones con fracciones — reglas fundamentales:**

Suma/Resta: Se necesita denominador común (m.c.m. de los denominadores).

Multiplicación: Numerador × numerador, denominador × denominador.

División: Se multiplica por la fracción inversa (se invierte la segunda fracción y se multiplica).

📐 **Orden de resolución:** Primero resolver los paréntesis más internos, luego los externos. Aplicar la jerarquía: paréntesis → multiplicaciones y divisiones → sumas y restas.

4 Operaciones con Polinomios

ÁLGEBRA · POLINOMIOS · SUMA, RESTA Y MULTIPLICACIÓN


✦ ENUNCIADO

Realiza las siguientes operaciones con polinomios:

a) $(3x^2 + 5x - 6) + (2x^4 - 2x^3 + 4x - 2)$

b) $(2x^4 - 2x^3 + 4x - 2) - (x^3 + 5x^2 - 2x - 3)$

c) $(x^2 + 5) \cdot (x^3 + 2x - 3)$



💡 **Suma y resta de polinomios:**
Solo se pueden sumar o restar *términos semejantes* (misma variable y mismo grado). Se suman/restan sus coeficientes manteniendo la parte literal.

Multiplicación de polinomios:
Cada término del primer polinomio se multiplica por cada término del segundo. Se aplica la propiedad distributiva y se recogen términos semejantes. Recuerda: $x \cdot x = x^2$; $x^2 \cdot x^3 = x^5$

📐 **Organiza los términos por grado descendente** para no olvidar ninguno. Usa una tabla de doble entrada para la multiplicación: así cada producto parcial queda en su casilla.

5 Productos Notables y Factor Común


ÁLGEBRA · IDENTIDADES NOTABLES · FACTORIZACIÓN

✦ ENUNCIADO

Calcula aplicando los productos notables en a) y extrae factor común en b):

a) $(x + 1/2)^2$

b) $4x^4 - 4x^3 + 4x^2$



💡 **Identidades notables:**

Cuadrado de una suma: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Cuadrado de una diferencia: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Suma por diferencia: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Factor común: Se busca el mayor factor (número o expresión algebraica) que divide a todos los términos, y se saca fuera del paréntesis.

📐 **Para el apartado a):** Identifica $a = x$ y $b = 1/2$, luego aplica $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Para el apartado b): Observa que 4, x^4, x^3 y x^2 comparten el factor $4x^2$. Comprueba siempre multiplicando el factor por el cociente.

6 Resolución de Ecuaciones

ÁLGEBRA · ECUACIONES DE 1.º Y 2.º GRADO

✦ ENUNCIADO

Resuelve las siguientes ecuaciones:

Ecuaciones de primer grado:


a) $3x/5 + 7 = 2x$

b) $x/2 - x/3 + x/5 = 11/6$

Ecuaciones de segundo grado:

a) $3x^2 - 9x + 6 = 0$

b) $x^2 + 5x = 0$



💡 **Ecuaciones de primer grado:** Despejar la incógnita aplicando operaciones inversas a ambos lados.

Si hay fracciones, multiplicar todos los términos por el m.c.m. de los denominadores.

Fórmula cuadrática (2.º grado): Para $ax^2 + bx + c = 0$:

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

El discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ determina el número de soluciones reales.

📐 Para $x^2 + 5x = 0$, **no dividas entre x** (perderías la solución $x = 0$). Saca factor común: $x(x + 5) = 0$.

7 Sistemas de Ecuaciones

ÁLGEBRA · SISTEMAS LINEALES · SUSTITUCIÓN Y REDUCCIÓN

✦ ENUNCIADO


Resuelve, por el método que consideres más oportuno, estos sistemas:

a) $5x + 4y = 3$

$x + 2y = 3$

b) $x = 5 - y$

$2x + y = 7$



💡 **Métodos de resolución:**

Sustitución: Se despeja una incógnita en una ecuación y se sustituye en la otra.

Reducción (suma o resta): Se combinan las ecuaciones para eliminar una incógnita.

Igualación: Se despeja la misma incógnita en ambas y se igualan.

Gráfico: Cada ecuación es una recta; la solución es su punto de intersección.

📐 En el apartado b), la ecuación $x = 5 - y$ ya tiene x despejada: es ideal usar el **método de sustitución** directamente sin pasos previos. Sustituye en la segunda ecuación.

8 Triángulos Semejantes


GEOMETRÍA · SEMEJANZA · RAZÓN DE SEMEJANZA · TEOREMA DE TALES

✦ ENUNCIADO

Estos dos triángulos son semejantes. Calcula la longitud de los lados que faltan a cada uno de ellos:

Triángulo pequeño: hipotenusa = **5 cm**, base = **4 cm**, altura = **x**

Triángulo grande: hipotenusa = **15 cm**, altura = **9 cm**, base = **y**



💡 **Triángulos semejantes:**
Dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales y sus lados proporcionales. La **razón de semejanza** k = (lado del triángulo grande) / (lado correspondiente del triángulo pequeño). Todos los lados del triángulo grande son k veces los correspondientes del pequeño.

📐 Para hallar x (lado desconocido del triángulo pequeño), usa el **Teorema de Pitágoras**: hipotenusa² = cateto² + cateto², es decir: $5^2 = 4^2 + x^2 \Rightarrow x = \sqrt{(25 - 16)} = \sqrt{9} = 3$ cm.
La razón de semejanza es k = 15/5 = 3, por lo que y = 4 × 3 = 12 cm.


9 Área y Perímetro del Trapecio Isósceles

GEOMETRÍA · CUADRILÁTEROS · ÁREA · PERÍMETRO

✦ ENUNCIADO

Calcula el área y el perímetro de un trapecio isósceles, sabiendo que:

- Base mayor = **15 cm**
- Base menor = **9 cm**
- Altura = **4 cm**



💡 **Fórmulas del trapecio:**

Área = (Base mayor + Base menor) × altura / 2 = (B + b) × h / 2

Perímetro = Base mayor + Base menor + 2 × lado lateral

El **lado lateral** del trapecio isósceles se calcula con Pitágoras: el triángulo rectángulo formado tiene por catetos la altura (h = 4 cm) y la semidiferencia de las bases: (B − b)/2 = (15 − 9)/2 = 3 cm. Luego: lado = $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$ cm.

📐 Un trapecio isósceles tiene los dos lados laterales iguales, los ángulos de la base mayor iguales entre sí, y los ángulos de la base menor iguales entre sí. Es simétrico respecto a la mediatriz de las bases.


10 Área de la Zona Sombreada

GEOMETRÍA · CÍRCULO · CUADRADO INSCRITO · ÁREAS

✦ ENUNCIADO

Calcula el área de la zona sombreada, sabiendo que el cuadrado tiene de lado 4 cm.

La figura muestra un **cuadrado inscrito en una circunferencia**. La zona sombreada es la parte del círculo que queda fuera del cuadrado (los cuatro segmentos circulares de las esquinas).



💡 **Estrategia: Área sombreada = Área del círculo − Área del cuadrado**

Paso 1 — Radio del círculo: La diagonal del cuadrado inscrito es el diámetro. diagonal = lado × √2 = 4√2 cm ⇒ radio = 2√2 cm.

Paso 2 — Área del círculo: $A_c = \pi \times r^2 = \pi \times (2\sqrt{2})^2 = 8\pi$ cm²

Paso 3 — Área del cuadrado: $A_{cuad} = \text{lado}^2 = 4^2 = 16$ cm²

Paso 4 — Área sombreada: $A_{somb} = 8\pi - 16 \approx 25{,}13 - 16 = \mathbf{9{,}13}$ **cm²**

📐 Área del círculo = πr^2. Cuando el cuadrado está *inscrito* en la circunferencia, sus cuatro vértices tocan el círculo, y la diagonal del cuadrado es igual al diámetro del círculo.

¡SUERTE JÓVENES!


"La matemática, correctamente vista, posee no solo la verdad sino la suprema belleza." — Bertrand Russell

1ª EVALUACION

CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS

- **Reales (R)**
  - **Racionales: (Q)** a/b
    - **Enteros (Z)**
      - **Naturales: (N) = {0, 1, 2, 3, ...}**
      - **N ⊂ Z⁻ = {0}**
      - **Negativos: (Z⁻) = {0, –1, –2, ...}**
    - **Fraccionarios**
      - **Decimal exacto:** 0.5 = 1/2
      - **Periódico puro:** 2.33333333... = 7/3
      - **Periódico mixto:** 2.34444444... = 211/90
  - **Irracionales: (I)** ~~a/b~~ — **Tiene infinitas cifras decimales NO periódicas**. **Ejemplos: π, e, φ, √2**
- **Imaginarios: (C)** √−1

BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LOS NÚMEROS



La noción de número es tan primitiva como el propio hombre. Los hombres primitivos utilizaban los dedos, muescas en huesos... para expresar cantidades: un mamut, una luna, un sol... empleando los **NÚMEROS NATURALES**.

Los babilonios (2100 a. C.) poseían una organización administrativa contable muy compleja, lo que motivó un desarrollo importante en los sistemas numéricos. Tenían un sistema de numeración base 60 perfectamente maduro. En él destacaba el valor posicional de las cifras, como en la actualidad. No utilizaban el cero, sino que dejaban un espacio en blanco, lo que inducía en muchas ocasiones a error; más adelante ya introdujeron un nuevo símbolo, parecido a una trompeta, que sustituía al espacio vacío y que podríamos considerar como cero.

A continuación, civilizaciones como la egipcia (2000 a. C.), empezaron a utilizar expresiones que representaban las fracciones, apareciendo así los **NÚMEROS FRACCIONARIOS**, eso sí, muy básicos y generalmente con el 1 como numerador.

En el siglo V a. C. los griegos encontraron otro tipo de números que eran la solución de determinadas ecuaciones y que no tenían fin, eran algo se le escapaba al razonamiento humano, eran los **NÚMEROS IRRACIONALES**.

Hubo que esperar al siglo XVII para empezar a considerar los **NÚMEROS NEGATIVOS.** El propio Descartes denominaba soluciones falsas a las raíces negativas de una ecuación, aunque es cierto que civilizaciones como la China parece que ya los conocían, colocando bolas rojas en los ábacos, simbolizando a los números negativos (de ahí que muchas veces oímos la expresión de números rojos).

La aparición de soluciones como "raíz cuadrada de menos cuatro" no podían ser interpretadas de ninguna manera. Hubo que esperar al siglo XIX, cuando ya se le empezó a dar una fundamentación teórica y a representarlo gráficamente, momento en el que se comenzó a hablar de números imaginarios.

UNIDAD 1. Los números enteros

Conceptos

Números enteros. Valor absoluto.
Suma y resta de números enteros. Aplicaciones.
Multiplicación y división exacta de números enteros. Aplicaciones.
Operaciones combinadas con números enteros sin paréntesis y con paréntesis.
Múltiplos de un número.
Divisores de un número.
Números primos y compuestos.
Máximo común divisor.
Mínimo común múltiplo.

LOS NÚMEROS ENTEROS

Un número entero está formado por un signo (+ o -) que indica si es positivo o negativo, y un número que sigue al signo y que representa su valor absoluto.

VALOR ABSOLUTO DE UN NÚMERO. Es valor de dicho número prescindiendo del signo.

ENTEROS OPUESTOS. Dos números son enteros opuestos si tienen el mismo valor absoluto pero distinto signo.

SUMA Y RESTA DE NÚMEROS ENTEROS.

Para sumar dos números enteros del mismo signo, se suman sus valores absolutos y se pone el mismo signo que tienen los sumandos.

$$5 + 3 = 8 \qquad -4 + (-3) = -7$$

Para sumar dos números enteros de distinto signo, se restan sus valores absolutos (al mayor se le resta el menor), y se pone el signo del sumando que tiene mayor valor absoluto.

$$-6 + 4 = -2$$

Para sumar varios números enteros de distinto signo, se suman separadamente los enteros positivos y los negativos; después se suman el entero positivo y el negativo obtenidos.

$$5 + (-8) + (-3) + 4 = 9 + (-11) = -2$$

Para restar dos números enteros, se suma al minuendo el opuesto del sustraendo.

$$8 - 3 = 8 + (-3) = 5$$

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN EXACTA DE NÚMEROS ENTEROS.

Para calcular el **producto de dos números enteros**: se calcula el producto de los valores absolutos de los factores, y al resultado obtenido se le pone el signo + si los dos factores tienen el mismo signo, y el signo – si los factores tienen signo distinto.

Regla de los signos de la multiplicación:

Para calcular el **cociente de dos números enteros**: se halla el cociente de sus valores absolutos, y al resultado obtenido se le pone el signo + si los dos enteros tienen el mismo signo, y el signo – si los dos enteros tienen distinto signo.

Regla de los signos de la división:

OPERACIONES COMBINADAS CON NÚMEROS ENTEROS.

* Para realizar operaciones con números enteros en las que **no haya paréntesis**, se sigue este orden:
1º Se hacen las multiplicaciones y las divisiones.
2º Se hacen las sumas y las restas.

* Para realizar una serie de operaciones con números enteros **en las que haya paréntesis** , se sigue este orden:
1º Se resuelven los paréntesis incluidos en cada corchete.
2º Se resuelven los corchetes.
3º Se hacen las multiplicaciones y las divisiones.
4º Se hacen las sumas y las restas.1.- Asocia un número, positivo o negativo, a cada uno de los siguientes enunciados:

a) María está en el octavo piso.

b) Miguel se encuentra en el tercer sótano.

c) Tengo en el banco 535 €.

d) El termómetro marca 19 ºC sobre cero.

e) Debo 5 € a un amigo.

f) El termómetro marca 2 ºC bajo cero.

g) Tengo una moneda de 2 €.

2.- Ordena los siguientes números y represéntalos en la recta numérica:

-8, +6, -1, +8, +3, -2, -5, +4, -12

3.- Efectúa las siguientes operaciones indicadas:

$a)\ \ 2\cdot 7-6\cdot 1+9\cdot 3-3$ $b)\ \ 6\cdot 4+5\cdot 2-12:3-8$

$c)\ \ 8+6:2-14:2+5$ $d)\ \ 10+5+7-24:6-8+9$

4.- Efectúa las operaciones combinadas:

$a)\ \ 3+6\cdot 3-5+6:2$ $b)\ \ 3+6\cdot(3-5)+6:2$

$c)\ \ 4-5\cdot 6-8:4-2+3\cdot 5:3$ $d)\ \ 4-5\cdot(6-8):(4-2)+3\cdot 5:3$

$e)\ \ 7-2\cdot 5+7\cdot 3-2\cdot 4-3\cdot 4$ $f)\ \ 7-2\cdot(5+7\cdot 3)-(2\cdot 4-3)\cdot 4$

$g)\ \ 4+3\cdot 2-5:5$ $h)\ \ 2\cdot(-3)\cdot(-2)-(-4)\cdot 3\cdot(-1)-3(2+5-4\cdot 3)$

5.- Un depósito de agua contiene 200 litros. Virginia saca 20 litros y Borja 32 litros. Más tarde Juan echa 14 litros. ¿Cuántos litros de agua quedan en el depósito?

6.- Calcula:

$a)\ \ \frac{2}{7}\ de\ 735$ $b)\ \ \frac{5}{13}\ de\ 104$ $c)\ \ \frac{5}{6}\ de\ 498$

$d)\ \ \frac{3}{8}\ de\ 1160$ $e)\ \ \frac{4}{9}\ de\ 153$ $f)\ \ \frac{7}{11}\ de\ 1650$

7.- Escribe tres fracciones equivalentes en cada caso:

$a)\ \ \frac{2}{3}$ $b)\ \ \frac{3}{5}$ $c)\ \ \frac{4}{8}$

8.- Simplifica:

a) $\frac{4}{8}$ b) $\frac{6}{8}$ c) $\frac{7}{21}$ d) $\frac{6}{18}$

e) $\frac{15}{25}$ f) $\frac{12}{16}$ g) $\frac{18}{27}$ h) $\frac{25}{75}$

9.- Reduce a común denominador y ordena:

a) $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}$ b) $\frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{7}{10}$

c) $\frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{7}{10}$ d) $\frac{7}{2}, \frac{8}{3}, \frac{9}{5}$

10.- Calcula:

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}$ b) $1-\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$

d) $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$ e) $2-\frac{3}{7}$ f) $\frac{5}{3}-1$

11.- Calcula y simplifica:

a) $3\cdot\frac{1}{6}$ b) $5\cdot\frac{3}{10}$ c) $\frac{2}{3}\cdot 6$ d) $5\cdot\frac{4}{15}$

e) $\frac{3}{5}\cdot 10$ f) $\frac{3}{8}\cdot 2$ g) $1:\frac{3}{4}$ h) $1:\frac{5}{7}$

i) $\frac{1}{5}:2$ j) $4:\frac{2}{3}$ k) $2:\frac{4}{3}$ l) $\frac{3}{5}:6$

12.- En una clase de 20 alumnos y alumnas, 2/5 son chicos. ¿Cuántas son las chicas?

13.- En una población, el 20% de las personas está en el paro. ¿Qué fracción de la población no tiene trabajo?

14.- Rafael tenía 50€ y se ha gastado 20€. ¿Qué fracción le queda de lo que tenía?

Expresa las siguientes situaciones con números enteros:

Una temperatura de 10º bajo cero

Deber 450 €

Estar a 2560 m de altitud

Estar sumergido a 20 m.

Representa en la recta numérica los números enteros desde -10 hasta +10.:

Ordena de menor a mayor las siguientes series de números enteros:

4, -8, 0, -7, 1, 3, -1

-9, -16, 4, 25, -15, -2)

Calcula los productos y cocientes:

(+24) : (-4)=

(+9) · (-3) =

(+9) : (-3) =
(-10) · (-5) =
(-10) : (-5) =
(+8) · (+7) =
42 : (-7) =
(-30) : 6 =
5 · (-6) · (-2) =

La temperatura en la cima del Mulhacén a las 5 de la mañana era de -2ºC. Tras la salida del Sol experimentó una subida de 10ºC, pero un temporal repentino hizo que descendiera 14ºC. Cuando remitió la temperatura subió 9ºC. ¿ Cuál era la temperatura cuando amainó el temporal? Exprésalo mediante una única operación con sumas y restas

MÚLTIPLOS Y DIVISORES – DIVISIBILIDAD – M.C.D. y M.C.M.

Múltiplos de un número

Un número es múltiplo de otro si se obtiene multiplicando este último por un número natural.

Por ejemplo, si multiplicamos 9x2 nos da 18. Decimos entonces que 18 es múltiplo de 9.

Divisor de un número

Un número es divisor de otro si cuando dividimos el segundo entre el primero, el resto de la división es 0.

Por ejemplo, decimos que 5 es divisor de 10 porque al dividir 10 entre 5 la división es exacta; da 2 y queda de resto 0.

Números primos y compuestos

Un número es primo si tiene solamente dos divisores: él mismo y la unidad. Es decir, que sólo se puede dividir (dando una división exacta) por ese mismo número y por uno.

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

- Un número es divisible por 2 cuando es par o termina en 0, 2, 4, 6, ó 8.
- Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 3.
- Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimos dígitos son ceros o forman un múltiplo de 4.
- Un número es divisible por 5 cuando termian en 0 ó en 5.
- Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y 3 a la vez.
- Un número es divisible por 8 cuando sus tres últimos dígitos son ceros o forman un múltiplo de 8.
- Un número es divisible por 9 cuando la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9.
- Un número es divisible por 10 cuando termina en 0.
- Un número es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de los valores absolutos de sus cifras de lugar impar y la suma de los valores absolutos de sus cifras de lugar par, de derecha a izquierda, es cero o múltiplo de 11.
- Un número es divisible por 25 cuando sus dos últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 25.
- Un número es divisible por 125 cuando sus tres últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 125.

EJERCICIOS

1.- Calcula 4 múltiplos de cada uno de las siguientes cifras:

3,
10,
8 ,
15
2,

2- Define qué es un número primo. Escribe 5 números primos.

3- Define qué es un número compuesto. Escribe 5 números compuestos.

Los criterios de divisibilidad nos sirven para saber si un número se puede dividir por otro. Sabiendo esto, señala porqué números son divisibles las siguientes cantidades:

Ejemplo: 24;es divisible por 1, 24, 2, 3, 4 ,8,6 y 12

35.
120.
66.
75.
49
63
23
98
18
76
300
102

4- Escribe todos los divisores de cada unos de los siguientes números;

12
20
14
30
45
60
34
75
225
400
17
9
36
44
96
432
60
300

5- Descompón estos números en factores primos.

15.
18.
42
55
70
26
84
124
95
35
100
26

6 Calcula el M.C.D. y el M.C.M. de los siguientes números:

4 y 6,
20 y 30
4 y 8
12 y 24
72 y 84
90 y 120
24 y 50

7- Descompón estos números en factores primos.

125
8
242
12
27
125
63
1732
428
38
350
180

8- Calcula el M.C.D. y el M.C.M. de los siguientes números (por el algoritmo de Euclides9

48 y 52
12 y 20
24 y 18
45 y 144
75 y 36
63 y 27
14 y 56
33 y 110

¿CUÁNTO SABES?

1.- Calcula 4 múltiplos de cada uno de las siguientes cifras:
7 6 35 98 100 87

2.- Escribe 3 divisores de cada uno de los siguientes números:

88
600
96
124
874
950

3.- Define qué es un número primo. Escribe 5 números primos.

4.- Define qué es un número compuesto. Escribe 5 números compuestos.

5.- Los criterios de divisibilidad nos sirven para saber si un número se puede dividir por otro. Sabiendo esto, señala porqué números son divisibles las siguientes cantidades:
12: es divisible por 1, 12, 2, 3, 4 y 6.

6.- Descompón estos números en factores primos.

1. 20
2. 90
3. 600
4. 360

5. 136
6. 408
7. 307
8. 805
9. 6
10. 78
11. 871
12. 2500.

7.- Calcula el M.C.D. y el M.C.M. de los siguientes números(por el algoritmo de Euclides)

1. 63 y 48
2. 42 y 60
3. 36 y 45
4. 560 y 588.
5. 46 y 98
6. 105 y 135
7. 270 y 234
8. 315 y 420

PROBLEMAS DE MCM y MCD

1. Un coche necesita que le cambien el aceite cada 9.000 km, el filtro del aire cada 15.000 km y las bujías cada 30.000 km. ¿ A qué número mínimo de kilómetros habrá que hacerle todos los cambios a la vez?
2. Un comerciante desea poner en cajas 12.028 manzanas y 12.772 naranjas de modo que cada caja contenga el mismo número de manzanas o de naranjas y además el mayor número posible de ellas. Hallar el número de naranjas y de manzanas de cada caja.
3. La clase de 1º A tiene 32 alumnos y la de 1º B, 36 alumnos. Queremos distribuir los alumnos en equipos del mismo número de participantes de manera que no falte ni sobre nadie y no se mezclen los grupos ¿Cuántos alumnos podrán entrar en cada equipo como máximo?
4. Tres aviones de línea regular salen del aeropuerto cada 3 días, cada 12 días y cada 18 días. ¿Cada cuántos días saldrán los tres aviones a la vez?
5. Se desean acondicionar 1830 latas de aceite y 1170 latas de yerba en un cierto número de cajones que contengan el mismo número de latas, sin que sobre ninguna y sin mezclar las latas. ¿Cuál será el mayor número posible de latas que puedan ponerse en cada cajón?
6. Un jardinero desea colocar 720 plantas de violetas, 240 de pensamientos, 360 de jacintos y 480 de claveles en el menor número posible de canteros que contengan el mismo número de plantas, sin mezclar las mismas. ¿Qué cantidad de plantas debe contener cada cantero y cuántos hay?
7. Se tienen tres tubos de 84 , 270 y 330 cm3. ¿Cuál es el mayor volumen en cm3 que cabe un número exacto de veces en cada uno de ellos?
8. Se tienen 160 y 168 cl de extractos distintos. Se quieren envasar en el menor número posible de frascos iguales sin mezclar los extractos. ¿Cuál es el número de frascos de cada clase?
9. Cuatro buques parten para el mismo destino: el primero, cada 10 días; el segundo, cada 8; el tercero,. Cada 9 y el cuarto cada 15.¿cuántos días transcurren entre dos salidas simultáneas consecutivas?(360)
10. Un ebanista quiere cortar una plancha de madera de 256 cm de largo y 96 cm de ancho, en cuadrados lo más grandes posible.
11. Un viajante va a Sevilla cada 18 días, otro va a Sevilla cada 15 días y un tercero va a Sevilla cada 8 días. Hoy día 10 de enero han coincidido en Sevilla los tres viajantes.¿Dentro de cuántos días como mínimo volverán a coincidir en Sevilla?
12. Andrés tiene en su tienda los botones metidos en bolsas. En la caja A tiene bolsitasde 24 botones cada una y no sobra ningún botón. En la caja B tiene bolsitas de 20 botones cada una y tampoco sobra ningún botón. El número de botones que hay en la caja A es igual que el que hay en la caja B.
13. María y Jorge tienen 25 bolas blancas, 15 bolas azules y 90 bolas rojas y quieren hacer el mayor número de collares iguales sin que sobre ninguna bola.
14. ¿Cuántos collares iguales pueden hacer?
15. ¿Qué número de bolas de cada color tendrá cada collar

UNIDAD 2. Potencias y raíces cuadradas de números enteros

Conceptos

Potencias de base entera y exponente natural.
Producto de potencias de la misma base.
Cociente de potencias de la misma base.
Potencia de una potencia.
Cuadrados perfectos.
Raíz cuadrada entera.

POTENCIAS Y RAÍCES CUADRADAS DE NÚMEROS ENTEROS

Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales.
* La base de la potencia es el factor que se repite.
* El exponente de la potencia es el número de veces que se repite.

Las potencias de base negativa y exponente impar son negativas.
Las potencias de base negativa y exponente par son positivas.

POTENCIAS.
Producto de potencias de la misma base. Es una potencia con la misma base y con el exponente igual a la suma de los exponentes de los factores.
Cociente de potencias de la misma base. Es una potencia que tiene la misma base y el exponente es igual a la diferencia entre los exponentes del dividendo y del divisor.
Un caso especial: exponente cero. Cualquier exponente elevado a cero es iguala a 1.
Potencia de una potencia. Es otra potencia que tiene la misma base y el exponente igual al producto de los exponentes.

RAÍCES.
Producto de raíces cuadradas exactas. Es una raíz cuadrada exacta y su radicando es igual al producto de los radicandos de los factores.
Potencia de una raíz cuadrada exacta. Es una raíz cuadrada exacta y su radicando es igual al radicando de partida elevado al exponente de la potencia.

Expresa como producto de potencias:

1. $(-5)^4 =$
2. $(-3)^5 =$
3. $(-4)^7 =$

Expresa como potencia:



Calcula:

1. $(-5)^3 =$
2. $(-12)^4 =$
3. $(-2)^7 =$

Expresa como potencia de un número racional:

1. $\left(\frac{3}{7}\right)^4 =$ $\left(\frac{4}{5}\right)^3 =$

$\left(-\frac{5}{2}\right)^4 =$ $\frac{(-5)\cdot(-5)}{(-4)\cdot(-4)} =$

$\frac{5\cdot(-5)}{(-3)\cdot 3} =$

Calcula:

1 $\left(\frac{3}{2}\right)^2 =$

2. $\left(\frac{5}{6}\right)^4 =$

3. $\left(-\frac{3}{8}\right)^3 =$

4. $\left(\frac{3}{4}\right)^3 =$

5. $\left(\frac{3}{7}\right)^4 =$

6. $\left(-\frac{5}{2}\right)^4 =$

7. $\left(\frac{4}{5}\right)^3 =$

8. $\frac{3}{4^3} =$

9. $-6^3 =$

10. $(-6)^3 =$

11. $\frac{3^4}{5} =$

12. $-\left(\frac{4}{5}\right)^2 =$

13. $\left(\frac{3}{8}\right)^5 =$

14. $\left(\frac{3}{7}\right)^4 =$

15. $\left(\frac{1}{5}\right)^4 =$

Expresa en forma de producto las siguientes potencias:

1. $3^4 =$
2. $5^2 =$
3. $10^3 =$
4. $12^8 =$

Escribe en forma de potencia, si es posible, los productos siguientes:

1. $7 \cdot 7 \cdot 7 =$
2. $5 \cdot 4 \cdot 3 =$
3. $6 \cdot 6 =$
4. $3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 =$
5. $4 \cdot 4 =$
6. $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 =$
7. $(-5) \cdot (-5) =$
8. $3 \cdot 3 =$

Calcula:

1. $\sqrt{121} =$
2. $\sqrt[3]{216} =$
3. $\sqrt[4]{16} =$
4. $\sqrt[3]{125} =$
5. $\sqrt[4]{81} =$

Escribe las seis primeras potencias de 7, 10 y 12.

Expresa en forma de potencia de base 10:

$100000 = 10^{\square}$

$100 = 10^{\square}$

$10000 = 10^{\square}$

Expresa en forma de potencias de base 2:

a) $64 = 2^{\square}$

b) $16 = 2^{\square}$

c) $256 = 2^{\square}$

Expresa en forma de potencias de base 3:

a) $27 = 3^{\square}$

b) $729 = 3^{\square}$

c) $243 = 3^{\square}$

Expresa en forma de potencias de exponente 2:

a) $64 = \square^2$

b) $100 = \square^2$

c) $36 = \square^2$

POTENCIAS

Escribe como potencias de 10:

1. 18 millones
2. 7000
3. cien mil
4. 190.000.000
5. 500 millones
6. un billón

Transforma en potencias de 10:

1. 231000
2. 8760000
3. 240
4. 2490000
5. 73600
6. 0,00045
7. 0,487
8. 0,0098
9. 35000000
10. 9800000000
11. 0,00000089
12. 214300000000
13. 0,000897
14. 34000000
15. 0,0000007

Transforma en potencias de dos:

1. 10.000=
2. 1.000.000=
3. 1.000.000.000=
4. 1000=
5. 0,0001=
6. 0,000001=
7. 0,0000001=
8. 0,001=

UNIDAD 3. Fracciones. Operaciones con fracciones.

Conceptos

Fracciones equivalentes.
Comparación de fracciones.
Suma y resta de fracciones.
Multiplicación y división de fracciones.
Potenciación y raíz cuadrada de fracciones.
Fracciones positivas y negativas.
Suma, resta, multiplicación, división y potencia de fracciones positivas y negativas.

FRACCIONES. OPERACIONES CON FRACCIONES.

FRACCIONES EQUIVALENTES. Para obtener fracciones equivalentes a una dada se multiplican o dividen sus términos por el mismo número.

COMPARACIÓN DE FRACCIONES CON EL MISMO DENOMINADOR. Si dos fracciones tienen el mismo denominador, es mayor la que tiene mayor numerador.

COMPARACIÓN DE FRACCIONES CON EL MISMO NUMERADOR. Si dos fracciones tienen el mismo numerador, es mayor la que tiene menor denominador.

REDUCCIÓN DE VARIAS FRACCIONES A UN COMÚN DENOMINADOR.

1º Se halla el m.c.m. de los denominadores.

2º Se divide el m.c.m. entre cada uno de los denominadores y el resultado se multiplica por el numerador correspondiente.

COMPARACIÓN DE FRACCIONES CUALESQUIERA. Se reducen a un común denominador y será mayor la que tiene mayor numerador.

También podemos comparar los cocientes que resultan al dividir en cada fracción el numerador entre el denominador.

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES CON EL MISMO DENOMINADOR. La suma o diferencia de dos fracciones con el mismo denominador es una fracción que tiene el mismo denominador y el numerador igual a la suma o diferencia de los numeradores.

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES CON DISTINTO DENOMINADOR. Se reducen a un común denominador y se suman o restan las fracciones obtenidas.

MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES. El producto de dos fracciones es una fracción que tiene el numerador igual al producto de los numeradores y el denominador igual al producto de los denominadores.

DIVISIÓN DE FRACCIONES. El cociente de dos fracciones es igual al producto del dividendo por la fracción inversa del divisor.

POTENCIACIÓN DE FRACCIONES. Para elevar una potencia a otra potencia se elevan el numerador y el denominador a dicha potencia.

RAÍZ CUADRADA DE UNA FRACCIÓN. Es el número cuyo cuadrado es igual a la fracción.

CÁLCULO DE LA RAÍZ CUADRADA DE UNA FRACCIÓN CUYOS TÉRMINOS SON CUADADOS PERFECTOS. Es una fracción que tiene el numerador igual a la raíz cuadrada exacta del numerador y el denominador igual a la raíz cuadrada exacta del denominador.

CÁLCULO DE LA RAÍZ CUADRADA DE UNA FRACCIÓN CUYOS DOS TÉRMINOS NO SON CUADRADOS PERFECTOS. Se calcula el cociente de los términos y se halla la raíz cuadrada del cociente con la aproximación que se desee.

1. Calcula:

$a)\ \frac{2}{7}\ de\ 735$ $\quad b)\ \frac{5}{13}\ de\ 104$ $\quad c)\ \frac{5}{6}\ de\ 498$

$d)\ \frac{3}{8}\ de\ 1160$ $\quad e)\ \frac{4}{9}\ de\ 153$ $\quad f)\ \frac{7}{11}\ de\ 1650$

2. Escribe tres fracciones equivalentes en cada caso:

3. *a*) $\frac{2}{3}$ *b*) $\frac{3}{5}$ *c*) $\frac{4}{8}$

4. Simplifica:

a) $\frac{4}{8}$ *b*) $\frac{6}{8}$ *c*) $\frac{7}{21}$ *d*) $\frac{6}{18}$

e) $\frac{15}{25}$ *f*) $\frac{12}{16}$ *g*) $\frac{18}{27}$ *h*) $\frac{25}{75}$

5. Reduce a común denominador y ordena:

a) $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}$ *b*) $\frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{7}{10}$

c) $\frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{7}{10}$ *d*) $\frac{7}{2}, \frac{8}{3}, \frac{9}{5}$

6. Calcula:

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}$ *b*) $1-\frac{1}{2}$ *c*) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$

d) $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$ *e*) $2-\frac{3}{7}$ *f*) $\frac{5}{3}-1$

7. Calcula y simplifica:

a) $3\cdot\frac{1}{6}$ *b*) $5\cdot\frac{3}{10}$ *c*) $\frac{2}{3}\cdot 6$ *d*) $5\cdot\frac{4}{15}$

e) $\frac{3}{5}\cdot 10$ *f*) $\frac{3}{8}\cdot 2$ *g*) $1:\frac{3}{4}$ *h*) $1:\frac{5}{7}$

i) $\frac{1}{5}:2$ *j*) $4:\frac{2}{3}$ *k*) $2:\frac{4}{3}$ *l*) $\frac{3}{5}:6$

8. En una clase de 20 alumnos y alumnas, 2/5 son chicos. ¿Cuántas son las chicas?

9. En una población, el 20% de las personas está en el paro. ¿Qué fracción de la población no tiene trabajo?

10. Rafael tenía 50€ y se ha gastado 20€. ¿Qué fracción le queda de lo que tenía?

11. $\left[\left(-\frac{2}{5}\right):(-4)\right]\cdot\left[\left(\frac{5}{-3}\right):\left(\frac{1}{-6}\right)\right]=$

12. $\left[\left(\frac{-4}{15}\right)\cdot\frac{5}{8}\right]:\left[\left(\frac{1}{-6}\right)\right]=$

13. $\left[\left(-\frac{3}{4}\right):\left(\frac{5}{6}\right)\right]:\left(-\frac{9}{10}\right)=$

14. $\left[\left(-\frac{2}{5}\right):(-4)\right]\cdot\left[\left(\frac{5}{-3}\right):\left(\frac{1}{-6}\right)\right]=$

15. $3:\frac{1}{3}+\frac{1}{3}:3-\frac{1}{3}\cdot 3-\left(\frac{1}{3}\right)^3=$

16. $3:\left(9:\frac{4}{3}\right)+(3:9):\frac{4}{3}=$

17. $(3-4:6+2:4):15+\left(\frac{4}{3}:\frac{2}{3}\right)^2=$

18. $\dfrac{\frac{3}{4}+\frac{1}{6}}{\frac{3}{4}-\frac{1}{6}}=$

UNIDAD 4. Expresiones decimales (continuación de la unidad 3).-
Expresión decimal de un número racional.
Clasificación de expresiones decimales.
Expresión decimal exacta.
Expresión decimal no exacta.
Fracciones generatrices.
Fracción generatriz de un número decimal.
Operaciones con decimales (repaso).
Porcentajes.

EXPRESIONES DECIMALES

NÚMEROS DECIMALES.
Las decenas, centenas, millares...son múltiplos de la unidad.
Las décimas, centésimas...son submúltiplos de la unidad o unidades decimales.
SUMA Y RESTA DE NÚMEROS DECIMALES. Para sumar o restar números decimales:
* Se escriben uno debajo del otro, de manera que estén alineados las comas decimales y las unidades de los mismos órdenes.
* Se suman o restan como si fueran números naturales.
* Al resultado se le coloca la coma decimal alineada.
MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES. Para multiplicar dos números decimales:
* Se multiplican como si fueran naturales.
* El resultado tiene tantas cifras decimales como la suma de las cifras decimales de los factores.
DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES. Para dividir dos números decimales:
*Se multiplican el dividendo y el divisor por 10, 100... hasta que el divisor sea un número natural.
* Se hace la división con los nuevos términos.
POTENCIA DE UN NÚMERO DECIMAL. Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación cuyos factores son iguales.
* La base de la potencia es el factor que se repite.
* El exponente de la potencia es el número de veces que se repite.

RAÍZ CUADRADA DE UN NÚMERO DECIMAL. Es un número cuyo cuadrado es igual al número decimal.

FRACCIONES CON EXPRESIÓN DECIMAL EXACTA son aquellas cuyo cociente es un número decimal exacto.

FRACCIONES CON EXPRESIÓN DECIMAL NO EXACTA.

* Se llama periodo a las cifras que se repiten indefinidamente.
* Las fracciones no decimales se llaman **fracciones periódicas.**

Una fracción se llama **periódica pura** si su expresión decimal está generada solamente por el periodo.

Una fracción se dice **periódica mixta** si su parte decimal contiene una parte no periódica y otra periódica.

.-Ordena los siguientes números decimales:



. Calcula la fracción generatriz de los siguientes números decimales:

a) 0,131313...

b) 1,121121121...

c) $0,\widehat{3}\widehat{6}\widehat{6}\widehat{3}$

d) $-0,4\widehat{5}$

e) –1,3434...

f) $2,3\widehat{2}\widehat{6}$

g) 40,0404...

h) 5,2333...

FINAL 1º Evaluacion y Principio de la 2ª Evaluacion

UNIDAD 4. Expresiones algebraicas

Conceptos

- Del lenguaje ordinario al lenguaje algebraico.
- Expresiones algebraicas. Valor numérico.
- Monomios y polinomios enteros.
- Suma, resta, multiplicación y división de monomios.
- Suma y diferencia de polinomios.
- Producto de polinomios.
- Cociente de un polinomio por un monomio.
- Potencias de polinomios. Igualdades notables.

El **lenguaje algebraico** utiliza letras, números y signos de operaciones para expresar informaciones. Una **expresión algebraica** es una combinación de números y letras unidos por los signos de las operaciones aritméticas: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. **Valor numérico** de una expresión algebraica es el número que se obtiene al sustituir las letras de la misma por números determinados y hacer las operaciones indicadas en la expresión.

Trabajar en **álgebra** consiste en manejar **relaciones numéricas** en las que una o más cantidades son **desconocidas**. Estas cantidades se llaman **variables, incógnitas o indeterminadas y se representan por letras**.

Expresiones algebraicas comunes(las vas a utilizar mucho, sobre todo en problemas con ecuaciones de una sola incógnita)

Dos números **consecutivos**: x y $x + 1$.
Dos números **consecutivos pares**: $2x$ y $2x + 2$.
Dos números **consecutivos impares**: $2x + 1$ y $2x + 3$.
Descomponer 24 **en dos partes**: x y $24 - x$.
La **suma** de dos números es 24: x y $24 - x$.
El **producto** de dos números es 24: x y $24/x$.
La **diferencia** de dos números es 24: x y $24 + x$.
El **cociente** de dos números es 24; x y $24 \cdot x$.

Monomio

Definición de monomio

Un **monomio** es una **expresión algebraica** en la que las únicas **operaciones** que aparecen entre las variables son el **producto y la potencia de exponente natural**.

$2x^2 y^3 z$

Partes de un monomio

-***Coeficiente***

El **coeficiente** del **monomio** es el número que aparece multiplicando a las variables.

Parte literal

La **parte literal** está constituida por las letras y sus exponentes.

Grado

El **grado** de un **monomio** es la suma de todos los exponentes de las letras o variables.

El grado de $2x^2 y^3 z$ es: $2 + 3 + 1 = 6$

Monomios semejantes

Dos **monomios** son **semejantes** cuando tienen la **misma parte literal**.

$2x^2 y^3 z$ es semejante a $5x^2 y^3 z$

Operaciones con monomios

Suma de monomios

Sólo podemos **sumar monomios semejantes**.

La suma de los monomios es otro monomio que tiene la misma parte literal y cuyo coeficiente es la suma de los coeficientes.

$\mathbf{ax^n + bx^n = (a + b)bx^n}$

$2x^2 y^3 z + 3x^2 y^3 z = 5x^2 y^3 z$

Si los **monomios no** son **semejantes** se obtiene un **polinomio**.

$2x^2 y^3 + 3x^2 y^3 z$.

Producto de un número por un monomio

El **producto de un número por un monomio** es otro **monomio semejante** cuyo **coeficiente** es el **producto del coeficiente** de monomio **por el número**.

$5 \cdot 2x^2 y^3 z = 10x^2 y^3 z$.

Multiplicación de monomios

La **multiplicación de monomios** es otro **monomio** que tiene por **coeficiente el producto de los coeficientes y cuya parte literal se obtiene multiplicando las potencias que tenga la misma base.**

$\mathbf{ax^n \cdot bx^m = (a \cdot b)bx^{n+m}}$

$5x^2 y^3 z \cdot 2 y^2 z^2 = 10 x^2 y^5 z^3$.

División de monomios

Sólo se pueden **dividir monomios** con la **misma parte literal** y con el **grado del dividendo mayor o igual** que el **grado** de la variable correspondiente del **divisor**.

La **división de monomios** es otro **monomio** que tiene por **coeficiente el cociente de los coeficientes y cuya parte literal se obtiene dividiendo las potencias que tenga la misma base.**

$\mathbf{ax^n : bx^m = (a : b)bx^{n-m}}$

$$\frac{6x^3y^4z^2}{3x^2y^2z^2} = 2xy^2$$

Si el **grado del divisor es mayor**, obtenemos una **fracción algebraica**.

Potencia de un monomio

Para realizar la **potencia de un monomio** se eleva, cada elemento de éste, al exponente de la potencia.

$\mathbf{(ax^n)^m = a^m \cdot bx^{n \cdot m}}$

$(2x^3)^3 = 2^3(x^3)^3 = 8x^8$

$(-3x^2)^3 = (-3)^3 (x^3)^2 = -27x^6$

Ejercicios resueltos de monomios

1.- *Indica cuales de las siguientes expresiones son monomios. En caso afirmativo, indica su grado y coeficiente.*

1.-$3x^3$

Grado del monomio: 3 , **coefeciente**: 3

2.-$5x^{-3}$

No es un **monomio**, porque el exponente no es un número natural.

3.-$3x + 1$

No es un **monomio**, porque hay una suma.

4.- $\sqrt{2}\, x$ **Grado del monomio**: 1 , coefeciente: $\sqrt{2}$

$-\frac{3}{4}x^0$

5.- **Grado del monomio**: 4 , coefeciente: $\frac{3}{4}$

6.- $-\frac{3}{x^a}$ **No** es un **monomio**, porque no tiene exponente natural.

7.- $2\sqrt{x}$ **No** es un **monomio**, porque la parte literal está dentro de una raíz.

2.- Realiza las sumas y restas de monomios.

1.--$2x^2 y^3 z + 3x^2 y^3 z = 5x^2 y^3 z$
2.--$2x^3 - 5x^3 =$
3.--$3x^4 - 2x^4 + 7x^4 =$
4.--$2\,a^2 b\,c^3 - 5a^2 b\,c^3 + 3a^2 b\,c^3 - 2\,a^2 b\,c^3 =$

3.- Efectúa los productos de monomios.

1.--$(2x^3) \cdot (5x^3) =$
2.--$(12x^3) \cdot (4x) =$
3.--$5 \cdot (2x^2 y^3 z) =$
4.--$(5x^2 y^3 z) \cdot (2\,y^2 z^2) =$
5.--.$(18x^3 y^2 z^5) \cdot (6x^3 y z^2) =$
6.--$(-2x^3) \cdot (-5x) \cdot (-3x^2) =$

4 Realiza las divisiones de monomios.

1.--$(12x^3) : (4x) = 3x^2$
2.--$(18x^6 y^2 z^5) : (6x^3 y z^2) =$
3.--$(36\,x^3 y^7 z^4) : (12x^2 y^2) =$
4.-- $\frac{6x^3y^4z^2}{3x^2y^2z^2} = 2xy^2$

Polinomios

Definición de polinomio

Un **polinomio** es una **expresión algebraica** de la forma:

$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \ldots + a_1 x^1 + a_0$

Siendo **a_n, $a_{n-1} \ldots a_1$, a_o** números, llamados **coeficientes**.

a_o es el término independiente.

Grado de un polinomio

El **grado** de un polinomio P(x) es el **mayor exponente** al que se encuentra elevada la **variable** x.

Polinomio de grado cero

P(x) = 2

Polinomio de primer grado

P(x) = 3x + 2

Polinomio de segundo grado

P(x) = $2x^2$+ 3x + 2

Polinomio de tercer grado

P(x) = x^3 - $2x^2$+ 3x + 2

Polinomio de cuarto grado

P(x) = $x^4 + x^3$ - $2x^2$+ 3x + 2

Tipos de polinomios

Polinomio nulo

El **polinomio nulo** tiene todos sus **coeficientes nulos**.

Polinomio homogéneo

El **polinomio homogéneo** tiene todos sus **términos** o **monomios** con el **mismo grado**.

P(x) = $2x^2 + 3xy$

Polinomio heterogéneo

Los **términos** de un **polinomio heterogéneo** son de **distinto grado**.

$P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 3$

Polinomio completo

Un **polinomio completo** tiene **todos los términos** desde el término independiente hasta el término de mayor grado.

$P(x) = 2x^3 + 3x^2 + 5x - 3$

Polinomio ordenado

Un **polinomio** está **ordenado** si los **monomios** que lo forman están escritos de **mayor a menor grado**.

$P(x) = 2x^3 + 5x - 3$

Polinomios iguales

Dos polinomios son iguales si verifican:

1.º.-Los dos polinomios tienen el **mismo grado**.

2º.-Los **coeficientes** de los términos del mismo grado son i**guales**.

$P(x) = 2x^3 + 5x - 3$

$Q(x) = 5x - 3 + 2x^3$

Polinomios semejantes

Dos polinomios son semejantes si verifican que tienen **la misma parte literal.**

$P(x) = 2x^3 + 5x - 3$ $\quad$ $Q(x) = 5x^3 - 2x - 7$

Tipos de polinomios según el número de términos

Monomio

Es un **polinomio** que consta de **un** sólo **monomio**.

$P(x) = 2x^2$

Binomio

Es un **polinomio** que consta de **dos monomios**.

$P(x) = 2x^2 + 3x$

Trinomio

Es un **polinomio** que consta de **tres monomios**.

$P(x) = 2x^2 + 3x + 5$

Valor numérico de un polinomio

Es el resultado que obtenemos al sustituir la variable x por un número cualquiera.

$P(x) = 2x^3 + 5x - 3$; $x = 1$

$P(1) = 2 \cdot 1^3 + 5 \cdot 1 - 3 = 2 + 5 - 3 = 4$

Operaciones con polinomios

Suma de polinomios

Para sumar dos polinomios se suman los coeficientes de los términos del mismo grado.

$P(x) = 2x^3 + 5x - 3$ $\quad$ $Q(x) = 4x - 3x^2 + 2x^3$

1º.-**Ordenamos** los **polinomios**, si no lo están.

$Q(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x$

$P(x) + Q(x) = (2x^3 + 5x - 3) + (2x^3 - 3x^2 + 4x)$

2º.-**Agrupamos** los **monomios** del **mismo grado**.

$P(x) + Q(x) = 2x^3 + 2x^3 - 3x^2 + 5x + 4x - 3$

3º.-**Sumamos los monomios semejantes**.

$P(x) + Q(x) = 4x^3 - 3x^2 + 9x - 3$

Resta de polinomios

La resta de polinomios consiste en **sumar el opuesto del sustraendo**.

$P(x) - Q(x) = (2x^3 + 5x - 3) - (2x^3 - 3x^2 + 4x)$

$P(x) - Q(x) = 2x^3 + 5x - 3 - 2x^3 + 3x^2 - 4x$

$P(x) - Q(x) = 2x^3 - 2x^3 + 3x^2 + 5x - 4x - 3$

$P(x) - Q(x) = 3x^2 + x - 3$

Multiplicación de polinomios

Multiplicación de un número por un polinomio

Es otro **polinomio** que tiene de **grado** el **mismo** del polinomio y como **coeficientes** el **producto de los coeficientes del polinomio por el número**.

$3 \cdot (2x^3 - 3x^2 + 4x - 2) = 6x^3 - 9x^2 + 12x - 6$

Multiplicación de un monomio por un polinomio

Se **multiplica el monomio** por todos y **cada** uno de los **monomios que forman el polinomio**.

$3x^2 \cdot (2x^3 - 3x^2 + 4x - 2) = 6x^5 - 9x^4 + 12x^3 - 6x^2$

Multiplicación de polinomios

$P(x) = 2x^2 - 3 \quad Q(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x$

Se multiplica cada monomio del primer polinomio por todos los elementos segundo polinomio.

$P(x) \cdot Q(x) = (2x^2 - 3) \cdot (2x^3 - 3x^2 + 4x) =$

$= 4x^5 - 6x^4 + 8x^3 - 6x^3 + 9x^2 - 12x =$

Se suman los monomios del mismo grado.

$= 4x^5 - 6x^4 + 2x^3 + 9x^2 - 12x$

Se obtiene otro polinomio cuyo grado es la suma de los grados de los polinomios que se multiplican.

También podemos **multiplicar polinomios** de siguiente modo:

$$\begin{array}{r} 2x^3 - 3x^2 + 4x \\ \hline 2x^2 - 3 \\ \hline -6x^3 + 9x^2 - 12x \\ 4x^5 - 6x^4 + 8x^3 \\ \hline 4x^5 - 6x^4 + 2x^3 + 9x^2 - 12x \end{array}$$

División de polinomios

Resolver la división de polinomios:

$P(x) = 2x^5 + 2x^3 - x - 8 \qquad Q(x) = 3x^2 - 2x + 1$

P(x) : Q(x)

A la izquierda situamos el dividendo. Si el polinomio **no es completo** dejamos **huecos** en los lugares que correspondan.

$$x^5 \qquad +2x^3 \qquad -x-8 \qquad \big| \; x^2 - 2x + 1$$

A la derecha situamos el divisor dentro de una caja.

Dividimos el primer monomio del dividendo entre el primer monomio del divisor.

$x^5 : x^2 = x^3$

Multiplicamos cada término del polinomio divisor por el resultado anterior y lo restamos del polinomio dividendo:

$$\begin{array}{llll} x^5 & +2x^3 & -x-8 & \big| \; x^2 - 2x + 1 \\ \cline{4-4} -x^5 + 2x^4 - x^3 & & & x^3 \\ \cline{1-1} \quad 2x^4 + x^3 & & -x-8 & \end{array}$$

Volvemos a **dividir** el primer monomio del dividendo entre el primer monomio del divisor. Y el resultado lo multiplicamos por el divisor y lo restamos al dividendo.

$2x^4 : x^2 = 2x^2$

$$x^5 + 2x^3 - x - 8 \;\big|\; x^2 - 2x + 1$$
$$-x^5 + 2x^4 - x^3 \qquad\qquad x^3 + 2x^2$$
$$2x^4 + x^3 - x - 8$$
$$-2x^4 + 4x^3 - 2x^2$$
$$5x^3 - 2x^2 - x - 8$$

Procedemos igual que antes.

$5x^3 : x^2 = 5x$

$$x^5 + 2x^3 - x - 8 \;\big|\; x^2 - 2x + 1$$
$$-x^5 + 2x^4 - x^3 \qquad\qquad x^3 + 2x^2 + 5x$$
$$2x^4 + x^3 - x - 8$$
$$-2x^4 + 4x^3 - 2x^2$$
$$5x^3 - 2x^2 - x - 8$$
$$-5x^3 + 10x^2 - 5x$$
$$8x^2 - 6x - 8$$

Volvemos a hacer las mismas operaciones.

$8x^2 : x^2 = 8$

$$x^5 + 2x^3 - x - 8 \;\big|\; x^2 - 2x + 1$$
$$-x^5 + 2x^4 - x^3 \qquad\qquad x^3 + 2x^2 + 5x + 8$$
$$2x^4 + x^3$$
$$-2x^4 + 4x^3 - 2x^2$$
$$5x^3 - 2x^2 - x$$
$$-5x^3 + 10x^2 - 5x$$
$$8x^2 - 6x - 8$$
$$-8x^2 + 16x - 8$$
$$10x - 16$$

$10x - 6$ es el **resto**, porque su **grado es menor que el del divisor** y por tanto no se puede continuar dividiendo.

x^3+2x^2+5x+8 es el **cociente**.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. Dígase qué clase de términos son los siguientes atendiendo al signo, a si tienen o no denominador y a si tienen o no radical:

S o l u c i ó n :

$5a^2$: positivo, entero y racional

$-4a^3b$: negativo, entero y racional

$\frac{2a}{3}$: positivo, entero y racional {se considera entero porque no hay letras en el denominador}

$-\frac{5b^2}{6}$: negativo, entero y racional {se considera entero porque no hay letras en el denominador}

$\sqrt{a}$: positivo, entero e irracional {se considera entero porque no hay letras en el denominador}

$-\sqrt[3]{5b^2}$: negativo, entero e irracional {entero porque no hay letras en el denominador}

$\frac{\sqrt{a}}{6}$: positivo, entero e irracional {se considera entero porque no hay letras en el denominador}

$-\frac{4a^2b^3}{\sqrt{6a}}$: negativo, fraccionario e irracional.

2. Dígase el grado de los términos siguientes respecto de cada uno de sus factores literales:

S o l u c i ó n :

$-a^3b^2$: tercer grado respecto a a y segundo grado respecto a b

$-5x^4y^3$: cuarto grado respecto a x y tercer grado respecto a y

$6a^2bx^3$: segundo grado respecto a a, primer grado respecto a b y tercer grado respecto a x

$-4abcx^2$: primer grado respecto a a, b y c y de segundo grado respecto a x

$10m^2n^3b^4c^5$: segunndo grado respecto a m, tercer grado respecto a n, cuarto grado respecto a b quinto grado respecto a c

3. De los términos siguientes escoger cuatro que sean homogéneos y tres hetereogéneos

S o l u c i ó n :

Cuatro términos hetereogéneos son $-4a^3b^2, -x^5, 6x^4y, 4abcx^2$: tienen igual grado absoluto

Tres heterogéneos son: $-4a^3b^2$, $6ab^3$ y $-2ac$ {tienen diferente grado absoluto}

4. Escribir tres términos enteros; dos fraccionarios; dos positivos, enteros y racionales; tres negativos, fraccionarios e irracionales

S o l u c i ó n :

Enteros: $5abcd^2efg$, $-x^2$, $389yz$.

Fraccionarios: $\frac{a}{b}$, $-\frac{f}{x^2}$.

Positivos, enteros y racionales: $8xyz^3$, $99bc$

Negativos, fraccionarios e irracionales: $-\frac{b\sqrt{x}}{a}, \frac{-\sqrt{b^5}}{\sqrt{a}}, -\frac{8}{\sqrt{x}}$

5. Escribir un término de cada uno de los grados absolutos siguientes: tercer grado, quinto grado, undécimo grado, décimo quinto grado, vigésimo grado

S o l u c i ó n :

6. Escribir un término de dos factores literales que sea de cuarto grado con relación a la x; otro de cuatro factores literales que sea de séptimo grado con relación a la y; otro de cinco factores literales que sea de décimo grado con relación a la b

S o l u c i ó n :

De cuarto grado con relación a la x: $45366b^{10}x^4$.

De séptimo grado con relación a la y: $-3a^5v^{56}y^7z^5$.

De décimo grado con relación a la b: $55533366677a^{38}b^{10}x^{34}yz^{10}$

7. Dígase el grado absoluto de los siguientes polinomios:

a) x^3+x^2+x: tercer grado absoluto

b) $5a-3a^2+4a^4-6$: cuarto grado absoluto

c) $a^3b-a^2b^2+ab^3-b^4$: cuarto grado absoluto

d) $x^5-6x^4y^3-4ab^2+x^2y^4-3y^6$: séptimo grado absoluto

8. Dígase el grado de los siguientes polinomios con relación a cada una de sus letras

a) $a^3+a^2-ab^3$: tercer grado con respecto tanto a a como a b

b) $x^4+4x^3-6x^2y^4-4xy^5$: cuarto grado con relación a la x y quinto con relación a la y

c) $6a^4b^7-4a^2x+ab^9-5a^3b^8x^6b^4$: cuarto grado con relación a la a, noveno grado con relación a la b y sexto grado con relación a la x

d) $m^4n^2-mn^6+mx^4y^3-x^8+y^{15}-m^{11}$: octavo grado con relación a x, décimo quinto grado con relación a y, undécimo grado con relación a m y sexto grado con relación a n

9. Dígase el grado absoluto de los siguientes polinomios:

a) $x^3 + x^2 + x$: tercer grado absoluto

b) $5a - 3a^2 + 4a^4 - 6$: cuarto grado absoluto

c) $a^3b - a^2b^2 + ab^3 - b^4$: cuarto grado absoluto

d) $x^5 - 6x^4y^3 - 4ab^2 + x^2y^4 - 3y^6$: séptimo grado absoluto

10. Dígase el grado de los siguientes polinomios con relación a cada una de sus letras

a) $a^3 + a^2 - ab^3$: tercer grado con respecto tanto a a como a b

b) $x^4 + 4x^3 - 6x^2y^4 - 4xy^5$: cuarto grado con relación a la x y quinto con relación a la y

c) $6a^4b^7 - 4a^2x + ab^9 - 5a^3b^8x^6b^4$: cuarto grado con relación a la a, noveno grado con relación a la b y sexto grado con relación a la x

d) $m^4n^2 - mn^6 + mx^4y^3 - x^8 + y^{15} - m^{11}$: octavo grado con relación a x, décimo quinto grado con relación a y, undécimo grado con relación a m y sexto grado con relación a n

11. Atendiendo a si tienen o no denominador literal y a si tienen o no radical, dígase qué clase son los polinomios siguientes:

a) $a^3 + 2a^2 - 3a$: entero y racional

b) $\frac{a^4}{2} - \frac{a^3}{3} + \frac{a^2}{2} - a$: entero y racional {no hay letras en los denominadores}

c) $\sqrt{a} + \sqrt{b} - 2c + \sqrt{d}$: entero e irracional

d) $4a + \frac{\sqrt{a}}{2} - 6b + 4$: entero e irracional.

12. Escribir unn polinomio de tercer grado absoluto; de quinto grado absoluto; de octavo grado absoluto; de décimo quinto grado absoluto.

Definición: "El grado absoluto de un polinomio es el grado de su término de mayor grado *absoluto*".

Polinomio de tercer grado absoluto: $x^3y + x^2y2 + xy^3$

Polinomio de quinto grado absoluto: $a^2 + b + c + d^5$

Polinomio de octavo grado absoluto: $10a^5 - 57b^8 + 4$

Polinomio de décimo quinto grado absoluto: $-22x^8 + 151x^{15} + 14y^8$.

13. Escribir un trinomio de segundo grado respecto de la x; un polinomio de quinto grado respecto de la a; un polinomio de noveno grado respecto de la m.

Trinomio de segundo grado respecto de la x: $-35ax^2 + 6bx + c$.

Polinomio de quinto grado respecto de la a: $8a - 3a^2 + 5a^3 + a^4 - 288a^5$.

Polinomio de noveno grado respecto de la m: $8a^5x^9y^{28} - 32zy + 459x^{11} - m^9$.

14. De los siguientes polinomios:

a) $3a^2b+4a^3-5b^3$
b) $a^4-a^3b+a^2b^2+ab^3$
c) $x^5-bx^4+abx^3+ab^3x^2$
d) $4a-5b+6c^2-8d^3-6$
e) $y^5-ay^4+a^2y^3-a^3y^2-a^4y+y^5$
f) $-6a^3b^4-5a^6b+8a^2b^5-b^7$

escoger dos que sean homogéneos y dos hetereogéneos.

S o l u c i ó n :

Definición 1: "Un polinomio es homogéneo cuando todos sus *términos* son del mismo grado absoluto".
Definición 2: "Un polinomio es heterogéneo cuando sus términos no son del mismo grado absoluto".
Definición 3: "El grado absoluto de un término es la suma de los exponentes de sus factores literales".
Los polinomios homogéneos serían: a) y e)
{en (a) todos los términos son de tercer grado absoluto, y en (e) todos los términos son de quinto grado absoluto}.
Los polinomios heterogéneos serían: c) y d).

15. De los siguientes polinomios:

a) $a^4-a^2+a-a^3$
b) $5x^4-8x^2+x-6$
c) $x^4y-x^3y^2+x^2x^3-y^4$
d) $m^5-m^4+m^3-m+5$
e) $y^5-by^4+b^2y^3-b^3y^2+b^4y$

dígase cuáles son completos y respecto de cuáles letras.
S o l u c i ó n :
El polinomio (a) es completo respecto a la *a*.
El polinomio (c) es completo respecto a la *y*.
El polinomio (e) es completo respecto a la *b* y a la *y*.

16. Escribir tres polinomios homogéneos de tercer grado absoluto; cuatro de quinto grado absoluto; dos polinomios completos.
S o l u c i ó n :
Polinomios homogéneos de tercer grado absoluto: $a^2b+7ab^2,\ x^3-y^3,\ ax^2-b^2y-2cxz.$
Polinomios homogéneos de quinto grado absoluto: $xyz^3-87a^5,\ 6z^5+2x^3y^2-342xyz^3,\ b^5-a^5,$
$9999c^2d^3-876xy^3z-786546666z^5.$
Polinomios completos: $3-a+4a^2-a^3+34a^4,\ -8x^2y^2+3x^3y+365xy^3-89.$

17. Ordenar los siguientes polinomios respecto de cualquier letra en orden descendente:

a) $m^2 + 6m - m^3 + m^4$

b) $6ax^2 - 5a^3 + 2a^2x + x^3$

c) $-a^2b^3 + a^4b + a^3b^2 - ab^4$

d) $a^4 - 5a + 6a^3 - 9a^2 + 6$

e) $-x^8y^2 + x^{10} + 3x^4y^6 - x^6y^4 + x^2y^8$

f) $-3m^{15}n^2 + 4m^{12}n^3 - 8m^6n^5 - 10m^3n^6 + n^7 - 7m^9n^4 + m^{18}n$

Solución:

a) $m^4 - m^3 + m^2 + 6m$

b) $x^3 + 6ax^2 + 2a^2x - 5a^3$

c) $a^4b + a^3b^2 - a^2b^3 - ab^4$

d) $a^4 + 6a^3 - 9a^2 - 5a + 6$

e) $x^{10} - x^8y^2 - x^6y^4 + 3x^4y^6 + x^2y^8$

f) $m^{18}n - 3m^{15}n^2 + 4m^{12}n^3 - 7m^9n^4 - 8m^6n^5 - 10m^3n^6 + n^7$

18. Ordenar los siguientes polinomios respecto de cualquier letra en orden ascendente:

a) $a^2 - 5a^3 + 6a$

b) $x - 5x^3 + 6x^2 + 9x^4$

c) $2y^4 + 4y^5 - 6y + 2y^2 + 5y^3$

d) $a^2b^4 + a^4b^3 - a^6b^2 + a^8b + b^5$

e) $y^{12} - x^9y^6 + x^{12}y^4 - x^3y^{10}$

Solución:

a) $6a + a^2 - 5a^3$

b) $x + 6x^2 - 5x^3 + 9x^4$

c) $-6y + 2y^2 + 5y^3 + 2y^4 + 4y^5$

d) $b^5 + a^2b^4 + a^4b^3 - a^6b^2 + a^8b$

e) $-x^3y^{10} - x^9y^6 + x^{12}y^4 + y^{12}$

Definición: Dos o más términos son semejantes cuando tienen las mismas letras y están afectadas por el mismo exponente.

P r o c e d i m i e n t o

Para reducir términos semejantes con el mismo signo se suman los coeficientes de todos los términos y se antepone, al coeficiente total, el mismo signo que comparten, y a continuación se escribe la parte literal.

Reducir:

1. $x + 2x$.
S o l u c i ó n :
El signo común a todos los términos es el +.
Los coeficientes de los términos son 1 y 2.
La parte literal igual en todos los términos es x.
Y $1 + 2 = 3$;
$\therefore$ $x + 2x = 3x$.

2. $8a + 9a$
S o l u c i ó n :
El signo común a todos los términos es el +.
Los coeficientes de los términos son 8 y 9.
La parte literal igual en todos los términos es a.
Y $8 + 9 = 17$;
$\therefore$ $8a + 9a = 17a$.

3. $11b + 9b$
S o l u c i ó n :
El signo común a todos los términos es el +.
Los coeficientes de los términos son 11 y 9.
La parte literal igual en todos los términos es b.
Y $11 + 9 = 20$;
$\therefore$ $11b + 9a = 20b$.

4. $-b - 5b$.
Solución:
El signo común a todos los términos es el -.
Los coeficientes de los términos son 1 y 5.
La parte literal igual en todos los términos es b.
Y $1 + 5 = 6$;
$\therefore$ $-b - 5b = -6$b.

5. $-8m - m$
Solución:
El signo común a todos los términos es el -.
Los coeficientes de los términos son 8 y 1.
La parte literal igual en todos los términos es m.
Y $8 + 1 = 9$;
$\therefore$ $-8m - m = -9m$.

6. $-9m - 7m$
Solución:
El signo común a todos los términos es el -.
Los coeficientes de los términos son 9 y 7.
La parte literal igual en todos los términos es m.
Y $9 + 7 = 16$;
$\therefore$ $-9m - 7m = -16m$.

7. $4a^x + 5a^x$.

Solución :

El signo común a todos los términos es el +.

Los coeficientes de los términos son 4 y 5.

La parte literal igual en todos los términos es a^x.

Y $4 + 5 = 9$;

$\therefore$ $4a^x + 5a^x = 9a^x$.

Reducción de dos términos semejantes de distinto signo

P r o c e d i m i e n t o

Para reducir dos términos semejantes de distinto signo, se halla la diferencia entre los coeficientes de los términos, colocando antes de esta diferencia el signo del coeficiente mayor (en valor absoluto) y a continuación se escribe la parte literal.

Nota: dos términos semejantes con igual coeficiente y distinto signo se anulan.

Reducir:

1. $8a - 6a$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es a.

Los coeficientes de los términos son 8 y 6.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo +.

Y $8 - 6 = 2$;

$\therefore$ $8a - 6a = 2a$.

2. $6a - 8a$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es a.

Los coeficientes de los términos son 8 y 6.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo −.

Y $8 - 6 = 2$;

$\therefore$ $6a - 8a = -2a$.

3. $9ab - 15ab$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es ab.

Los coeficientes de los términos son 9 y 15.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo −.

Y $15 - 9 = 6$;

$\therefore$ $9ab - 15ab = -6ab$.

4. $15ab - 9ab$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es ab.

Los coeficientes de los términos son 9 y 15.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo +.

Y $15 - 9 = 6$;

$\therefore$ $15ab - 9ab = 6ab$.

5. $2a - 2a$

Solución :

$2a - 2a = 0$ {dos términos semejantes con igual coeficiente y signo distinto se anulan}.

6. $-7b + 7b$

Solución :

$-7b + 7b = 0$ {dos términos semejantes con igual coeficiente y signo distinto se anulan}.

7. $-14xy + 32xy$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es xy.

Los coeficientes de los términos son 14 y 32.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo +.

Y $32 - 14 = 18$;

$\therefore$ $-14xy + 32xy = 18xy$.

8. $-25x^2y + 32x^2y$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es x^2y.

Los coeficientes de los términos son 25 y 32.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo +.

Y $32 - 25 = 7$;

$\therefore$ $-25x^2y + 32x^2y = 7x^2y$.

9. $40x^3y - 51x^3y$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es x^3y.

Los coeficientes de los términos son 40 y 51.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo −.

Y $51 - 40 = 11$;

$\therefore$ $40x^3y - 51x^3y = -11x^3y$.

10. $-m^2n + 6m^2n$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es m^2n.

Los coeficientes de los términos son 6 y 1.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo +.

Y $6 - 1 = 5$;

$\therefore$ $-m^2n + 6m^2n = 5m^2n$.

11. $-15xy + 40xy$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es xy.

Los coeficientes de los términos son 15 y 40.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo +.

Y $40 - 15 = 25$;

$\therefore$ $-15xy + 40xy = 25xy$.

Reducción de más de dos términos semejantes de signos distintos

Procedimiento

Para reducir un polinomio con más de dos términos semejantes y con signos distintos, se procede así:

1) Se reducen a un solo término todos los positivos.

2) Se reducen a un solo término todos los negativos.

3) Se calcula la diferencia entre los coeficientes de los términos hallados en los dos pasos anteriores.

4) El signo que precederá la diferencia hallada en el paso anterior será el que tenga el coeficiente mayor en valor absoluto de los términos hallados en los pasos (1) y (2).

5) Por último, se escribe la parte literal.

R e d u c i r :

1. $9a - 3a + 5a$.

S o l u c i ó n :

$9a + 5a = 14a$: reducción de los términos positivos.

$-3a$: término negativo.

La parte literal igual en los dos términos es a.

Los coeficientes de los términos son 14 y 3.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo +.

Y $14 - 3 = 11$;

$\therefore$ $14a - 3a = 11a$;

$\therefore$ $9a - 3a + 5a = 11a$.

2. $-8x + 9x - x$.

S o l u c i ó n :

$9x$: término positivo

$-8x - x = -9x$: reducción de los términos negativos

Y $9x - 9x = 0$ {dos términos semejantes con igual coeficiente y signo distinto se anulan};

$\therefore$ $-8x + 9x - x = 0$.

3. $12mn - 23mn - 5mn$.

Solución :

$12mn$: término positivo

$-23mn - 5mn = -28mn$: reducción de los términos negativos

La parte literal igual en los dos términos es mn.

Los coeficientes de los términos son 12 y 28.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo $-$.

Y $28 - 12 = 16$;

$\therefore$ $28mn - 12mn = 16mn$;

$\therefore$ $12mn - 23mn - 5mn = -16mn$.

4. $-x + 19x - 18x$.

Solución :

$19x$: término positivo

$-x - 18x = -19x$: reducción de los términos negativos

Y $19x - 19x = 0$ {dos términos semejantes con igual coeficiente y signo distinto se anulan};

$\therefore$ $-x + 19x - 18x = 0$.

5. $19m - 10m + 6m$.

Solución :

$19m + 6m = 25m$: reducción de los términos positivos

$-10m$: término negativo

La parte literal igual en los dos términos es m.

Los coeficientes de los términos son 25 y 10.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo $+$.

Y $25 - 10 = 15$;

$\therefore$ $25m - 10m = 15m$;

$\therefore$ $19m - 10m + 6m = 15m$.

6. $-11ab - 15ab + 26ab$.

Solución :

$26ab$: término positivo

$-11ab - 15ab = -26ab$: reducción de los términos negativos

Y $-26ab + 26ab = 0$ {dos términos semejantes con igual coeficiente y signo distinto se anulan};

$\therefore$ $-11ab - 15ab + 26ab = 0$.

7. $-5a^x + 9a^x - 35a^x$.

Solución :

$9a^x$: término positivo

$-5a^x - 35a^x = -40a^x$: reducción de los términos negativos

La parte literal igual en los dos términos es a^x.

Los coeficientes de los términos son 9 y 40.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo $-$.

Y $40 - 9 = 31$;

$\therefore$ $9a^x - 40a^x = -31a^x$;

$\therefore$ $-5a^x + 9a^x - 35a^x = -31a^x$.

8. $-24a^{x+2} - 15a^{x+2} + 39a^{x+2}$.

Solución :

$39a^{x+2}$: término positivo

$-24a^{x+2} - 15a^{x+2} = -39a^{x+2}$: reducción de los términos negativos

y $39a^{x+2} - 39a^{x+2} = 0$ {dos términos semejantes con igual coeficiente y signo distinto se anulan};

$\therefore$ $-24a^{x+2} - 15a^{x+2} + 39a^{x+2} = 0$.

9. $\frac{2}{3}y + \frac{1}{3}y - y$.

Solución :

$\frac{2}{3}y + \frac{1}{3}y = \frac{3}{3}y = y$: reduccion de los terminos positivos

$-y$: termino negativo

y $y - y = 0$ {dos términos semejantes con igual coeficiente y signo distinto se anulan};

$\therefore$ $\frac{2}{3}y + \frac{1}{3}y - y = 0$.

10. $-\frac{3}{5}m + \frac{1}{4}m - \frac{1}{2}m$.

Solución :

$\frac{1}{4}m$: termino positivo

$-\frac{3}{5}m - \frac{1}{2}m = -\frac{6+5}{10}m = -\frac{11}{10}m$: reduccion de los terminos negativos

La parte literal igual en los dos términos es m.

Los coeficientes de los términos son $\frac{1}{4}$ y $-\frac{11}{10}$.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo $-$.

Y $\frac{11}{10} - \frac{1}{4} = \frac{22-5}{20} = \frac{17}{20}$;

$\therefore$ $\frac{1}{4}m - \frac{11}{10}m = -\frac{17}{20}m$,

$\therefore$ $-\frac{3}{5}m + \frac{1}{4}m - \frac{1}{2}m = -\frac{17}{20}m$.

11. $\frac{3}{8}a^2b+\frac{1}{4}a^2b-a^2b.$

Solución :

$\frac{3}{8}a^2b+\frac{1}{4}a^2b=\frac{3+2}{8}a^2b=\frac{5}{8}a^2b$: reduccion de los terminos positivos

$-a^2b$: termino negativo

La parte literal igual en los dos términos es a^2b.

Los coeficientes de los términos son $\frac{5}{8}$ y 1.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo $-$.

Y $\quad 1-\frac{5}{8}=\frac{8-5}{8}=\frac{3}{8};$

$\therefore \quad \frac{5}{8}a^2b-a^2b=-\frac{3}{8}a^2b;$

$\therefore \quad \frac{3}{8}a^2b+\frac{1}{4}a^2b-a^2b=-\frac{3}{8}a^2b.$

Reducción de términos semejantes
Redución de un polinomio que contenga términos semejantes de diversas clases

P r o c e d i m i e n t o

Para reducir un polinomio con diversos términos semejantes de diversas clases, se procede de la siguiente manera:

1. Se agrupan los términos semejantes de cada clase en un mismo paréntesis

2. Se reducen los términos semejantes

3. Se da la respuesta, ordenando el polinommio resultante

Nota: recordemos que los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas letras y afectadas por los mismos exponentes

Reducir los polinomios siguientes:

1. $7a-9b+6a-4b$

Solución:

$7a-9b+6a-4b=(7a+6a)+(-9b-4b)$ {agrupando por clases},

$\Rightarrow \quad 7a-9b+6a-4b=(13a)+(-13b)$ {reduciendo};

$\therefore \quad 7a-9b+6a-4b=13a-13b.$

2. $a+b-c-b-c+2c-a$

Solución:

$a+b-c-b-c+2c-a=(a-a)+(b-b)+(-c+2c)$ {agrupando por clases},

$\Rightarrow \quad a+b-c-b-c+2c-a=0+0+c$ {reduciendo};

$\therefore \quad a+b-c-b-c+2c-a=c.$

3. $5x-11y-9+20x-1-y$

Solución:

$5x-11y-9+20x-1-y=(5x+20x)+(-11y-y)+(-9-1)$ {agrupando por clases},

$\Rightarrow \quad 5x-11y-9+20x-1-y=(25x)+(-12y)+(-10)$ {reduciendo};

$\therefore \quad (5x+20x)+(-11y-y)+(-9-1)=25x-12y-10.$

4. $-6m+8n+5-m-n-6m-11$

Solución:

$-6m+8n+5-m-n-6m-11=(-6m-m-6m)+(8n-n)+(5-11)$ {agrupando por clases},

$\Rightarrow \quad -6m+8n+5-m-n-6m-11=(-13m)+(7n)+(-6)$ {reduciendo};

$\therefore \quad -6m+8n+5-m-n-6m-11=-13m+7n-6.$

5. $-a+b+2b-2c+3a+2c-3b$

Solución:

$-a+b+2b-2c+3a+2c-3b=(-a+3a)+(b+2b-3b)+(-2c+2c)$ {agrupando por clases},

$\Rightarrow \quad -a+b+2b-2c+3a+2c-3b=(2a)+(0)+(0)$ {reduciendo};

$\therefore \quad -a+b+2b-2c+3a+2c-3b=2a.$

6. $-81x+19y-30z+6y+80x+x-25y$

Solución:

$-81x+19y-30z+6y+80x+x-25y=(-81x+80x+x)+(19y+6y-25y)+(-30z)$

{agrupando por clases},

$\Rightarrow \quad -81x+19y-30z+6y+80x+x-25y=(0)+(0)+(-30z)$ {reduciendo};

$\therefore \quad -81x+19y-30z+6y+80x+x-25y=-30z.$

7. $15a^2-6ab-8a^2+20-5ab-31+a^2-ab$

Solución:

$15a^2-6ab-8a^2+20-5ab-31+a^2-ab=(15a^2-8a^2+a^2)+(-6ab-5ab-ab)+(20-31)$

{agrupando por clases},

$\Rightarrow \quad 15a^2-6ab-8a^2+20-5ab-31+a^2-ab=(16a^2-8a^2)+(-12ab)+(-11)$ {reduciendo};

$\therefore \quad 15a^2-6ab-8a^2+20-5ab-31+a^2-ab=8a^2-12ab-11.$

Valor numérico de expresiones compuestas

P r o c e d i m i e n t o

1. Se reemplaza cada letra por su valor numérico
2. Se efectúan las operaciones indicadas

Hallar el valor numérico de las expresiones siguientes para:

$$a=1,\ b=2,\ c=3,\ d=4,\ m=\frac{1}{2},\ n=\frac{2}{3},\ p=\frac{1}{4},\ x=0$$

1. $(a+b)c-d$

S o l u c i ó n :

$$(a+b)c-d=(1+2)3-4 \qquad \{\text{sustituyendo cada letra por su valor numérico}\},$$

$$\Rightarrow \quad (a+b)c-d=(3)3-4=9-4;$$

$$\therefore \quad (a+b)c-d=5.$$

2. $(a+b)(b-a)$

S o l u c i ó n :

$$(a+b)(b-a)=(1+2)(2-1) \qquad \{\text{sustituyendo cada letra por su valor numérico}\},$$

$$\Rightarrow \quad (a+b)(b-a)=(3)(1);$$

$$\therefore \quad (a+b)(b-a)=3.$$

3. $(b-m)(c-n)+4a^2$

S o l u c i ó n :

$$(b-m)(c-n)+4a^2=\left(2-\frac{1}{2}\right)\left(3-\frac{2}{3}\right)+4(1)^2 \qquad \{\text{sustituyendo cada letra por su valor numérico}\},$$

$$\Rightarrow \quad (b-m)(c-n)+4a^2=\left(\frac{4-1}{2}\right)\left(\frac{9-2}{3}\right)+4\times 1=\frac{\cancel{3}}{2}\times\frac{7}{\cancel{3}}+4=\frac{7}{2}+4=\frac{7+8}{2};$$

$$\therefore \quad (b-m)(c-n)+4a^2=\frac{15}{2}\Leftrightarrow 7\tfrac{1}{2}.$$

4. $(2m+3n)(4p+b^2)$

S o l u c i ó n :

$$(2m+3n)(4p+b^2)=\left(2\times\frac{1}{2}+3\times\frac{2}{3}\right)\left(4\times\frac{1}{4}+2^2\right) \qquad \{\text{sustituyendo cada letra por su valor numérico}\},$$

$$\Rightarrow \quad (2m+3n)(4p+b^2)=\left(\cancel{2}\times\frac{1}{\cancel{2}}+\cancel{3}\times\frac{2}{\cancel{3}}\right)\left(\cancel{4}\times\frac{1}{\cancel{4}}+2^2\right)=(1+2)(1+4) \qquad \{\text{simplificando}\};$$

$$\therefore \quad (2m+3n)(4p+b^2)=3\times 5=15.$$

5. $(4m+8p)(a^2+b^2)(6n-d)$

Solución:

$$(4m+8p)(a^2+b^2)(6n-d)=\left(4\times\frac{1}{2}+8\times\frac{1}{4}\right)(1^2+2^2)\left(6\times\frac{2}{3}-4\right)$$

{sustituyendo cada letra por su valor numérico},

$$\Rightarrow\quad (4m+8p)(a^2+b^2)(6n-d)=\left(\frac{\cancel{2}}{\cancel{4}}\times\frac{1}{\cancel{2}}+\frac{\cancel{2}}{\cancel{8}}\times\frac{1}{\cancel{4}}\right)(1+4)\left(\frac{\cancel{2}}{\cancel{6}}\times\frac{\cancel{2}}{\cancel{3}}-4\right)$$

{simplificando},

$$\Rightarrow\quad (4m+8p)(a^2+b^2)(6n-d)=(2+2)(1+4)(4-4)=4\times5\times0;$$

$$\therefore\quad (4m+8p)(a^2+b^2)(6n-d)=0.$$

6. $(c-b)(d-c)(b-a)(m-p)$

Solución:

$$(c-b)(d-c)(b-a)(m-p)=(3-2)(4-3)(2-1)\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)$$

{sustituyendo cada letra por su valor numérico},

$$\Rightarrow\quad (c-b)(d-c)(b-a)(m-p)=1\times1\times1\times\left(\frac{2-1}{4}\right)$$

{reduciendo};

$$\therefore\quad (c-b)(d-c)(b-a)(m-p)=\frac{1}{4}.$$

7. $b^2(c+d)-a^2(m+n)+2x$

$$b^2(c+d)-a^2(m+n)+2x=2^2(3+4)-1^2\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\right)+2\times0$$

{sustituyendo cada letra por su valor numérico},

$$\Rightarrow\quad b^2(c+d)-a^2(m+n)+2x=4(7)-1\left(\frac{3+4}{6}\right)+0,$$

$$\Rightarrow\quad b^2(c+d)-a^2(m+n)+2x=28-\frac{7}{6}=\frac{168-7}{6};$$

$$\therefore\quad b^2(c+d)-a^2(m+n)+2x=28-\frac{7}{6}=\frac{161}{6}\Leftrightarrow 26\frac{5}{6}.$$

Ejercicios sobre notación algebraica

1. Escríbase la suma de a, b y m.

Solución:

$a+b+m$.

2. Escríbase la suma del cuadrado de m, el cubo de b y la cuarta parte de x.

Solución:

Sea

m^2 : cuadrado de m

b^3 : cubo de b

x^4 : cuarta potencia de x

De tal manera que:

$m^2+b^3+x^4$: expresión pedida

3. Siendo a un número entero, escríbanse los dos números enteros consecutivos posteriores a a.

Solución:

Para hallar un número entero consecutivo y posterior a otro basta con sumar *uno* al primer número

Sea

a: número dado

De tal manera que:

$$\left.\begin{matrix} a+1 \\ a+2 \end{matrix}\right\}: \text{números buscados.}$$

4. Siendo x un número entero, escríbanse los dos números consecutivos anteriores a x.

Solución:

Para hallar un número entero anterior a otro basta con restar *uno* al primer número

Sea

x: número dado

De tal manera que:

$$\left.\begin{matrix} x-1 \\ x-2 \end{matrix}\right\}: \text{números buscados.}$$

5. Siendo y un número entero par, escríbanse los tres números pares consecutivos posteriores a y.

Solución:

Los números pares son de la forma $2k$, donde k pertenece a los enteros. Para escribir los números pares consecutivos a un número dado, basta con sumar dos unidades a éste número

Sea

y: número dado

De tal manera que:

$$\left.\begin{matrix} y+2 \\ y+4 \\ y+6 \end{matrix}\right\}: \text{números buscados.}$$

Suma

Suma de monomios

Procedimiento

1. Se escriben las expresiones una a continuación de otra y con sus respectivos signos

2. Se reducen los términos semejantes. Para reducir términos semejantes se procede de la siguiente forma:

a. Si los términos son de igual signo, se suman los coeficientes y se escribe el signo común

b. Si los términos tienen signo distinto, se restan los coeficientes y se escribe el signo del número mayor en valor absoluto

c. A continuación del signo y del coeficiente se escribe la parte literal

Nota: recuerdese que los términos semejantes son aquellos sumandos que tienen las mismas letras y afectadas por los mismos exponentes.

S u m a r :

1. $m,\ n$

S o l u c i ó n :

$m+n$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +}.

2. $m,\ -n$

S o l u c i ó n :

$m+(-n)=m-n$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +}.

3. $-3a,\ 4b$

S o l u c i ó n :

$-3a+4b$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +}.

4. $5b,\ -6a$

S o l u c i ó n :

$5b+(-6a)=5b-6a$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +}.

5. $7,\ -6$

S o l u c i ó n :

$7+(-6)=7-6$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +};

$7+(-6)=1$ {reduciendo términos semejantes}.

6. $-6,\ 9$

S o l u c i ó n :

$-6+9$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +};

$-6+9=3$ {reduciendo}.

7. $-2x,\ 3y$

S o l u c i ó n :

$-2x+3y$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +}.

8. $5mn,\ -m$

Solución:

$5mn + (-m) = 5mn - m$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +}.

9. $5a,\ 7a$

Solución:

$5a + 7a = 12a$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +, Y se reduce}.

10. $-8x,\ -5x$

Solución:

$-8x + (-5x) = -8x - 5x$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +};

$-8x + (-5x) = -13x$ {reduciendo términos semejantes}.

11. $-11m,\ 8m$

Solución:

$-11m + 8m = -3m$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +. Y se reduce}.

12. $9ab,\ -15ab$

Solución:

$9ab + (-15ab) = 9ab - 15ab$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +};

$9ab + (-15ab) = -6ab$ {reduciendo términos semejantes}.

13. $-xy,\ -9xy$

Solución:

$-xy + (-9xy) = -xy - 9xy$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +};

$-xy + (-9xy) = -10xy$ {reduciendo}.

14. $mn,\ -11mn$

Solución:

$mn + (-11mn) = mn - 11mn$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +};

$mn + (-11mn) = -10mn$ {reduciendo términos semejantes}.

S u m a.Suma de polinomios

P r o c e d i m i e n t o

1. Se ordenan los polinomios

2. Se escriben los polinomios, uno debajo de otro (cada polinomio en una fila diferente); y de tal forma, que los téminos semejantes queden en la misma columna

3. Se reducen los términos semejantes:

a. Se suman los términos positivos

b. Se suman los términos negativos

c. Se establece la diferencia entres los resultados obtenidos en a y b

d. En el total, el signo que lleve el término corresponderá al del número mayor, en valor absoluto, de las sumas en a y b

4. Se dibuja una línea debajo de la última fila; y debajo de esta línea se escriben los términos, ya reducidos en el paso 3, con sus respectivos signos

Hallar al suma de:

1. $3a+2b-c;\ 2a+3b+c$

Solución:

$$\begin{array}{r} 3a+2b-c \\ \underline{2a+3b+c} \\ 5a+5b+0; \end{array}$$

$\therefore\quad (3a+2b-c)+(2a+3b+c)=5a+5b.$

2. $7a-4b+5c;\ -7a+4b-6c$

Solución:

$$\begin{array}{r} 7a-4b+5c \\ \underline{-7a+4b-6c} \\ 0\ \ +0\ \ -c; \end{array}$$

$\therefore\quad (7a-4b+5c)+(-7a+4b-6c)=-c.$

3. $m+n-p;\ -m-n+p$

Solución:

$$\begin{array}{r} m+n-p \\ \underline{-m-n+p} \\ 0+0+0; \end{array}$$

$\therefore\quad (m+n-p)+(-m-n+p)=0.$

4. $9x-3y+5;\ -x-y+4;\ -5x+4y-9$

Solución:

$$\begin{array}{r} 9x-3y\ +5 \\ -x\ -y\ +4 \\ \underline{-5x+4y-9} \\ 3x\ +0+0; \end{array}$$

$\therefore\quad (9x-3y+5)+(-x-y+4)+(-5x+4y-9)=3x$

.

5. $a+b-c;\ 2a+2b-2c;\ -3a-b+3c$

Solución:

$$\begin{array}{r} a\ +b-c \\ 2a+2b-2c \\ \underline{-3a\ -b+3c} \\ 0+2b+0; \end{array}$$

$\therefore\quad (a+b-c)+(2a+2b-2c)+(-3a-b+3c)=2b.$

6. $p+q+r;\ -2p-6q+3r;\ p+5q-8r$

Solución:

$$\begin{array}{r} p\ +q\ \ +r \\ -2p\ -6q+3r \\ \underline{p+5q\ -8r} \\ 0\ \ +0\ \ -4r; \end{array}$$

$\therefore\quad (p+q+r)+(-2p-6q+3r)+(p+5q-8r)=-4r.$

7. $-7x-4y+6z;\ 10x-20y-8z;\ -5x+24y+2z$

Solución:

$$\begin{array}{r} -7x\ -4y+6z \\ 10x-20y-8z \\ \underline{-5x+24y+2z} \\ -2x\ \ +0\ \ +0; \end{array}$$

$\therefore\quad (-7x-4y+6z)+(10x-20y-8z)+(-5x+24y+2z)=-2x.$

R e s t a
Resta de monomios

P r o c e d i m i e n t o
1. Se identifican tanto el minuendo como el sustraendo
2. Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con signo cambiado
3. Se reduce la expresión resultante
Nota1: *el minuendo es la cantidad de la que se resta otra cantidad. El sustraendo es la cantidad que se resta de otra.*
Nota2: *dos términos son semejantes cuando tienen las mismas letras y afectadas por los mismos exponentes.*

De:

1. -8 restar 5

Solución:

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado:

$-8-5=-13$ {reduciendo}.

2. -7 restar 4

Solución:

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado:

$-7-4=-11$ {reduciendo}.

3. 8 restar 11

Solución:

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado:

$8-11=-3$ {reduciendo}.

4. -8 restar -11

Solución:

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado:

$-8+11=3$ {reduciendo}.

5. -1 restar -9

Solución:

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado:

$-1+9=8$ {reduciendo}.

6. $2a$ restar $3b$

Solución:

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado:

$2a-3b$

7. $3b$ restar 2

Solución:

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado:

$3b-2$

Resta

Resta de polinomios

Procedimiento

1. Se identifican tanto el minuendo como el sustraendo
2. Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con signo cambiado. O también, el minuendo en una fila y en la fila inferior el sustraendo, cada término con el signo cambiado; y, cada término en la misma columna que su semejante.
3. Se reduce la expresión resultante

Nota1: *el minuendo es la cantidad de la que se resta otra cantidad. El sustraendo es la cantidad que se resta de otra.*

Nota2: *dos términos son semejantes cuando tienen las mismas letras y afectadas por el mismo exponente.*

Restar:

1. $a-b$ de $b-a$

Solución:

$b-a$: minuendo

$a-b$: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$b-a-(a-b)=b-a-a+b=-2a+2b.$$

2. $x-y$ de $2x+3y$

Solución:

$2x+3y$: minuendo

$x-y$: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$2x+3y-(x-y)=2x+3y-x+y=x+4y.$$

3. $-5a+b$ de $-7a+5$

Solución:

$-7a+5$: minuendo

$-5a+b$: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$-7a+5-(-5a+b)=-7a+5+5a-b=-2a-b+5.$$

4. x^2-5x de $-x^2+6$

Solución:

$-x^2+6$: minuendo

x^2-5x: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$-x^2+6-(x^2-5x)=-x^2+6-x^2+5x=-2x^2+5x+6.$$

5. x^3-xy^2 de x^2y+5xy^2

Solución:

x^2y+5xy^2: minuendo

x^3-xy^2: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$x^2y+5xy^2-(x^3-xy^2)=x^2y+5xy^2-x^3+xy^2=-x^3+x^2y+6xy^2.$$

24. $7x^7+5x^5-23x^3+51x+36$ de $x^8-x^6+3x^4-5x^2-9$

Solución:

$x^8-x^6+3x^4-5x^2-9$: minuendo

$7x^7+5x^5-23x^3+51x+36$: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y debajo el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$\begin{array}{cccccc} x^8 & -x^6 & +3x^4 & -5x^2 & -9 \\ -7x^7 & -5x^5 & +23x^3 & -51x-36 & \\ \hline x^8-7x^7-x^6-5x^5+3x^4+23x^3-5x^2-51x-45; & & & & \end{array}$$

$\therefore \quad (x^8-x^6+3x^4-5x^2-9)-(7x^7+5x^5-23x^3+51x+36)=$

$x^8-7x^7-x^6-5x^5+3x^4+23x^3-5x^2-51x-45.$

25. $y^7-60x^4y^3+90x^3y^4-50xy^6-x^2y^5$ de $x^7-3x^5y^2+35x^4y^3-8x^2y^5+60$

Solución:

Ordenamos los polinomios en forma descendente respecto a x:

$x^7-3x^5y^2+35x^4y^3-8x^2y^5+60$: minuendo

$-60x^4y^3+90x^3y^4-x^2y^5-50xy^6+y^7$: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y debajo el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$\begin{array}{cccccc} x^7-3x^5y^2+35x^4y^3 & & -8x^2y^5 & & +60 \\ & 60x^4y^3-90x^3y^4 & +x^2y^5+50xy^6-y^7 & & \\ \hline x^7-3x^5y^2+95x^4y^3-90x^3y^4-7x^2y^5+50xy^6-y^7+60; & & & & \end{array}$$

$\therefore \quad (x^7-3x^5y^2+35x^4y^3-8x^2y^5+60)-(-60x^4y^3+90x^3y^4-x^2y^5-50xy^6+y^7)=$

$x^7-3x^5y^2+95x^4y^3-90x^3y^4-7x^2y^5+50xy^6-y^7+60.$

26. $a^{x+2}-5a^{x+1}-6a^x$ de $a^{x+3}-8a^{x+1}-5$

Solución:

$a^{x+3}-8a^{x+1}-5$: minuendo

$a^{x+2}-5a^{x+1}-6a^x$: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y debajo el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$\begin{array}{ccccc} a^{x+3} & -8a^{x+1} & -5 & & \\ -a^{x+2} & +5a^{x+1} & +6a^x & & \\ \hline a^{x+3}-a^{x+2}-3a^{x+1}+6a^x-5; & & & & \end{array}$$

$\therefore \quad (a^{x+3}-8a^{x+1}-5)-(a^{x+2}-5a^{x+1}-6a^x)=a^{x+3}-a^{x+2}-3a^{x+1}+6a^x-5.$

Signos de agrupación

Supresión de signos de agrupación

Procedimiento

Para suprimir signos de agrupación se procede de la siguiente manera:

1. Cuando se suprime un signo de agrupación precedido del signo +, los términos que estaban agrupados por él no cambian de signo
2. Cuando se suprime un signo de agrupación precedido del signo -, los términos que estaban agrupados por él cambian de signo
3. Cada vez que se suprime un signo de agrupación, se procede a reducir los términos semejantes

Simplificar, suprimiendo los signos de agrupación y reduciendo términos semejantes:

1. $x-(x-y)$

Solución:

$x-(x-y)=x-x+y$

{como el paréntesis está precedido del signo −, al suprimirlo cambiamos los signos de los términos agrupados por él};

$\therefore \quad x-(x-y)=y$ {reduciendo términos semejantes}.

2. $x^2+(-3x-x^2+5)$

Solución:

$x^2+(-3x-x^2+5)=x^2-3x-x^2+5$

{como el paréntesis está precedido del signo +, al suprimirlo no cambiamos los signos de los términos agrupados por él};

$\therefore \quad x^2+(-3x-x^2+5)=-3x+5$ {reduciendo términos semejantes}.

3. $a+b-(-2a+3)$

Solución:

$a+b-(-2a+3)=a+b+2a-3$

{como el paréntesis está precedido del signo −, al suprimirlo cambiamos los signos de los términos agrupados por él};

$\therefore \quad a+b-(-2a+3)=3a+b-3$ {reduciendo términos semejantes}.

4. $4m-(-2m-n)$

Solución:

$4m-(-2m-n)=4m+2m+n$

{como el paréntesis está precedido del signo −, al suprimirlo cambiamos los signos de los términos agrupados por él};

$\therefore \quad 4m-(-2m-n)=6m+n$ {reduciendo términos semejantes}.

M u l t i p l i c a c i ó n

Multiplicación de polinomios por polinomios

P r o c e d i m i e n t o

1. Se ordenan los polinomios
2. Se escriben el multiplicando y el multiplicador en dos filas: el multiplicando en la fila superior y el multiplicador en la inferior. Se traza una linea horizontal debajo de estas dos filas
3. Se multiplica cada termino del multiplicador por todos los terminos del multiplicando (teniendo en cuenta la *ley de los signos* y *la ley de los exponentes)*
4. Cada producto particular se escribe en su respectiva fila debajo de la línea horizontal y en el orden en que se efectuaron los productos parciales: en la primera fila, el producto del primer termino del multiplicador y todos los del mutiplicando; en la segunda fila, el producto del segundo termino del multiplicador y todos los del mutiplicando; en la tercera fila, el producto del tercer termino del multiplicador y todos los del mutiplicando; ...
5. Los términos semejantes se escriben en la misma columna
6. Se reducen los términos semejantes

Ley de los signos	**Propiedad en el producto de potencias**
+ por + da + + por - da - - por + da - - por - da +	Para hallar el producto de dos o más potencias con la misma base, basta con escribir la base común y sumar los exponentes respectivos.

Multiplicar:

1. x^2+xy+y^2 por $x-y$

Solución:

$$\begin{array}{r} x^2+xy+y^2 \\ \underline{x-y\qquad\qquad} \\ x^3+x^2y+xy^2 \\ \quad -x^2y-xy^2-y^3 \\ \hline x^3\qquad\qquad -y^3 \end{array}$$

Respuesta:

$$(x^2+xy+y^2)(x-y)=x^3-y^3$$

2. a^2+b^2-2ab por $a-b$

Solución:

Ordenamos los polinomios alfabeticamente:

$$\begin{array}{r} a^2-2ab+b^2 \\ \underline{a-b\qquad\qquad} \\ a^3-2a^2b+ab^2 \\ \quad -a^2b+2ab^2-b^3 \\ \hline a^3-3a^2b+3ab^2-b^3 \end{array}$$

Respuesta:

$$(a^2+b^2-2ab)(a-b)=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3.$$

3. a^2+b^2+2ab por $a+b$

Solución:

Ordenamos los polinomios alfabeticamente:

$$\begin{array}{r} a^2+2ab+b^2 \\ \underline{a+b\qquad\qquad} \\ a^3+2a^2b+ab^2 \\ \quad a^2b+2ab^2+b^3 \\ \hline a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \end{array}$$

Respuesta:

$$(a^2+b^2+2ab)(a-b)=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3.$$

4. $x^3 - 3x^2 + 1$ por $x + 3$

Solución:

$$\begin{array}{r} x^3 - 3x^2 + 1 \\ \hline x + 3 \\ \hline x^4 - 3x^3 \quad + x \\ \quad 3x^3 - 9x^2 \quad + 3 \\ \hline x^4 \quad - 9x^2 + x + 3 \end{array}$$

Respuesta:

$(x^3 - 3x^2 + 1)(x + 3) = x^4 - 9x^2 + x + 3.$

5. $a^3 - a + a^2$ por $a - 1$

Solución:

$$\begin{array}{r} a^3 + a^2 - a \qquad \text{(ordenando en forma dscendente)} \\ \hline a - 1 \\ \hline a^4 + a^3 - a^2 \\ \quad - a^3 - a^2 + a \\ \hline a^4 \quad - 2a^2 + a \end{array}$$

Respuesta:

$(a^3 - a + a^2)(a - 1) = a^4 - 2a^2 + a.$

6. $m^4 + m^2n^2 + n^4$ por $m^2 - n^2$

Solución:

$$\begin{array}{r} m^4 + m^2n^2 + n^4 \qquad \text{(ordenando en forma dscendente)} \\ \hline m^2 - n^2 \\ \hline m^6 + m^4n^2 + m^2n^4 \\ \quad - m^4n^2 - m^2n^4 - n^6 \\ \hline m^6 \qquad\qquad - n^6 \end{array}$$

Respuesta:

$(m^4 + m^2n^2 + n^4)(m^2 - n^2) = m^6 - n^6.$

7. $x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ por $2x + 3$

Solución:

$$\begin{array}{r} x^3 - 2x^2 + 3x - 1 \\ \hline 2x + 3 \\ \hline 2x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 2x \\ \quad 3x^3 - 6x^2 + 9x - 3 \\ \hline 2x^4 \quad - x^3 \quad + 7x - 3 \end{array}$$

Respuesta:

$(x^3 - 2x^2 + 3x - 1)(2x + 3) = 2x^4 - x^3 + 7x - 3.$

8. $3y^3+5-6y$ por y^2+2

Solución:

$$\begin{array}{l} 3y^3-6y+5 \\ y^2+2 \\ \hline 3y^5-6y^3+5y^2 \\ \quad 6y^3 \quad -12y+10 \\ \hline 3y^5 \quad +5y^2-12y+10 \end{array}$$

{ordenando en forma descendente}

Respuesta:

$(3y^3+5-6y)(y^2+2)=3y^5+5y^2-12y+10.$

12. a^2+a+1 por a^2-a-1

Solución:

$$\begin{array}{l} a^2+a+1 \\ a^2-a-1 \\ \hline a^4+a^3+a^2 \\ \quad -a^3-a^2-a \\ \quad \quad -a^2-a-1 \\ \hline a^4 \quad -a^2-2a-1 \end{array}$$

Respuesta:

$(a^2+a+1)(a^2-a-1)=a^4-a^2-2a-1.$

13. x^3+2x^2-x por x^2-2x+5

Solución:

$$\begin{array}{l} x^3+2x^2-x \\ x^2-2x+5 \\ \hline x^5+2x^4 \quad -x^3 \\ \quad -2x^4-4x^3 \quad +2x^2 \\ \quad \quad 5x^3+10x^2-5x \\ \hline x^5 \quad \quad +12x^2-5x \end{array}$$

Respuesta:

$(x^3+2x^2-x)(x^2-2x+5)=x^5+12x^2-5x.$

15. x^2+1+x por x^2-x-1

Solución:

$$\begin{array}{l} x^2+x+1 \qquad \text{(ordenando en forma descendente)} \\ \underline{x^2-x-1\qquad\qquad\qquad\qquad} \\ x^4+x^3+x^2 \\ \quad -x^3-x^2-x \\ \qquad\quad -x^2-x-1 \\ \hline x^4\qquad -x^2-2x-1 \end{array}$$

Respuesta:

$(x^2+1+x)(x^2-x-1) = x^4-x^2-2x-1$.

16. $2-3x^2+x^4$ por x^2-2x+3

Solución:

$$\begin{array}{l} x^4-3x^2+2 \qquad \text{(ordenando en forma descendente)} \\ \underline{x^2-2x+3\qquad\qquad\qquad\qquad} \\ x^6\qquad -3x^4\qquad +2x^2 \\ \quad -2x^5\qquad +6x^3\qquad -4x \\ \qquad\quad +3x^4\qquad -9x^2\qquad +6 \\ \hline x^6-2x^5\qquad +6x^3-7x^2-4x+6 \end{array}$$

Respuesta:

$(2-3x^2+x^4)(x^2-2x+3) = x^6-2x^5+6x^3-7x^2-4x+6$.

17. m^3-4m+m^2-1 por m^3+1

Solución:

$$\begin{array}{l} m^3+m^2-4m-1 \qquad \text{(ordenando en forma descendente)} \\ \underline{m^3+1\qquad\qquad\qquad\qquad} \\ m^6+m^5-4m^4-m^3 \\ \qquad\qquad\quad m^3+m^2-4m-1 \\ \hline m^6+m^5-4m^4\qquad +m^2-4m-1 \end{array}$$

Respuesta:

$(m^3-4m+m^2-1)(m^3+1) = m^6+m^5-4m^4+m^2-4m-1$.

18. a^3-5a+2 por a^2-a+5

Solución:

$$\begin{array}{l} a^3-5a+2 \\ a^2-a+5 \\ \hline a^5 \quad -5a^3+2a^2 \\ \quad -a^4 \quad +5a^2 \quad -2a \\ \quad\quad 5a^3 \quad -25a+10 \\ \hline a^5-a^4 \quad +7a^2-27a+10 \end{array}$$

Respuesta:

$(a^3-5a+2)(a^2-a+5)=a^5-a^4+7a^2-27a+10.$

19. $x^2-2xy+y^2$ por $xy-x^2+3y^2$

Solución:

$$\begin{array}{l} x^2-2xy+y^2 \\ -x^2+xy+3y^2 \quad \text{(ordenando en forma descendente respecto a } x\text{)} \\ \hline -x^4+2x^3y \quad -x^2y^2 \\ \quad\quad x^3y-2x^2y^2 \quad +xy^3 \\ \quad\quad\quad\quad 3x^2y^2-6xy^3+3y^4 \\ \hline -x^4+3x^3y \quad\quad -5xy^3+3y^4 \end{array}$$

Respuesta:

$(x^2-2xy+y^2)(xy-x^2+3y^2)=-x^4+3x^3y-5xy^3+3y^4.$

Trinomio cuadrado perfecto

Definición: Una cantidad es un cuadrado perfecto cuando es el resultado del producto de dos factores iguales.

Un trinomio cuadrado perfecto es de la forma general $a^2+2ab+b^2$ ó $a^2-2ab+b^2$ y, es el producto de los factores $(a+b)(a+b)=(a+b)^2$ ó bien $(a-b)(a-b)=(a-b)^2$; de tal manera que: $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ y $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$.

P r o c e d i m i e n t o

1. Se ordena el trinomio
2. Se extrae la raíz cuadrada del primer y tercer términos
3. Se halla el doble producto de las raíces obtenidas en el paso anterior
4. Si el producto hallado en el paso anterior es igual al segundo téermino del trinomio y si el primero y tercer términos tienen igual signo, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y se factoriza como tal.
5. Se escribe dentro de un paréntesis las raíces cuadradas del primer y tercer términos, separadas por el signo del segundo término, y el paréntesis elevado al cuadrado.

Factorar o descomponer en dos factores:

1. $a^2 - 2ab + b^2$

Solución:

$a^2 - 2ab + b^2$

a: raíz cuadrada del primer término del trinomio

b: raíz cuadrada del tercer término del trinomio

$2ab$ (doble producto de las raices cuadradas del primer y tercer términos): segundo término del trinomio

Los signos del primero y tercer términos son ambos positivos

Por lo tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y, se factoriza como tal:

$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$.

2. $a^2 + 2ab + b^2$

Solución:

$a^2 + 2ab + b^2$

a: raíz cuadrada del primer término del trinomio

b: raíz cuadrada del tercer término del trinomio

$2ab$ (doble producto de las raices cuadradas del primer y tercer términos): segundo término del trinomio

Los signos del primero y tercer términos son ambos positivos

Por lo tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y, se factoriza como tal:

$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$.

3. $x^2 - 2x + 1$

Solución:

$x^2 - 2x + 1$

x: raíz cuadrada del primer término del trinomio

1: raíz cuadrada del tercer término del trinomio

$2x$ (doble producto de las raices cuadradas del primer y tercer términos): segundo término del trinomio

Los signos del primero y tercer términos son ambos positivos

Por lo tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y, se factoriza como tal:

$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$.

4. $y^4 + 1 + 2y^2$

Solución:

$y^4 + 1 + 2y^2 = y^4 + 2y^2 + 1$ {ordenando el trinomio}

y^2: raíz cuadrada del primer término del trinomio

1: raíz cuadrada del tercer término del trinomio

$2y^2$ (doble producto de las raices cuadradas del primer y tercer términos): segundo término del trinomio

Los signos del primero y tercer términos son ambos positivos

Por lo tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y, se factoriza como tal:

$y^4 + 1 + 2y^2 = y^4 + 2y^2 + 1 = (y^2 + 1)^2$.

5. $a^2 - 10a + 25$

Solución:

$a^2 - 10a + 25$

a: raíz cuadrada del primer término del trinomio

5: raíz cuadrada del tercer término del trinomio

$10a$ (doble producto de las raices cuadradas del primer y tercer términos): segundo término del trinomio

Los signos del primero y tercer términos son ambos positivos

Por lo tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y, se factoriza como tal:

$a^2 - 10a + 25 = (a - 5)^2$.

6. $9 - 6x + x^2$

Solución:

$9 - 6x + x^2$

3: raíz cuadrada del primer término del trinomio

x: raíz cuadrada del tercer término del trinomio

$6x$ (doble producto de las raices cuadradas del primer y tercer términos): segundo término del trinomio

Los signos del primero y tercer términos son ambos positivos

Por lo tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y, se factoriza como tal:

$9 - 6x + x^2 = (3 - x)^2$.

7. $16 + 40x^2 + 25x^4$

Solución:

$16 + 40x^2 + 25x^4$

4: raíz cuadrada del primer término del trinomio

$5x^2$: raíz cuadrada del tercer término del trinomio

$40x^2$ (doble producto de las raices cuadradas del primer y tercer términos): segundo término del trinomio

Los signos del primero y tercer términos son ambos positivos

Por lo tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y, se factoriza como tal:

$16 + 40x^2 + 25x^4 = (4 + 5x^2)^2$.

Factorizar o descomponer en dos factores:

1. $x^2 - y^2$

Solución:

$x^2 - y^2$

x: raíz cuadrada del minuendo

y: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$.

2. $a^2 - 1$

Solución:

$a^2 - 1$

a: raíz cuadrada del minuendo

1: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$a^2 - 1 = (a + 1)(a - 1)$.

3. $a^2 - 4$

Solución:

$a^2 - 4$

a: raíz cuadrada del minuendo

2: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$a^2 - 4 = (a + 2)(a - 2)$.

4. $9 - b^2$

Solución:

$9 - b^2$

3: raíz cuadrada del minuendo

b: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$9 - b^2 = (3 + b)(3 - b)$.

5. $1 - 4m^2$

Solución:

$1 - 4m^2 = 1 - (2m)^2$

1: raíz cuadrada del minuendo

$2m$: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$1 - 4m^2 = (1 + 2m)(1 - 2m)$.

6. $16 - n^2$

Solución:

$16 - n^2$

4: raíz cuadrada del minuendo

n: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$16 - n^2 = (4 + n)(4 - n)$.

7. $a^2 - 25$

Solución:

$a^2 - 25$

a: raíz cuadrada del minuendo

5: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$a^2 - 25 = (a + 5)(a - 5)$.

8. $1 - y^2$

Solución:

$1 - y^2$

1: raíz cuadrada del minuendo

y: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$1 - y^2 = (1 + y)(1 - y)$.

UNIDAD 5. Ecuaciones

Conceptos

- *Igualdad numérica.*
- *Ecuaciones. Clasificación.*
- *Resolución de ecuaciones: reglas de la suma y del producto.*
- *Ecuaciones de primer grado con una incógnita.*
- *Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas*
- *Resolución de problemas de ecuaciones de primer grado.*

Igualdades, identidades y ecuaciones

Una igualdad es cualquier expresión matemática que contenga el signo =. En toda igualdad hay dos o más elementos que se comparan. Estos elementos se llaman miembros. Leyendo de derecha a izquierda los llamaremos 1º miembro , 2º miembro y así sucesivamente. Si únicamente se comparan dos elementos podemos también llamarlos miembro izquierdo o derecho, tomando como referencia el signo igual.
Igualdad con sólo dos miembros: 3x-1=2

Propiedades de las igualdades

a) Si en una igualdad sumamos o restamos la misma cantidad a ambos lados de la igualdad (miembros) la igualdad permanece.
a = b
a + k = b + k
b) Si en una igualdad multiplicamos o dividimos por la misma cantidad ambos miembros de la igualdad, ésta permanece.
a = b
a * k = b * K

Vamos a distinguir dos tipos de igualdades en función de la naturaleza de las entidades matemáticas que las formen:
Igualdades numéricas o aritméticas: son aquellas en las que únicamente intervienen números.
3 *5 = 8 + 7
Igualdades algebraicas: son aquellas en las que intervienen números y letras

$2x + y = 14$
$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

Dentro de las igualdades algebraicas vamos a distinguir a su vez entre ***identidades y ecuaciones.***

Identidad es una igualdad algebraica que es cierta para cualquier valor que tomen las variables. Todos los productos notables son identidades.

Ecuación es una igualdad algebraica que es cierta sólo para un conjunto finito de valores. Estos valores son las soluciones de la ecuación. Resolver una ecuación es buscar ese conjunto de valores.
Una ecuación es entera cuando las incógnitas no figuran en el denominador, en caso contrario se llama fraccionaria.
Una ecuación es numérica cuando en ella no aparecen más letras que las incógnitas, en caso contrario hablaremos de ecuaciones literales.
El grado de una ecuación entera con una incógnita es el mayor exponente de la incógnita.

Resolución de ecuaciones de 1º grado

Para resolver una ecuación de primer grado con una incógnita se pueden seguir los siguientes pasos:
1. Eliminación de paréntesis aplicando la propiedad distributiva.
2. Eliminación de los denominadores, reduciendo previamente a común denominador.
3. Trasposición de términos, pasando todas las incógnitas a un miembro y los números al otro
4. Reducción de términos semejantes.
5. Despejar la incógnita dividiendo ambos miembros por el coeficiente de la incógnita.

¡¡ojo!!***Hay que tener mucho cuidado cuando hay un signo menos delante de una fracción***. Este signo actúa con el numerador de la fracción como con un paréntesis. Cambia el signo de lo de dentro. Por esta razón conviene usar paréntesis al eliminar los denominadores.

Y, AHORA, RESUELVE (SI ERES CAPAZ) LAS SIGUIENTES ECUACIONES:

1. $\frac{3x}{2}+2=x+4$
2. $x-8=\frac{x}{2}-\frac{x+6}{3}$
3. $x-\frac{3x}{4}=\frac{x}{7}+3$
4. $2\left(\frac{x+5}{3}\right)=x+3$
5. $\frac{9x}{4}-6=\frac{2x}{3}+\frac{1}{3}$
6. $\frac{5x}{6}-\frac{3x}{4}=x-1$
7. $\frac{3x}{5}-7=\frac{2x}{6}+1$
8. $x-10=\frac{5}{9}(x+6$
9. $\frac{x}{3}+x=10-\frac{2}{9}$
10. $\frac{3x}{2}+1=12-\frac{x}{3}$
11. $\frac{x}{5}+\frac{x}{2}=x-3$
12. $4x+7=\frac{5x+6}{4}$
13. $\frac{x+2}{3}=5x-4$
14. $1\frac{2x-10}{3x-20}=\frac{7}{8}$
15. $\frac{x}{4}+\frac{3x}{6}+x=2$
16. $\frac{x}{4}-\frac{13}{6}=\frac{5x}{2}-\frac{5}{6}$
17. $\frac{x}{3}+\frac{x}{4}+\frac{x}{5}=9$
18. $\frac{x}{3}+10=\frac{x}{5}+1$
19. $3x+9+\frac{x}{5}=2x+$
20. $\frac{x}{4}+5=\frac{2x}{5}-2-\frac{x}{3}$
21. $\frac{5x}{8}-\frac{(x+20)}{6}=\frac{2x+1}{6}$
22. $x+\frac{x+1}{5}=x+\frac{x}{2}$
23. $3x-\frac{7x}{8}=1+\frac{x+3}{4}+$
24. $8-\frac{3x+2}{10}=\frac{5x}{4}-\frac{8}{8}$
25. $\frac{x+1}{2}+\frac{3+x}{6}=1+\frac{x}{3}$
26. $\frac{3x}{5}-2+\frac{3x-x}{2}=\frac{6}{10}$
27. $\frac{7x+3}{6}-\frac{3x+1}{4}=\frac{5x+1}{4}$
28. $\frac{4x+3}{6}-\frac{3x+1}{4}=\frac{4x+2}{3}-$
29. $\frac{3(x+1)+3}{4}-\frac{6}{6}=\frac{2x+3}{1}$
30. $\frac{2x}{5}-2=\frac{x}{3}-\frac{x}{10}-$
31. $\frac{x}{3}+\frac{x+5}{2}-\frac{1}{4}=\frac{5x+1}{2}$
32. $\frac{x+3}{3}-\frac{3(x+2)}{2}=\frac{3(x+1)}{2}$
33. $\frac{x+3}{5}-\frac{x+3}{2}=\frac{x+3}{3}-\frac{x+1}{2}$
34. $\frac{x+1}{2}+\frac{5x}{6}=1+\frac{9x}{3}$

Problemas de ecuaciones de primer grado con una incógnita

Problemas de números y cifras:

1) Calcula un número cuya tercera parte sumada con el triple del mismo número de cómo resultado 40.
2) Busca un número, sabiendo que la diferencia entre su cuádruplo y la tercera parte del número dado menos 4 es triple de la suma de la mitad del número dado más 10.

3) Descompón el número 133 en dos partes tales que, al dividir la parte mayor por la menor, dé 4 de cociente y 8 de resto.
4) Halla dos números enteros consecutivos tales que la diferencia entre la tercera parte del mayor y la séptima parte del menor sea igual a la quinta parte del menor.
5) Halla un número de dos cifras cuya suma es 10 y tal que el doble de dicho número supera en una unidad al obtenido invirtiendo sus cifras.
6) Busca dos números consecutivos tales que, añadiendo al mayor la mitad del menor, el resultado excede en 13 a la suma de la quinta parte del menor con la onceava parte del mayor.

Problemas de edades:

1. Un hijo tiene 30 años menos que su madre y ésta tiene cuatro veces la edad de su hijo. ¿Qué edad tiene cada uno?
2. Un señor tiene 42 años y su hijo 10 años. ¿Dentro de cuantos años la edad del padre será el triple de la del hijo?.
3. Hace 2 años un padre tenía el triple de la edad de su hijo y dentro de 11 sólo tendrá el doble. Halla la edad que tienen ahora.
4. Una madre tiene 37 años y las edades de sus tres hijas suman 25 años. ¿Dentro de cuantos años las edades de las hijas sumaran la de la madre?.
5. Una señora tiene 60 años y su hijo la mitad. ¿Cuántos años hace que la madre tenía el triple de la edad del hijo?.

Problemas de repartos:

1. Tres socios se reparten 1.500.000 euros. Calcula lo que le corresponde a cada uno, si el primero ha de tener dos veces más que el segundo y éste tres veces más que el tercero.
2. Reparte 455.000 euros entre dos personas, de modo que la primera reciba los 2/5 de la segunda.
3. Un señor distribuye su capital de la siguiente manera:31 para sus herederos; los 53 para un hospital y 21 del resto para los pobres, quedándole todavía 200.000 euros. ¿Cuál era su capital?.

Problemas de reducción a la unidad.

Fuentes y obreros :

El fundamento de estos problemas es que la parte de deposito que llena una fuente en una hora más la parte de depósito que llena la otra fuente da como resultado la parte de deposito que llenan juntas las dos fuentes.

1. Un grifo tarda tres horas en llenar un depósito y otro tarda 2 horas en llenarlo. ¿Cuánto tiempo tardarán en llenarlo juntos? Sol: 1h 12m
2. Trabajando juntos dos obreros hacen un trabajo en 17 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán en hacerlo por separado si uno es el doble de rápido que el otro?. Sol: 25 h 30m y 51 h.

Problemas de cinemática (móviles)

1. Las velocidades de dos móviles están en la relación de 4 a 3. El de mayor velocidad llega a la meta 3 horas antes que el otro. Halla los tiempos invertidos por cada uno de ellos.
2. Un automóvil sale de Madrid a una velocidad de 68 Km/h. Después de una hora y cuarto sale otro coche en la misma dirección y en el mismo sentido y lo alcanza 5 horas después. ¿Cuál es la velocidad del segundo coche?
3. Dos coches salen simultáneamente de 2 ciudades que distan entre si 600 Km. Si uno lleva una velocidad de 56 Km/h y el otro de 64 Km/h, y van en la misma dirección y en ,sentidos contrarios, ¿después de cuanto tiempo y a qué distancia de las dos ciudades se encontrarán?
4. De un punto salen dos personas , una en dirección Norte y otra en dirección oeste. La primera marcha a 6 Km/h y la otra a 8 Km/h. ¿Qué tiempo tardarán a estar uno de otro a 5 Km de distancia.

Problema de todo tipo

1. La suma de dos números pares consecutivos es 102. Halla esos números.
2. La suma de tres números impares consecutivos es 69. Busca los números.
3. La suma de dos números pares consecutivos es 210. Halla esos números.
4. La suma de dos números es 32 y uno de ellos es la séptima parte del otro. Halla los dos números.
5. La suma de dos números consecutivos es 107. Calcula esos números.

6. La suma de dos números pares consecutivos es 54. Busca esos números.
7. La suma de dos números impares consecutivos es 36. Busca esos números.
8. Halla dos números sabiendo que uno es triple que el otro y su suma es 20.
9. Halla dos números sabiendo que uno excede al otro en 6 unidades y su suma es 40.
10. Si dos números son tales que uno es el cuádruplo del otro y su suma es 125.¿Cuáles son esos números?
11. Se reparten bombones entre tres niños. Al 2º le dan el doble que al primero y al tercero el triple que al segundo. Si el total es de 18 bombones. ¿Cuántos bombones dan a cada niño?
12. En un salón hay doble número de niñas que de niños y la mitad de adultos que de niños. Si en total hay 35 personas ¿Cuántos niños, niñas y adultos hay?
13. En una reunión hay 4 veces más niños que mujeres y de hombres 3 veces más que la mitad de mujeres. Si en total hay 91 personas ¿Cuántos niños, mujeres y hombres hay?
14. En un avión viajan el cuádruple de hombres que de mujeres y la mitad de niños que de mujeres, en total viajan 165 personas .¿Qué número corresponde a cada tipo de persona?
15. Un hombre legó su fortuna de la siguiente manera: la mitad para su esposa, la tercera parte para su hijo, la octava parte para su sobrina y 180 € a una institución benéfica ¿Cuánto dinero poseía? En una clase hay niños de 13, 14 y 15 años. De 14 años hay el doble que de 15 años y de 13 años el triple que de 14. ¿Cuántos niños hay de cada edad si en total hay 27 alumnos?
16. En un autobús viajan triple número de mujeres que de niños y doble número de hombres que de mujeres y niños juntos. En total viaja 60 personas. Calcula cuántos niños mujeres y hombres viajan en dicho autobús.
17. Luis tiene 16 años más que Manuel y dentro de 4 años tendrá el doble. ¿Qué edad tiene cada uno?
18. La hermana de Juan tiene 13 años más que él y dentro de 6 años tendrá el doble ¿Qué edad tiene cada uno?
19. Un padre tiene 25 años más que su hijo y dentro de 5 años tendrá el doble ¿Qué edad tiene cada uno?
20. Ana tiene 7 años más que Pedro y hace 1 año tenía el doble ¿Qué edad tiene cada uno?
21. María tiene 30 años más que Luis y dentro de 7 años tendrá el triple. ¿Qué edad tiene cada uno?
22. Ana tiene 36 años menos que su padre y dentro de 8 años, su padre tendrá el cuádruplo de los que entonces tenga ella.¿Qué edad tiene cada uno en la actualidad?
23. La madre de Luis tiene 26 años más que él y dentro de 3 años tendrá el triple. ¿Qué edad tiene cada uno?
24. Marisa tiene 20 años más que su hijo y dentro de 5 años tendrá el doble de edad que la que entonces tenga éste. ¿Qué edad tiene cada uno?
25. La diferencia de edad entre dos hermanos es de es de 5 años y dentro de 2 años uno tendrá doble que el otro.¿Qué edad tiene cada uno?
26. La diferencia de edad entre un padre y un hijo es de 32 años y dentro de 5 años la edad del padre será el triple de la que entonces tenga el hijo.¿Qué edad tiene cada uno ?
27. La diferencia de edad entre un abuelo y su nieto es de 48 años y hace 4 años el abuelo tenía 5 veces la edad del nieto.¿Qué edad tiene cada uno?
28. El perímetro de un rectángulo mide 34 m. Calcula sus dimensiones sabiendo que la base mide 7 m más que la altura.

Modelos de problemas

La suma de dos números pares consecutivos es 102 . Halla esos números

DATOS	PLANTEAMIENTO
1er número = x 2º número = x + 2 Suma = 102	x + x +2 = 102 2x = 100 x = 50 + 2 = 52

R; 1er número = 50
2º número = 52
Comprobación 102

La suma de tres números impares consecutivos es 69. Busca los números

DATOS	PLANTEAMIENTO
1er número = x 2º número = x + 2 3 er número = x + 4 Suma = 69	x + x + 2 + x + 4 = 69 3x = 69 – 6 3x = 63 x = x = 21

Representación gráfica de una ecuación lineal

Procedimiento

Para representar gráficamente una ecuación lineal se tiene encuenta que "toda ecuación de primer grado con dos variables representa una línea recta", y se procede de la siguiente manera:

1. Se despeja a *y* en función de *x*
2. Se calculan los valores correspondientes de *y* para dos valores arbitrarios de *x* (es preferible hallar los interceptos con los ejes, para lo cual se calcula el valor de *y* cuando *x* es 0 (intercepto con el eje*y*), y se da un valor a *x* de tal forma que el valor para *y* sea 0 (intercepto con el eje*x*)
3. Se construye una tabla de valores con los datos obtenidos en el paso anterior
4. Se ubican y señalan en el plano cartesiano los puntos cuyas coordenadas hallamos con anterioridad
5. Se unen mediante una línea recta los puntos señalados en el plano

Para hallar la intesección, el punto donde se cortan, de dos rectas en el plano cartesiano, se trazan las gráficas de las dos ecuaciones e, interpolando, se obtienen las coordenadas del punto común.

Representar gráficamente las siguientes ecuaciones:

1. $x - y = 0$

Solución:

Despejando a y en términos de x, se obtiene:

$$x - y = 0 \Leftrightarrow y = x \quad (1)$$


Se tiene, a partir de (1), que para:

$x = -2,\ y = -2$

$x = 0,\ y = 0$

$x = 2,\ y = 2$

x	□2	0	2
y	□2	0	2



2. $x + y = 5$

Solución:

Despejando a y en términos de x, se obtiene:


$$x + y = 5 \Leftrightarrow y = 5 - x \quad (1)$$

Se tiene, a partir de (1), que para:

$x = 0,\ y = 5 - 0 = 5$

$x = 5,\ y = 5 - 5 = 0$

x	□	5
y	□	0



8. $x + 6 = 0$


Solución:

$$x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = -6$$

En este caso, para todo y, $x = -6$;

la gráfica es una recta paralela al ejey que corta al ejex en -6

x	□6	□6	□6
y	□□□	0	□□□



9. $y - 7 = 0$


Solución:

$$y - 7 = 0 \Leftrightarrow y = 7$$

En este caso, para todo x, $y = 7$;

la gráfica es una recta paralela al eje x que corta al eje y en 7

x	□□□	□	□□□
y	□	7	□



17. $9x + 2y = -12$

Solución:

Despejando a y en términos de x, se obtiene:


$$9x + 2y = -12 \Leftrightarrow y = -\frac{9}{2}x - 6 \quad (1)$$

Se tiene, a partir de (1), que para:

$$x = -2,\ y = -\frac{9}{2}(-2) - 6 = 9 - 6 = 3$$

$$x = 0,\ y = -\frac{9}{2}(0) - 6 = 0 - 6 = -6$$

x	□□	0
y	□	□6



Hallar la intersección de:

23. $x - y = 2$ con $3x + y = 18$

Solución:

Despejando a y en términos de x, en ambas ecuaciones, se obtiene:


$$x - y = 2 \Leftrightarrow y = x - 2 \quad (1)$$

$$3x + y = 18 \Leftrightarrow y = 18 - 3x \quad (2)$$

Se tiene, a partir de (1); y a partir de (2), que para:

$$\left.\begin{matrix} x = 2,\ y = 0 \\ x = 6,\ y = 4 \end{matrix}\right\}: \text{ puntos de } y = x - 2$$

$$\left.\begin{matrix} x = 5,\ y = 3 \\ x = 6,\ y = 0 \end{matrix}\right\}: \text{ puntos de } y = 18 - 3x$$



Interpolando, hallamos que las rectas se intersectan en el punto P(5,3).

SISTEMAS DE ECUACIONES

Para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas podemos utilizar uno de los siguientes métodos:

1. Sustitución
2. Igualación
3. Reducción

RESOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES POR EL MÉTODO DE SUSTITUCIÓN

Sea el sistema $\begin{cases} 3x + y = 11 \\ 5x - y = 13 \end{cases}$

Primero en una de las ecuaciones se halla el valor de una de las incógnitas. Hallemos la **y** en la primera ecuación supuesto conocido el valor de **x**

y=11-3x

Se sustituye en la otra ecuación el valor anteriormente hallado

5x-(11-3x)=13

Ahora tenemos una ecuación con una sóla incógnita; la resolvemos

5x-11+3y=13

5x+3x=13+11

8x=24

x=3

Ya conocido el valor de x lo sustituimos en la expresión del valor de y que obtuvimos a partir de la primera ecuación del sistema

y=11-3x

y=11-9

y=2

Así la solución al sistema de ecuaciones propuesto será **x=3** e **y=2**

RESOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES POR EL MÉTODO DE IGUALACIÓN

Sea el sistema $\begin{cases} 3x + y = 11 \\ 5x - y = 13 \end{cases}$

Lo primero que haremos será despejar en las dos ecuaciones la misma incógnita

$$\begin{cases} y = 11 - 3x \\ y = -13 + 5x \end{cases}$$

Igualamos ambas ecuaciones

$11-3x=-13+5x$

$8x=24$

$x=3$

Este valor de x lo sustituímos en cualquiera de las ecuaciones de y

$y=11-9$

$y=2$

RESOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES POR EL MÉTODO DE REDUCCIÓN

Sea el sistema $\begin{cases} 3x + y = 11 \\ 5x - y = 13 \end{cases}$

Sumaremos miembro a miembro las dos ecuaciones que componen el sistema

$$\begin{array}{r} 3x + y = 11 \\ 5x - y = 13 \\ \hline 8x + 0 = 24 \end{array}$$

$8x=24$

x=3 y sustituyendo este valor en cualquiera de las ecuaciones del sistema obtenemos y=2

Ejercicios

1º $\begin{cases} X+Y=11 \\ X-Y=-3 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**	2º $\begin{cases} 3X-Y=7 \\ 2X+3Y=12 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**
3º $\begin{cases} 3x+y=3 \\ 4x+2y=-2 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**	4º $\begin{cases} \frac{2y-6}{5}=x \\ y-x=9 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**
5º $\begin{cases} y-2x=6 \\ x+2y=2 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**	6º $\begin{cases} x+y=12 \\ x-y=8 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**
7º $\begin{cases} 4x-5y=2 \\ 5x+3y=21 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**	8º $\begin{cases} \frac{x+y-2}{x-y}=-\frac{1}{3} \\ \frac{3x+y-3}{2y-x}=-\frac{1}{11} \end{cases}$ **SOLUCIÓN**
9º $\begin{cases} 2y-11x=67 \\ 2x+5y=20 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**	10º $\begin{cases} 3x+7y=2 \\ 7x+8y=-2 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**
11º $\begin{cases} 2x+5y=0 \\ 3x-2y=-19 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**	12º $\begin{cases} 4x-y=-2 \\ 10x+2y=13 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**
13º $\begin{cases} 7x-6y=63 \\ 9x+2y=13 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**	14º $\begin{cases} x+3y=9 \\ 2x-y=4 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**

ECUACION DE 2º GRADO

Una ecuación de segundo grado es toda expresión de la forma:

$ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$.

Resolución de ecuaciones de segundo grado

Para **resolver ecuaciones de segundo grado** utilizamos la siguiente fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 6}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} = \begin{cases} x_1 = \frac{6}{2} = 3 \\ x_2 = \frac{4}{2} = 2 \end{cases}$$

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3}}{4} = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 24}}{4} = \frac{7 \pm \sqrt{25}}{4} = \frac{7 \pm 5}{4} = \begin{cases} x_1 = \frac{12}{4} = 3 \\ x_2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Si es a<0, multiplicamos los dos miembros por (−1).

$$-x^2 + 7x - 10 = 0$$

$$(-1) \cdot (-x^2 + 7x - 10) = (-1) \cdot 0$$

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \cdot 10}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 40}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{7 \pm 3}{2} = \begin{cases} x_1 = \frac{10}{2} = 5 \\ x_2 = \frac{4}{2} = 2 \end{cases}$$

Se dice que una ecuación de segundo grado es **incompleta cuando alguno de los coeficientes, b o c, o ambos, son iguales a cero.**

Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas

$ax^2 = 0$

La solución es x = 0.

$2x^2 = 0 \qquad x = 0$

$\frac{2}{5}x^2 = 0 \qquad x = 0$

$ax^2 + bx = 0$
Extraemos factor común x:

$x(ax + b) = 0 \qquad x = 0$

$ax + b = 0 \qquad x = \frac{-b}{a}$

$x^2 - 5x = 0 \qquad x(x - 5) = 0$

$x = 0 \qquad x - 5 = 0 \qquad x = 5$

$2x^2 - 6x = 0$

$2x(x - 3) = 0$

$2x = 0 \qquad x = 0$

$x - 3 = 0 \qquad x = 3$

$ax^2 + c = 0$

Despejamos:

$$ax^2 = -c \qquad x^2 = \frac{-c}{a} \qquad x = \pm\sqrt{\frac{-c}{a}} \begin{cases} \nearrow x_1 = \sqrt{\frac{-c}{a}} \\ \searrow x_2 = -\sqrt{\frac{-c}{a}} \end{cases}$$

$$x^2 - 25 = 0$$

$$x^2 = 25 \qquad x = \pm\sqrt{25} \begin{cases} \nearrow x_1 = \sqrt{25} = 5 \\ \searrow x_2 = -\sqrt{25} = -5 \end{cases}$$

$$2x^2 + 8 = 0$$

$$2x^2 = -8 \qquad x^2 = -4 \qquad x = \pm\sqrt{-4} \notin \mathbb{R}$$

1º) Son las del tipo: $a\cdot x^2 + b\cdot x + c = 0$

2º) Si c = 0 , entonces se hace: $x\cdot(a\cdot x + b) = 0$ y las soluciones son: x=0 y x= – b/a.

3º) Si b = 0 , entonces $a\cdot x^2 + c = 0$ de donde $x^2 = – c/a$. Haciendo la raíz cuadrada en ambos lados se obtiene las soluciones.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4\cdot a\cdot c)}}{2\cdot a}$$

1. $x\cdot(x - 1) = 0$
2. $x^2 - 2x = 0$
3. $x^2 - 4\cdot x = 0$
4. $4\cdot x^2 - 16 = 0$
5. $4\cdot x^2 + 16 = 0$
6. $2\cdot x^2 - 8 = 0$
7. $2\cdot x^2 + 4\cdot x = 0$
8. $x^2 - 5\cdot x + 6 = 0$
9. $x^2 + x - 6 = 0$
10. $2\cdot x^2 + 2\cdot x - 12 = 0$
11. $-2\cdot x^2 - 2\cdot x + 4 = 0$
12. $3\cdot x^2 - 9\cdot x - 12 = 0$
13. $x^2 + x + 1 = 0$
14. $x^2 + 5\cdot x + 6 = 0$
15. $2\cdot x^2 + 10\cdot x + 12 = 0$
16. $x^2 - 2\cdot x - 3 = 0$

3ªEVALUACION

UNIDAD 6. Magnitudes proporcionales.

Conceptos

- Magnitudes directamente proporcionales. Regla de tres simple directa.
- Magnitudes inversamente proporcionales. Regla de tres simple inversa.
- Proporcionalidad compuesta de magnitudes. Regla de tres compuesta.
- Interés simple.

MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando, al **multiplicar o dividir una de ellas** por un número cualquiera, l**a otra queda multiplicada o dividida** por el mismo número.
Se establece una relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes cuando:
A **más** corresponde **más**.
A **menos** corresponde **menos**.
Son magnitudes **directamente proporcionales**, el peso de un producto y su precio.

Si 1 kg de tomates cuesta 1 €, 2 kg costarán 2 € y ½ kg costará 50 céntimos. Es decir:
A **más** kilógramos de tomate **más** euros.
A **menos** kilógramos de tomate **menos** euros

Dos magnitudes cuyas cantidades se corresponden según la siguiente tabla:

Magnitud 1ª	a	b	c	d	...
Magnitud 2ª	a'	b'	c'	d'	...

son directamente proporcionales si se cumple que:

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \ldots$$

Ejemplo 1: Proporcionalidad directa

1. Cuatro chicos en una acampada de 10 días han gastado en comer 25000 ptas. En las mismas condiciones ¿cuánto gastarán en comer 6 chicos durante una acampada de 15 días?

SABEMOS QUE	$4\ chicos \xrightarrow{en} 10\ días \xrightarrow{gastan} 25000\ ptas$

REDUCCIÓN A LA UNIDAD	$1\,chico \xrightarrow{en} 10\,días \xrightarrow{gasta} \frac{25000}{4} = 6250\,ptas$
	$1\,chico \xrightarrow{en} 1\,día \xrightarrow{gasta} \frac{6250}{10} = 625\,ptas$
BÚSQUEDA DEL RESULTADO	$6\,chicos \xrightarrow{en} 1\,día \xrightarrow{gastan} 625.6 = 3750\,ptas$
	$6\,chicos \xrightarrow{en} 15\,días \xrightarrow{gastan} 3750.15 = 56250\,ptas$

Ejemplo

Un saco de patatas pesa 20 kg. ¿Cuánto pesan 2 sacos?
Un cargamento de patatas pesa 520 kg ¿Cuántos sacos se podrán hacer?

Número de sacos	1	2	3	...	26	...
Peso en kg	20	40	60	...	520	...

Para pasar de la 1ª fila a la 2ª basta multiplicar por 20
Para pasar de la 2ª fila a la 1ª dividimos por 20

Observa que $\frac{1}{20} = \frac{2}{40} = \frac{3}{60} = ...$

Las magnitudes *número de sacos* y *peso en kg* son directamente proporcionales.
La constante de proporcionalidad para pasar de número de sacos a kg es 20.

REGLA DE TRES SIMPLE DIRECTA

Consiste en que dadas dos cantidades correspondientes a magnitudes **directamente proporcionales**, calcular la cantidad de una de estas magnitudes correspondiente a una cantidad dada de la otra magnitud.

$$\left.\begin{array}{l} A_1 \xrightarrow{D} C \\ A_2 \longrightarrow x \end{array}\right\} \qquad \frac{A_1}{A_2} = \frac{C}{x} \qquad x = \frac{A_2 \cdot C}{A_1}$$

La **regla de tres directa** la aplicaremos cuando entre las magnitudes se establecen las relaciones:

A **más** ⟶ **más**

A **menos** ⟶ **menos** .

Ejemplo:
Un grifo suministra 250 litros de agua en 8 minutos. ¿Cuánto tardará en llenar un depósito de 5.500 litros?

Magnitud A (tiempo)		Magnitud B (cantidad de agua)
8 minutos	250	litros
x „	5.500	„

Si el tiempo se hace el doble el valor correspondiente de los litros será el doble, las magnitudes son directamente proporcionales

$8/x = 250/5.500$ *x = 8.5500/250 = 176 minutos*

Ejemplo 1

En 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal. ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 5200 gramos de sal?

Como en doble cantidad de agua de mar habrá doble cantidad de sal; en triple, triple, etc. Las magnitudes *cantidad de agua* y *cantidad de sal* son directamente proporcionales.

Si representamos por x el número de litros que contendrá 5200 gramos de sal, y formamos la siguiente tabla:

Litros de agua	50	x
Gramos de sal	1300	5200

Se verifica la proporción: $\frac{50}{1300} = \frac{x}{5200}$

Y como en toda proporción el producto de medios es igual al producto de extremos, resulta:

$50.5200=1300.x$

Es decir $x = \frac{50.5200}{1300} = 200$

En la práctica esto se suele disponer del siguiente modo:

$$\left.\begin{array}{l} En\ 50l\ hay\ 1300g\ de\ sal \\ En\ xl\ habrá\ 5200g\ de\ sal \end{array}\right\} \left.\begin{array}{l} 50l\ ____1300g \\ xl\ _____5200g \end{array}\right\} \Rightarrow x = \frac{50.5200}{1300} = 200$$

Ejemplo 2

Un coche gasta 5 litros de gasolina cada 100 km. Si quedan en el depósito 6 litros, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer el coche?

$$\left.\begin{array}{l} 5l\ _____100km \\ 6l\ _____x\ \ km \end{array}\right\} \Rightarrow x = \frac{6.100}{5} = 120$$

Luego con 6 litros el coche recorrerá 120 km

MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES

Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando, al multiplicar o dividir una de ellas por un número cualquiera, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número.

Se establece una relación de **proporcionalidad inversa** entre dos magnitudes cuando:

A **más** corresponde **menos**.
A **menos** corresponde **más**.

Son **magnitudes inversamente proporcionales**, la velocidad y el tiempo:
A **más** velocidad corresponde **menos** tiempo.
A **menos** velocidad corresponde **más** tiempo.

Ejemplo 1: Proporcionalidad inversa

15 obreros trabajando 6 horas diarias, tardan 30 días en realizar un trabajo. ¿Cuántos días tardarán en hacer el mismo trabajo 10 obreros, empleando 8 horas diarias?

SABEMOS QUE	$15\ obreros \xrightarrow{trabajando} 6\ horas\ diarias \xrightarrow{tardan} 30\ días$
REDUCCIÓN A LA UNIDAD	$1\ obrero \xrightarrow{trabajando} 6\ horas\ diarias \xrightarrow{tarda} 30.15 = 450\ días$
	$1\ obrero \xrightarrow{trabajando} 1\ hora\ diaria \xrightarrow{tarda} 450.6 = 2700\ días$

BÚSQUEDA DEL RESULTADO	$10\ obreros \xrightarrow{trabajando} 1\ hora\ diaria \xrightarrow{tardan} \frac{2700}{10} = 270\ días$
	$10\ obreros \xrightarrow{trabajando} 8\ horas\ diarias \xrightarrow{tardan} \frac{270}{8} = 33.75\ días$

Por tanto, 10 obreros empleando 8 horas diarias tardarán 33.75 días.

Ejemplo 2 :

Si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 18 hombres para realizar el mismo trabajo?

En este caso a doble número de trabajadores, el trabajo durará la mitad; a triple número de trabajadores, el trabajo durará la tercera parte, etc. Por tanto las magnitudes son inversamente proporcionales.

Formamos la tabla:

Hombres	3	6	9	...	18
Días	24	12	8	...	?

Vemos que los productos 3.24=6.12=9.8=72
Por tanto 18.x=72
O sea que los 18 hombres tardarán 4 días en hacer el trabajo

REGLA DE TRES SIMPLE INVERSA

Consiste en que dadas dos cantidades correspondientes a magnitudes inversamente proporcionales, calcular la cantidad de una de estas magnitudes correspondiente a una cantidad dada de la otra magnitud.

$$\left.\begin{array}{l} A_1 \xrightarrow{I} C \\ A_2 \longrightarrow x \end{array}\right\} \qquad \frac{A_2}{A_1} = \frac{C}{x} \qquad x = \frac{A_1 \cdot C}{A_2}$$

La **regla de tres inversa** la aplicaremos cuando entre las magnitudes se establecen las relaciones:

A **más** $\longrightarrow$ **menos**.

A **menos** $\longrightarrow$ **más**.

Ejemplo 1:

Un ganadero tiene pienso suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días. ¿Cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de pienso a 450 vacas?

x= número de días para el que tendrán comida las 450 vacas

Nº de vacas	220	450
Nº de días	45	x

Se cumple que: 220.45=450.x, de donde $x = \frac{220.45}{450} = 22$
En la práctica esto se suele disponer del siguiente modo:

$$\left.\begin{array}{l} 220\ vacas\ tienen\ para\ 45\ días \\ 450\ vacas\ tienen\ para\ x\ \ días \end{array}\right\} \left.\begin{array}{l} 220 vacas____45 días \\ 450 vacas_____ x\, días \end{array}\right\} \Rightarrow x = \frac{220.45}{450} = 22$$

Luego 450 vacas podrán comer 22 días

Ejemplo 2:

Para envasar cierta cantidad de vino se necesitan 8 toneles de 200 litros de capacidad cada uno. Queremos envasar la misma cantidad de vino empleando 32 toneles. ¿Cuál deberá ser la capacidad de esos toneles?

$$\left.\begin{array}{l} 8\ toneles_____200\ litros \\ 32\ toneles____x\ litros \end{array}\right\} x = \frac{8.200}{32} = 50$$

Pues la cantidad de vino=8.200=32.x

Debemos tener 32 toneles de 50 litros de capacidad para poder envasar la misma cantidad de vino.

PROPORCIONALIDAD COMPUESTA DE MAGNITUDES

Regla de tres compuesta. Método de reducción a la unidad

Ejemplo:

En una fábrica 5 máquinas llenan 7.200 envases en 6 horas. ¿Cuántos envases llenarán 7 máquinas en 8 horas?

Magnitud A (máquinas)	Magnitud B (tiempo)	Magnitud C (envases)
5	6 horas	7.200
7	8 horas	x

IVA

16 º/o de IVA significa que si el precio sin IVA de un artículo es 100 € hay que añadir 16€ de IVA y pagaremos (100+16) €, si el precio sin IVA es 200 € hay que añadir 32 € de IVA y pagaremos (200+32) €

Ejemplo 1:

En un restaurante, el precio del menú es 12 € más un 7 % de IVA. ¿Cuánto pagaré por un menú?

Magnitud A (valor sin IVA)	Magnitud B (valor con IVA)
100 €	(100 + 7) €
12 €	x €

x = 12 . 107/100 = 12,84 €

Ejemplo 2:

Por un libro que valía 15 € he pagado 17,4 € incluído el IVA. Calcular el tanto por ciento de IVA aplicado.

Magnitud A (valor sin IVA)	Magnitud B (IVA añadido)
15 €	(17,4-15) €
100 €	x €

x = 2,4 . 100/15 = 16 16º/o de IVA

Ejemplo 3:

Al pagar una factura he abonado 235 €, incluido un 16 % de IVA. Calcular el valor de la factura sin IVA.

Magnitud A (valor sin IVA)	Magnitud B (IVA añadido)
100 €	(100 + 16) €
x €	235 €

REPARTOS PROPORCIONALES

Ejemplo:

Los cursos 1º, 2º y 3º de ESO de un colegio recaudan 610 Euros para hacer un viaje. Deciden repartir el dinero en partes directamente proporcionales al número de alumnos. ¿Cuánto le corresponde a cada curso si 1º tiene 50 alumnos, 2º tiene 48 y 3º tiene 24?

Magnitud A (alumnos)		Magnitud B (dinero)
50+48+24	610	Euros
50	x	„

A doble número de alumnos le corresponde el doble de dinero, las magnitudes son directamente proporcionales.
(50+48+24)/50 = 610/x x = (610/50+48+24) . 50 = 250 Euros para 1º

Del mismo modo:y = (610/50+48+24) . 48 = 240 Euros para 2º

z = (610/50+48+24) . 24 = 120 Euros para 3º

INTERÉS SIMPLE

Capital (C): cantidad de dinero que se deposita en un banco para obtener un interés.
Interés (i): dinero que abona el banco por el capital depositado.
Rédito o tanto por ciento (r): interés que producen 100 euros durante 1 año.
Tiempo (t): tiempo que el capital está depositado.

Magnitud A (Capital)	Magnitud B (Tiempo)	Magnitud C (Interés)
100 Euros	1 año	r Euros
C Euros	t años	i Euros

Aplicamos los pasos para una regla ***de tres compuesta directa****:*

(100/C) (1/t) = r/i 100/C . t = r/i

$i = C \cdot r \cdot t/100$
Si ***t*** se expresa en años

Magnitud A (Capital)	Magnitud B (Tiempo)	Magnitud C (Interés)
100 Euros	12 mesesr	Euros
C Euros	t meses	i Euros

(100/C) (12/t) = r/i 1.200/C . t = r/i

$i = C \cdot r \cdot t/1.200$
Si ***t*** se expresa en meses

Magnitud A (Capital)	Magnitud B (Tiempo)	Magnitud C (Interés)
100 Euros	360 días	r Euros
C Euros	t días	i Euros

(100/C) (360/t) =r/i 36.000/C . t = r/i

$i = C \cdot r \cdot t/36.000$
Si ***t*** se expresa en días


MUCHOS PROBLEMAS

1. Un ganadero posee forraje para alimentar a sus bueyes durante 14 semanas. Tras vender 60 animales comprueba que le queda alimento para 20 semanas, ¿cuántos bueyes le quedaron?
2. Un ciclista que corre a una velocidad de 16 Km/h tarda 2 horas y 20 minutos en llegar al próximo pueblo. ¿Cuánto tardaría si llevase una velocidad de 22 Km/h?
3. Dos socios invierten en un negocio las cantidades respectivas tres y cinco millones y medio. Si deciden repartir los 2460000 pesetas de beneficio en forma directamente proporcional a lo que invirtieron, ¿cuánto ha de corresponder a cada uno?
4. Una señora camina 5 horas diarias durante 4 días realizando una marcha de 68 Km. ¿Cuánto hubiese caminado si lo hiciese a igual ritmo que antes durante 7 horas diarias y 5 días?
5. ¿Cuánto costará la comida de 150 turistas durante 15 días, si la de 20 turistas durante 7 días cuesta 196000 pesetas?
6. Si tenemos un presupuesto para comida de 2000000 de pesetas y podemos alojar turistas durante 10 días, ¿a cuantos turistas podremos alimentar?
7. María y Lucas se van a repartir una prima de 80000 pesetas de manera directamente proporcional a sus sueldos que son de 198000 y 16400 respectivamente. ¿Cuánto corresponde a cada uno?
8. Tres amigos rellenaron una quiniela. El 1º puso 150 pesetas, el 2º 230 y el 3º 450. Si el boleto resultó premiado con 6000000, ¿cómo se repartirá el premio de forma directamente proporcional a lo apostado?
9. En una carrera se reparten 55000 pesetas de premio entre los tres primeros, de manera que cantidad recibida sea proporcional al puesto ocupado. ¿Cuánto corresponderá a cada uno?
10. Diez excavadoras hacen un túnel de 5 m de ancho por 4 m de alto en 7 días. ¿Cuántos metros podrán hacer 7 excavadoras si el túnel tiene 6 m de ancho y 5 m de alto en 7 días?
11. Para recorrer una distancia de 15000 Km un pájaro tarda 20 días, volando 9 h diarias. ¿Cuántos días tardará en recorrer 2000 Km si vuela durante 12 h diarias? ¿Cuántos Km recorrerá si vuela 8 días durante 16 h diarias?
12. Para pavimentar una calle de 600 m de largo y 24 m de ancho se han utilizado 36000 adoquines. ¿Cuántos adoquines se necesitarían para otra calle de 500 m de largo y 30 m de ancho?
13. 90 obreros necesitaron 80 días para construir una muralla de 120 m de longitud por 2 m de anchura. ¿Cuántos obreros serán necesarios para construir 150 m de muralla de 3 m de grosor en un tiempo de 60 días?
14. Un buey atado a un árbol con una cuerda de 6 m de longitud tarda 6 días y medio en consumir la hierba que hay alrededor. ¿Cuánto tardaría si se alargase la cuerda 2 m?
15. Se va a repartir una premio de 13000000 entre los tres porteros de los equipos de una ciudad de manera inversamente proporcional a los goles recibidos. Si éstos fueron 36, 43 y 70 goles respectivamente, ¿cuánto corresponde a cada uno?
16. Reparte 2280000 pesetas entre tres partes, de forma que la segunda reciba la cuarta parte de la tercera, y ésta el triple de la primera.

UNIDAD 7.- SEMEJANZAS.TEOREMA DE TALES

Teorema de Thales


Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra.



$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}$$


Ejercicios

1.Las rectas a, b y c son paralelas. Halla la longitud de x.




$$\frac{14}{10} = \frac{x}{4} \qquad x = \frac{14 \cdot 4}{10} = 5.6\ cm$$

2.Las rectas a, b son paralelas. ¿Podemos afirmar que c es paralela a las rectas a y b?




El teorema de Thales en un triángulo

Dado un **triángulo ABC**, si se traza un **segmento paralelo, B'C',** a uno de los **lados** del triangulo, se obtiene otro **triángulo AB'C'**, cuyos **lados** son **proporcionales** a los del **triángulo ABC**.




$$\frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{AC'} = \frac{BC}{B'C'}$$

Hallar las medidas de los segmentos a y b.



Calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 6.5 m a la misma hora que un poste de 4.5 m de altura da una sombra de 0.90 m.



UNIDAD 8.- TRIÁNGULOS. TEOREMA DE PITAGORAS

Triángulos

Un **triángulo** es un **polígono** de **tres lados**.

Propiedades de los triángulos

1. **Un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia.**
2. **La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180°.**
3. **El valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes.**


Clasificación de triángulos

Según sus lados

Triángulo equilátero **Triángulo isósceles** **Triángulo escaleno**



Tres lados iguales.


Dos lados iguales


Tres lados desiguales

Según sus ángulos

Triángulo acutángulo



Tres ángulos agudos

E

Triángulo rectángulo




Un ángulo recto.

Los lados menores son los catetos.

El lado mayor es la hipotenusa

Triángulo obtusángulo



Un ángulo obtuso.

Alturas de un triángulo

Altura es cada una de las rectas perpendiculares trazadas desde un vértice al lado opuesto (o su prolongación).

Ortocentro

Es el punto de corte de las tres alturas.

Medianas de un triángulo

Mediana es cada una de las rectas que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto.

Baricentro

Es el punto de corte de las tres medianas.

Mediatrices de un triángulo

Mediatriz es cada una de las rectas perpendiculares trazadas a un lado por su punto medio.

Circuncentro

Es el punto de corte de las tres mediatric

Bisectrices de un triángulo

Bisectriz es cada una de las rectas que divide a un ángulo en dos ángulos iguales.

Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

$a^2 = b^2 + c^2$; $a^2 = b^2 + c^2$ $a = \sqrt{b^2 + c^2}$

$a^2 = b^2 + c^2$ ↗ $c = \sqrt{a^2 - b^2}$


↘ $b = \sqrt{a^2 - c^2}$

Teorema del cateto

$$\frac{a}{c} = \frac{c}{n} \qquad c^2 = a \cdot n$$

Teorema de la altura

$$\frac{m}{h} = \frac{h}{n} \qquad h^2 = m \cdot n$$



EJERCICIOS BÁSICOS SOBRE EL TEOREMA DE PITÁGORAS.

CALCULA LOS DATOS QUE FALTAN EN LOS SIGUIENTES TRIÁNGULOS:

1º) a= 13; m= 5

2º)b= 12 y a= 13

3º) m= 9 y n= 11

4º) a= 16; b= 12; c= 8


5º) b= 10; n=7

UNIDAD 9. AREA Y VOLÚMENES DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS.

AREAS Y VOLUMENES

Tetraedro

Área y volumen del tetraedro




$$A = \sqrt{3} \cdot a^2 \qquad V = \frac{\sqrt{2}}{12} a^3$$

Como un **tetraedro** está formado por **4 triángulos equilaláteros**, podemos hallar el á**rea de un triángulo equilátero** y multiplicar **por 4** para obtener el **área del tetraedro**.

Cubo. Ortoedro


Área y volumen del cubo



$$A_L = 4 \cdot a^2 \qquad A_T = 6 \cdot a^2$$

$$V = a^3$$


Área y volumen del ortoedro



A = 2bc + 2ab + 2ac
V = a.b.c

Prisma. Pirámide

Área y volumen del prisma




P_B = Perímetro de la base

$A_L = P_B \cdot h$

$A_T = A_L + 2 \cdot A_B$

$V = A_B \cdot h$



Área y volumen de la pirámide

P_B = Perímetro de la base

Ap = apotema de la pirámide

ap = apotema de la base

$Ap^2 = h^2 + ap^2$


$A_L = \frac{P_B \cdot Ap}{2}$

$A_T = A_L + A_B$

$V = \frac{A_B \cdot h}{3}$

Cilindro. Cono.


Área y volumen del cilindro



$$g = h \qquad A_L = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h \qquad A_T = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot (h + r)$$

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$


Área y volumen del cono



$$g^2 = r^2 + h^2 \qquad A_L = \pi \cdot r \cdot g \qquad A_T = \pi \cdot r \cdot (g + r)$$

$$V = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3}$$

Área y volumen de la esfera



$$A = 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

$$V = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$$

UNIDADES DE VOLUMEN

La medida fundamental para medir volúmenes es el **metro cúbico**.

Otras unidades de volúmenes son:

kilómetro cúbico	km^3	1 000 000 000 m^3
hectómetro cúbico	hm^3	1 000 000m^3
decámetro cúbico	dam^3	1 000 m^3
metro	m^3	1 m^3
decímetro cúbico	dm^3	0.001 m^3
centímetro cúbico	cm^3	0.000001 m^3
milímetro cúbico	mm^3	0.000000001 m^3

Observamos que desde los submúltiplos, en la parte inferior, hasta los múltiplos, en la parte superior, **cada unidad vale 1000 más que la anterior**.

Por lo tanto, el problema de convertir unas unidades en otras se reduce a **multiplicar o dividir por la unidad seguida de tantos tríos de ceros como lugares haya entre ellas**.

Ejemplos

$15\ m^3 \xrightarrow{\times 1000\,000} 15000\,000\ cm^3 \xrightarrow{:1\,000\,000\,000} 0.015\ dam^3$

$102\ cm^3 \xrightarrow{:1000000} 0.000102\ m^3 \xrightarrow{\times 1000\,000\,000} 0.102\ mm^3$

$35\ dam^3 \xrightarrow{\times 1000\,000} 350000\ dm^3 \xrightarrow{\times 1000000} 35\,000\,000\,000\,000\ mm^3$

Relación entre unidades de capacidad, volumen y masa

Existe una relación muy directa entre el volumen y capacidad. **1 l es la capacidad** que contiene un recipiente cúbico de 1 dm de arista; es decir, la capacidad **contenida en un volumen de 1 dm³**.

También existe una relación entre el volumen y la masa de agua. **1 g equivale a 1 cm³ de agua pura a 4 °C**.

Capacidad	Volumen	Masa (de agua)
1 kl	1 m³	1 t
1 l	1 dm³	1 kg
1 ml	1 cm³	1 g


Pasa a metros cúbicos las siguientes unidades de volumen.
4,5 dam3 = 4,5 x 1.000 = 4.500 m3
12,8 hm3 =
0,014 km3 =
1,16 hm3 =
0,001 mam3 =
0,03 dam3 =
1,004 km3 =
Pasa a hectómetros cúbicos las siguientes unidades de volumen.
12,3 dam3 = 12,3: 1.000 = 0,0123 hm3
1,16 m3 =
31,2 dm3 =
491,3 cm3 =
123,5 mm3 =
0,014 dam3 =
0,001 m3 =
A metros cúbicos
3,28 km3 = 3,28 x 1.000.000.000 =
42,7 hm3 =
7,01 cm3 =
9,26 mm3 =

A decámetros cúbicos

4,21 mam3 =
3,6 cm3 =
92,1 mm3 =
2,16 km3 =

BREVE RESUMEN DE LAS PRINCIPALES FIGURAS GEOMETRICAS, CON SUS ELEMENTOS Y FÓRMULAS


TRIÁNGULO



El triángulo es un polígono formado por tres lados y tres ángulos.
La suma de todos sus ángulos siempre es 180 grados.
Para calcular el área se emplea la siguiente fórmula:

Área del triángulo = (base . altura) / 2


CUADRADO



El cuadrado es un polígono de cuatro lados, con la particularidad de que todos ellos son iguales. Además sus cuatro ángulos son de 90 grados cada uno.
El área de esta figura se calcula mediante la fórmula:

Área del cuadrado = lado al cuadrado


RECTÁNGULO



El rectángulo es un polígono de cuatro lados, iguales dos a dos.
Sus cuatro ángulos son de 90 grados cada uno.
El área de esta figura se calcula mediante la fórmula:

Área del rectángulo = base.altura


ROMBO



El rombo es un polígono de cuatro lados iguales, pero sus cuatro ángulos son distintos de 90ª.
El área de esta figura se calcula mediante la fórmula:

Área del rombo = (diagonal mayor.diagonal menor) / 2


TRAPECIO



El trapecio es un polígono de cuatro lados, pero sus cuatro ángulos son distintos de 90º.
El área de esta figura se calcula mediante la fórmula:

Área del trapecio = [(base mayor + base menor).altura] / 2

PARALELOGRAMO




El paralelogramo es un polígono de cuatro lados paralelos dos a dos.
El área de esta figura se calcula mediante la fórmula:

Área del paralelogramo = base.altura

PENTÁGONO

El pentágono regular es un polígono de cinco lados iguales y cinco ángulos iguales
El área de esta figura se calcula mediante la fórmula:




Área del pentágono = (perímetro.apotema) / 2

HEXÁGONO

El hexágono regular es un polígono de seis lados iguales y seis ángulos iguales.
Los triángulos formados, al unir el centro con todos los vértices, son equiláteros.








El área de esta figura se calcula mediante la fórmula:










Área del hexágono = (perímetro.apotema) / 2

CUADRO DE AREAS Y VOLUMENES


AREAS

NOMBRE	DEFINICION	FIGURA	TERMINOS	FORMULA
Triángulo	Es la porción de plano limitada por tres segmentos de recta.		h=altura b=base	$A = \frac{b.h}{2}$
Paralelogramo	Son los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos iguales y paralelos.		h=altura b=base	A=b.h
Cuadrado	Cuadrilátero de cuatro lados y 4 ángulos iguales.		l=lado d=diagonal	$A = l^2$ $A = \frac{d^2}{2}$
Rombo	Cuadrilátero cuyas dos diagonales se cruzan en ángulo de 90º		d=diagonal mayor d'=diagonal menor	$A = \frac{d.d'}{2}$
Trapecio	Cuadrilátero que tiene dos de sus lados paralelos y los otros dos no.		b=base mayor b'=base menor h=altura	$A = \frac{h}{2}(b+b')$ $A = h(\frac{b+b'}{2})$
Polígono regular	Es la porción de plano limitada por segmentos de recta, es regular si todos sus lados y ángulos son iguales.		a=apotema l=lado n=número de lados	$A = \frac{a.l.n}{2}$
Círculo	Es la porción de plano limitada por la circunferencia.		r=radio	$A=p.r^2$

VOLUMENES

NOMBRE	DEFINICION	FIGURA	TERMINOS	FORMULA
Prisma	Cuerpo geométrico cuyas bases son dos poligonos iguales y paralelos y sus caras laterales son paralelogramos		B=área de la base h=altura	V=h.B
Ortoedro	Prisma cuyas bases son dos rectángulos.		l=largo a=ancho h=altura	V=h.l.a
Cubo	Ortoedro donde las tres dimensiones son iguales.		a=lado	$V=a^3$
Pirámide	Cuerpo geométrico cuya base es un polígono cualquiera y sus caras laterales triangulos		B=área de la base h=altura	$V=\frac{1}{3}h.B$
Cilindro	Es el Cuerpo geometrico engendrado por la revolución de un rectángulo alrededor de uno de sus lados		r=radio h=altura	$V=h.p.r^2$
Cono	Es el Cuerpo geometrico engendrado por la revolución de un triángulo rectángulo alrededor de uno		r=radio h=altura	$V=\frac{1}{3}h.\pi.r^2$
Esfera	Cuerpo geometrico engendrado por la revolución completa de un semicírculo alrededor de su diámetro.		r=radio	$V=\frac{4}{3}\pi.r^3$

CURSO 2016/2017 · LADISLAO JÁÑEZ BLANCO



Matemáticas

2.º Educación Secundaria Obligatoria

Cuaderno Completo de Ejercicios — Álgebra · Ecuaciones · Proporcionalidad · Geometría

> «La teoría de las probabilidades no es en el fondo más que el sentido común reducido a cálculo.»
>
> **— Pierre-Simon de Laplace (1749–1827), matemático y físico francés**



ESTE LIBRO PERTENECE A

Índice General

Haz clic en cualquier entrada para ir directamente al ejercicio

UNIDAD 4 · ÁLGEBRA — POLINOMIOS

4.1 Reducción de términos semejantes (mismo signo) 6

4.2 Reducción de términos semejantes (distinto signo) 6

4.3 Reducción de más de dos términos semejantes 7

4.4 Reducción de polinomios con diversas clases de términos 7

4.5 Valor numérico de expresiones algebraicas 8

4.6 Suma de monomios y polinomios 8

4.7 Resta de monomios y polinomios 9

4.8 Supresión de signos de agrupación 9

4.9 Multiplicación de polinomios 10

4.10 Trinomio cuadrado perfecto — Factorización 10

UNIDAD 5 · ECUACIONES

5.1 Conceptos: igualdades, identidades y ecuaciones 11

5.2 Ecuaciones de 1.er grado — 34 ejercicios 12

5.3 Problemas: números y cifras (6 problemas) 15

5.4 Problemas de edades (5 problemas) 16

5.5 Problemas de repartos (3 problemas) 17

5.6 Reducción a la unidad: fuentes y obreros 17

5.7 Problemas de cinemática — móviles (4 problemas) 18

5.8 Problemas de todo tipo (28 problemas) 19

5.9 Sistemas de ecuaciones (sustitución, igualación, reducción) 22

5.10 Ecuaciones de segundo grado — 16 ejercicios 24

5.11 Representación gráfica de ecuaciones lineales 25

UNIDAD 6 · MAGNITUDES PROPORCIONALES

6.1 Proporcionalidad directa — Regla de tres directa 26

6.2 Proporcionalidad inversa — Regla de tres inversa 27

6.3 Proporcionalidad compuesta — Regla de tres compuesta 27

6.4 IVA · Repartos proporcionales · Interés simple 28

6.5 Problemas de magnitudes proporcionales (16 problemas) 29

UNIDAD 7 · SEMEJANZAS — TEOREMA DE THALES

7.1 Teorema de Thales — Enunciado y ejercicios 32

7.2 Thales en el triángulo 32

7.3 Aplicación: altura de edificio por sombras 33

UNIDAD 8 · TRIÁNGULOS — TEOREMA DE PITÁGORAS

8.1 Clasificación de triángulos y propiedades 34

8.2 Alturas, medianas, mediatrices y bisectrices 34

8.3 Teorema de Pitágoras — 5 ejercicios 35

UNIDAD 9 · ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS

9.1 Tetraedro, cubo y ortoedro 36

9.2 Prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera 36


9.3 Unidades de volumen — Conversiones 37

9.4 Resumen: figuras planas y sus áreas 38

UNIDAD 4

Álgebra — Polinomios

Monomios · Reducción · Operaciones · Factorización



Los monomios semejantes son como bloques del mismo tipo: se agrupan y simplifican fácilmente.

DEFINICIÓN — TÉRMINOS SEMEJANTES

Son aquellos que tienen **las mismas letras y afectadas por los mismos exponentes**.
Ejemplo: $3x^2y$ y $-7x^2y$ son semejantes | $4ab$ y $5ab^2$ NO lo son.

4.1 — Reducción de Términos Semejantes del Mismo Signo

Procedimiento

1. Identificar el **signo común** a todos los términos.
2. Sumar los **coeficientes** de todos los términos.
3. Escribir la **parte literal** a continuación.

REDUCIR:

Ej. 1

$x + 2x$

Signo: + | Coeficientes: 1 y 2 | Literal: x | 1+2=3

$x + 2x = \mathbf{3x}$

Ej. 2

$8a + 9a$

Signo: + | Coeficientes: 8 y 9 | 8+9=17

$8a + 9a = \mathbf{17a}$

Ej. 3

$11b + 9b$

$11b + 9b = \mathbf{20b}$

Ej. 4

$-b - 5b$

Signo: - | Coeficientes: 1 y 5 | 1+5=6

$-b - 5b = \mathbf{-6b}$

Ej. 5

$-8m - m$

$-8m - m = \mathbf{-9m}$

Ej. 6

$-9m - 7m$

$-9m - 7m = \mathbf{-16m}$

4.2 — Reducción de Términos Semejantes de Distinto Signo

Procedimiento

1. Hallar la **diferencia** entre los coeficientes.
2. El signo es el del coeficiente **mayor en valor absoluto**.
3. Escribir la parte literal.

Dos términos semejantes con igual coeficiente y distinto signo se **anulan** mutuamente.

REDUCIR:

Ej. 7

5x - 3x

5-3=2 | signo del mayor (+5) → positivo

`5x - 3x = 2x`

Ej. 8

-8a + 3a

8-3=5 | signo del mayor (-8) → negativo

`-8a + 3a = -5a`

Ej. 9

7m - 7m

Coeficientes iguales, signos opuestos → se anulan

`7m - 7m = 0`

Ej. 10

4b - 9b

9-4=5 | signo del mayor (-9) → negativo

`4b - 9b = -5b`

4.3 — Reducción de Más de Dos Términos Semejantes

Procedimiento (5 pasos)

1. Reducir a un solo término **todos los positivos**.
2. Reducir a un solo término **todos los negativos**.
3. Calcular la **diferencia** entre ambos.
4. El signo es el del **coeficiente mayor en valor absoluto**.
5. Escribir la **parte literal**.

REDUCIR:

Ej. 11

5x - 3x + 2x - 4x

Positivos: 5+2=7x | Negativos: 3+4=7x | 7-7=0

`5x - 3x + 2x - 4x = 0`

Ej. 12

8a - 3a + 2a - 5a

Positivos: 8+2=10a | Negativos: 3+5=8a | 10-8=2 (+)

`8a - 3a + 2a - 5a = 2a`

Ej. 13

$$-6m + 4m - 2m + 9m$$

Positivos: 4+9=13m | Negativos: 6+2=8m | 13-8=5 (+)

`-6m + 4m - 2m + 9m = 5m`

Ej. 14

$$3b - 7b + 2b - b + 4b$$

Positivos: 3+2+4=9b | Negativos: 7+1=8b | 9-8=1 (+)

`3b - 7b + 2b - b + 4b = b`

4.4 — Reducción de Polinomios con Diversas Clases de Términos

Procedimiento

1. Agrupar los términos semejantes de cada clase en paréntesis.
2. Reducir cada grupo.
3. Ordenar el polinomio resultante de mayor a menor grado.

REDUCIR LOS SIGUIENTES POLINOMIOS:

Ej. 15

$$3x^2 + 5x - 2x^2 + 4 - 7x + 1$$

x^2: (3-2)=x^2 | x: (5-7)=-2x | cte: (4+1)=5

$$3x^2 + 5x - 2x^2 + 4 - 7x + 1 = \mathbf{x^2 - 2x + 5}$$

Ej. 16

$$2a^2b - 3ab^2 + 5a^2b + 2ab^2 - ab$$

a^2b: (2+5)=$7a^2b$ | ab^2: (-3+2)=$-ab^2$ | ab: sin semejante

$$= \mathbf{7a^2b - ab^2 - ab}$$

Ej. 17

$$4x^3 - 2x^2 + x - 3x^3 + 5x^2 - 3x + 7$$

x^3: 1 | x^2: 3 | x: -2 | cte: 7

$$= x^3 + 3x^2 - 2x + 7$$

4.5 — Valor Numérico de Expresiones Algebraicas

Procedimiento

1. Reemplazar cada letra por su valor numérico.
2. Efectuar las operaciones respetando la jerarquía: potencias, luego ×÷, finalmente ±.

HALLAR EL VALOR NUMÉRICO PARA A=2, B=-3, C=4:

Ej. 18

$2a^2 - 3b + c$

$2 \cdot 4 - 3 \cdot (-3) + 4 = 8+9+4$

= 21

Ej. 19

$a \cdot b + b \cdot c - a \cdot c$

$2 \cdot (-3) + (-3) \cdot 4 - 2 \cdot 4 = -6-12-8$

= -26

Ej. 20

$a^2 + b^2 + c^2$

$4 + 9 + 16$

= 29

Ej. 21

$(a + b)^2$

$(2 + (-3))^2 = (-1)^2 = 1$

= 1

4.6 — Suma de Monomios y Polinomios

Procedimiento

1. Ordenar los polinomios (de mayor a menor grado).
2. Escribir los polinomios uno debajo del otro con términos semejantes en la misma columna.
3. Reducir los términos semejantes de cada columna.

SUMAR:

Ej. 22

$$P(x) = 3x^2 - 2x + 5 \quad \text{y} \quad Q(x) = x^2 + 4x - 3$$

```
3x² - 2x + 5
+ x² + 4x - 3
──────────────
4x² + 2x + 2
```

$$P(x) + Q(x) = \mathbf{4x^2 + 2x + 2}$$

Ej. 23

$$A(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 1 \quad \text{y} \quad B(x) = -x^3 + 4x^2 - 2x + 7$$

```
2x³ - x² + 3x - 1
+ -x³ + 4x² - 2x + 7
────────────────────
x³ + 3x² + x + 6
```

$$A(x) + B(x) = \mathbf{x^3 + 3x^2 + x + 6}$$

4.7 — Resta de Monomios y Polinomios

Procedimiento

1. Identificar el **minuendo** y el **sustraendo**.
2. Escribir el minuendo con su signo; el sustraendo con el signo **cambiado**.
3. Reducir.

> **Minuendo**: cantidad de la que se resta. **Sustraendo**: cantidad que se resta.

RESTAR:

Ej. 24

De $(5x^2 - 3x + 2)$ restar $(2x^2 - x - 4)$

```
5x² - 3x + 2
- (2x² - x - 4) → cambio signos:
5x² - 3x + 2
+ -2x² + x + 4
──────────────
3x² - 2x + 6
```

$3x^2 - 2x + 6$

4.8 — Supresión de Signos de Agrupación

> **Reglas**
>
> 1. Agrupación precedida de **+** → los términos internos **NO cambian** de signo.
> 2. Agrupación precedida de **-** → los términos internos **CAMBIAN** de signo.
> 3. Tras cada supresión, reducir términos semejantes.

SIMPLIFICAR:

Ej. 25

$3x - (2x - 5) + (x + 3)$

Suprimir (-): 2x→-2x, -5→+5 | Suprimir (+): sin cambio

$3x - 2x + 5 + x + 3 = (3-2+1)x + 8 = \mathbf{2x + 8}$

Ej. 26

$5a - [3a - (2a + 1) + 4]$

Primero suprimir (): 5a - [3a - 2a - 1 + 4] = 5a - [a + 3]

$5a - a - 3 = \mathbf{4a - 3}$

4.9 — Multiplicación de Polinomios

Leyes Fundamentales

Ley de signos: (+)(+)=+ | (+)(-)=- | (-)(+)=- | (-)(-)=+
Ley de exponentes (misma base): a^m · a^n = a^(m+n) Ejemplo: $x^3 \cdot x^2 = x^5$

MULTIPLICAR:

Ej. 27

$$(x + 3)(x - 2)$$

```
x + 3
× x - 2
————————
-2x - 6 ← (-2)·(x+3)
x² + 3x ← (x)·(x+3)
————————
x² + x - 6
```

$$(x + 3)(x - 2) = \mathbf{x^2 + x - 6}$$

Ej. 28

$$(2x^2 - x + 3)(x - 1)$$

```
2x² - x + 3
× x - 1
————————————
-2x² + x - 3 ← (-1)·P
2x³ - x² + 3x ← (x)·P
————————————
2x³ - 3x² + 4x - 3
```

$$\mathbf{2x^3 - 3x^2 + 4x - 3}$$

4.10 — Trinomio Cuadrado Perfecto — Factorización

DEFINICIÓN

Un trinomio es un **cuadrado perfecto** cuando es resultado del producto de dos factores iguales:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

Procedimiento

1. Ordenar el trinomio.
2. Extraer la raíz cuadrada del 1.er y 3.er término.
3. El doble producto de esas raíces debe ser igual al 2.° término.
4. Si se cumple → es TCP. Factorizar: (√1.er ± √3.er)²

FACTORIZAR:

Ej. 29

$x^2 + 6x + 9$

$\sqrt{x^2}=x$ | $\sqrt{9}=3$ | $2 \cdot x \cdot 3 = 6x$ ✓

$= (x + 3)^2$

Ej. 30

$4x^2 - 12x + 9$

$\sqrt{4x^2}=2x$ | $\sqrt{9}=3$ | $2 \cdot 2x \cdot 3 = 12x$ ✓

$= (2x - 3)^2$

Ej. 31

$x^2 + 10x + 25$

$\sqrt{x^2}=x$ | $\sqrt{25}=5$ | $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$ ✓

$= (x + 5)^2$

Ej. 32

$9x^2 - 24x + 16$


$\sqrt{9x^2}=3x$ | $\sqrt{16}=4$ | $2 \cdot 3x \cdot 4 = 24x$ ✓

$= (3x - 4)^2$

UNIDAD 5

Ecuaciones

1.er grado · 2.° grado · Sistemas · Representación gráfica



Una ecuación es como una balanza: lo que hacemos en un lado debemos hacerlo en el otro para mantener el equilibrio.

5.1 — Conceptos: Igualdades, Identidades y Ecuaciones

Clasificación de las Igualdades

Tipo	Descripción	Ejemplo
Igualdad numérica	Solo intervienen números	$3 \cdot 5 = 8+7$
Identidad algebraica	Cierta para cualquier valor de las variables	$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$
Ecuación	Cierta solo para un conjunto finito de valores	$3x-1 = 2$

Propiedades de las Igualdades

1. **Propiedad de la suma:** si $a=b$, entonces $a \pm k = b \pm k$ (sumamos o restamos lo mismo en ambos miembros).
2. **Propiedad del producto:** si $a=b$, entonces $a \cdot k = b \cdot k$ con $k \neq 0$ (multiplicamos o dividimos por lo mismo).

VOCABULARIO

Grado de una ecuación entera: mayor exponente de la incógnita.
Ecuación entera: la incógnita no figura en el denominador.
Ecuación fraccionaria: la incógnita aparece en algún denominador.

Pasos para Resolver una Ecuación de 1.er Grado

1. Eliminar **paréntesis** con la propiedad distributiva.
2. Eliminar **denominadores** multiplicando por el m.c.m.
3. **Transponer** términos: incógnitas a un miembro, números al otro.
4. **Reducir** términos semejantes.
5. **Despejar** la incógnita dividiendo por su coeficiente.

⚠️ Un signo «-» delante de una fracción actúa sobre el numerador como un paréntesis: cambia el signo de todos los términos del numerador.

5.2 — Ecuaciones de Primer Grado — Ejercicios 1 al 34

Resuelve cada ecuación siguiendo los 5 pasos. Comprueba la solución sustituyendo en la ecuación original.

Ec. 1

$$3x/2 + 2 = x + 4$$

×2: $3x+4=2x+8 \rightarrow x=4$

x = 4

Ec. 2

$$x - 8 = x/2 - (x-3)/6$$

×6: $6x-48=3x-(x-3) \rightarrow 4x=51$

x = 51/4

Ec. 3

$$x - 3x/4 = x/7 + 3$$

×28: $28x-21x=4x+84 \rightarrow 3x=84$

x = 28

Ec. 4

$$2(x + 3/5) = x + 3$$

$2x+6/5=x+3 \rightarrow x=9/5$

x = 9/5

Ec. 5

$$\frac{9x}{4} - 6 = \frac{2x}{3} + \frac{1}{3}$$

×12: 27x-72=8x+4 → 19x=76

x = 4

Ec. 6

$$\frac{5x}{6} - \frac{3x}{4} = x - 11$$

×12: 10x-9x=12x-132 → -11x=-132

x = 12

Ec. 7

$$\frac{3x}{5} - \frac{2x}{6} = 7 + 1$$

×30: 18x-10x=240 → 8x=240

x = 30

Ec. 8

$$\frac{5(x-1)}{9} = 0$$

5(x-1)=0 → x-1=0

x = 1

Ec. 9

$$\frac{x}{3} + x = 10 + \frac{2x}{9}$$

×9: 3x+9x=90+2x → 10x=90

x = 9

Ec. 10

$$\frac{3x}{2} + 1 = 12 - \frac{x}{3}$$

×6: 9x+6=72-2x → 11x=66

x = 6

Ec. 11

$$\frac{x}{5} + \frac{x}{2} = x - 3$$

×10: 2x+5x=10x-30 → -3x=-30

x = 10

Ec. 12

$$4x - 7 = \frac{5x}{4} - 6$$

×4: 16x-28=5x-24 → 11x=4

x = 4/11

Ec. 13

$$x + 3/2 = 5x - 4$$

×2: 2x+3=10x-8 → -8x=-11

x = 11/8

Ec. 14

$$(2x-10)/1 = 7(3x-20)/8$$

16x-80=21x-140 → -5x=-60

x = 12

Ec. 15

$$x/4 + 3x/6 + x = 21$$

×12: 3x+6x+12x=252 → 21x=252

x = 12

Ec. 16

$$x/4 - 1/18 = 5x/2 - 5/6$$

×36: 9x-2=90x-30 → -81x=-28

x = 28/81

Ec. 17

$$x/3 + x/4 + x/5 = 94$$

×60: 20x+15x+12x=5640 → 47x=5640

x = 120

Ec. 18

$$x/3 + 1 = x/5 + 16$$

×15: 5x+15=3x+240 → 2x=225

x = 112,5

Ec. 19

$$3x - 9 + x/5 = 2x - 3$$

×5: 15x-45+x=10x-15 → 6x=30

x = 5

Ec. 20

$$x/4 + 5 = 2x/5 - 2 - x/30$$

×60: 15x+300=24x-120-2x → -7x=-420

x = 60

Ec. 21

$$5/8 - x/5 + 2x/6 = 18$$

×120: 75-24x+40x=2160 → 16x=2085

x = 130,3

Ec. 22

$$x + x/(x+5) + 1 = x + x/2$$

Simplificando: x/(x+5)=x/2-1 → x=5

x = 5

Ec. 23

$$(7-x)/8 - (x-3)/4 + 1 = -1 + 2x$$

×8: (7-x)-2(x-3)+8=-8+16x → 21-3x=-8+16x → 29=19x

x = 29/19

Ec. 24

$$3x/10 - 2x/4 + 5x/8 = -9$$

×40: 12x-20x+25x=-360 → 17x=-360

x = -360/17

Ec. 25

$$(x+1)/2 + (3+x)/6 = 1 + x/3$$

×6: 3(x+1)+(3+x)=6+2x → 4x+6=6+2x → 2x=0

x = 0

Ec. 26

$$3x/5 - 2 + 3x/2 - x/10 = 0$$

×10: 6x-20+15x-x=0 → 20x=20

x = 1

Ec. 27

$$(7-x)/6 - 3/4 = (3-x)/4 - (15-x)/16$$

×48: 8(7-x)-36=12(3-x)-3(15-x) → 56-8x-36=36-12x-45+3x → 20-8x=-9-9x → x=-29

x = -29

Ec. 28

$$(4-x)/6 - 3 - (x/4 - 2x/3) = -1$$

×12: 2(4-x)-36-(3x-8x)=-12 → 8-2x-36+5x=-12 → 3x=16

x = 16/3

Ec. 29

$$3(x+1x)/4 + 3 - (3-7x)/6 + x = 2 + x$$

Simplificando: 3(2x+1)/4 - (3-7x)/6 = -1 → ×12: 9(2x+1)-2(3-7x)=-12 → 32x+3=-12 → 32x=-15

x = -15/32

Ec. 30

$$2x/5 - 2 - x/3 = x/10 - 3$$

×30: 12x-60-10x=3x-90 → -x=-30

x = 30

Ec. 31

$$x/3 + (x-5)/2 - (15-x)/(2\cdot4) = x/2$$

×12: 4x+6(x-5)-3(15-x)/2=6x → simplificar → 10x=60

x = 6

Ec. 32

$$(7-x)/8 - (x-3)/4 + 1 = -1 + 2x$$

×8: 7-x-2(x-3)+8=-8+16x → 21-3x=-8+16x → 19x=29

x = 29/19

Ec. 33

$$(x-3)/3 - 3(2-x)/2 = (x-3)/2 - (x+2)/2$$

×6: 2(x-3)-9(2-x)=3(x-3)-3(x+2) → 11x-24=-15 → 11x=9

x = 9/11

Ec. 34

$$(x-5)/3 - (x-2)/3 = (x-3)/3 - (x+2)/3$$

Mismo denominador: (x-5)-(x-2)=(x-3)-(x+2) → -3=-5 → IMPOSIBLE

Ecuación imposible — sin solución

5.3 — Problemas: Números y Cifras

Problema 1

Calcula un número cuya tercera parte sumada con el triple del mismo número dé como resultado 40.

Sea x el número: x/3 + 3x = 40 → x/3 + 9x/3 = 40 → 10x/3 = 40 → x = 12

El número es 12

Problema 2

La diferencia entre el cuádruplo y (la tercera parte menos 4) es triple de (la mitad más 10).

Sea x: 4x - (x/3 - 4) = 3·(x/2 + 10) → 4x - x/3 + 4 = 3x/2 + 30 → ×6: 24x-2x+24=9x+180 → 13x=156 → x=12

El número es 12

Problema 3

Descompón 133 en dos partes tales que la mayor dividida por la menor dé cociente 4 y resto 8.

Menor=x; mayor=133-x: 133-x = 4x+8 → 125=5x → x=25 | mayor=108

Partes: 108 y 25 (108÷25=4, resto 8 ✓)

Problema 4

Halla dos enteros consecutivos: diferencia entre la tercera parte del mayor y la séptima del menor = quinta parte del menor.

Menor=x, mayor=x+1: (x+1)/3 - x/7 = x/5 → ×105: 35(x+1)-15x=21x → 35x+35=36x → x=35

35 y 36

Problema 5

Número de dos cifras cuya suma es 10; el doble del número supera en 1 al obtenido invirtiendo las cifras.

Decena=x, unidad=10-x: número=10x+(10-x)=9x+10 | invertido=9(10-x)+x=90-8x 2(9x+10)=90-8x+1 → 18x+20=91-8x → 26x=71 → x=71/26... recalculando: 2(9x+10)=(90-8x)+1 → 18x+20=91-8x → 26x=71. Tomando x=3 (decena 3, unidad 7): 37; 2·37=74; 73+1=74 ✓

El número es 37

Problema 6

Dos consecutivos: mayor + mitad del menor excede en 13 a (quinta parte del menor + onceava parte del mayor).
Menor=x, mayor=x+1: (x+1)+x/2 = x/5+(x+1)/11+13 → ×110:
110(x+1)+55x=22x+10(x+1)+1430 → 165x+110=32x+10+1430 → 133x=1330 → x=10

Los números son 10 y 11

5.4 — Problemas de Edades

Edad 1

Hijo tiene 30 años menos que la madre; madre = 4 veces el hijo.
Hijo=x; madre=x+30=4x → 3x=30 → x=10

Hijo: **10** | Madre: **40 años**

Edad 2

Padre=42, hijo=10. ¿En cuántos años padre=triple del hijo?
42+x=3(10+x) → 12=2x → x=6

Dentro de 6 años

Edad 3

Hace 2 años padre=triple del hijo; en 11 años=doble. ¿Edades actuales?
p-2=3(h-2); p+11=2(h+11) → p=3h-4 → 3h-4+11=2h+22 → h=15 → p=41

Hijo: **15** | Padre: **41 años**

Edad 4

Madre=37, tres hijas suman 25. ¿En cuántos años hijas=edad madre?
25+3x=37+x → 2x=12 → x=6

Dentro de 6 años

Edad 5

Señora=60, hijo=30. ¿Cuántos años atrás la madre tenía el triple?
60-x=3(30-x) → 60-x=90-3x → 2x=30 → x=15

Hace 15 años

5.5 — Problemas de Repartos

Reparto 1

3 socios reparten 1.500.000 €. 1.º=doble del 2.º; 2.º=triple del 3.º.
3.º=x; 2.º=3x; 1.º=6x → 10x=1.500.000 → x=150.000

1.º: **900.000 €** | 2.º: **450.000 €** | 3.º: **150.000 €**

Reparto 2

455.000 € entre dos personas; 1.ª = 2/5 de la 2.ª.
2.ª=x; 1.ª=2x/5 → 2x/5+x=455.000 → 7x/5=455.000 → x=325.000

1.ª: **130.000 €** | 2.ª: **325.000 €**

Reparto 3

Capital: 1/3 herederos, 5/3·(1/5) hospital, 1/2 del resto para pobres, quedan 200.000 €.
Herederos=C/3; hospital=C/3; resto=C/3 → mitad resto=C/6 → C/6=200.000 → C=1.200.000 €

Capital: 1.200.000 €

5.6 — Fuentes y Obreros (Reducción a la Unidad)

Fracción llenada por fuente 1 en 1 h + fracción llenada por fuente 2 en 1 h = fracción llenada juntas en 1 h = 1/T

Fuentes 1

Grifo 1 llena en 3 h; grifo 2 en 2 h. Tiempo juntos.
1/3 + 1/2 = 1/T → 5/6 = 1/T → T = 6/5 h

1 hora 12 minutos

Fuentes 2

Juntos terminan en 17 h. Uno es el doble de rápido.
1/x + 2/x = 1/17 → 3/x=1/17 → x=51 h; rápido=25,5 h

Rápido: **25h 30min** | Lento: **51 horas**

5.7 — Problemas de Cinemática — Móviles

Cinemática 1

Velocidades en relación 4:3. El rápido llega 3 horas antes. Tiempos de cada uno.
$v_1=4v$, $v_2=3v$; distancia igual: $4v \cdot t_1=3v \cdot t_2 \rightarrow t_2=4t_1/3$; $t_2-t_1=3 \rightarrow t_1/3=3 \rightarrow t_1=9$ h; $t_2=12$ h

Rápido: **9 horas** | Lento: **12 horas**

Cinemática 2

Automóvil sale a 68 km/h. Tras 1¼ h sale otro; lo alcanza 5 h después. Velocidad del segundo.
Distancia 1.º en 6,25 h: 68·6,25=425 km. Vel 2.º: 425/5

85 km/h

Cinemática 3

2 ciudades a 600 km. Velocidades 56 y 64 km/h en sentidos contrarios. ¿Cuándo y dónde se encuentran?
56+64=120 km/h; t=600/120=5 h; Coche 1: 280 km; Coche 2: 320 km

A las **5 horas**, a 280 km del punto 1 y 320 km del punto 2

Cinemática 4

Norte a 6 km/h y Oeste a 8 km/h (perpendiculares). ¿Cuándo están a 5 km?
$d^2=(6t)^2+(8t)^2=100t^2 \rightarrow 10t=5 \rightarrow t=0{,}5$ h

30 minutos

5.8 — Problemas de Todo Tipo (1 al 28)

Prob. 1

Dos pares consecutivos, suma=102.
$x+(x+2)=102 \rightarrow x=50$

50 y 52

Prob. 2

Tres impares consecutivos, suma=69.
$x+(x+2)+(x+4)=69 \rightarrow x=21$

21, 23 y 25

Prob. 3

Dos pares consecutivos, suma=210.
$x+(x+2)=210 \rightarrow x=104$

104 y 106

Prob. 4

Suma=32; uno=séptima parte del otro.
$x+7x=32 \rightarrow x=4$

4 y 28

Prob. 5

Dos consecutivos, suma=107.
$x+(x+1)=107 \rightarrow x=53$

53 y 54

Prob. 6

Dos pares consecutivos, suma=54.
$x+(x+2)=54 \rightarrow x=26$

26 y 28

Prob. 7

Dos impares consecutivos, suma=36.
$x+(x+2)=36 \rightarrow x=17$

17 y 19

Prob. 8

Uno=triple del otro; suma=20.
$x+3x=20 \rightarrow x=5$

5 y 15

Prob. 9

Uno excede al otro en 6; suma=40.
$x+(x+6)=40 \rightarrow x=17$

17 y 23

Prob. 10

Uno=cuádruplo del otro; suma=125.
$x+4x=125 \rightarrow x=25$

25 y 100

Prob. 11

3 niños: 2.º=doble 1.º; 3.º=triple 2.º; total=18.
$x+2x+6x=18 \rightarrow x=2$

2, 4, 12 bombones

Prob. 12

Niñas=2·niños; adultos=niños/2; total=35.
$x+2x+x/2=35 \rightarrow x=10$

10 niños, 20 niñas, 5 adultos

Prob. 13

Niños=4·mujeres; hombres=3·(mujeres/2); total=91.
x+4x+3x/2=91→x=14

14M, 56N, 21H

Prob. 14

Hombres=4·mujeres; niños=mujeres/2; total=165.
x+4x+x/2=165→x=30

30M, 120H, 15N

Prob. 15

Fortuna: 1/2 esposa, 1/3 hijo, 1/8 sobrina, 180€ benéfica.
C(1-1/2-1/3-1/8)=180→C/24=180

4.320 €

Prob. 16

Autobús: mujeres=3·niños; hombres=2·(mujeres+niños); total=60.
x+3x+8x=60→x=5

5N, 15M, 40H

Prob. 17

Luis=Manuel+16; en 4 años Luis=doble de Manuel.
M+20=2M+8→M=12

Manuel: 12, Luis: 28 años

Prob. 18

Hermana=Juan+13; en 6 años=doble.
J+19=2J+12→J=7

Juan: 7, Hermana: 20 años

Prob. 19

Padre=hijo+25; en 5 años=doble.
H+30=2H+10→H=20

Hijo: 20, Padre: 45 años

Prob. 20

Ana=Pedro+7; hace 1 año Ana=doble de Pedro.
P+6=2P-2→P=8

Pedro: 8, Ana: 15 años

Prob. 21

María=Luis+30; en 7 años=triple.
L+37=3L+21→L=8

Luis: 8, María: 38 años

Prob. 22

Ana=padre-36; en 8 años padre=cuádruple.
A+44=4A+32→A=4

Ana: 4, Padre: 40 años

Prob. 23

Madre=Luis+26; en 3 años=triple.
L+29=3L+9→L=10

Luis: 10, Madre: 36 años

Prob. 24

Marisa=hijo+20; en 5 años=doble.
H+25=2H+10→H=15

Hijo: 15, Marisa: 35 años

Prob. 25

Diferencia=5 años; en 2 años mayor=doble del menor.
H2+7=2H2+4→H2=3

Menor: 3, Mayor: 8 años

Prob. 26

Padre-hijo=32 años; en 5 años padre=triple.
H+37=3H+15→H=11

Hijo: 11, Padre: 43 años

Prob. 27

Abuelo-nieto=48; hace 4 años abuelo=5·nieto.
N+44=5N-20→N=16

Nieto: 16, Abuelo: 64 años

Prob. 28


Rectángulo: perímetro=34m; base=altura+7.
2(b+h)=34;
b=h+7→2h+7=17→h=5

Base: 12m, Altura: 5m

UNIDAD 5 — CONTINUACIÓN

Sistemas de Ecuaciones

Sustitución · Igualación · Reducción



La solución de un sistema es el punto de intersección de las dos rectas que representan las ecuaciones.

5.9 — Métodos de Resolución de Sistemas

Método de Sustitución

1. Despejar una incógnita en una ecuación.
2. Sustituir en la otra ecuación.
3. Resolver la ecuación de una sola incógnita.
4. Hallar la segunda sustituyendo.

Método de Igualación

1. Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones.
2. Igualar las dos expresiones resultantes.
3. Resolver y sustituir.

Método de Reducción

1. Multiplicar ecuaciones para igualar (u oponer) coeficientes de una incógnita.
2. Sumar o restar miembro a miembro para eliminarla.
3. Resolver y sustituir.

Ejemplo completo por Sustitución:
Sistema: 3x + y = 11 y 5x - y = 13
De la 1.ª: y = 11 - 3x → sustituimos en la 2.ª: 5x - (11-3x) = 13 → 8x = 24 → x = 3 → y = 11-9 = 2
Solución: x = 3, y = 2

EJERCICIOS DE SISTEMAS:

Sist. 1

3x + y = 11 | 5x - y = 13

Reducción: sumando→8x=24→x=3; y=2

x=3, y=2

Sist. 2

2x + 3y = 12 | x - y = 1

Sustitución: x=1+y → 5y=10 → y=2; x=3

x=3, y=2

Sist. 3

4x - 2y = 6 | x + y = 3

Sustitución: x=3-y → 4(3-y)-2y=6 → y=1; x=2

x=2, y=1

Sist. 4

5x + 2y = 16 | 3x - y = 5

Igualación: y=5x-16/2=3x-5 → 5x-16=6x-10 → x=... y=3x-5-5=...

x=26/11, y=43/11

Sist. 5

x/2 + y/3 = 5 | x - y = 3

x=y+3 → (y+3)/2+y/3=5 → ×6: 5y=21 → y=21/5

x=36/5, y=21/5

Sist. 6

2x + y = 7 | x + 2y = 8

Igualación: y=7-2x=4-x/2 → x=2; y=3

x=2, y=3

Sist. 7

$$x + y = 5 \mid 2x - y = 1$$

Reducción: sumando→3x=6→x=2; y=3

x=2, y=3

Sist. 8

$$3x + 2y = 13 \mid x - y = -1$$

Sustitución: x=y-1 → 3(y-1)+2y=13 → 5y=16 → y=16/5

x=11/5, y=16/5

Sist. 9

$$4x - 3y = 5 \mid 2x + y = 9$$

Reducción (×3 a la 2.ª): 4x-3y=5; 6x+3y=27 → 10x=32 → x=16/5

x=16/5, y=13/5

Sist. 10

$$x + 2y = 8 \mid 3x - y = 3$$

×2 en la 2.ª: 6x-2y=6 → sumando: 7x=14→x=2; y=3

x=2, y=3

Sist. 11

$$5x + y = 12 \mid x + 3y = 4$$

×3 en la 1.ª: 15x+3y=36 → restando: 14x=32 → x=16/7

x=16/7, y=4/7

Sist. 12

$$2x - 3y = -1 \mid x + y = 3$$

x=3-y → 2(3-y)-3y=-1 → 6-5y=-1 → y=7/5

x=8/5, y=7/5

Sist. 13

$$x - y = 0 \mid x + y = 6$$

Reducción: 2x=6→x=3; y=3

x=3, y=3

Sist. 14

$$2x + y = 10 \mid x - 2y = 0$$

x=2y → 4y+y=10 → y=2; x=4

x=4, y=2

5.10 — Ecuaciones de Segundo Grado

DEFINICIÓN

Ecuación de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ (con } a \neq 0)$$

Fórmula General (Fórmula Cuadrática)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$: $\Delta>0$ → dos soluciones reales | $\Delta=0$ → solución doble | $\Delta<0$ → sin solución real

Ecuaciones Incompletas

$ax^2=0$: $x=0$ | **$ax^2+bx=0$**: $x(ax+b)=0 \rightarrow x=0$ o $x=-b/a$ | **$ax^2+c=0$**: $x=\pm\sqrt{-c/a}$

RESOLVER:

2.º 1

$$x(x - 1) = 0$$

Ya factorizada

$$x_1=0,\ x_2=1$$

2.º 2

$$x^2 - 2x = 0$$

$x(x-2)=0$

$$x_1=0,\ x_2=2$$

2.º 3

$x^2 - 4x = 0$

$x(x-4)=0$

$x_1=0,\ x_2=4$

2.º 4

$4x^2 - 16 = 0$

$x^2=4 \rightarrow x=\pm 2$

$x_1=2,\ x_2=-2$

2.º 5

$4x^2 + 16 = 0$

$x^2=-4 \rightarrow \Delta<0$

Sin solución real

2.º 6

$2x^2 - 8 = 0$

$x^2=4 \rightarrow x=\pm 2$

$x_1=2,\ x_2=-2$

2.º 7

$2x^2 + 4x = 0$

$2x(x+2)=0$

$x_1=0,\ x_2=-2$

2.º 8

$x^2 - 5x + 6 = 0$

$\Delta=25-24=1;\ x=(5\pm 1)/2$

$x_1=3,\ x_2=2$

2.º 9

$x^2 + x - 6 = 0$

$\Delta=1+24=25;\ x=(-1\pm 5)/2$

$x_1=2,\ x_2=-3$

2.º 10

$2x^2 + 2x - 12 = 0$

$\div 2$: $x^2+x-6=0 \rightarrow$ igual al 9

$x_1=2,\ x_2=-3$

2.º 11

$-2x^2 - 2x + 4 = 0$

×(-1)÷2: $x^2+x-2=0$; $\Delta=9$; $x=(-1\pm3)/2$

$x_1=1,\ x_2=-2$

2.º 12

$3x^2 - 9x - 12 = 0$

÷3: $x^2-3x-4=0$; $\Delta=25$; $x=(3\pm5)/2$

$x_1=4,\ x_2=-1$

2.º 13

$x^2 + x + 1 = 0$

$\Delta=1-4=-3 < 0$

Sin solución real

2.º 14

$x^2 + 5x + 6 = 0$

$\Delta=25-24=1$; $x=(-5\pm1)/2$

$x_1=-2,\ x_2=-3$

2.º 15

$2x^2 + 10x + 12 = 0$

÷2: $x^2+5x+6=0$ → igual al 14

$x_1=-2,\ x_2=-3$

2.º 16

$x^2 - 2x - 3 = 0$

$\Delta=4+12=16$; $x=(2\pm4)/2$

$x_1=3,\ x_2=-1$

5.11 — Representación Gráfica de Ecuaciones Lineales

Procedimiento

1. Despejar y en función de x.
2. Calcular pares (x,y): se recomienda hallar los interceptos con los ejes.
3. Construir tabla de valores y representar los puntos en el plano cartesiano.
4. Unir mediante una línea recta.

Toda ecuación de primer grado con dos variables representa una línea recta en el plano.

Graf. 1

$$y = 2x + 1$$

x	-2	0	2
y	-3	1	5

Pendiente m=2 | Intercepto y: (0,1) | Intercepto x: (-0,5 ; 0)

Graf. 2 — Intersección

Hallar la intersección de y=2x-1 e y=-x+8


Igualar: 2x-1=-x+8 → 3x=9 → x=3; y=5

Intersección: **P(3, 5)**

UNIDAD 6

Magnitudes Proporcionales

Directa · Inversa · Compuesta · IVA · Repartos · Interés Simple



En la proporcionalidad directa: a más cantidad, más precio. La razón entre ambas magnitudes permanece constante.

6.1 — Magnitudes Directamente Proporcionales

DEFINICIÓN

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** cuando al multiplicar (o dividir) una por un número, la otra queda multiplicada (o dividida) por ese mismo número.
Relación: **A más → más; A menos → menos.**
Se cumple: a/a' = b/b' = c/c' = k (constante de proporcionalidad).

Regla de Tres Simple Directa

$$x = (valor_1 \cdot valor_3) / valor_2$$

Ej. 1

En 50 litros de agua de mar hay 1.300 g de sal. ¿Cuántos litros contendrán 5.200 g?

```
50 litros ——— 1.300 g
x litros ——— 5.200 g
————————————————————
x = 50 · 5.200 / 1.300 = 200 litros
```

200 litros

Ej. 2

Un grifo suministra 250 litros en 8 minutos. ¿Cuánto tardará en llenar un depósito de 5.500 litros?

```
8 min ——— 250 litros
x min ——— 5.500 litros
————————————————————
x = 8 · 5.500 / 250 = 176 minutos
```

176 minutos

6.2 — Magnitudes Inversamente Proporcionales

DEFINICIÓN

Dos magnitudes son **inversamente proporcionales** cuando al multiplicar una por un número, la otra queda dividida por ese mismo número.
Relación: **A más → menos; A menos → más.**
Se cumple: a·a' = b·b' = k (el producto es constante).

Regla de Tres Simple Inversa

$$x = (valor_1 \cdot valor_2) \,/\, valor_3$$

Ej. 3

220 vacas tienen pienso para 45 días. ¿Cuántos días durará para 450 vacas?

```
220 vacas ——— 45 días (a más vacas → menos días: INVERSA)
450 vacas ——— x días
————————————————————————
x = 220 · 45 / 450 = 22 días
```

22 días

Ej. 4

8 toneles de 200 litros envasan cierta cantidad de vino. Con 32 toneles, ¿qué capacidad necesitan?

```
8 toneles ——— 200 litros (INVERSA)
32 toneles ——— x litros
————————————————————————
x = 8 · 200 / 32 = 50 litros
```

50 litros por tonel

6.3 — Proporcionalidad Compuesta (Regla de Tres Compuesta)

Ej. 5

5 máquinas llenan 7.200 envases en 6 horas. ¿Cuántos llenarán 7 máquinas en 8 horas?

Máquinas (directa)	Horas (directa)	Envases
5	6	7.200
7	8	x

```
x = 7.200 · (7/5) · (8/6) = 7.200 · 1,4 · 1,333 = 13.440 envases
```

13.440 envases

Ej. 6

4 chicos en 10 días gastaron 25.000 ptas en comida. ¿Cuánto gastarán 6 chicos en 15 días?

```
Reducción a la unidad:
1 chico en 10 días → 25.000/4 = 6.250 ptas
1 chico en 1 día → 6.250/10 = 625 ptas
6 chicos en 1 día → 625·6 = 3.750 ptas
6 chicos en 15 días → 3.750·15 = 56.250 ptas
```

56.250 pesetas

6.4 — IVA · Repartos Proporcionales · Interés Simple

IVA

Tipo	Fórmula	Ejemplo
Precio con IVA	P_IVA = P · (1 + r/100)	12€ + 7%: 12·1,07 = 12,84€
Precio sin IVA	P = P_IVA / (1 + r/100)	235€ con 16%: 235/1,16 = 202,59€
Calcular % IVA	r = (P_IVA/P - 1)·100	17,4/15=1,16 → 16%

Interés Simple

Tiempo	Fórmula
En años (t)	**i = C · r · t / 100**
En meses (t)	**i = C · r · t / 1.200**
En días (t)	**i = C · r · t / 36.000**

C=Capital | r=rédito (%) | t=tiempo | i=interés generado

6.5 — Problemas de Magnitudes Proporcionales (1 al 16)

Prob. 1

Ganadero: forraje para 14 semanas. Tras vender 60 animales, dura 20 semanas. ¿Cuántos quedan?
$N_1 \cdot 14 = N_2 \cdot 20$; $N_1 - N_2 = 60 \rightarrow 6N_1/20 = 60 \rightarrow N_1 = 200 \rightarrow N_2 = 140$

140 bueyes

Prob. 2

Ciclista a 16 km/h tarda 2h 20min=140 min. ¿Tiempo a 22 km/h?
$d = 16 \cdot (7/3) = 112/3$ km; $t = d/22 = 112/(3 \cdot 22) \approx 1{,}697$ h≈1h 41min

≈ 1 hora 42 minutos

Prob. 3

Socios invierten 3.000.000 y 5.500.000 ptas. Reparto de 2.460.000 ptas proporcional.
Total=8.500.000; 1.º: $2.460.000 \cdot (3/8{,}5) = 867.059$; 2.º: $2.460.000 \cdot (5{,}5/8{,}5) = 1.592.941$

1.º: 867.059 · 2.º: 1.592.941 ptas

Prob. 4

Señora camina 5h/día durante 4 días → 68 km. ¿Cuánto si camina 7h/día durante 5 días?
$v = 68/(5 \cdot 4) = 3{,}4$ km/h → $3{,}4 \cdot 7 \cdot 5 = 119$ km

119 kilómetros

Prob. 5

20 turistas durante 7 días → 196.000 ptas. ¿Cuánto para 150 turistas en 15 días?
$196.000/(20 \cdot 7) = 1.400$ ptas/turista·día → $1.400 \cdot 150 \cdot 15 = 3.150.000$ ptas

3.150.000 pesetas

Prob. 6

Presupuesto comida: 2.000.000 ptas durante 10 días. ¿A cuántos turistas?
$N = 2.000.000/(1.400 \cdot 10) = 142{,}8 \rightarrow 142$ turistas

142 turistas

Prob. 7

María (198.000) y Lucas (164.000 ptas). Prima=80.000 ptas proporcional.
Total=362.000; M: $80.000 \cdot 198/362 = 43.756$; L: $80.000 \cdot 164/362 = 36.243$

María: 43.756 · Lucas: 36.243 ptas

Prob. 8

3 amigos pusieron 150, 230 y 450 ptas. Premio=6.000.000 ptas proporcional.
Total=830; 1.º: $6M \cdot 150/830 = 1.084.337$; 2.º: 1.662.651; 3.º: 3.253.012

1.084.337 / 1.662.651 / 3.253.012 ptas

Prob. 9

55.000 ptas entre 3 primeros puestos, proporcional al puesto (1, 2, 3 partes). Total=6 partes; 1.º=55.000/6=9.167; 2.º=18.333; 3.º=27.500

9.167 / 18.333 / 27.500 ptas

Prob. 10

10 excavadoras hacen un túnel de 5×4 en 7 días → x metros. Con 7 excavadoras en 7 días, sección 6×5, ¿cuántos metros? Relación directa en máquinas e inversa en sección: $x_2=x_1\cdot(7/10)\cdot(5\cdot4)/(6\cdot5) = x_1\cdot28/60\approx0{,}467x_1$

La longitud se reduce (≈46,7% de la original)

Prob. 11

Pájaro: 15.000 km en 20 días a 9 h/día. ¿Cuántos días para 2.000 km a 12 h/día? v=15.000/(20·9)=83,33 km/h → t=2.000/(12·83,33)=2 días. ¿Km si vuela 8 días a 16 h/día?→ 83,33·16·8=10.667 km

2 días · 10.667 km

Prob. 12

600m × 24m → 36.000 adoquines. ¿Para 500m × 30m? 36.000/(600·24)=2,5 adoquines/m^2 → 500·30·2,5=37.500

37.500 adoquines

Prob. 13

90 obreros, 80 días → muralla 120×2. ¿Obreros para 150×3 en 60 días? N=90·80·(120·2)/(60·150·3)=90·80·240/(27.000)=64

64 obreros

Prob. 14

Buey con cuerda de 6m tarda 6,5 días en consumir hierba de área $\pi\cdot r^2$. Si cuerda=8m, ¿cuánto tarda? Área$\propto r^2$: $t_2=6{,}5\cdot(64/36)=6{,}5\cdot16/9\approx11{,}56$ días

≈ 11 días 13 horas

Prob. 15

Premio 13.000.000 ptas entre 3 porteros inversamente proporcional a goles recibidos (36, 43, 70).
Partes inversas: 1/36, 1/43, 1/70. Suma inversa≈0,0694. Cada uno: 13M·(1/goles)/suma

1.º(36g): ≈5.170.000 · 2.º(43g): ≈4.330.000 · 3.º(70g): ≈2.657.000 ptas

Prob. 16


Reparte 2.280.000 ptas: 2.ª=cuarta parte de 3.ª; 3.ª=triple de 1.ª.
1.ª=x; 3.ª=3x; 2.ª=3x/4 → x+3x/4+3x=2.280.000 → 19x/4=2.280.000 → x=480.000

1.ª: 480.000 · 2.ª: 360.000 · 3.ª: 1.440.000 ptas

UNIDAD 7

Semejanzas — Teorema de Thales

Proporcionalidad de segmentos · Semejanza de triángulos



El Teorema de Thales: rectas paralelas dividen a las transversales en segmentos proporcionales.

7.1 — Teorema de Thales

ENUNCIADO

Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son **proporcionales** a los segmentos correspondientes en la otra.

$$AB/A'B' = BC/B'C' = AC/A'C'$$

EJERCICIOS DE THALES:

Thales 1

Rectas a, b, c paralelas. AB=6, BC=9, A'B'=4. Halla B'C'.

Por Thales: AB/A'B' = BC/B'C' → 6/4 = 9/x → x = 9·4/6 = 6

B'C' = 6 unidades

Thales 2

En una recta: AB=3, BC=5, CD=4. En la paralela: A'B'=6. Halla B'C' y C'D'.

Razón k = A'B'/AB = 6/3 = 2 → B'C'=10, C'D'=8

B'C'=10, C'D'=8

Thales 3

Dos rectas se cortan por paralelas creando: AB=4, BC=6 en la 1.ª recta; A'B'=2 en la 2.ª. ¿Es c paralela a a y b?

Si AB/A'B' = BC/B'C' → 4/2 = 6/B'C' → B'C'=3. Comprueba con CD: si cumple la proporción → c es paralela.

Si B'C'=3 cumple la proporción: **c es paralela a a y b** ✓

7.2 — Teorema de Thales en el Triángulo

TEOREMA

En el triángulo ABC, si se traza B'C' paralelo a BC, el triángulo AB'C' es semejante a ABC:

$$AB'/AB = AC'/AC = B'C'/BC$$

Thales 4

Triángulo ABC: AB=10, AC=8, BC=12. Se traza B'C'∥BC con AB'=6. Hallar B'C' y AC'.

Razón: AB'/AB = 6/10 = 0,6 → B'C'=12·0,6=7,2 | AC'=8·0,6=4,8

B'C'=7,2 | AC'=4,8

7.3 — Aplicación: Altura de un Edificio por Sombras

Thales 5

Un edificio proyecta una sombra de 6,5 m a la misma hora que un poste de 4,5 m da una sombra de 0,90 m. Calcula la altura del edificio.

Los triángulos formados por los rayos del sol son semejantes (mismo ángulo solar). poste/sombra poste = edificio/sombra edificio → 4,5/0,9 = h/6,5


```
4,5 m (poste) ——— 0,90 m (sombra)
h m (edif.) ——— 6,50 m (sombra)
————————————————————————
h = 4,5 · 6,5 / 0,9 = 32,5 m
```

Altura del edificio: 32,5 metros

UNIDAD 8

Triángulos — Teorema de Pitágoras

Clasificación · Líneas notables · Teorema de Pitágoras



En todo triángulo rectángulo: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos ($a^2+b^2=c^2$).

8.1 — Clasificación de Triángulos

Por sus Lados

Equilátero: tres lados iguales.
Isósceles: dos lados iguales.
Escaleno: tres lados desiguales.

Por sus Ángulos

Acutángulo: tres ángulos agudos (<90°).
Rectángulo: un ángulo de 90°. Catetos (lados menores) e hipotenusa (lado mayor).
Obtusángulo: un ángulo obtuso (>90°).

Propiedades Fundamentales

1. Un lado es **menor** que la suma de los otros dos y **mayor** que su diferencia.
2. La suma de los **ángulos interiores = 180°**.
3. Un ángulo exterior = suma de los dos ángulos interiores no adyacentes.

8.2 — Líneas Notables del Triángulo

Línea notable	Definición	Punto de concurrencia
Altura	Perpendicular desde un vértice al lado opuesto	**Ortocentro**
Mediana	Une el punto medio de un lado con el vértice opuesto	**Baricentro**
Mediatriz	Perpendicular a un lado por su punto medio	**Circuncentro**
Bisectriz	Divide un ángulo interior en dos partes iguales	**Incentro**

8.3 — Teorema de Pitágoras

ENUNCIADO

En un triángulo rectángulo, el **cuadrado de la hipotenusa** es igual a la **suma de los cuadrados de los catetos**:

$$c^2 = a^2 + b^2 \implies c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

Donde c=hipotenusa y a, b=catetos.

EJERCICIOS BÁSICOS — CALCULA LOS DATOS QUE FALTAN:

Pit. 1

Hipotenusa a=13, cateto m=5. Hallar n.

$a^2=m^2+n^2 \rightarrow 169=25+n^2 \rightarrow n^2=144 \rightarrow n=12$

n = 12

Pit. 2

Catetos b=12 y n=5. Hallar hipotenusa a.

$a^2=144+25=169 \rightarrow a=13$

a = 13

Pit. 3

Catetos m=9 y n=11. Hallar hipotenusa.

$c^2=81+121=202 \rightarrow c=\sqrt{202}\approx 14{,}21$

c ≈ 14,21

Pit. 4

a=16, b=12, c=8. ¿Es triángulo rectángulo?

$12^2+8^2=144+64=208 \neq 16^2=256 \rightarrow$ NO

No es triángulo rectángulo

Pit. 5

Hipotenusa b=10, cateto n=7. Hallar m.


$m^2=100-49=51 \rightarrow m=\sqrt{51}\approx 7{,}14$

m ≈ 7,14

UNIDAD 9

Áreas y Volúmenes de Cuerpos Geométricos

Poliedros · Cuerpos de revolución · Conversiones de unidades



Los principales cuerpos geométricos con sus fórmulas de área y volumen.

9.1 — Tetraedro, Cubo y Ortoedro

Cuerpo	Área Total	Volumen
Tetraedro regular (lado a)	$A = a^2 \cdot \sqrt{3}$	$V = a^3 \cdot \sqrt{2} / 12$
Cubo (lado a)	$A = 6a^2$	$V = a^3$
Ortoedro (l, a, h)	$A = 2(la + lh + ah)$	$V = l \cdot a \cdot h$

9.2 — Prisma, Pirámide, Cilindro, Cono y Esfera

Cuerpo	Área Total	Volumen
Prisma (B=área base, h, p=perímetro base)	$A = 2B + p \cdot h$	$V = B \cdot h$
Pirámide (B, h, a=apotema, p)	$A = B + p \cdot a/2$	$V = B \cdot h/3$
Cilindro (r, h)	$A = 2\pi r(r+h)$	$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$
Cono (r, h, g=generatriz)	$A = \pi r(r+g)$	$V = \pi \cdot r^2 \cdot h/3$
Esfera (r)	$A = 4\pi r^2$	$V = (4/3) \cdot \pi \cdot r^3$

RELACIÓN CAPACIDAD — VOLUMEN — MASA DE AGUA

Capacidad	Volumen	Masa (agua)
1 kl	1 m^3	1 tonelada
1 litro	1 dm^3	1 kg
1 ml	1 cm^3	1 g

9.3 — Unidades de Volumen — Conversiones

Unidad	Símbolo	Equivalencia en m^3
Kilómetro cúbico	km^3	1.000.000.000 m^3
Hectómetro cúbico	hm^3	1.000.000 m^3
Decámetro cúbico	dam^3	1.000 m^3
Metro cúbico	**m^3**	**1 m^3**
Decímetro cúbico	dm^3	0,001 m^3
Centímetro cúbico	cm^3	0,000001 m^3
Milímetro cúbico	mm^3	0,000000001 m^3

Cada unidad vale **1.000 veces** más que la inmediatamente inferior. Para convertir: multiplica o divide por potencias de 1.000.

CONVERTIR A METROS CÚBICOS:

C.1

$4{,}5\ dam^3 = ?$

×1.000

4.500 m^3

C.2

$12{,}8\ hm^3 = ?$

×1.000.000

12.800.000 m^3

C.3

$0{,}014\ km^3 = ?$

×10^9

14.000.000 m^3

C.4

1,16 hm³ = ?

1.160.000 m³

C.5

0,03 dam³ = ?

30 m³

C.6

1,004 km³ = ?

1.004.000.000 m³

C.7

3,28 km³ = ?

3.280.000.000 m³

C.8

42,7 hm³ = ?

42.700.000 m³

C.9

7,01 cm³ = ?

÷1.000.000

0,00000701 m³

9.4 — Resumen: Figuras Planas y sus Áreas

Figura	Descripción	Fórmula del Área
Triángulo	3 lados; suma de ángulos=180°	A = (base · altura) / 2
Cuadrado	4 lados iguales; 4 ángulos de 90°	A = lado²
Rectángulo	Lados iguales dos a dos; 4 ángulos de 90°	A = base · altura
Rombo	4 lados iguales; diagonales perpendiculares	A = (D·d) / 2
Trapecio	Un par de lados paralelos	A = (B+b)·h / 2
Paralelogramo	Dos pares de lados paralelos	A = base · altura
Pentágono regular	5 lados y 5 ángulos iguales	A = (perímetro · apotema) / 2
Hexágono regular	6 lados y 6 ángulos iguales	A = (perímetro · apotema) / 2
Polígono regular (n lados)	Todos lados y ángulos iguales	A = (n · lado · apotema) / 2
Círculo	Limitado por la circunferencia	A = π · r²

«La matemática es el lenguaje en que Dios escribió el Universo.»


— Galileo Galilei (1564–1642)

Matemáticas · 2.º ESO · Cuaderno de Ejercicios · Ladislao Jáñez Blanco · Curso 2016/2017

Edición Matemática Completa

Documento de 87 páginas + Resoluciones

"La matemática es el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo."
— **Ladislao Jáñez Blanco**





1 de abril de 2026

Presentación

Este PDF integra dos partes:

- **Parte I**: reproducción íntegra y editada de las **87 páginas** del material original.
- **Parte II**: resolución rigurosa, paso a paso, de ejercicios propuestos seleccionados del documento.

Índice general

I Edición matemática íntegra de las 87 páginas **1**

1. Documento completo con diseño matemático **3**

II Ejercicios propuestos resueltos **91**

2. Números enteros, fracciones y divisibilidad **93**
2.1. Ejercicio 1 . . . 93
2.2. Ejercicio 2 . . . 93
2.3. Ejercicio 3 . . . 93
2.4. Ejercicio 4 . . . 94
2.5. Ejercicio 5 . . . 94
2.6. Ejercicio 6 . . . 94
2.7. Ejercicio 7 . . . 94
2.8. Ejercicio 8 . . . 95
2.9. Ejercicio 9 . . . 95
2.10. Ejercicio 10 . . . 95
2.11. Ejercicio 11 . . . 95
2.12. Ejercicio 12 . . . 96
2.13. Ejercicio 13 (Divisibilidad) . . . 96
2.14. Ejercicio 14 (MCD de 32 y 36) . . . 96
2.15. Ejercicio 15 (m.c.m. de 3,12,18) . . . 96
2.16. Ejercicio 16 (MCD de 1830 y 1170) . . . 97
2.17. Ejercicio 17 (MCD de 720,240,360,480) . . . 97
2.18. Ejercicio 18 (MCD de 84,270,330) . . . 97
2.19. Ejercicio 19 (MCD de 160 y 168) . . . 98
2.20. Ejercicio 20 (m.c.m. de 10,8,9,15) . . . 98

3. Ilustraciones matemáticas de apoyo **99**
3.1. Recta numérica y fracciones . . . 99
3.2. Geometría elemental . . . 99

Comprobación de índice e hipervínculos **101**

Parte I

Edición matemática íntegra de las 87 páginas

Capítulo 1

Documento completo con diseño matemático

Junta de Castilla y León

CURSO 2016/17. Matemáticas. 2º E.S.O.


IES Tovar Antonio Centro bilingüe

1ª EVALUACION

CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS

- **Reales (R)**
  - **Racionales: (Q)** a/b
    - **Enteros (Z)**
      - **Naturales: (N) = {0, 1, 2, 3, ...}**
      - **N ⊂ Z⁻ = {0}**
      - **Negativos: (Z⁻) = {0, –1, –2, ...}**
    - **Fraccionarios**
      - **Decimal exacto:** 0.5 = 1/2
      - **Periódico puro:** 2.33333333... = 7/3
      - **Periódico mixto:** 2.34444444... = 211/90
  - **Irracionales: (I)** ~~a/b~~ — **Tiene infinitas cifras decimales NO periódicas**. **Ejemplos:** □□, e, □, √2
- **Imaginarios: (C)** √□□

BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LOS NÚMEROS



La noción de número es tan primitiva como el propio hombre. Los hombres primitivos utilizaban los dedos, muescas en huesos... para expresar cantidades: un mamut, una luna, un sol... empleando los **NÚMEROS NATURALES.**

Los babilonios (2100 a. C.) poseían una organización administrativa contable muy compleja, lo que motivó un desarrollo importante en los sistemas numéricos. Tenían un sistema de numeración base 60 perfectamente maduro. En él destacaba el valor posicional de las cifras, como en la actualidad. No utilizaban el cero, sino que dejaban un espacio en blanco, lo que inducía en muchas ocasiones a error; más adelante ya introdujeron un nuevo símbolo, parecido a una trompeta, que sustituía al espacio vacío y que podríamos considerar como cero.

A continuación, civilizaciones como la egipcia (2000 a. C.), empezaron a utilizar expresiones que representaban las fracciones, apareciendo así los **NÚMEROS FRACCIONARIOS**, eso sí, muy básicos y generalmente con el 1 como numerador.

En el siglo V a. C. los griegos encontraron otro tipo de números que eran la solución de determinadas ecuaciones y que no tenían fin, eran algo se le escapaba al razonamiento humano, eran los **NÚMEROS IRRACIONALES**.

Hubo que esperar al siglo XVII para empezar a considerar los **NÚMEROS NEGATIVOS.** El propio Descartes denominaba soluciones falsas a las raíces negativas de una ecuación, aunque es cierto que civilizaciones como la China parece que ya los conocían, colocando bolas rojas en los ábacos, simbolizando a los números negativos (de ahí que muchas veces oímos la expresión de números rojos).

La aparición de soluciones como "raíz cuadrada de menos cuatro" no podían ser interpretadas de ninguna manera. Hubo que esperar al siglo XIX, cuando ya se le empezó a dar una fundamentación teórica y a representarlo gráficamente, momento en el que se comenzó a hablar de números imaginarios.

UNIDAD 1. Los números enteros

Conceptos

Números enteros. Valor absoluto.
Suma y resta de números enteros. Aplicaciones.
Multiplicación y división exacta de números enteros. Aplicaciones.
Operaciones combinadas con números enteros sin paréntesis y con paréntesis.
Múltiplos de un número.
Divisores de un número.
Números primos y compuestos.
Máximo común divisor.
Mínimo común múltiplo.

LOS NÚMEROS ENTEROS

Un número entero está formado por un signo (+ o -) que indica si es positivo o negativo, y un número que sigue al signo y que representa su valor absoluto.

VALOR ABSOLUTO DE UN NÚMERO. Es valor de dicho número prescindiendo del signo.

ENTEROS OPUESTOS. Dos números son enteros opuestos si tienen el mismo valor absoluto pero distinto signo.

SUMA Y RESTA DE NÚMEROS ENTEROS.

Para sumar dos números enteros del mismo signo, se suman sus valores absolutos y se pone el mismo signo que tienen los sumandos.

$$5 + 3 = 8 \qquad -4 + (-3) = -7$$

Para sumar dos números enteros de distinto signo, se restan sus valores absolutos (al mayor se le resta el menor), y se pone el signo del sumando que tiene mayor valor absoluto.

$$-6 + 4 = -2$$

Para sumar varios números enteros de distinto signo, se suman separadamente los enteros positivos y los negativos; después se suman el entero positivo y el negativo obtenidos.

$$5 + (-8) + (-3) + 4 = 9 + (-11) = -2$$

Para restar dos números enteros, se suma al minuendo el opuesto del sustraendo.

$$8 - 3 = 8 + (-3) = 5$$

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN EXACTA DE NÚMEROS ENTEROS.

Para calcular el **producto de dos números enteros**: se calcula el producto de los valores absolutos de los factores, y al resultado obtenido se le pone el signo + si los dos factores tienen el mismo signo, y el signo – si los factores tienen signo distinto.

Regla de los signos de la multiplicación:

Para calcular el **cociente de dos números enteros**: se halla el cociente de sus valores absolutos, y al resultado obtenido se le pone el signo + si los dos enteros tienen el mismo signo, y el signo – si los dos enteros tienen distinto signo.

Regla de los signos de la división:

OPERACIONES COMBINADAS CON NÚMEROS ENTEROS.

* Para realizar operaciones con números enteros en las que **no haya paréntesis**, se sigue este orden:

1º Se hacen las multiplicaciones y las divisiones.

2º Se hacen las sumas y las restas.

* Para realizar una serie de operaciones con números enteros **en las que haya paréntesis** , se sigue este orden:
1º Se resuelven los paréntesis incluidos en cada corchete.
2º Se resuelven los corchetes.
3º Se hacen las multiplicaciones y las divisiones.
4º Se hacen las sumas y las restas.1.- Asocia un número, positivo o negativo, a cada uno de los siguientes enunciados:

a) María está en el octavo piso.

b) Miguel se encuentra en el tercer sótano.

c) Tengo en el banco 535 €.

d) El termómetro marca 19 ºC sobre cero.

e) Debo 5 € a un amigo.

f) El termómetro marca 2 ºC bajo cero.

g) Tengo una moneda de 2 €.

2.- Ordena los siguientes números y represéntalos en la recta numérica:

-8, +6, -1, +8, +3, -2, -5, +4, -12

3.- Efectúa las siguientes operaciones indicadas:

$a)\ 2\cdot 7-6\cdot 1+9\cdot 3-3$ $b)\ 6\cdot 4+5\cdot 2-12:3-8$

$c)\ 8+6:2-14:2+5$ $d)\ 10+5+7-24:6-8+9$

4.- Efectúa las operaciones combinadas:

$a)\ 3+6\cdot 3-5+6:2$ $b)\ 3+6\cdot(3-5)+6:2$

$c)\ 4-5\cdot 6-8:4-2+3\cdot 5:3$ $d)\ 4-5\cdot(6-8):(4-2)+3\cdot 5:3$

$e)\ 7-2\cdot 5+7\cdot 3-2\cdot 4-3\cdot 4$ $f)\ 7-2\cdot(5+7\cdot 3)-(2\cdot 4-3)\cdot 4$

$g)\ 4+3\cdot 2-5:5$ $h)\ 2\cdot(-3)\cdot(-2)-(-4)\cdot 3\cdot(-1)-3(2+5-4\cdot 3)$

5.- Un depósito de agua contiene 200 litros. Virginia saca 20 litros y Borja 32 litros. Más tarde Juan echa 14 litros. ¿Cuántos litros de agua quedan en el depósito?

6.- Calcula:

$a)\ \frac{2}{7}\ de\ 735$ $b)\ \frac{5}{13}\ de\ 104$ $c)\ \frac{5}{6}\ de\ 498$

$d)\ \frac{3}{8}\ de\ 1160$ $e)\ \frac{4}{9}\ de\ 153$ $f)\ \frac{7}{11}\ de\ 1650$

7.- Escribe tres fracciones equivalentes en cada caso:

$a)\ \frac{2}{3}$ $b)\ \frac{3}{5}$ $c)\ \frac{4}{8}$

8.- Simplifica:

$a)\ \frac{4}{8}$ $b)\ \frac{6}{8}$ $c)\ \frac{7}{21}$ $d)\ \frac{6}{18}$

$e)\ \frac{15}{25}$ $f)\ \frac{12}{16}$ $g)\ \frac{18}{27}$ $h)\ \frac{25}{75}$

9.- Reduce a común denominador y ordena:

$a)\ \frac{3}{4},\frac{1}{2},\frac{5}{8}$ $b)\ \frac{1}{2},\frac{3}{5},\frac{7}{10}$

$c)\ \frac{3}{4},\frac{4}{5},\frac{7}{10}$ $d)\ \frac{7}{2},\frac{8}{3},\frac{9}{5}$

10.- Calcula:

$a)\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}$ $b)\ 1-\frac{1}{2}$ $c)\ \frac{1}{2}+\frac{1}{4}$

$d)\ \frac{3}{4}-\frac{1}{2}$ $e)\ 2-\frac{3}{7}$ $f)\ \frac{5}{3}-1$

11.- Calcula y simplifica:

$a)\ 3\cdot\frac{1}{6}$ $b)\ 5\cdot\frac{3}{10}$ $c)\ \frac{2}{3}\cdot 6$ $d)\ 5\cdot\frac{4}{15}$

$e)\ \frac{3}{5}\cdot 10$ $f)\ \frac{3}{8}\cdot 2$ $g)\ 1:\frac{3}{4}$ $h)\ 1:\frac{5}{7}$

$i)\ \frac{1}{5}:2$ $j)\ 4:\frac{2}{3}$ $k)\ 2:\frac{4}{3}$ $l)\ \frac{3}{5}:6$

12.- En una clase de 20 alumnos y alumnas, 2/5 son chicos. ¿Cuántas son las chicas?

13.- En una población, el 20% de las personas está en el paro. ¿Qué fracción de la población no tiene trabajo?

14.- Rafael tenía 50€ y se ha gastado 20€. ¿Qué fracción le queda de lo que tenía?

Expresa las siguientes situaciones con números enteros:

Una temperatura de 10º bajo cero — Estar a 2560 m de altitud

Deber 450 € — Estar sumergido a 20 m.

Representa en la recta numérica los números enteros desde -10 hasta +10.:

Ordena de menor a mayor las siguientes series de números enteros:

4, -8, 0, -7, 1, 3, -1 — -9, -16, 4, 25, -15, -2)

Calcula los productos y cocientes:

(+24) : (-4)= — (+9) · (-3) =

(+9) : (-3) =
(-10) · (-5) =
(-10) : (-5) =
(+8) · (+7) =
42 : (-7) =
(-30) : 6 =
5 · (-6) · (-2) =

La temperatura en la cima del Mulhacén a las 5 de la mañana era de -2ºC. Tras la salida del Sol experimentó una subida de 10ºC, pero un temporal repentino hizo que descendiera 14ºC. Cuando remitió la temperatura subió 9ºC. ¿ Cuál era la temperatura cuando amainó el temporal? Exprésalo mediante una única operación con sumas y restas

MÚLTIPLOS Y DIVISORES – DIVISIBILIDAD – M.C.D. y M.C.M.

Múltiplos de un número

Un número es múltiplo de otro si se obtiene multiplicando este último por un número natural.

Por ejemplo, si multiplicamos 9x2 nos da 18. Decimos entonces que 18 es múltiplo de 9.

Divisor de un número

Un número es divisor de otro si cuando dividimos el segundo entre el primero, el resto de la división es 0.

Por ejemplo, decimos que 5 es divisor de 10 porque al dividir 10 entre 5 la división es exacta; da 2 y queda de resto 0.

Números primos y compuestos

Un número es primo si tiene solamente dos divisores: él mismo y la unidad. Es decir, que sólo se puede dividir (dando una división exacta) por ese mismo número y por uno.

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

- Un número es divisible por 2 cuando es par o termina en 0, 2, 4, 6, ó 8.
- Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 3.
- Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimos dígitos son ceros o forman un múltiplo de 4.
- Un número es divisible por 5 cuando termian en 0 ó en 5.
- Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y 3 a la vez.
- Un número es divisible por 8 cuando sus tres últimos dígitos son ceros o forman un múltiplo de 8.
- Un número es divisible por 9 cuando la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9.
- Un número es divisible por 10 cuando termina en 0.
- Un número es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de los valores absolutos de sus cifras de lugar impar y la suma de los valores absolutos de sus cifras de lugar par, de derecha a izquierda, es cero o múltiplo de 11.
- Un número es divisible por 25 cuando sus dos últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 25.
- Un número es divisible por 125 cuando sus tres últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 125.

EJERCICIOS

1.- Calcula 4 múltiplos de cada uno de las siguientes cifras:

3,
8 ,
2,
10,
15

2- Define qué es un número primo. Escribe 5 números primos.

3- Define qué es un número compuesto. Escribe 5 números compuestos.

Los criterios de divisibilidad nos sirven para saber si un número se puede dividir por otro. Sabiendo esto, señala porqué números son divisibles las siguientes cantidades:

Ejemplo: 24;es divisible por 1, 24, 2, 3, 4 ,8,6 y 12

35. 23
120. 98
66. 18
75. 76
49 300
63 102

4- Escribe todos los divisores de cada unos de los siguientes números;

12 400
20 17
14 9
30 36
45 44
60 96
34 432
75 60
225 300

5- Descompón estos números en factores primos.

15. 84
18. 124
42 95
55 35
70 100
26 26

6 Calcula el M.C.D. y el M.C.M. de los siguientes números:

4 y 6, 72 y 84
20 y 30 90 y 120
4 y 8 24 y 50
12 y 24

7- Descompón estos números en factores primos.

125 63
8 1732
242 428
12 38
27 350
125 180

8- Calcula el M.C.D. y el M.C.M. de los siguientes números (por el algoritmo de Euclides9

48 y 52 75 y 36
12 y 20 63 y 27
24 y 18 14 y 56
45 y 144 33 y 110

¿CUÁNTO SABES?

1.- Calcula 4 múltiplos de cada uno de las siguientes cifras:
7 6 35 98 100 87
2.- Escribe 3 divisores de cada uno de los siguientes números:
88 124
600 874
96 950

3.- Define qué es un número primo. Escribe 5 números primos.
4.- Define qué es un número compuesto. Escribe 5 números compuestos.
5.- Los criterios de divisibilidad nos sirven para saber si un número se puede dividir por otro. Sabiendo esto, señala porqué números son divisibles las siguientes cantidades:
12: es divisible por 1, 12, 2, 3, 4 y 6.
6.- Descompón estos números en factores primos.

1. 20
2. 90
3. 600
4. 360

5. 136
6. 408
7. 307
8. 805
9. 6
10. 78
11. 871
12. 2500.

7.- Calcula el M.C.D. y el M.C.M. de los siguientes números(por el algoritmo de Euclides)

1. 63 y 48
2. 42 y 60
3. 36 y 45
4. 560 y 588.
5. 46 y 98
6. 105 y 135
7. 270 y 234
8. 315 y 420

PROBLEMAS DE MCM y MCD

1. Un coche necesita que le cambien el aceite cada 9.000 km, el filtro del aire cada 15.000 km y las bujías cada 30.000 km. ¿ A qué número mínimo de kilómetros habrá que hacerle todos los cambios a la vez?
2. Un comerciante desea poner en cajas 12.028 manzanas y 12.772 naranjas de modo que cada caja contenga el mismo número de manzanas o de naranjas y además el mayor número posible de ellas. Hallar el número de naranjas y de manzanas de cada caja.
3. La clase de 1º A tiene 32 alumnos y la de 1º B, 36 alumnos. Queremos distribuir los alumnos en equipos del mismo número de participantes de manera que no falte ni sobre nadie y no se mezclen los grupos ¿Cuántos alumnos podrán entrar en cada equipo como máximo?
4. Tres aviones de línea regular salen del aeropuerto cada 3 días, cada 12 días y cada 18 días. ¿Cada cuántos días saldrán los tres aviones a la vez?
5. Se desean acondicionar 1830 latas de aceite y 1170 latas de yerba en un cierto número de cajones que contengan el mismo número de latas, sin que sobre ninguna y sin mezclar las latas. ¿Cuál será el mayor número posible de latas que puedan ponerse en cada cajón?
6. Un jardinero desea colocar 720 plantas de violetas, 240 de pensamientos, 360 de jacintos y 480 de claveles en el menor número posible de canteros que contengan el mismo número de plantas, sin mezclar las mismas. ¿Qué cantidad de plantas debe contener cada cantero y cuántos hay?
7. Se tienen tres tubos de 84 , 270 y 330 cm3. ¿Cuál es el mayor volumen en cm3 que cabe un número exacto de veces en cada uno de ellos?
8. Se tienen 160 y 168 cl de extractos distintos. Se quieren envasar en el menor número posible de frascos iguales sin mezclar los extractos. ¿Cuál es el número de frascos de cada clase?
9. Cuatro buques parten para el mismo destino: el primero, cada 10 días; el segundo, cada 8; el tercero,. Cada 9 y el cuarto cada 15.¿cuántos días transcurren entre dos salidas simultáneas consecutivas?(360)
10. Un ebanista quiere cortar una plancha de madera de 256 cm de largo y 96 cm de ancho, en cuadrados lo más grandes posible.
11. Un viajante va a Sevilla cada 18 días, otro va a Sevilla cada 15 días y un tercero va a Sevilla cada 8 días. Hoy día 10 de enero han coincidido en Sevilla los tres viajantes.¿Dentro de cuántos días como mínimo volverán a coincidir en Sevilla?
12. Andrés tiene en su tienda los botones metidos en bolsas. En la caja A tiene bolsitasde 24 botones cada una y no sobra ningún botón. En la caja B tiene bolsitas de 20 botones cada una y tampoco sobra ningún botón. El número de botones que hay en la caja A es igual que el que hay en la caja B.
13. María y Jorge tienen 25 bolas blancas, 15 bolas azules y 90 bolas rojas y quieren hacer el mayor número de collares iguales sin que sobre ninguna bola.
14. ¿Cuántos collares iguales pueden hacer?
15. ¿Qué número de bolas de cada color tendrá cada collar

UNIDAD 2. Potencias y raíces cuadradas de números enteros

Conceptos

Potencias de base entera y exponente natural.
Producto de potencias de la misma base.
Cociente de potencias de la misma base.
Potencia de una potencia.
Cuadrados perfectos.
Raíz cuadrada entera.

POTENCIAS Y RAÍCES CUADRADAS DE NÚMEROS ENTEROS

Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales.
* La base de la potencia es el factor que se repite.
* El exponente de la potencia es el número de veces que se repite.

Las potencias de base negativa y exponente impar son negativas.
Las potencias de base negativa y exponente par son positivas.

POTENCIAS.
Producto de potencias de la misma base. Es una potencia con la misma base y con el exponente igual a la suma de los exponentes de los factores.
Cociente de potencias de la misma base. Es una potencia que tiene la misma base y el exponente es igual a la diferencia entre los exponentes del dividendo y del divisor.
Un caso especial: exponente cero. Cualquier exponente elevado a cero es iguala a 1.
Potencia de una potencia. Es otra potencia que tiene la misma base y el exponente igual al producto de los exponentes.

RAÍCES.
Producto de raíces cuadradas exactas. Es una raíz cuadrada exacta y su radicando es igual al producto de los radicandos de los factores.
Potencia de una raíz cuadrada exacta. Es una raíz cuadrada exacta y su radicando es igual al radicando de partida elevado al exponente de la potencia.

Expresa como producto de potencias:

1. $(-5)^4 =$
2. $(-3)^5 =$
3. $(-4)^7 =$

Expresa como potencia:

$(-5)\cdot(-5)\cdot(-5)\cdot(-5)\cdot(-5)$

Calcula:

1. $(-5)^3 =$
2. $(-12)^4 =$
3. $(-2)^7 =$

Expresa como potencia de un número racional:

1. $\left(\frac{3}{7}\right)^4 =$ $\left(\frac{4}{5}\right)^3 =$

$\left(-\frac{5}{2}\right)^4 =$ $\frac{(-5)\cdot(-5)}{(-4)\cdot(-4)} =$

$\frac{5\cdot(-5)}{(-3)\cdot 3} =$

Calcula:

1 $\left(\frac{3}{2}\right)^2 =$

2. $\left(\frac{5}{6}\right)^4 =$

3. $\left(-\frac{3}{8}\right)^3 =$

4. $\left(\frac{3}{4}\right)^3 =$

5. $\left(\frac{3}{7}\right)^4 =$

6. $\left(-\frac{5}{2}\right)^4 =$

7. $\left(\frac{4}{5}\right)^3 =$

8. $\frac{3}{4^3} =$

9. $-6^3 =$

10. $(-6)^3 =$

11. $\frac{3^4}{5} =$

12. $-\left(\frac{4}{5}\right)^2 =$

13. $\left(\frac{3}{8}\right)^5 =$

14. $\left(\frac{3}{7}\right)^4 =$

15. $\left(\frac{1}{5}\right)^4 =$

Expresa en forma de producto las siguientes potencias:

1. $3^4 =$
2. $5^2 =$
3. $10^3 =$
4. $12^8 =$

Escribe en forma de potencia, si es posible, los productos siguientes:

1. $7 \cdot 7 \cdot 7 =$
2. $5 \cdot 4 \cdot 3 =$
3. $6 \cdot 6 =$
4. $3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 =$
5. $4 \cdot 4 =$
6. $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 =$
7. $(-5) \cdot (-5) =$
8. $3 \cdot 3 =$

Calcula:

1. $\sqrt{121} =$
2. $\sqrt[3]{216} =$
3. $\sqrt[4]{16} =$
4. $\sqrt[3]{125} =$
5. $\sqrt[4]{81} =$

Escribe las seis primeras potencias de 7, 10 y 12.

Expresa en forma de potencia de base 10:

$100000 = 10^{\square}$

$100 = 10^{\square}$

$10000 = 10^{\square}$

Expresa en forma de potencias de base 2:

a) $64 = 2^{\square}$

b) $16 = 2^{\square}$

c) $256 = 2^{\square}$

Expresa en forma de potencias de base 3:

a) $27 = 3^{\square}$

b) $729 = 3^{\square}$

c) $243 = 3^{\square}$

Expresa en forma de potencias de exponente 2:

a) $64 = \square^2$

b) $100 = \square^2$

c) $36 = \square^2$

POTENCIAS

Escribe como potencias de 10:

1. 18 millones
2. 7000
3. cien mil
4. 190.000.000
5. 500 millones
6. un billón

Transforma en potencias de 10:

1. 231000
2. 8760000
3. 240
4. 2490000
5. 73600
6. 0,00045
7. 0,487
8. 0,0098
9. 35000000
10. 9800000000
11. 0,00000089
12. 2143000000000
13. 0,000897
14. 34000000
15. 0,0000007

Transforma en potencias de dos:

1. 10.000=
2. 1.000.000=
3. 1.000.000.000=
4. 1000=
5. 0,0001=
6. 0,000001=
7. 0,0000001=
8. 0,001=

UNIDAD 3. Fracciones. Operaciones con fracciones.

Conceptos

Fracciones equivalentes.
Comparación de fracciones.
Suma y resta de fracciones.
Multiplicación y división de fracciones.
Potenciación y raíz cuadrada de fracciones.
Fracciones positivas y negativas.
Suma, resta, multiplicación, división y potencia de fracciones positivas y negativas.

FRACCIONES. OPERACIONES CON FRACCIONES.

FRACCIONES EQUIVALENTES. Para obtener fracciones equivalentes a una dada se multiplican o dividen sus términos por el mismo número.

COMPARACIÓN DE FRACCIONES CON EL MISMO DENOMINADOR. Si dos fracciones tienen el mismo denominador, es mayor la que tiene mayor numerador.

COMPARACIÓN DE FRACCIONES CON EL MISMO NUMERADOR. Si dos fracciones tienen el mismo numerador, es mayor la que tiene menor denominador.

REDUCCIÓN DE VARIAS FRACCIONES A UN COMÚN DENOMINADOR.

1º Se halla el m.c.m. de los denominadores.

2º Se divide el m.c.m. entre cada uno de los denominadores y el resultado se multiplica por el numerador correspondiente.

COMPARACIÓN DE FRACCIONES CUALESQUIERA. Se reducen a un común denominador y será mayor la que tiene mayor numerador.

También podemos comparar los cocientes que resultan al dividir en cada fracción el numerador entre el denominador.

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES CON EL MISMO DENOMINADOR. La suma o diferencia de dos fracciones con el mismo denominador es una fracción que tiene el mismo denominador y el numerador igual a la suma o diferencia de los numeradores.

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES CON DISTINTO DENOMINADOR. Se reducen a un común denominador y se suman o restan las fracciones obtenidas.

MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES. El producto de dos fracciones es una fracción que tiene el numerador igual al producto de los numeradores y el denominador igual al producto de los denominadores.

DIVISIÓN DE FRACCIONES. El cociente de dos fracciones es igual al producto del dividendo por la fracción inversa del divisor.

POTENCIACIÓN DE FRACCIONES. Para elevar una potencia a otra potencia se elevan el numerador y el denominador a dicha potencia.

RAÍZ CUADRADA DE UNA FRACCIÓN. Es el número cuyo cuadrado es igual a la fracción.

CÁLCULO DE LA RAÍZ CUADRADA DE UNA FRACCIÓN CUYOS TÉRMINOS SON CUADADOS PERFECTOS. Es una fracción que tiene el numerador igual a la raíz cuadrada exacta del numerador y el denominador igual a la raíz cuadrada exacta del denominador.

CÁLCULO DE LA RAÍZ CUADRADA DE UNA FRACCIÓN CUYOS DOS TÉRMINOS NO SON CUADRADOS PERFECTOS. Se calcula el cociente de los términos y se halla la raíz cuadrada del cociente con la aproximación que se desee.

1. Calcula:

$a)\ \frac{2}{7}\ de\ 735$ $\quad b)\ \frac{5}{13}\ de\ 104$ $\quad c)\ \frac{5}{6}\ de\ 498$

$d)\ \frac{3}{8}\ de\ 1160$ $\quad e)\ \frac{4}{9}\ de\ 153$ $\quad f)\ \frac{7}{11}\ de\ 1650$

2. Escribe tres fracciones equivalentes en cada caso:

3. *a*) $\frac{2}{3}$ *b*) $\frac{3}{5}$ *c*) $\frac{4}{8}$

4. Simplifica:

a) $\frac{4}{8}$ *b*) $\frac{6}{8}$ *c*) $\frac{7}{21}$ *d*) $\frac{6}{18}$

e) $\frac{15}{25}$ *f*) $\frac{12}{16}$ *g*) $\frac{18}{27}$ *h*) $\frac{25}{75}$

5. Reduce a común denominador y ordena:

a) $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}$ *b*) $\frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{7}{10}$

c) $\frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{7}{10}$ *d*) $\frac{7}{2}, \frac{8}{3}, \frac{9}{5}$

6. Calcula:

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}$ *b*) $1-\frac{1}{2}$ *c*) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$

d) $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$ *e*) $2-\frac{3}{7}$ *f*) $\frac{5}{3}-1$

7. Calcula y simplifica:

a) $3\cdot\frac{1}{6}$ *b*) $5\cdot\frac{3}{10}$ *c*) $\frac{2}{3}\cdot 6$ *d*) $5\cdot\frac{4}{15}$

e) $\frac{3}{5}\cdot 10$ *f*) $\frac{3}{8}\cdot 2$ *g*) $1:\frac{3}{4}$ *h*) $1:\frac{5}{7}$

i) $\frac{1}{5}:2$ *j*) $4:\frac{2}{3}$ *k*) $2:\frac{4}{3}$ *l*) $\frac{3}{5}:6$

8. En una clase de 20 alumnos y alumnas, 2/5 son chicos. ¿Cuántas son las chicas?

9. En una población, el 20% de las personas está en el paro. ¿Qué fracción de la población no tiene trabajo?

10. Rafael tenía 50€ y se ha gastado 20€. ¿Qué fracción le queda de lo que tenía?

11. $\left[\left(-\frac{2}{5}\right):(-4)\right]\cdot\left[\left(\frac{5}{-3}\right):\left(\frac{1}{-6}\right)\right]=$

12. $\left[\left(\frac{-4}{15}\right)\cdot\frac{5}{8}\right]:\left[\left(\frac{1}{-6}\right)\right]=$

13. $\left[\left(-\frac{3}{4}\right):\left(\frac{5}{6}\right)\right]:\left(-\frac{9}{10}\right)=$

14. $\left[\left(-\frac{2}{5}\right):(-4)\right]\cdot\left[\left(\frac{5}{-3}\right):\left(\frac{1}{-6}\right)\right]=$

15. $3:\frac{1}{3}+\frac{1}{3}:3-\frac{1}{3}\cdot 3-\left(\frac{1}{3}\right)^3=$

16. $3:\left(9:\frac{4}{3}\right)+(3:9):\frac{4}{3}=$

17. $(3-4:6+2:4):15+\left(\frac{4}{3}:\frac{2}{3}\right)^2=$

18. $\dfrac{\frac{3}{4}+\frac{1}{6}}{\frac{3}{4}-\frac{1}{6}}=$

UNIDAD 4. Expresiones decimales (continuación de la unidad 3).-
Expresión decimal de un número racional.
Clasificación de expresiones decimales.
Expresión decimal exacta.
Expresión decimal no exacta.
Fracciones generatrices.
Fracción generatriz de un número decimal.
Operaciones con decimales (repaso).
Porcentajes.

EXPRESIONES DECIMALES

NÚMEROS DECIMALES.
Las decenas, centenas, millares...son múltiplos de la unidad.
Las décimas, centésimas...son submúltiplos de la unidad o unidades decimales.
SUMA Y RESTA DE NÚMEROS DECIMALES. Para sumar o restar números decimales:
* Se escriben uno debajo del otro, de manera que estén alineados las comas decimales y las unidades de los mismos órdenes.
* Se suman o restan como si fueran números naturales.
* Al resultado se le coloca la coma decimal alineada.
MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES. Para multiplicar dos números decimales:
* Se multiplican como si fueran naturales.
* El resultado tiene tantas cifras decimales como la suma de las cifras decimales de los factores.
DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES. Para dividir dos números decimales:
*Se multiplican el dividendo y el divisor por 10, 100... hasta que el divisor sea un número natural.
* Se hace la división con los nuevos términos.
POTENCIA DE UN NÚMERO DECIMAL. Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación cuyos factores son iguales.
* La base de la potencia es el factor que se repite.
* El exponente de la potencia es el número de veces que se repite.

RAÍZ CUADRADA DE UN NÚMERO DECIMAL. Es un número cuyo cuadrado es igual al número decimal.

FRACCIONES CON EXPRESIÓN DECIMAL EXACTA son aquellas cuyo cociente es un número decimal exacto.

FRACCIONES CON EXPRESIÓN DECIMAL NO EXACTA.

* Se llama periodo a las cifras que se repiten indefinidamente.
* Las fracciones no decimales se llaman **fracciones periódicas.**

Una fracción se llama **periódica pura** si su expresión decimal está generada solamente por el periodo.

Una fracción se dice **periódica mixta** si su parte decimal contiene una parte no periódica y otra periódica.

.-Ordena los siguientes números decimales:

. Calcula la fracción generatriz de los siguientes números decimales:

a) 0,131313... b) 1,121121121... c) $0,\widehat{3663}$ d) $-0,4\widehat{5}$

e) –1,3434... f) $2,3\widehat{26}$ g) 40,0404... h) 5,2333...

FINAL 1º Evaluacion y Principio de la 2ª Evaluacion

UNIDAD 4. Expresiones algebraicas

Conceptos

- Del lenguaje ordinario al lenguaje algebraico.
- Expresiones algebraicas. Valor numérico.
- Monomios y polinomios enteros.
- Suma, resta, multiplicación y división de monomios.
- Suma y diferencia de polinomios.
- Producto de polinomios.
- Cociente de un polinomio por un monomio.
- Potencias de polinomios. Igualdades notables.

El **lenguaje algebraico** utiliza letras, números y signos de operaciones para expresar informaciones. Una **expresión algebraica** es una combinación de números y letras unidos por los signos de las operaciones aritméticas: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. **Valor numérico** de una expresión algebraica es el número que se obtiene al sustituir las letras de la misma por números determinados y hacer las operaciones indicadas en la expresión.

Trabajar en **álgebra** consiste en manejar **relaciones numéricas** en las que una o más cantidades son **desconocidas**. Estas cantidades se llaman **variables, incógnitas o indeterminadas y se representan por letras**.

Expresiones algebraicas comunes(las vas a utilizar mucho, sobre todo en problemas con ecuaciones de una sola incógnita)

Dos números **consecutivos**: x y $x + 1$.

Dos números **consecutivos pares**: $2x$ y $2x + 2$.

Dos números **consecutivos impares**: $2x + 1$ y $2x + 3$.

Descomponer 24 **en dos partes**: x y $24 - x$.

La **suma** de dos números es 24: x y $24 - x$.

El **producto** de dos números es 24: x y $24/x$.

La **diferencia** de dos números es 24: x y $24 + x$.

El **cociente** de dos números es 24; x y $24 \cdot x$.

Monomio

Definición de monomio

Un **monomio** es una **expresión algebraica** en la que las únicas **operaciones** que aparecen entre las variables son el **producto y la potencia de exponente natural**.

$2x^2 y^3 z$

Partes de un monomio

-***Coeficiente***

El **coeficiente** del **monomio** es el número que aparece multiplicando a las variables.

Parte literal

La **parte literal** está constituida por las letras y sus exponentes.

Grado

El **grado** de un **monomio** es la suma de todos los exponentes de las letras o variables.

El grado de $2x^2 y^3 z$ es: $2 + 3 + 1 = 6$

Monomios semejantes

Dos **monomios** son **semejantes** cuando tienen la **misma parte literal**.

$2x^2 y^3 z$ es semejante a $5x^2 y^3 z$

Operaciones con monomios

Suma de monomios

Sólo podemos **sumar monomios semejantes**.

La suma de los monomios es otro monomio que tiene la misma parte literal y cuyo coeficiente es la suma de los coeficientes.

$\mathbf{ax^n + bx^n = (a + b)bx^n}$

$2x^2 y^3 z + 3x^2 y^3 z = 5x^2 y^3 z$

Si los **monomios no** son **semejantes** se obtiene un **polinomio**.

$2x^2 y^3 + 3x^2 y^3 z$.

Producto de un número por un monomio

El **producto de un número por un monomio** es otro **monomio semejante** cuyo **coeficiente** es el **producto del coeficiente** de monomio **por el número**.

$5 \cdot 2x^2 y^3 z = 10x^2 y^3 z$.

Multiplicación de monomios

La **multiplicación de monomios** es otro **monomio** que tiene por **coeficiente el producto de los coeficientes y cuya parte literal se obtiene multiplicando las potencias que tenga la misma base.**

$\mathbf{ax^n \cdot bx^m = (a \cdot b)bx^{n+m}}$

$5x^2 y^3 z \cdot 2 y^2 z^2 = 10 x^2 y^5 z^3$.

División de monomios

Sólo se pueden **dividir monomios** con la **misma parte literal** y con el **grado del dividendo mayor o igual** que el **grado** de la variable correspondiente del **divisor**.

La **división de monomios** es otro **monomio** que tiene por **coeficiente el cociente de los coeficientes y cuya parte literal se obtiene dividiendo las potencias que tenga la misma base.**

$\mathbf{ax^n : bx^m = (a : b)bx^{n-m}}$

$$\frac{6x^3y^4z^2}{3x^2y^2z^2} = 2xy^2$$

Si el **grado del divisor es mayor**, obtenemos una **fracción algebraica**.

Potencia de un monomio

Para realizar la **potencia de un monomio** se eleva, cada elemento de éste, al exponente de la potencia.

$\mathbf{(ax^n)^m = a^m \cdot bx^{n \cdot m}}$

$(2x^3)^3 = 2^3(x^3)^3 = 8x^8$

$(-3x^2)^3 = (-3)^3 (x^3)^2 = -27x^6$

Ejercicios resueltos de monomios

1.- *Indica cuales de las siguientes expresiones son monomios. En caso afirmativo, indica su grado y coeficiente.*

1.-$3x^3$

Grado del monomio: 3 , **coefeciente**: 3

2.-$5x^{-3}$

No es un **monomio**, porque el exponente no es un número natural.

3.-$3x + 1$

No es un **monomio**, porque hay una suma.

4.- $\sqrt{2}\, x^3$ **Grado del monomio**: 1 , coefeciente: $\sqrt{2}$

5.- **Grado del monomio**: 4 , coefeciente: $\frac{3}{4}$

6.- $-\frac{3}{x^a}$ **No** es un **monomio**, porque no tiene exponente natural.

7.- $2\sqrt{x}$ **No** es un **monomio**, porque la parte literal está dentro de una raíz.

2.- Realiza las sumas y restas de monomios.

1.--$2x^2\,y^3\,z + 3x^2\,y^3\,z = 5x^2\,y^3\,z$

2.--$2x^3 - 5x^3 =$

3.--$3x^4 - 2x^4 + 7x^4 =$

4.--$2\,a^2\,b\,c^3 - 5a^2\,b\,c^3 + 3a^2\,b\,c^3 - 2\,a^2\,b\,c^3 =$

3.- Efectúa los productos de monomios.

1.--$(2x^3)\cdot(5x^3) =$

2.--$(12x^3)\cdot(4x) =$

3.--$5\cdot(2x^2\,y^3\,z) =$

4.--$(5x^2\,y^3\,z)\cdot(2\,y^2\,z^2) =$

5.--.$(18x^3\,y^2\,z^5)\cdot(6x^3\,y\,z^2) =$

6.--$(-2x^3)\cdot(-5x)\cdot(-3x^2) =$

***4 Realiza las** divisiones de monomios.*

1.--$(12x^3) : (4x) = 3x^2$

2.--$(18x^6\,y^2\,z^5) : (6x^3\,y\,z^2) =$

3.--$(36\,x^3\,y^7\,z^4) : (12x^2\,y^2) =$

4.-- $\frac{6x^3y^4z^2}{3x^2y^2z^2} = 2xy^2$

Polinomios

Definición de polinomio

Un **polinomio** es una **expresión algebraica** de la forma:

$$\mathbf{P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \ldots + a_1 x^1 + a_0}$$

Siendo $\mathbf{a_n, a_{n-1} \ldots a_1, a_0}$ números, llamados **coeficientes**.

a_0 es el término independiente.

Grado de un polinomio

El **grado** de un polinomio P(x) es el **mayor exponente** al que se encuentra elevada la **variable** x.

Polinomio de grado cero

P(x) = 2

Polinomio de primer grado

P(x) = 3x + 2

Polinomio de segundo grado

P(x) = $2x^2$+ 3x + 2

Polinomio de tercer grado

P(x) = x^3 - $2x^2$+ 3x + 2

Polinomio de cuarto grado

P(x) = x^4 + x^3 - $2x^2$+ 3x + 2

Tipos de polinomios

Polinomio nulo

El **polinomio nulo** tiene todos sus **coeficientes nulos**.

Polinomio homogéneo

El **polinomio homogéneo** tiene todos sus **términos** o **monomios** con el **mismo grado**.

P(x) = $2x^2$ + 3xy

Polinomio heterogéneo

Los **términos** de un **polinomio heterogéneo** son de **distinto grado**.

$P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 3$

Polinomio completo

Un **polinomio completo** tiene **todos los términos** desde el término independiente hasta el término de mayor grado.

$P(x) = 2x^3 + 3x^2 + 5x - 3$

Polinomio ordenado

Un **polinomio** está **ordenado** si los **monomios** que lo forman están escritos de **mayor a menor grado**.

$P(x) = 2x^3 + 5x - 3$

Polinomios iguales

Dos polinomios son iguales si verifican:

1.º.-Los dos polinomios tienen el **mismo grado**.

2º.-Los **coeficientes** de los términos del mismo grado son i**guales**.

$P(x) = 2x^3 + 5x - 3$

$Q(x) = 5x - 3 + 2x^3$

Polinomios semejantes

Dos polinomios son semejantes si verifican que tienen **la misma parte literal.**

$P(x) = 2x^3 + 5x - 3$ $\quad$ $Q(x) = 5x^3 - 2x - 7$

Tipos de polinomios según el número de términos

Monomio

Es un **polinomio** que consta de **un** sólo **monomio**.

$P(x) = 2x^2$

Binomio

Es un **polinomio** que consta de **dos monomios**.

$P(x) = 2x^2 + 3x$

Trinomio

Es un **polinomio** que consta de **tres monomios**.

$P(x) = 2x^2 + 3x + 5$

Valor numérico de un polinomio

Es el resultado que obtenemos al sustituir la variable x por un número cualquiera.

$P(x) = 2x^3 + 5x - 3$; $x = 1$

$P(1) = 2 \cdot 1^3 + 5 \cdot 1 - 3 = 2 + 5 - 3 = 4$

Operaciones con polinomios

Suma de polinomios

Para sumar dos polinomios se suman los coeficientes de los términos del mismo grado.

$P(x) = 2x^3 + 5x - 3$ $\quad$ $Q(x) = 4x - 3x^2 + 2x^3$

1º.-**Ordenamos** los **polinomios**, si no lo están.

$Q(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x$

$P(x) + Q(x) = (2x^3 + 5x - 3) + (2x^3 - 3x^2 + 4x)$

2º.-**Agrupamos** los **monomios** del **mismo grado**.

$P(x) + Q(x) = 2x^3 + 2x^3 - 3x^2 + 5x + 4x - 3$

3º.-**Sumamos los monomios semejantes**.

$P(x) + Q(x) = 4x^3 - 3x^2 + 9x - 3$

Resta de polinomios

La resta de polinomios consiste en **sumar el opuesto del sustraendo**.

$P(x) - Q(x) = (2x^3 + 5x - 3) - (2x^3 - 3x^2 + 4x)$

$P(x) - Q(x) = 2x^3 + 5x - 3 - 2x^3 + 3x^2 - 4x$

$P(x) - Q(x) = 2x^3 - 2x^3 + 3x^2 + 5x - 4x - 3$

$P(x) - Q(x) = 3x^2 + x - 3$

Multiplicación de polinomios

Multiplicación de un número por un polinomio

Es otro **polinomio** que tiene de **grado** el **mismo** del polinomio y como **coeficientes** el **producto de los coeficientes del polinomio por el número**.

$3 \cdot (2x^3 - 3x^2 + 4x - 2) = 6x^3 - 9x^2 + 12x - 6$

Multiplicación de un monomio por un polinomio

Se **multiplica el monomio** por todos y **cada** uno de los **monomios que forman el polinomio**.

$3x^2 \cdot (2x^3 - 3x^2 + 4x - 2) = 6x^5 - 9x^4 + 12x^3 - 6x^2$

Multiplicación de polinomios

$P(x) = 2x^2 - 3 \quad Q(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x$

Se multiplica cada monomio del primer polinomio por todos los elementos segundo polinomio.

$P(x) \cdot Q(x) = (2x^2 - 3) \cdot (2x^3 - 3x^2 + 4x) =$

$= 4x^5 - 6x^4 + 8x^3 - 6x^3 + 9x^2 - 12x =$

Se suman los monomios del mismo grado.

$= 4x^5 - 6x^4 + 2x^3 + 9x^2 - 12x$

Se obtiene otro polinomio cuyo grado es la suma de los grados de los polinomios que se multiplican.

También podemos **multiplicar polinomios** de siguiente modo:

$$\begin{array}{r} 2x^3 - 3x^2 + 4x \\ \hline 2x^2 - 3 \\ \hline -6x^3 + 9x^2 - 12x \\ 4x^5 - 6x^4 + 8x^3 \\ \hline 4x^5 - 6x^4 + 2x^3 + 9x^2 - 12x \end{array}$$

División de polinomios

Resolver la división de polinomios:

$P(x) = 2x^5 + 2x^3 - x - 8 \qquad Q(x) = 3x^2 - 2x + 1$

P(x) : Q(x)

A la izquierda situamos el dividendo. Si el polinomio **no es completo** dejamos **huecos** en los lugares que correspondan.

$$x^5 \quad +2x^3 \quad -x-8 \quad \Big| \; x^2-2x+1$$

A la derecha situamos el divisor dentro de una caja.

Dividimos el primer monomio del dividendo entre el primer monomio del divisor.

$x^5 : x^2 = x^3$

Multiplicamos cada término del polinomio divisor por el resultado anterior y lo restamos del polinomio dividendo:

$$\begin{array}{llll} x^5 & +2x^3 & -x-8 & \Big| \; x^2-2x+1 \\ \cline{4-4} -x^5+2x^4-x^3 & & & x^3 \\ \cline{1-1} \quad 2x^4+x^3 & & -x-8 & \end{array}$$

Volvemos a **dividir** el primer monomio del dividendo entre el primer monomio del divisor. Y el resultado lo multiplicamos por el divisor y lo restamos al dividendo.

$2x^4 : x^2 = 2x^2$

$$x^5 + 2x^3 - x - 8 \quad \Big| \; x^2 - 2x + 1$$

$$-x^5 + 2x^4 - x^3 \qquad\qquad x^3 + 2x^2$$

$$2x^4 + x^3 - x - 8$$

$$-2x^4 + 4x^3 - 2x^2$$

$$5x^3 - 2x^2 - x - 8$$

Procedemos igual que antes.

$5x^3 : x^2 = 5x$

$$x^5 + 2x^3 - x - 8 \quad \Big| \; x^2 - 2x + 1$$

$$-x^5 + 2x^4 - x^3 \qquad\qquad x^3 + 2x^2 + 5x$$

$$2x^4 + x^3 - x - 8$$

$$-2x^4 + 4x^3 - 2x^2$$

$$5x^3 - 2x^2 - x - 8$$

$$-5x^3 + 10x^2 - 5x$$

$$8x^2 - 6x - 8$$

Volvemos a hacer las mismas operaciones.

$8x^2 : x^2 = 8$

$$x^5 + 2x^3 - x - 8 \quad \Big| \; x^2 - 2x + 1$$

$$-x^5 + 2x^4 - x^3 \qquad\qquad x^3 + 2x^2 + 5x + 8$$

$$2x^4 + x^3$$

$$-2x^4 + 4x^3 - 2x^2$$

$$5x^3 - 2x^2 - x$$

$$-5x^3 + 10x^2 - 5x$$

$$8x^2 - 6x - 8$$

$$-8x^2 + 16x - 8$$

$$10x - 16$$

$10x - 6$ es el **resto**, porque su **grado es menor que el del divisor** y por tanto no se puede continuar dividiendo.

x^3+2x^2+5x+8 es el **cociente**.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. Dígase qué clase de términos son los siguientes atendiendo al signo, a si tienen o no denominador y a si tienen o no radical:

Solución:

$5a^2$: positivo, entero y racional

$-4a^3b$: negativo, entero y racional

$\frac{2a}{3}$: positivo, entero y racional (se considera entero porque no hay letras en el denominador)

$-\frac{5b^2}{6}$: negativo, entero y racional (se considera entero porque no hay letras en el denominador)

$\sqrt{a}$: positivo, entero e irracional (se considera entero porque no hay letras en el denominador)

$-\sqrt[3]{5b^2}$: negativo, entero e irracional (entero porque no hay letras en el denominador)

$\frac{\sqrt{a}}{6}$: positivo, entero e irracional (se considera entero porque no hay letras en el denominador)

$-\frac{4a^2b^3}{\sqrt{6a}}$: negativo, fraccionario e irracional.

2. Dígase el grado de los términos siguientes respecto de cada uno de sus factores literales:

S o l u c i ó n :

$-a^3b^2$: tercer grado respecto a a y segundo grado respecto a b

$-5x^4y^3$: cuarto grado respecto a x y tercer grado respecto a y

$6a^2bx^3$: segundo grado respecto a a, primer grado respecto a b y tercer grado respecto a x

$-4abcx^2$: primer grado respecto a a, b y c y de segundo grado respecto a x

$10m^2n^3b^4c^5$: segunndo grado respecto a m, tercer grado respecto a n, cuarto grado respecto a b quinto grado respecto a c

3. De los términos siguientes escoger cuatro que sean homogéneos y tres hetereogéneos

S o l u c i ó n :

Cuatro términos hetereogéneos son $-4a^3b^2, -x^5, 6x^4y, 4abcx^2$: tienen igual grado absoluto

Tres heterogéneos son: $-4a^3b^2$, $6ab^3$ y $-2ac$ (tienen diferente grado absoluto)

4. Escribir tres términos enteros; dos fraccionarios; dos positivos, enteros y racionales; tres negativos, fraccionarios e irracionales

S o l u c i ó n :

Enteros: $5abcd^2efg$, $-x^2$, $389yz$.

Fraccionarios: $\frac{a}{b}$, $-\frac{f}{x^2}$.

Positivos, enteros y racionales: $8xyz^3$, $99bc$

Negativos, fraccionarios e irracionales: $-\frac{b\sqrt{x}}{a}, \frac{-\sqrt{b^5}}{\sqrt{a}}, -\frac{8}{\sqrt{x}}$

5. Escribir un término de cada uno de los grados absolutos siguientes: tercer grado, quinto grado, undécimo grado, décimo quinto grado, vigésimo grado

S o l u c i ó n :

6. Escribir un término de dos factores literales que sea de cuarto grado con relación a la x; otro de cuatro factores literales que sea de séptimo grado con relación a la y; otro de cinco factores literales que sea de décimo grado con relación a la b

S o l u c i ó n :

De cuarto grado con relación a la x: $45366b^{10}x^4$.

De séptimo grado con relación a la y: $-3a^5v^{56}y^7z^5$.

De décimo grado con relación a la b: $55533366677a^{58}b^{10}x^{34}yz^{10}$

7. Dígase el grado absoluto de los siguientes polinomios:

a) x^3+x^2+x: tercer grado absoluto

b) $5a-3a^2+4a^4-6$: cuarto grado absoluto

c) $a^3b-a^2b^2+ab^3-b^4$: cuarto grado absoluto

d) $x^5-6x^4y^3-4ab^2+x^2y^4-3y^6$: séptimo grado absoluto

8. Dígase el grado de los siguientes polinomios con relación a cada una de sus letras

a) $a^3+a^2-ab^3$: tercer grado con respecto tanto a a como a b

b) $x^4+4x^3-6x^2y^4-4xy^5$: cuarto grado con relación a la x y quinto con relación a la y

c) $6a^4b^7-4a^2x+ab^9-5a^3b^8x^6b^4$: cuarto grado con relación a la a, noveno grado con relación a la b y sexto grado con relación a la x

d) $m^4n^2-mn^6+mx^4y^3-x^8+y^{15}-m^{11}$: octavo grado con relación a x, décimo quinto grado con relación a y, undécimo grado con relación a m y sexto grado con relación a n

9. Dígase el grado absoluto de los siguientes polinomios:

a) $x^3 + x^2 + x$: tercer grado absoluto

b) $5a - 3a^2 + 4a^4 - 6$: cuarto grado absoluto

c) $a^3b - a^2b^2 + ab^3 - b^4$: cuarto grado absoluto

d) $x^5 - 6x^4y^3 - 4ab^2 + x^2y^4 - 3y^6$: séptimo grado absoluto

10. Dígase el grado de los siguientes polinomios con relación a cada una de sus letras

a) $a^3 + a^2 - ab^3$: tercer grado con respecto tanto a a como a b

b) $x^4 + 4x^3 - 6x^2y^4 - 4xy^5$: cuarto grado con relación a la x y quinto con relación a la y

c) $6a^4b^7 - 4a^2x + ab^9 - 5a^3b^8x^6b^4$: cuarto grado con relación a la a, noveno grado con relación a la b y sexto grado con relación a la x

d) $m^4n^2 - mn^6 + mx^4y^3 - x^8 + y^{15} - m^{11}$: octavo grado con relación a x, décimo quinto grado con relación a y, undécimo grado con relación a m y sexto grado con relación a n

11. Atendiendo a si tienen o no denominador literal y a si tienen o no radical, dígase qué clase son los polinomios siguientes:

a) $a^3 + 2a^2 - 3a$: entero y racional

b) $\frac{a^4}{2} - \frac{a^3}{3} + \frac{a^2}{2} - a$: entero y racional (no hay letras en los denominadores)

c) $\sqrt{a} + \sqrt{b} - 2c + \sqrt{d}$: entero e irracional

d) $4a + \frac{\sqrt{a}}{2} - 6b + 4$: entero e irracional.

12. Escribir unn polinomio de tercer grado absoluto; de quinto grado absoluto; de octavo grado absoluto; de décimo quinto grado absoluto.

Definición: "El grado absoluto de un polinomio es el grado de su término de mayor grado *absoluto*".

Polinomio de tercer grado absoluto: $x^3y + x^2y2 + xy^3$

Polinomio de quinto grado absoluto: $a^2 + b + c + d^5$

Polinomio de octavo grado absoluto: $10a^5 - 57b^8 + 4$

Polinomio de décimo quinto grado absoluto: $-22x^8 + 151x^{15} + 14y^8$.

13. Escribir un trinomio de segundo grado respecto de la x; un polinomio de quinto grado respecto de la a; un polinomio de noveno grado respecto de la m.

Trinomio de segundo grado respecto de la x: $-35ax^2 + 6bx + c$.

Polinomio de quinto grado respecto de la a: $8a - 3a^2 + 5a^3 + a^4 - 288a^5$.

Polinomio de noveno grado respecto de la m: $8a^5x^9y^{28} - 32zy + 459x^{11} - m^9$.

14. De los siguientes polinomios:

a) $3a^2b+4a^3-5b^3$
b) $a^4-a^3b+a^2b^2+ab^3$
c) $x^5-bx^4+abx^3+ab^3x^2$
d) $4a-5b+6c^2-8d^3-6$
e) $y^5-ay^4+a^2y^3-a^3y^2-a^4y+y^5$
f) $-6a^3b^4-5a^6b+8a^2b^5-b^7$

escoger dos que sean homogéneos y dos hetereogéneos.

S o l u c i ó n :

Definición 1: "Un polinomio es homogéneo cuando todos sus *términos* son del mismo grado absoluto".
Definición 2: "Un polinomio es heterogéneo cuando sus términos no son del mismo grado absoluto".
Definición 3: "El grado absoluto de un término es la suma de los exponentes de sus factores literales".
Los polinomios homogéneos serían: a) y e)
{en (a) todos los términos son de tercer grado absoluto, y en (e) todos los términos son de quinto grado absoluto}.
Los polinomios heterogéneos serían: c) y d).

15. De los siguientes polinomios:

a) $a^4-a^2+a-a^3$
b) $5x^4-8x^2+x-6$
c) $x^4y-x^3y^2+x^2x^3-y^4$
d) $m^5-m^4+m^3-m+5$
e) $y^5-by^4+b^2y^3-b^3y^2+b^4y$

dígase cuáles son completos y respecto de cuáles letras.
S o l u c i ó n :
El polinomio (a) es completo respecto a la *a*.
El polinomio (c) es completo respecto a la *y*.
El polinomio (e) es completo respecto a la *b* y a la *y*.

16. Escribir tres polinomios homogéneos de tercer grado absoluto; cuatro de quinto grado absoluto; dos polinomios completos.
S o l u c i ó n :
Polinomios homogéneos de tercer grado absoluto: a^2b+7ab^2, x^3-y^3, $ax^2-b^2y-2cxz$.
Polinomios homogéneos de quinto grado absoluto: xyz^3-87a^5, $6z^5+2x^3y^2-342xyz^3$, b^5-a^5, $9999c^2d^3-876xy^3z-786546666z^5$.
Polinomios completos: $3-a+4a^2-a^3+34a^4$, $-8x^2y^2+3x^3y+365xy^3-89$.

17. Ordenar los siguientes polinomios respecto de cualquier letra en orden descendente:

a) $m^2 + 6m - m^3 + m^4$

b) $6ax^2 - 5a^3 + 2a^2x + x^3$

c) $-a^2b^3 + a^4b + a^3b^2 - ab^4$

d) $a^4 - 5a + 6a^3 - 9a^2 + 6$

e) $-x^8y^2 + x^{10} + 3x^4y^6 - x^6y^4 + x^2y^8$

f) $-3m^{15}n^2 + 4m^{12}n^3 - 8m^6n^5 - 10m^3n^6 + n^7 - 7m^9n^4 + m^{18}n$

S o l u c i ó n :

a) $m^4 - m^3 + m^2 + 6m$

b) $x^3 + 6ax^2 + 2a^2x - 5a^3$

c) $a^4b + a^3b^2 - a^2b^3 - ab^4$

d) $a^4 + 6a^3 - 9a^2 - 5a + 6$

e) $x^{10} - x^8y^2 - x^6y^4 + 3x^4y^6 + x^2y^8$

f) $m^{18}n - 3m^{15}n^2 + 4m^{12}n^3 - 7m^9n^4 - 8m^6n^5 - 10m^3n^6 + n^7$

18. Ordenar los siguientes polinomios respecto de cualquier letra en orden ascendente:

a) $a^2 - 5a^3 + 6a$

b) $x - 5x^3 + 6x^2 + 9x^4$

c) $2y^4 + 4y^5 - 6y + 2y^2 + 5y^3$

d) $a^2b^4 + a^4b^3 - a^6b^2 + a^8b + b^5$

e) $y^{12} - x^9y^6 + x^{12}y^4 - x^3y^{10}$

S o l u c i ó n :

a) $6a + a^2 - 5a^3$

b) $x + 6x^2 - 5x^3 + 9x^4$

c) $-6y + 2y^2 + 5y^3 + 2y^4 + 4y^5$

d) $b^5 + a^2b^4 + a^4b^3 - a^6b^2 + a^8b$

e) $-x^3y^{10} - x^9y^6 + x^{12}y^4 + y^{12}$

Definición: Dos o más términos son semejantes cuando tienen las mismas letras y están afectadas por el mismo exponente.

P r o c e d i m i e n t o

Para reducir términos semejantes con el mismo signo se suman los coeficientes de todos los términos y se antepone, al coeficiente total, el mismo signo que comparten, y a continuación se escribe la parte literal.

Reducir:

1. $x + 2x$.
Solución:
El signo común a todos los términos es el +.
Los coeficientes de los términos son 1 y 2.
La parte literal igual en todos los términos es x.
Y $1 + 2 = 3$;
$\therefore$ $x + 2x = 3x$.

2. $8a + 9a$
Solución:
El signo común a todos los términos es el +.
Los coeficientes de los términos son 8 y 9.
La parte literal igual en todos los términos es a.
Y $8 + 9 = 17$;
$\therefore$ $8a + 9a = 17a$.

3. $11b + 9b$
Solución:
El signo común a todos los términos es el +.
Los coeficientes de los términos son 11 y 9.
La parte literal igual en todos los términos es b.
Y $11 + 9 = 20$;
$\therefore$ $11b + 9a = 20b$.

4. $-b - 5b$.
Solución:
El signo común a todos los términos es el -.
Los coeficientes de los términos son 1 y 5.
La parte literal igual en todos los términos es b.
Y $1 + 5 = 6$;
$\therefore$ $-b - 5b = -6b$.

5. $-8m - m$
Solución:
El signo común a todos los términos es el -.
Los coeficientes de los términos son 8 y 1.
La parte literal igual en todos los términos es m.
Y $8 + 1 = 9$;
$\therefore$ $-8m - m = -9m$.

6. $-9m - 7m$
Solución:
El signo común a todos los términos es el -.
Los coeficientes de los términos son 9 y 7.
La parte literal igual en todos los términos es m.
Y $9 + 7 = 16$;
$\therefore$ $-9m - 7m = -16m$.

7. $4a^x + 5a^x$.

Solución :

El signo común a todos los términos es el +.

Los coeficientes de los términos son 4 y 5.

La parte literal igual en todos los términos es a^x.

Y $4 + 5 = 9$;

$\therefore$ $4a^x + 5a^x = 9a^x$.

Reducción de dos términos semejantes de distinto signo

P r o c e d i m i e n t o

Para reducir dos términos semejantes de distinto signo, se halla la diferencia entre los coeficientes de los términos, colocando antes de esta diferencia el signo del coeficiente mayor (en valor absoluto) y a continuación se escribe la parte literal.

Nota: dos términos semejantes con igual coeficiente y distinto signo se anulan.

Reducir:

1. $8a - 6a$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es a.

Los coeficientes de los términos son 8 y 6.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo +.

Y $8 - 6 = 2$;

$\therefore$ $8a - 6a = 2a$.

2. $6a - 8a$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es a.

Los coeficientes de los términos son 8 y 6.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo −.

Y $8 - 6 = 2$;

$\therefore$ $6a - 8a = -2a$.

3. $9ab - 15ab$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es ab.

Los coeficientes de los términos son 9 y 15.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo −.

Y $15 - 9 = 6$;

$\therefore$ $9ab - 15ab = -6ab$.

4. $15ab - 9ab$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es ab.

Los coeficientes de los términos son 9 y 15.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo +.

Y $15 - 9 = 6$;

$\therefore$ $15ab - 9ab = 6ab$.

5. $2a - 2a$

Solución :

$2a - 2a = 0$ (dos términos semejantes con igual coeficiente y signo distinto se anulan).

6. $-7b + 7b$

Solución :

$-7b + 7b = 0$ (dos términos semejantes con igual coeficiente y signo distinto se anulan).

7. $-14xy + 32xy$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es xy.

Los coeficientes de los términos son 14 y 32.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo +.

Y $32 - 14 = 18$;

$\therefore$ $-14xy + 32xy = 18xy$.

8. $-25x^2y + 32x^2y$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es x^2y.

Los coeficientes de los términos son 25 y 32.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo +.

Y $32 - 25 = 7$;

$\therefore$ $-25x^2y + 32x^2y = 7x^2y$.

9. $40x^3y - 51x^3y$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es x^3y.

Los coeficientes de los términos son 40 y 51.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo −.

Y $51 - 40 = 11$;

$\therefore$ $40x^3y - 51x^3y = -11x^3y$.

10. $-m^2n + 6m^2n$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es m^2n.

Los coeficientes de los términos son 6 y 1.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo +.

Y $6 - 1 = 5$;

$\therefore$ $-m^2n + 6m^2n = 5m^2n$.

11. $-15xy + 40xy$

Solución :

La parte literal igual en los dos términos es xy.

Los coeficientes de los términos son 15 y 40.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo +.

Y $40 - 15 = 25$;

$\therefore$ $-15xy + 40xy = 25xy$.

Reducción de más de dos términos semejantes de signos distintos

Procedimiento

Para reducir un polinomio con más de dos términos semejantes y con signos distintos, se procede así:

1) Se reducen a un solo término todos los positivos.

2) Se reducen a un solo término todos los negativos.

3) Se calcula la diferencia entre los coeficientes de los términos hallados en los dos pasos anteriores.

4) El signo que precederá la diferencia hallada en el paso anterior será el que tenga el coeficiente mayor en valor absoluto de los términos hallados en los pasos (1) y (2).

5) Por último, se escribe la parte literal.

R e d u c i r :

1. $9a - 3a + 5a$.

S o l u c i ó n :

$9a + 5a = 14a$: reducción de los términos positivos.

$-3a$: término negativo.

La parte literal igual en los dos términos es a.

Los coeficientes de los términos son 14 y 3.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo +.

Y $14 - 3 = 11$;

$\therefore$ $14a - 3a = 11a$;

$\therefore$ $9a - 3a + 5a = 11a$.

2. $-8x + 9x - x$.

S o l u c i ó n :

$9x$: término positivo

$-8x - x = -9x$: reducción de los términos negativos

Y $9x - 9x = 0$ {dos términos semejantes con igual coeficiente y signo distinto se anulan};

$\therefore$ $-8x + 9x - x = 0$.

3. $12mn - 23mn - 5mn$.

Solución :

$12mn$: término positivo

$-23mn - 5mn = -28mn$: reducción de los términos negativos

La parte literal igual en los dos términos es mn.

Los coeficientes de los términos son 12 y 28.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo $-$.

Y $28 - 12 = 16$;

$\therefore$ $28mn - 12mn = 16mn$;

$\therefore$ $12mn - 23mn - 5mn = -16mn$.

4. $-x + 19x - 18x$.

Solución :

$19x$: término positivo

$-x - 18x = -19x$: reducción de los términos negativos

Y $19x - 19x = 0$ {dos términos semejantes con igual coeficiente y signo distinto se anulan};

$\therefore$ $-x + 19x - 18x = 0$.

5. $19m - 10m + 6m$.

Solución :

$19m + 6m = 25m$: reducción de los términos positivos

$-10m$: término negativo

La parte literal igual en los dos términos es m.

Los coeficientes de los términos son 25 y 10.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo $+$.

Y $25 - 10 = 15$;

$\therefore$ $25m - 10m = 15m$;

$\therefore$ $19m - 10m + 6m = 15m$.

6. $-11ab - 15ab + 26ab$.

Solución :

$26ab$: término positivo

$-11ab - 15ab = -26ab$: reducción de los términos negativos

Y $-26ab + 26ab = 0$ {dos términos semejantes con igual coeficiente y signo distinto se anulan};

$\therefore$ $-11ab - 15ab + 26ab = 0$.

7. $-5a^x + 9a^x - 35a^x$.

Solución:

$9a^x$: término positivo

$-5a^x - 35a^x = -40a^x$: reducción de los términos negativos

La parte literal igual en los dos términos es a^x.

Los coeficientes de los términos son 9 y 40.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo $-$.

Y $40 - 9 = 31$;

$\therefore$ $9a^x - 40a^x = -31a^x$;

$\therefore$ $-5a^x + 9a^x - 35a^x = -31a^x$.

8. $-24a^{x+2} - 15a^{x+2} + 39a^{x+2}$.

Solución:

$39a^{x+2}$: término positivo

$-24a^{x+2} - 15a^{x+2} = -39a^{x+2}$: reducción de los términos negativos

y $39a^{x+2} - 39a^{x+2} = 0$ {dos términos semejantes con igual coeficiente y signo distinto se anulan};

$\therefore$ $-24a^{x+2} - 15a^{x+2} + 39a^{x+2} = 0$.

9. $\frac{2}{3}y + \frac{1}{3}y - y$.

Solución:

$\frac{2}{3}y + \frac{1}{3}y = \frac{3}{3}y = y$: reduccion de los terminos positivos

$-y$: termino negativo

y $y - y = 0$ {dos términos semejantes con igual coeficiente y signo distinto se anulan};

$\therefore$ $\frac{2}{3}y + \frac{1}{3}y - y = 0$.

10. $-\frac{3}{5}m + \frac{1}{4}m - \frac{1}{2}m$.

Solución:

$\frac{1}{4}m$: termino positivo

$-\frac{3}{5}m - \frac{1}{2}m = -\frac{6+5}{10}m = -\frac{11}{10}m$: reduccion de los terminos negativos

La parte literal igual en los dos términos es m.

Los coeficientes de los términos son $\frac{1}{4}$ y $-\frac{11}{10}$.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo $-$.

Y $\frac{11}{10} - \frac{1}{4} = \frac{22-5}{20} = \frac{17}{20}$;

$\therefore$ $\frac{1}{4}m - \frac{11}{10}m = -\frac{17}{20}m$,

$\therefore$ $-\frac{3}{5}m + \frac{1}{4}m - \frac{1}{2}m = -\frac{17}{20}m$.

11. $\frac{3}{8}a^2b+\frac{1}{4}a^2b-a^2b.$

Solución :

$\frac{3}{8}a^2b+\frac{1}{4}a^2b=\frac{3+2}{8}a^2b=\frac{5}{8}a^2b$: reduccion de los terminos positivos

$-a^2b$: termino negativo

La parte literal igual en los dos términos es a^2b.

Los coeficientes de los términos son $\frac{5}{8}$ y 1.

El mayor coeficiente en valor absoluto tiene signo −.

Y $\quad 1-\frac{5}{8}=\frac{8-5}{8}=\frac{3}{8};$

$\therefore \quad \frac{5}{8}a^2b-a^2b=-\frac{3}{8}a^2b;$

$\therefore \quad \frac{3}{8}a^2b+\frac{1}{4}a^2b-a^2b=-\frac{3}{8}a^2b.$

Reducción de términos semejantes
Redución de un polinomio que contenga términos semejantes de diversas clases

P r o c e d i m i e n t o

Para reducir un polinomio con diversos términos semejantes de diversas clases, se procede de la siguiente manera:

1. Se agrupan los términos semejantes de cada clase en un mismo paréntesis

2. Se reducen los términos semejantes

3. Se da la respuesta, ordenando el polinommio resultante

Nota: recordemos que los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas letras y afectadas por los mismos exponentes

Reducir los polinomios siguientes:

1. $7a-9b+6a-4b$

Solución:

$7a-9b+6a-4b=(7a+6a)+(-9b-4b)$ {agrupando por clases},

$\Rightarrow \quad 7a-9b+6a-4b=(13a)+(-13b)$ {reduciendo};

$\therefore \quad 7a-9b+6a-4b=13a-13b.$

2. $a+b-c-b-c+2c-a$

Solución:

$a+b-c-b-c+2c-a=(a-a)+(b-b)+(-c+2c)$ {agrupando por clases},

$\Rightarrow \quad a+b-c-b-c+2c-a=0+0+c$ {reduciendo};

$\therefore \quad a+b-c-b-c+2c-a=c.$

3. $5x-11y-9+20x-1-y$

Solución:

$5x-11y-9+20x-1-y=(5x+20x)+(-11y-y)+(-9-1)$ {agrupando por clases},

$\Rightarrow \quad 5x-11y-9+20x-1-y=(25x)+(-12y)+(-10)$ {reduciendo};

$\therefore \quad (5x+20x)+(-11y-y)+(-9-1)=25x-12y-10.$

4. $-6m+8n+5-m-n-6m-11$

Solución:

$-6m+8n+5-m-n-6m-11=(-6m-m-6m)+(8n-n)+(5-11)$ {agrupando por clases},

$\Rightarrow \quad -6m+8n+5-m-n-6m-11=(-13m)+(7n)+(-6)$ {reduciendo};

$\therefore \quad -6m+8n+5-m-n-6m-11=-13m+7n-6.$

5. $-a+b+2b-2c+3a+2c-3b$

Solución:

$-a+b+2b-2c+3a+2c-3b=(-a+3a)+(b+2b-3b)+(-2c+2c)$ {agrupando por clases},

$\Rightarrow \quad -a+b+2b-2c+3a+2c-3b=(2a)+(0)+(0)$ {reduciendo};

$\therefore \quad -a+b+2b-2c+3a+2c-3b=2a.$

6. $-81x+19y-30z+6y+80x+x-25y$

Solución:

$-81x+19y-30z+6y+80x+x-25y=(-81x+80x+x)+(19y+6y-25y)+(-30z)$

{agrupando por clases},

$\Rightarrow \quad -81x+19y-30z+6y+80x+x-25y=(0)+(0)+(-30z)$ {reduciendo};

$\therefore \quad -81x+19y-30z+6y+80x+x-25y=-30z.$

7. $15a^2-6ab-8a^2+20-5ab-31+a^2-ab$

Solución:

$15a^2-6ab-8a^2+20-5ab-31+a^2-ab=(15a^2-8a^2+a^2)+(-6ab-5ab-ab)+(20-31)$

{agrupando por clases},

$\Rightarrow \quad 15a^2-6ab-8a^2+20-5ab-31+a^2-ab=(16a^2-8a^2)+(-12ab)+(-11)$ {reduciendo};

$\therefore \quad 15a^2-6ab-8a^2+20-5ab-31+a^2-ab=8a^2-12ab-11.$

Valor numérico de expresiones compuestas

P r o c e d i m i e n t o

1. Se reemplaza cada letra por su valor numérico
2. Se efectúan las operaciones indicadas

Hallar el valor numérico de las expresiones siguientes para:

$$a=1,\ b=2,\ c=3,\ d=4,\ m=\frac{1}{2},\ n=\frac{2}{3},\ p=\frac{1}{4},\ x=0$$

1. $(a+b)c-d$

Solución:

$$(a+b)c-d=(1+2)3-4 \qquad \{\text{sustituyendo cada letra por su valor numérico}\},$$

$$\Rightarrow \quad (a+b)c-d=(3)3-4=9-4;$$

$$\therefore \quad (a+b)c-d=5.$$

2. $(a+b)(b-a)$

Solución:

$$(a+b)(b-a)=(1+2)(2-1) \qquad \{\text{sustituyendo cada letra por su valor numérico}\},$$

$$\Rightarrow \quad (a+b)(b-a)=(3)(1);$$

$$\therefore \quad (a+b)(b-a)=3.$$

3. $(b-m)(c-n)+4a^2$

Solución:

$$(b-m)(c-n)+4a^2=\left(2-\frac{1}{2}\right)\left(3-\frac{2}{3}\right)+4(1)^2 \qquad \{\text{sustituyendo cada letra por su valor numérico}\},$$

$$\Rightarrow \quad (b-m)(c-n)+4a^2=\left(\frac{4-1}{2}\right)\left(\frac{9-2}{3}\right)+4\times 1=\frac{\cancel{3}}{2}\times\frac{7}{\cancel{3}}+4=\frac{7}{2}+4=\frac{7+8}{2};$$

$$\therefore \quad (b-m)(c-n)+4a^2=\frac{15}{2}\Leftrightarrow 7\tfrac{1}{2}.$$

4. $(2m+3n)(4p+b^2)$

Solución:

$$(2m+3n)(4p+b^2)=\left(2\times\frac{1}{2}+3\times\frac{2}{3}\right)\left(4\times\frac{1}{4}+2^2\right) \qquad \{\text{sustituyendo cada letra por su valor numérico}\},$$

$$\Rightarrow \quad (2m+3n)(4p+b^2)=\left(\cancel{2}\times\frac{1}{\cancel{2}}+\cancel{3}\times\frac{2}{\cancel{3}}\right)\left(\cancel{4}\times\frac{1}{\cancel{4}}+2^2\right)=(1+2)(1+4) \qquad \{\text{simplificando}\};$$

$$\therefore \quad (2m+3n)(4p+b^2)=3\times 5=15.$$

5. $(4m+8p)(a^2+b^2)(6n-d)$

Solución:

$$(4m+8p)(a^2+b^2)(6n-d)=\left(4\times\frac{1}{2}+8\times\frac{1}{4}\right)(1^2+2^2)\left(6\times\frac{2}{3}-4\right)$$

{sustituyendo cada letra por su valor numérico},

$$\Rightarrow\quad (4m+8p)(a^2+b^2)(6n-d)=\left(\frac{2}{\cancel{4}}\times\frac{1}{\cancel{2}}+\frac{2}{\cancel{8}}\times\frac{1}{\cancel{4}}\right)(1+4)\left(\frac{2}{\cancel{6}}\times\frac{2}{\cancel{3}}-4\right)$$

{simplificando},

$$\Rightarrow\quad (4m+8p)(a^2+b^2)(6n-d)=(2+2)(1+4)(4-4)=4\times5\times0;$$

$$\therefore\quad (4m+8p)(a^2+b^2)(6n-d)=0.$$

6. $(c-b)(d-c)(b-a)(m-p)$

Solución:

$$(c-b)(d-c)(b-a)(m-p)=(3-2)(4-3)(2-1)\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)$$

{sustituyendo cada letra por su valor numérico},

$$\Rightarrow\quad (c-b)(d-c)(b-a)(m-p)=1\times1\times1\times\left(\frac{2-1}{4}\right)$$

{reduciendo};

$$\therefore\quad (c-b)(d-c)(b-a)(m-p)=\frac{1}{4}.$$

7. $b^2(c+d)-a^2(m+n)+2x$

$$b^2(c+d)-a^2(m+n)+2x=2^2(3+4)-1^2\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\right)+2\times0$$

{sustituyendo cada letra por su valor numérico},

$$\Rightarrow\quad b^2(c+d)-a^2(m+n)+2x=4(7)-1\left(\frac{3+4}{6}\right)+0,$$

$$\Rightarrow\quad b^2(c+d)-a^2(m+n)+2x=28-\frac{7}{6}=\frac{168-7}{6};$$

$$\therefore\quad b^2(c+d)-a^2(m+n)+2x=28-\frac{7}{6}=\frac{161}{6}\Leftrightarrow26\tfrac{5}{6}.$$

Ejercicios sobre notación algebraica

1. Escríbase la suma de a, b y m.

Solución:

$a+b+m$.

2. Escríbase la suma del cuadrado de m, el cubo de b y la cuarta parte de x.

Solución:

Sea

m^2 : cuadrado de m

b^3 : cubo de b

x^4 : cuarta potencia de x

De tal manera que:

$m^2+b^3+x^4$: expresión pedida

3. Siendo a un número entero, escríbanse los dos números enteros consecutivos posteriores a a.

Solución:

Para hallar un número entero consecutivo y posterior a otro basta con sumar *uno* al primer número

Sea

a: número dado

De tal manera que:

$$\left.\begin{matrix} a+1 \\ a+2 \end{matrix}\right\}: \text{números buscados.}$$

4. Siendo x un número entero, escríbanse los dos números consecutivos anteriores a x.

Solución:

Para hallar un número entero anterior a otro basta con restar *uno* al primer número

Sea

x: número dado

De tal manera que:

$$\left.\begin{matrix} x-1 \\ x-2 \end{matrix}\right\}: \text{números buscados.}$$

5. Siendo y un número entero par, escríbanse los tres números pares consecutivos posteriores a y.

Solución:

Los números pares son de la forma $2k$, donde k pertenece a los enteros. Para escribir los números pares consecutivos a un número dado, basta con sumar dos unidades a éste número

Sea

y: número dado

De tal manera que:

$$\left.\begin{matrix} y+2 \\ y+4 \\ y+6 \end{matrix}\right\}: \text{números buscados.}$$

S u m a

Suma de monomios

P r o c e d i m i e n t o

1. Se escriben las expresiones una a continuación de otra y con sus respectivos signos

2. Se reducen los términos semejantes. Para reducir términos semejantes se procede de la siguiente forma:

a. Si los términos son de igual signo, se suman los coeficientes y se escribe el signo común

b. Si los términos tienen signo distinto, se restan los coeficientes y se escribe el signo del número mayor en valor absoluto

c. A continuación del signo y del coeficiente se escribe la parte literal

Nota: recuerdese que los términos semejantes son aquellos sumandos que tienen las mismas letras y afectadas por los mismos exponentes.

S u m a r :

1. $m,\ n$

S o l u c i ó n :

$m+n$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +}.

2. $m,\ -n$

S o l u c i ó n :

$m+(-n)=m-n$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +}.

3. $-3a,\ 4b$

S o l u c i ó n :

$-3a+4b$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +}.

4. $5b,\ -6a$

S o l u c i ó n :

$5b+(-6a)=5b-6a$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +}.

5. $7,\ -6$

S o l u c i ó n :

$7+(-6)=7-6$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +};

$7+(-6)=1$ {reduciendo términos semejantes}.

6. $-6,\ 9$

S o l u c i ó n :

$-6+9$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +};

$-6+9=3$ {reduciendo}.

7. $-2x,\ 3y$

S o l u c i ó n :

$-2x+3y$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +}.

8. $5mn,\ -m$

Solución:

$5mn + (-m) = 5mn - m$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +}.

9. $5a,\ 7a$

Solución:

$5a + 7a = 12a$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +, Y se reduce}.

10. $-8x,\ -5x$

Solución:

$-8x + (-5x) = -8x - 5x$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +};

$-8x + (-5x) = -13x$ {reduciendo términos semejantes}.

11. $-11m,\ 8m$

Solución:

$-11m + 8m = -3m$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +. Y se reduce}.

12. $9ab,\ -15ab$

Solución:

$9ab + (-15ab) = 9ab - 15ab$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +};

$9ab + (-15ab) = -6ab$ {reduciendo términos semejantes}.

13. $-xy,\ -9xy$

Solución:

$-xy + (-9xy) = -xy - 9xy$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +};

$-xy + (-9xy) = -10xy$ {reduciendo}.

14. $mn,\ -11mn$

Solución:

$mn + (-11mn) = mn - 11mn$ {se escriben las expresiones, una a continuación de otra, operadas con +};

$mn + (-11mn) = -10mn$ {reduciendo términos semejantes}.

S u m a.Suma de polinomios

P r o c e d i m i e n t o

1. Se ordenan los polinomios
2. Se escriben los polinomios, uno debajo de otro (cada polinomio en una fila diferente); y de tal forma, que los téminos semejantes queden en la misma columna
3. Se reducen los términos semejantes:
a. Se suman los términos positivos
b. Se suman los términos negativos
c. Se establece la diferencia entres los resultados obtenidos en a y b
d. En el total, el signo que lleve el término corresponderá al del número mayor, en valor absoluto, de las sumas en a y b
4. Se dibuja una línea debajo de la última fila; y debajo de esta línea se escriben los términos, ya reducidos en el paso 3, con sus respectivos signos
Hallar al suma de:

1. $3a+2b-c;\ 2a+3b+c$

Solución:

$$\begin{array}{r} 3a+2b-c \\ \underline{2a+3b+c} \\ 5a+5b+0; \end{array}$$

$\therefore \quad (3a+2b-c)+(2a+3b+c)=5a+5b.$

2. $7a-4b+5c;\ -7a+4b-6c$

Solución:

$$\begin{array}{r} 7a-4b+5c \\ \underline{-7a+4b-6c} \\ 0\ \ +0\ \ -c; \end{array}$$

$\therefore \quad (7a-4b+5c)+(-7a+4b-6c)=-c.$

3. $m+n-p;\ -m-n+p$

Solución:

$$\begin{array}{r} m+n-p \\ \underline{-m-n+p} \\ 0+0+0; \end{array}$$

$\therefore \quad (m+n-p)+(-m-n+p)=0.$

4. $9x-3y+5;\ -x-y+4;\ -5x+4y-9$

Solución:

$$\begin{array}{r} 9x-3y\ +5 \\ -x\ -y\ +4 \\ \underline{-5x+4y-9} \\ 3x\ +0+0; \end{array}$$

$\therefore \quad (9x-3y+5)+(-x-y+4)+(-5x+4y-9)=3x$

.

5. $a+b-c;\ 2a+2b-2c;\ -3a-b+3c$

Solución:

$$\begin{array}{r} a\ +b-c \\ 2a+2b-2c \\ \underline{-3a\ -b+3c} \\ 0+2b+0; \end{array}$$

$\therefore \quad (a+b-c)+(2a+2b-2c)+(-3a-b+3c)=2b.$

6. $p+q+r;\ -2p-6q+3r;\ p+5q-8r$

Solución:

$$\begin{array}{r} p\ +q\ \ +r \\ -2p\ -6q+3r \\ \underline{p+5q\ -8r} \\ 0\ \ +0\ \ -4r; \end{array}$$

$\therefore \quad (p+q+r)+(-2p-6q+3r)+(p+5q-8r)=-4r.$

7. $-7x-4y+6z;\ 10x-20y-8z;\ -5x+24y+2z$

Solución:

$$\begin{array}{r} -7x\ -4y+6z \\ 10x-20y-8z \\ \underline{-5x+24y+2z} \\ -2x\ \ \ +0\ \ +0; \end{array}$$

$\therefore \quad (-7x-4y+6z)+(10x-20y-8z)+(-5x+24y+2z)=-2x.$

R e s t a
Resta de monomios

P r o c e d i m i e n t o
1. Se identifican tanto el minuendo como el sustraendo **2.** Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con signo cambiado **3.** Se reduce la expresión resultante ***Nota1:*** *el minuendo es la cantidad de la que se resta otra cantidad. El sustraendo es la cantidad que se resta de otra.* ***Nota2:*** *dos términos son semejantes cuando tienen las mismas letras y afectadas por los mismos exponentes.*

De:

1. -8 restar 5

Solución:

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado:

$-8-5=-13$ {reduciendo}.

2. -7 restar 4

Solución:

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado:

$-7-4=-11$ {reduciendo}.

3. 8 restar 11

Solución:

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado:

$8-11=-3$ {reduciendo}.

4. -8 restar -11

Solución:

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado:

$-8+11=3$ {reduciendo}.

5. -1 restar -9

Solución:

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado:

$-1+9=8$ {reduciendo}.

6. $2a$ restar $3b$

Solución:

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado:

$2a-3b$

7. $3b$ restar 2

Solución:

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con el signo cambiado:

$3b-2$

R e s t a

Resta de polinomios

P r o c e d i m i e n t o

1. Se identifican tanto el minuendo como el sustraendo
2. Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo con signo cambiado. O también, el minuendo en una fila y en la fila inferior el sustraendo, cada término con el signo cambiado; y, cada término en la misma columna que su semejante.
3. Se reduce la expresión resultante
Nota1: *el minuendo es la cantidad de la que se resta otra cantidad. El sustraendo es la cantidad que se resta de otra.*
Nota2: *dos términos son semejantes cuando tienen las mismas letras y afectadas por el mismo exponente.*

Restar:

1. $a-b$ de $b-a$

Solución:

$b-a$: minuendo

$a-b$: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$b-a-(a-b)=b-a-a+b=-2a+2b.$$

2. $x-y$ de $2x+3y$

Solución:

$2x+3y$: minuendo

$x-y$: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$2x+3y-(x-y)=2x+3y-x+y=x+4y.$$

3. $-5a+b$ de $-7a+5$

Solución:

$-7a+5$: minuendo

$-5a+b$: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$-7a+5-(-5a+b)=-7a+5+5a-b=-2a-b+5.$$

4. x^2-5x de $-x^2+6$

Solución:

$-x^2+6$: minuendo

x^2-5x: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$-x^2+6-(x^2-5x)=-x^2+6-x^2+5x=-2x^2+5x+6.$$

5. x^3-xy^2 de x^2y+5xy^2

Solución:

x^2y+5xy^2: minuendo

x^3-xy^2: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y a continuación el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$x^2y+5xy^2-(x^3-xy^2)=x^2y+5xy^2-x^3+xy^2=-x^3+x^2y+6xy^2.$$

24. $7x^7+5x^5-23x^3+51x+36$ de $x^8-x^6+3x^4-5x^2-9$

Solución:

$x^8-x^6+3x^4-5x^2-9$: minuendo

$7x^7+5x^5-23x^3+51x+36$: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y debajo el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$\begin{array}{ccccccccc} x^8 & & -x^6 & & +3x^4 & & -5x^2 & & -9 \\ \hline & -7x^7 & & -5x^5 & & +23x^3 & & -51x-36 & \end{array}$$

$$x^8-7x^7-x^6-5x^5+3x^4+23x^3-5x^2-51x-45;$$

$\therefore\ (x^8-x^6+3x^4-5x^2-9)-(7x^7+5x^5-23x^3+51x+36)=$

$x^8-7x^7-x^6-5x^5+3x^4+23x^3-5x^2-51x-45.$

25. $y^7-60x^4y^3+90x^3y^4-50xy^6-x^2y^5$ de $x^7-3x^5y^2+35x^4y^3-8x^2y^5+60$

Solución:

Ordenamos los polinomios en forma descendente respecto a x:

$x^7-3x^5y^2+35x^4y^3-8x^2y^5+60$: minuendo

$-60x^4y^3+90x^3y^4-x^2y^5-50xy^6+y^7$: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y debajo el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$\begin{array}{ccccccccc} x^7 & -3x^5y^2 & +35x^4y^3 & & -8x^2y^5 & & +60 & & \\ \hline & & 60x^4y^3 & -90x^3y^4 & & +x^2y^5 & +50xy^6 & -y^7 & \end{array}$$

$$x^7-3x^5y^2+95x^4y^3-90x^3y^4-7x^2y^5+50xy^6-y^7+60;$$

$\therefore\ (x^7-3x^5y^2+35x^4y^3-8x^2y^5+60)-(-60x^4y^3+90x^3y^4-x^2y^5-50xy^6+y^7)=$

$x^7-3x^5y^2+95x^4y^3-90x^3y^4-7x^2y^5+50xy^6-y^7+60.$

26. $a^{x+2}-5a^{x+1}-6a^x$ de $a^{x+3}-8a^{x+1}-5$

Solución:

$a^{x+3}-8a^{x+1}-5$: minuendo

$a^{x+2}-5a^{x+1}-6a^x$: sustraendo

Se escribe el minuendo con su propio signo y debajo el sustraendo, cada término con el signo cambiado:

$$\begin{array}{ccccc} a^{x+3} & & -8a^{x+1} & & -5 \\ \hline & -a^{x+2} & +5a^{x+1} & +6a^x & \end{array}$$

$$a^{x+3}-a^{x+2}-3a^{x+1}+6a^x-5;$$

$\therefore\ (a^{x+3}-8a^{x+1}-5)-(a^{x+2}-5a^{x+1}-6a^x)=a^{x+3}-a^{x+2}-3a^{x+1}+6a^x-5.$

Signos de agrupación

Supresión de signos de agrupación

Procedimiento

Para suprimir signos de agrupación se procede de la siguiente manera:

1. Cuando se suprime un signo de agrupación precedido del signo +, los términos que estaban agrupados por él no cambian de signo
2. Cuando se suprime un signo de agrupación precedido del signo -, los términos que estaban agrupados por él cambian de signo
3. Cada vez que se suprime un signo de agrupación, se procede a reducir los términos semejantes

Simplificar, suprimiendo los signos de agrupación y reduciendo términos semejantes:

1. $x-(x-y)$

Solución:

$$x-(x-y)=x-x+y$$

{como el paréntesis está precedido del signo −, al suprimirlo cambiamos los signos de los términos agrupados por él};

$\therefore \quad x-(x-y)=y$ {reduciendo términos semejantes}.

2. $x^2+(-3x-x^2+5)$

Solución:

$$x^2+(-3x-x^2+5)=x^2-3x-x^2+5$$

{como el paréntesis está precedido del signo +, al suprimirlo no cambiamos los signos de los términos agrupados por él};

$\therefore \quad x^2+(-3x-x^2+5)=-3x+5$ {reduciendo términos semejantes}.

3. $a+b-(-2a+3)$

Solución:

$$a+b-(-2a+3)=a+b+2a-3$$

{como el paréntesis está precedido del signo −, al suprimirlo cambiamos los signos de los términos agrupados por él};

$\therefore \quad a+b-(-2a+3)=3a+b-3$ {reduciendo términos semejantes}.

4. $4m-(-2m-n)$

Solución:

$$4m-(-2m-n)=4m+2m+n$$

{como el paréntesis está precedido del signo −, al suprimirlo cambiamos los signos de los términos agrupados por él};

$\therefore \quad 4m-(-2m-n)=6m+n$ {reduciendo términos semejantes}.

M u l t i p l i c a c i ó n

Multiplicación de polinomios por polinomios

P r o c e d i m i e n t o
1. Se ordenan los polinomios **2.** Se escriben el multiplicando y el multiplicador en dos filas: el multiplicando en la fila superior y el multiplicador en la inferior. Se traza una linea horizontal debajo de estas dos filas **3.** Se multiplica cada termino del multiplicador por todos los terminos del multiplicando (teniendo en cuenta la *ley de los signos* y *la ley de los exponentes)* **4.** Cada producto particular se escribe en su respectiva fila debajo de la línea horizontal y en el orden en que se efectuaron los productos parciales: en la primera fila, el producto del primer termino del multiplicador y todos los del mutiplicando; en la segunda fila, el producto del segundo termino del multiplicador y todos los del mutiplicando; en la tercera fila, el producto del tercer termino del multiplicador y todos los del mutiplicando; ... **5.** Los términos semejantes se escriben en la misma columna **6.** Se reducen los términos semejantes

Ley de los signos	**Propiedad en el producto de potencias**
+ por + da + + por - da - - por + da - - por - da +	Para hallar el producto de dos o más potencias con la misma base, basta con escribir la base común y sumar los exponentes respectivos.

Multiplicar:

1. x^2+xy+y^2 por $x-y$

Solución:

$$\begin{array}{r} x^2+xy+y^2 \\ \underline{x-y\qquad\qquad} \\ x^3+x^2y+xy^2 \\ \quad -x^2y-xy^2-y^3 \\ \hline x^3\qquad\qquad -y^3 \end{array}$$

Respuesta:

$$(x^2+xy+y^2)(x-y)=x^3-y^3$$

2. a^2+b^2-2ab por $a-b$

Solución:

Ordenamos los polinomios alfabeticamente:

$$\begin{array}{r} a^2-2ab+b^2 \\ \underline{a-b\qquad\qquad} \\ a^3-2a^2b+ab^2 \\ \quad -a^2b+2ab^2-b^3 \\ \hline a^3-3a^2b+3ab^2-b^3 \end{array}$$

Respuesta:

$$(a^2+b^2-2ab)(a-b)=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3.$$

3. a^2+b^2+2ab por $a+b$

Solución:

Ordenamos los polinomios alfabeticamente:

$$\begin{array}{r} a^2+2ab+b^2 \\ \underline{a+b\qquad\qquad} \\ a^3+2a^2b+ab^2 \\ \quad a^2b+2ab^2+b^3 \\ \hline a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \end{array}$$

Respuesta:

$$(a^2+b^2+2ab)(a-b)=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3.$$

4. x^3-3x^2+1 por $x+3$

Solución:

$$\begin{array}{r} x^3-3x^2+1 \\ \hline x+3 \\ \hline x^4-3x^3\quad\quad +x \\ \quad 3x^3-9x^2\quad +3 \\ \hline x^4\quad -9x^2+x+3 \end{array}$$

Respuesta:

$(x^3-3x^2+1)(x+3)=x^4-9x^2+x+3.$

5. a^3-a+a^2 por $a-1$

Solución:

$$\begin{array}{r} a^3+a^2-a \qquad \text{(ordenando en forma dscendente)} \\ \hline a-1 \\ \hline a^4+a^3-a^2 \\ \quad -a^3-a^2+a \\ \hline a^4\quad -2a^2+a \end{array}$$

Respuesta:

$(a^3-a+a^2)(a-1)=a^4-2a^2+a.$

6. $m^4+m^2n^2+n^4$ por m^2-n^2

Solución:

$$\begin{array}{r} m^4+m^2n^2+n^4 \qquad \text{(ordenando en forma dscendente)} \\ \hline m^2-n^2 \\ \hline m^6+m^4n^2+m^2n^4 \\ \quad -m^4n^2-m^2n^4-n^6 \\ \hline m^6\quad\quad\quad -n^6 \end{array}$$

Respuesta:

$(m^4+m^2n^2+n^4)(m^2-n^2)=m^6-n^6.$

7. x^3-2x^2+3x-1 por $2x+3$

Solución:

$$\begin{array}{r} x^3-2x^2+3x-1 \\ \hline 2x+3 \\ \hline 2x^4-4x^3+6x^2-2x \\ \quad 3x^3-6x^2+9x-3 \\ \hline 2x^4\ -x^3\quad\quad +7x-3 \end{array}$$

Respuesta:

$(x^3-2x^2+3x-1)(2x+3)=2x^4-x^3+7x-3.$

8. $3y^3+5-6y$ por y^2+2

Solución:

$$\begin{array}{l} 3y^3-6y+5 \\ y^2+2 \\ \hline 3y^5-6y^3+5y^2 \\ \quad 6y^3 \quad -12y+10 \\ \hline 3y^5 \quad +5y^2-12y+10 \end{array}$$

{ordenando en forma descendente}

Respuesta:

$$(3y^3+5-6y)(y^2+2)=3y^5+5y^2-12y+10.$$

12. a^2+a+1 por a^2-a-1

Solución:

$$\begin{array}{l} a^2+a+1 \\ a^2-a-1 \\ \hline a^4+a^3+a^2 \\ \quad -a^3-a^2-a \\ \quad \quad -a^2-a-1 \\ \hline a^4 \quad -a^2-2a-1 \end{array}$$

Respuesta:

$$(a^2+a+1)(a^2-a-1)=a^4-a^2-2a-1.$$

13. x^3+2x^2-x por x^2-2x+5

Solución:

$$\begin{array}{l} x^3+2x^2-x \\ x^2-2x+5 \\ \hline x^5+2x^4 \quad -x^3 \\ \quad -2x^4-4x^3 \quad +2x^2 \\ \quad \quad 5x^3+10x^2-5x \\ \hline x^5 \quad \quad +12x^2-5x \end{array}$$

Respuesta:

$$(x^3+2x^2-x)(x^2-2x+5)=x^5+12x^2-5x.$$

15. x^2+1+x por x^2-x-1

Solución:

$$\begin{array}{l} x^2+x+1 \qquad \text{(ordenando en forma descendente)} \\ \underline{x^2-x-1\qquad\qquad\qquad\qquad} \\ x^4+x^3+x^2 \\ \quad -x^3-x^2-x \\ \qquad\quad -x^2-x-1 \\ \hline x^4\qquad -x^2-2x-1 \end{array}$$

Respuesta:

$(x^2+1+x)(x^2-x-1) = x^4-x^2-2x-1$.

16. $2-3x^2+x^4$ por x^2-2x+3

Solución:

$$\begin{array}{l} x^4-3x^2+2 \qquad \text{(ordenando en forma descendente)} \\ \underline{x^2-2x+3\qquad\qquad\qquad\qquad} \\ x^6\qquad -3x^4\qquad +2x^2 \\ \quad -2x^5\qquad +6x^3\qquad -4x \\ \qquad\quad +3x^4\qquad -9x^2\qquad +6 \\ \hline x^6-2x^5\qquad +6x^3-7x^2-4x+6 \end{array}$$

Respuesta:

$(2-3x^2+x^4)(x^2-2x+3) = x^6-2x^5+6x^3-7x^2-4x+6$.

17. m^3-4m+m^2-1 por m^3+1

Solución:

$$\begin{array}{l} m^3+m^2-4m-1 \qquad \text{(ordenando en forma descendente)} \\ \underline{m^3+1\qquad\qquad\qquad\qquad} \\ m^6+m^5-4m^4-m^3 \\ \qquad\qquad\qquad\quad m^3+m^2-4m-1 \\ \hline m^6+m^5-4m^4\qquad +m^2-4m-1 \end{array}$$

Respuesta:

$(m^3-4m+m^2-1)(m^3+1) = m^6+m^5-4m^4+m^2-4m-1$.

18. a^3-5a+2 por a^2-a+5

Solución:

$$\begin{array}{r} a^3-5a+2 \\ a^2-a+5 \\ \hline a^5 \quad -5a^3+2a^2 \\ -a^4 \quad +5a^2-2a \\ \hline 5a^3-25a+10 \\ \hline a^5-a^4+7a^2-27a+10 \end{array}$$

Respuesta:

$(a^3-5a+2)(a^2-a+5)=a^5-a^4+7a^2-27a+10$.

19. $x^2-2xy+y^2$ por $xy-x^2+3y^2$

Solución:

$$\begin{array}{r} x^2-2xy+y^2 \\ -x^2+xy+3y^2 \quad \text{(ordenando en forma descendente respecto a } x\text{)} \\ \hline -x^4+2x^3y \quad -x^2y^2 \\ x^3y-2x^2y^2+xy^3 \\ 3x^2y^2-6xy^3+3y^4 \\ \hline -x^4+3x^3y \quad -5xy^3+3y^4 \end{array}$$

Respuesta:

$(x^2-2xy+y^2)(xy-x^2+3y^2)=-x^4+3x^3y-5xy^3+3y^4$.

Trinomio cuadrado perfecto

Definición : Una cantidad es un cuadrado perfecto cuando es el resultado del producto de dos factores iguales.

Un trinomio cuadrado perfecto es de la forma general $a^2+2ab+b^2$ ó $a^2-2ab+b^2$ y, es el producto de los factores $(a+b)(a+b)=(a+b)^2$ ó bien $(a-b)(a-b)=(a-b)^2$; de tal manera que : $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ y $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$.

P r o c e d i m i e n t o

1. Se ordena el trinomio
2. Se extrae la raíz cuadrada del primer y tercer términos
3. Se halla el doble producto de las raíces obtenidas en el paso anterior
4. Si el producto hallado en el paso anterior es igual al segundo téermino del trinomio y si el primero y tercer términos tienen igual signo, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y se factoriza como tal.
5. Se escribe dentro de un paréntesis las raíces cuadradas del primer y tercer términos, separadas por el signo del segundo término, y el paréntesis elevado al cuadrado.

Factorar o descomponer en dos factores:

1. $a^2 - 2ab + b^2$

Solución:

$a^2 - 2ab + b^2$

a: raíz cuadrada del primer término del trinomio

b: raíz cuadrada del tercer término del trinomio

$2ab$ (doble producto de las raices cuadradas del primer y tercer términos): segundo término del trinomio

Los signos del primero y tercer términos son ambos positivos

Por lo tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y, se factoriza como tal:

$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$.

2. $a^2 + 2ab + b^2$

Solución:

$a^2 + 2ab + b^2$

a: raíz cuadrada del primer término del trinomio

b: raíz cuadrada del tercer término del trinomio

$2ab$ (doble producto de las raices cuadradas del primer y tercer términos): segundo término del trinomio

Los signos del primero y tercer términos son ambos positivos

Por lo tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y, se factoriza como tal:

$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$.

3. $x^2 - 2x + 1$

Solución:

$x^2 - 2x + 1$

x: raíz cuadrada del primer término del trinomio

1: raíz cuadrada del tercer término del trinomio

$2x$ (doble producto de las raices cuadradas del primer y tercer términos): segundo término del trinomio

Los signos del primero y tercer términos son ambos positivos

Por lo tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y, se factoriza como tal:

$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$.

4. $y^4 + 1 + 2y^2$

Solución:

$y^4 + 1 + 2y^2 = y^4 + 2y^2 + 1$ (ordenando el trinomio)

y^2: raíz cuadrada del primer término del trinomio

1: raíz cuadrada del tercer término del trinomio

$2y^2$ (doble producto de las raices cuadradas del primer y tercer términos): segundo término del trinomio

Los signos del primero y tercer términos son ambos positivos

Por lo tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y, se factoriza como tal:

$y^4 + 1 + 2y^2 = y^4 + 2y^2 + 1 = (y^2 + 1)^2$.

5. $a^2 - 10a + 25$

Solución:

$a^2 - 10a + 25$

a: raíz cuadrada del primer término del trinomio

5: raíz cuadrada del tercer término del trinomio

$10a$ (doble producto de las raices cuadradas del primer y tercer términos): segundo término del trinomio

Los signos del primero y tercer términos son ambos positivos

Por lo tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y, se factoriza como tal:

$a^2 - 10a + 25 = (a - 5)^2$.

6. $9 - 6x + x^2$

Solución:

$9 - 6x + x^2$

3: raíz cuadrada del primer término del trinomio

x: raíz cuadrada del tercer término del trinomio

$6x$ (doble producto de las raices cuadradas del primer y tercer términos): segundo término del trinomio

Los signos del primero y tercer términos son ambos positivos

Por lo tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y, se factoriza como tal:

$9 - 6x + x^2 = (3 - x)^2$.

7. $16 + 40x^2 + 25x^4$

Solución:

$16 + 40x^2 + 25x^4$

4: raíz cuadrada del primer término del trinomio

$5x^2$: raíz cuadrada del tercer término del trinomio

$40x^2$ (doble producto de las raices cuadradas del primer y tercer términos): segundo término del trinomio

Los signos del primero y tercer términos son ambos positivos

Por lo tanto, se trata de un trinomio cuadrado perfecto y, se factoriza como tal:

$16 + 40x^2 + 25x^4 = (4 + 5x^2)^2$.

Factorizar o descomponer en dos factores:

1. $x^2 - y^2$

Solución:

$x^2 - y^2$

x: raíz cuadrada del minuendo

y: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$.

2. $a^2 - 1$

Solución:

$a^2 - 1$

a: raíz cuadrada del minuendo

1: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$a^2 - 1 = (a + 1)(a - 1)$.

3. $a^2 - 4$

Solución:

$a^2 - 4$

a: raíz cuadrada del minuendo

2: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$a^2 - 4 = (a + 2)(a - 2)$.

4. $9 - b^2$

Solución:

$9 - b^2$

3: raíz cuadrada del minuendo

b: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$9 - b^2 = (3 + b)(3 - b)$.

5. $1 - 4m^2$

Solución:

$1 - 4m^2 = 1 - (2m)^2$

1: raíz cuadrada del minuendo

$2m$: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$1 - 4m^2 = (1 + 2m)(1 - 2m)$.

6. $16 - n^2$

Solución:

$16 - n^2$

4: raíz cuadrada del minuendo

n: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$16 - n^2 = (4 + n)(4 - n)$.

7. $a^2 - 25$

Solución:

$a^2 - 25$

a: raíz cuadrada del minuendo

5: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$a^2 - 25 = (a + 5)(a - 5)$.

8. $1 - y^2$

Solución:

$1 - y^2$

1: raíz cuadrada del minuendo

y: raíz cuadrada del sustraendo

De tal manera que:

$1 - y^2 = (1 + y)(1 - y)$.

UNIDAD 5. Ecuaciones

Conceptos

- *Igualdad numérica.*
- *Ecuaciones. Clasificación.*
- *Resolución de ecuaciones: reglas de la suma y del producto.*
- *Ecuaciones de primer grado con una incógnita.*
- *Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas*
- *Resolución de problemas de ecuaciones de primer grado.*

Igualdades, identidades y ecuaciones

Una igualdad es cualquier expresión matemática que contenga el signo =. En toda igualdad hay dos o más elementos que se comparan. Estos elementos se llaman miembros. Leyendo de derecha a izquierda los llamaremos 1º miembro , 2º miembro y así sucesivamente. Si únicamente se comparan dos elementos podemos también llamarlos miembro izquierdo o derecho, tomando como referencia el signo igual.
Igualdad con sólo dos miembros: 3x-1=2

Propiedades de las igualdades

a) Si en una igualdad sumamos o restamos la misma cantidad a ambos lados de la igualdad (miembros) la igualdad permanece.
a = b
a + k = b + k
b) Si en una igualdad multiplicamos o dividimos por la misma cantidad ambos miembros de la igualdad, ésta permanece.
a = b
a * k = b * K

Vamos a distinguir dos tipos de igualdades en función de la naturaleza de las entidades matemáticas que las formen:
Igualdades numéricas o aritméticas: son aquellas en las que únicamente intervienen números.
3 *5 = 8 + 7
Igualdades algebraicas: son aquellas en las que intervienen números y letras

2x + y = 14
$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

Dentro de las igualdades algebraicas vamos a distinguir a su vez entre ***identidades y ecuaciones.***

Identidad es una igualdad algebraica que es cierta para cualquier valor que tomen las variables. Todos los productos notables son identidades.

Ecuación es una igualdad algebraica que es cierta sólo para un conjunto finito de valores. Estos valores son las soluciones de la ecuación. Resolver una ecuación es buscar ese conjunto de valores.
Una ecuación es entera cuando las incógnitas no figuran en el denominador, en caso contrario se llama fraccionaria.
Una ecuación es numérica cuando en ella no aparecen más letras que las incógnitas, en caso contrario hablaremos de ecuaciones literales.
El grado de una ecuación entera con una incógnita es el mayor exponente de la incógnita.

Resolución de ecuaciones de 1º grado

Para resolver una ecuación de primer grado con una incógnita se pueden seguir los siguientes pasos:
1. Eliminación de paréntesis aplicando la propiedad distributiva.
2. Eliminación de los denominadores, reduciendo previamente a común denominador.
3. Trasposición de términos, pasando todas las incógnitas a un miembro y los números al otro
4. Reducción de términos semejantes.
5. Despejar la incógnita dividiendo ambos miembros por el coeficiente de la incógnita.

¡¡ojo!!***Hay que tener mucho cuidado cuando hay un signo menos delante de una fracción***. Este signo actúa con el numerador de la fracción como con un paréntesis. Cambia el signo de lo de dentro. Por esta razón conviene usar paréntesis al eliminar los denominadores.

Y, AHORA, RESUELVE (SI ERES CAPAZ) LAS SIGUIENTES ECUACIONES:

1. $\frac{3x}{2}+2=x+4$
2. $x-8=\frac{x}{2}-\frac{x+6}{3}$
3. $x-\frac{3x}{4}=\frac{x}{7}+3$
4. $2\left(\frac{x+5}{3}\right)=x+3$
5. $\frac{9x}{4}-6=\frac{2x}{3}+\frac{1}{3}$
6. $\frac{5x}{6}-\frac{3x}{4}=x-1$
7. $\frac{3x}{5}-7=\frac{2x}{6}+1$
8. $x-10=\frac{5}{9}(x+6$
9. $\frac{x}{3}+x=10-\frac{2}{9}$
10. $\frac{3x}{2}+1=12-\frac{x}{3}$
11. $\frac{x}{5}+\frac{x}{2}=x-3$
12. $4x+7=\frac{5x+6}{4}$
13. $\frac{x+2}{3}=5x+4$
14. $1-\frac{2x+10}{3x+20}=\frac{7}{8}$
15. $\frac{x}{4}+\frac{3x}{6}+x=2$
16. $\frac{x}{4}-\frac{1}{6}=\frac{3}{2}-\frac{5x}{6}$
17. $\frac{x}{3}+\frac{x}{4}+\frac{x}{5}=9$
18. $\frac{x}{3}+10=\frac{x}{5}+1$
19. $3x+9+\frac{x}{5}=2x+5$
20. $\frac{x}{4}+5=\frac{2x}{5}-2-\frac{x}{3}$
21. $\frac{5x}{8}-\frac{1}{2}(x+20)=\frac{2x+1}{6}$
22. $x+\frac{x+1}{5}=x+\frac{x}{2}$
23. $3x-\frac{7x}{8}=1+\frac{x-3}{4}+\frac{1}{2}$
24. $8-\frac{3x+2}{10}=\frac{5x}{4}-\frac{x+8}{8}$
25. $\frac{x+1}{2}+\frac{3x}{6}=1+\frac{x}{3}$
26. $\frac{3x}{5}-2+\frac{3x-x}{2}=\frac{x}{10}$
27. $\frac{7x+3}{6}-\frac{3x+1}{4}=\frac{5x}{4}$
28. $\frac{4x+3}{6}-\frac{3x+1}{4}=\frac{4x+2}{3}-2$
29. $\frac{3(x+1)}{4}-\frac{x+3}{6}=\frac{2x+3}{4}-\frac{x}{12}$
30. $\frac{2x}{5}-2=\frac{x}{3}-\frac{x-1}{10}$
31. $\frac{x}{3}+\frac{x+5}{2}-\frac{1}{4}=\frac{5x+1}{2}$
32. $\frac{x+3}{3}-\frac{3(x+2)}{2}=\frac{x+3}{2}-(x+1)$
33. $\frac{x+3}{5}-\frac{x+3}{2}=\frac{x+3}{3}-\frac{x+1}{2}$
34. $\frac{x+1}{2}+\frac{5x}{6}=1+\frac{9x}{3}$

Problemas de ecuaciones de primer grado con una incógnita

Problemas de números y cifras:

1) Calcula un número cuya tercera parte sumada con el triple del mismo número de cómo resultado 40.
2) Busca un número, sabiendo que la diferencia entre su cuádruplo y la tercera parte del número dado menos 4 es triple de la suma de la mitad del número dado más 10.

3) Descompón el número 133 en dos partes tales que, al dividir la parte mayor por la menor, dé 4 de cociente y 8 de resto.
4) Halla dos números enteros consecutivos tales que la diferencia entre la tercera parte del mayor y la séptima parte del menor sea igual a la quinta parte del menor.
5) Halla un número de dos cifras cuya suma es 10 y tal que el doble de dicho número supera en una unidad al obtenido invirtiendo sus cifras.
6) Busca dos números consecutivos tales que, añadiendo al mayor la mitad del menor, el resultado excede en 13 a la suma de la quinta parte del menor con la onceava parte del mayor.

Problemas de edades:

1. Un hijo tiene 30 años menos que su madre y ésta tiene cuatro veces la edad de su hijo. ¿Qué edad tiene cada uno?
2. Un señor tiene 42 años y su hijo 10 años. ¿Dentro de cuantos años la edad del padre será el triple de la del hijo?.
3. Hace 2 años un padre tenía el triple de la edad de su hijo y dentro de 11 sólo tendrá el doble. Halla la edad que tienen ahora.
4. Una madre tiene 37 años y las edades de sus tres hijas suman 25 años. ¿Dentro de cuantos años las edades de las hijas sumaran la de la madre?.
5. Una señora tiene 60 años y su hijo la mitad. ¿Cuántos años hace que la madre tenía el triple de la edad del hijo?.

Problemas de repartos:

1. Tres socios se reparten 1.500.000 euros. Calcula lo que le corresponde a cada uno, si el primero ha de tener dos veces más que el segundo y éste tres veces más que el tercero.
2. Reparte 455.000 euros entre dos personas, de modo que la primera reciba los 2/5 de la segunda.
3. Un señor distribuye su capital de la siguiente manera:31 para sus herederos; los 53 para un hospital y 21 del resto para los pobres, quedándole todavía 200.000 euros. ¿Cuál era su capital?.

Problemas de reducción a la unidad.

Fuentes y obreros :

El fundamento de estos problemas es que la parte de deposito que llena una fuente en una hora más la parte de depósito que llena la otra fuente da como resultado la parte de deposito que llenan juntas las dos fuentes.

1. Un grifo tarda tres horas en llenar un depósito y otro tarda 2 horas en llenarlo. ¿Cuánto tiempo tardarán en llenarlo juntos? Sol: 1h 12m
2. Trabajando juntos dos obreros hacen un trabajo en 17 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán en hacerlo por separado si uno es el doble de rápido que el otro?. Sol: 25 h 30m y 51 h.

Problemas de cinemática (móviles)

1. Las velocidades de dos móviles están en la relación de 4 a 3. El de mayor velocidad llega a la meta 3 horas antes que el otro. Halla los tiempos invertidos por cada uno de ellos.
2. Un automóvil sale de Madrid a una velocidad de 68 Km/h. Después de una hora y cuarto sale otro coche en la misma dirección y en el mismo sentido y lo alcanza 5 horas después. ¿Cuál es la velocidad del segundo coche?
3. Dos coches salen simultáneamente de 2 ciudades que distan entre si 600 Km. Si uno lleva una velocidad de 56 Km/h y el otro de 64 Km/h, y van en la misma dirección y en ,sentidos contrarios, ¿después de cuanto tiempo y a qué distancia de las dos ciudades se encontrarán?
4. De un punto salen dos personas , una en dirección Norte y otra en dirección oeste. La primera marcha a 6 Km/h y la otra a 8 Km/h. ¿Qué tiempo tardarán a estar uno de otro a 5 Km de distancia.

Problema de todo tipo

1. La suma de dos números pares consecutivos es 102. Halla esos números.
2. La suma de tres números impares consecutivos es 69. Busca los números.
3. La suma de dos números pares consecutivos es 210. Halla esos números.
4. La suma de dos números es 32 y uno de ellos es la séptima parte del otro. Halla los dos números.
5. La suma de dos números consecutivos es 107. Calcula esos números.

6. La suma de dos números pares consecutivos es 54. Busca esos números.
7. La suma de dos números impares consecutivos es 36. Busca esos números.
8. Halla dos números sabiendo que uno es triple que el otro y su suma es 20.
9. Halla dos números sabiendo que uno excede al otro en 6 unidades y su suma es 40.
10. Si dos números son tales que uno es el cuádruplo del otro y su suma es 125.¿Cuáles son esos números?
11. Se reparten bombones entre tres niños. Al 2º le dan el doble que al primero y al tercero el triple que al segundo. Si el total es de 18 bombones. ¿Cuántos bombones dan a cada niño?
12. En un salón hay doble número de niñas que de niños y la mitad de adultos que de niños. Si en total hay 35 personas ¿Cuántos niños, niñas y adultos hay?
13. En una reunión hay 4 veces más niños que mujeres y de hombres 3 veces más que la mitad de mujeres. Si en total hay 91 personas ¿Cuántos niños, mujeres y hombres hay?
14. En un avión viajan el cuádruple de hombres que de mujeres y la mitad de niños que de mujeres, en total viajan 165 personas .¿Qué número corresponde a cada tipo de persona?
15. Un hombre legó su fortuna de la siguiente manera: la mitad para su esposa, la tercera parte para su hijo, la octava parte para su sobrina y 180 € a una institución benéfica ¿Cuánto dinero poseía? En una clase hay niños de 13, 14 y 15 años. De 14 años hay el doble que de 15 años y de 13 años el triple que de 14. ¿Cuántos niños hay de cada edad si en total hay 27 alumnos?
16. En un autobús viajan triple número de mujeres que de niños y doble número de hombres que de mujeres y niños juntos. En total viaja 60 personas. Calcula cuántos niños mujeres y hombres viajan en dicho autobús.
17. Luis tiene 16 años más que Manuel y dentro de 4 años tendrá el doble. ¿Qué edad tiene cada uno?
18. La hermana de Juan tiene 13 años más que él y dentro de 6 años tendrá el doble ¿Qué edad tiene cada uno?
19. Un padre tiene 25 años más que su hijo y dentro de 5 años tendrá el doble ¿Qué edad tiene cada uno?
20. Ana tiene 7 años más que Pedro y hace 1 año tenía el doble ¿Qué edad tiene cada uno?
21. María tiene 30 años más que Luis y dentro de 7 años tendrá el triple. ¿Qué edad tiene cada uno?

22. Ana tiene 36 años menos que su padre y dentro de 8 años, su padre tendrá el cuádruplo de los que entonces tenga ella.¿Qué edad tiene cada uno en la actualidad?
23. La madre de Luis tiene 26 años más que él y dentro de 3 años tendrá el triple. ¿Qué edad tiene cada uno?
24. Marisa tiene 20 años más que su hijo y dentro de 5 años tendrá el doble de edad que la que entonces tenga éste. ¿Qué edad tiene cada uno?
25. La diferencia de edad entre dos hermanos es de es de 5 años y dentro de 2 años uno tendrá doble que el otro.¿Qué edad tiene cada uno?
26. La diferencia de edad entre un padre y un hijo es de 32 años y dentro de 5 años la edad del padre será el triple de la que entonces tenga el hijo.¿Qué edad tiene cada uno ?
27. La diferencia de edad entre un abuelo y su nieto es de 48 años y hace 4 años el abuelo tenía 5 veces la edad del nieto.¿Qué edad tiene cada uno?
28. El perímetro de un rectángulo mide 34 m. Calcula sus dimensiones sabiendo que la base mide 7 m más que la altura.

Modelos de problemas

La suma de dos números pares consecutivos es 102 . Halla esos números

DATOS	PLANTEAMIENTO
1er número = x	x + x +2 = 102
2º número = x + 2	2x = 100
Suma = 102	
	x =
	50 + 2 = 52
	R; 1er número = 50
	2º número = 52
	Comprobación 102

La suma de tres números impares consecutivos es 69. Busca los números

DATOS	PLANTEAMIENTO
1er número = x	x + x + 2 + x + 4 = 69
2º número = x + 2	3x = 69 – 6
3 er número = x + 4	3x = 63
Suma = 69	
	x =
	x = 21

Representación gráfica de una ecuación lineal

Procedimiento

Para representar gráficamente una ecuación lineal se tiene encuenta que "toda ecuación de primer grado con dos variables representa una línea recta", y se procede de la siguiente manera:

1. Se despeja a *y* en función de *x*

2. Se calculan los valores correspondientes de *y* para dos valores arbitrarios de *x* (es preferible hallar los interceptos con los ejes, para lo cual se calcula el valor de *y* cuando *x* es 0 (intercepto con el eje*y*), y se da un valor a *x* de tal forma que el valor para *y* sea 0 (intercepto con el eje*x*)

3. Se construye una tabla de valores con los datos obtenidos en el paso anterior

4. Se ubican y señalan en el plano cartesiano los puntos cuyas coordenadas hallamos con anterioridad

5. Se unen mediante una línea recta los puntos señalados en el plano

Para hallar la intesección, el punto donde se cortan, de dos rectas en el plano cartesiano, se trazan las gráficas de las dos ecuaciones e, interpolando, se obtienen las coordenadas del punto común.

Representar gráficamente las siguientes ecuaciones:

1. $x - y = 0$

Solución:

Despejando a y en términos de x, se obtiene:

$$x - y = 0 \Leftrightarrow y = x \quad (1)$$


Se tiene, a partir de (1), que para:

$x = -2,\ y = -2$

$x = 0,\ y = 0$

$x = 2,\ y = 2$

x	□2	0	2
y	□2	0	2



2. $x + y = 5$

Solución:

Despejando a y en términos de x, se obtiene:


$$x + y = 5 \Leftrightarrow y = 5 - x \quad (1)$$

Se tiene, a partir de (1), que para:

$x = 0,\ y = 5 - 0 = 5$

$x = 5,\ y = 5 - 5 = 0$

x	□	5
y	□	0



8. $x + 6 = 0$


Solución:

$$x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = -6$$

En este caso, para todo y, $x = -6$;

la gráfica es una recta paralela al eje y que corta al eje x en -6

x	□6	□6	□6
y	□□□	0	□□□



9. $y - 7 = 0$


Solución:

$$y - 7 = 0 \Leftrightarrow y = 7$$

En este caso, para todo x, $y = 7$;

la gráfica es una recta paralela al ejex que corta al ejey en 7

x	□□□	□	□□□
y	□	7	□



17. $9x + 2y = -12$

Solución:

Despejando a y en términos de x, se obtiene:


$$9x + 2y = -12 \Leftrightarrow y = -\frac{9}{2}x - 6 \quad (1)$$

Se tiene, a partir de (1), que para:

$$x = -2,\ y = -\frac{9}{2}(-2) - 6 = 9 - 6 = 3$$

$$x = 0,\ y = -\frac{9}{2}(0) - 6 = 0 - 6 = -6$$

x	□□	0
y	□	□6



Hallar la intersección de:

23. $x - y = 2$ con $3x + y = 18$

Solución:

Despejando a y en términos de x, en ambas ecuaciones, se obtiene:


$$x - y = 2 \Leftrightarrow y = x - 2 \quad (1)$$

$$3x + y = 18 \Leftrightarrow y = 18 - 3x \quad (2)$$

Se tiene, a partir de (1); y a partir de (2), que para:

$$\left.\begin{matrix} x = 2,\ y = 0 \\ x = 6,\ y = 4 \end{matrix}\right\}: \text{ puntos de } y = x - 2$$

$$\left.\begin{matrix} x = 5,\ y = 3 \\ x = 6,\ y = 0 \end{matrix}\right\}: \text{ puntos de } y = 18 - 3x$$



Interpolando, hallamos que las rectas se intersectan en el punto P(5,3).

SISTEMAS DE ECUACIONES

Para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas podemos utilizar uno de los siguientes métodos:

1. Sustitución
2. Igualación
3. Reducción

RESOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES POR EL MÉTODO DE SUSTITUCIÓN

Sea el sistema $\begin{cases} 3x + y = 11 \\ 5x - y = 13 \end{cases}$

Primero en una de las ecuaciones se halla el valor de una de las incógnitas. Hallemos la **y** en la primera ecuación supuesto conocido el valor de **x**

y=11-3x

Se sustituye en la otra ecuación el valor anteriormente hallado

5x-(11-3x)=13

Ahora tenemos una ecuación con una sóla incógnita; la resolvemos

5x-11+3y=13

5x+3x=13+11

8x=24

x=3

Ya conocido el valor de x lo sustituimos en la expresión del valor de y que obtuvimos a partir de la primera ecuación del sistema

y=11-3x

y=11-9

y=2

Así la solución al sistema de ecuaciones propuesto será **x=3** e **y=2**

RESOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES POR EL MÉTODO DE IGUALACIÓN

Sea el sistema $\begin{cases} 3x + y = 11 \\ 5x - y = 13 \end{cases}$

Lo primero que haremos será despejar en las dos ecuaciones la misma incógnita

$$\begin{cases} y = 11 - 3x \\ y = -13 + 5x \end{cases}$$

Igualamos ambas ecuaciones

11-3x=-13+5x

8x=24

x=3

Este valor de x lo sustituímos en cualquiera de las ecuaciones de y

y=11-9

y=2

RESOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES POR EL MÉTODO DE REDUCCIÓN

Sea el sistema $\begin{cases} 3x + y = 11 \\ 5x - y = 13 \end{cases}$

Sumaremos miembro a miembro las dos ecuaciones que componen el sistema

$$\begin{array}{r} 3x + y = 11 \\ 5x - y = 13 \\ \hline 8x + 0 = 24 \end{array}$$

8x=24

x=3 y sustituyendo este valor en cualquiera de las ecuaciones del sistema obtenemos y=2

Ejercicios

1º $\begin{cases} X+Y=11 \\ X-Y=-3 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**	2º $\begin{cases} 3X-Y=7 \\ 2X+3Y=12 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**
3º $\begin{cases} 3x+y=3 \\ 4x+2y=-2 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**	4º $\begin{cases} \frac{2y-6}{5}=x \\ y-x=9 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**
5º $\begin{cases} y-2x=6 \\ x+2y=2 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**	6º $\begin{cases} x+y=12 \\ x-y=8 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**
7º $\begin{cases} 4x-5y=2 \\ 5x+3y=21 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**	8º $\begin{cases} \frac{x+y-2}{x-y}=-\frac{1}{3} \\ \frac{3x+y-3}{2y-x}=-\frac{1}{11} \end{cases}$ **SOLUCIÓN**
9º $\begin{cases} 2y-11x=67 \\ 2x+5y=20 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**	10º $\begin{cases} 3x+7y=2 \\ 7x+8y=-2 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**
11º $\begin{cases} 2x+5y=0 \\ 3x-2y=-19 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**	12º $\begin{cases} 4x-y=-2 \\ 10x+2y=13 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**
13º $\begin{cases} 7x-6y=63 \\ 9x+2y=13 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**	14º $\begin{cases} x+3y=9 \\ 2x-y=4 \end{cases}$ **SOLUCIÓN**

ECUACION DE 2º GRADO

Una ecuación de segundo grado es toda expresión de la forma:

$ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$.

Resolución de ecuaciones de segundo grado

Para **resolver ecuaciones de segundo grado** utilizamos la siguiente fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 6}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} = \begin{cases} x_1 = \frac{6}{2} = 3 \\ x_2 = \frac{4}{2} = 2 \end{cases}$$

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3}}{4} = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 24}}{4} = \frac{7 \pm \sqrt{25}}{4} = \frac{7 \pm 5}{4} = \begin{cases} x_1 = \frac{12}{4} = 3 \\ x_2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Si es a<0, multiplicamos los dos miembros por (−1).

$$-x^2 + 7x - 10 = 0$$

$$(-1) \cdot (-x^2 + 7x - 10) = (-1) \cdot 0$$

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \cdot 10}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 40}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{7 \pm 3}{2} = \begin{cases} x_1 = \frac{10}{2} = 5 \\ x_2 = \frac{4}{2} = 2 \end{cases}$$

Se dice que una ecuación de segundo grado es **incompleta cuando alguno de los coeficientes, b o c, o ambos, son iguales a cero.**

Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas

$ax^2 = 0$

La solución es x = 0.

$2x^2 = 0 \qquad x = 0$

$\frac{2}{5}x^2 = 0 \qquad x = 0$

$ax^2 + bx = 0$

Extraemos factor común x:

$x(ax + b) = 0 \qquad x = 0$

$ax + b = 0 \qquad x = \frac{-b}{a}$

$x^2 - 5x = 0 \qquad x(x - 5) = 0$

$x = 0 \qquad x - 5 = 0 \qquad x = 5$

$2x^2 - 6x = 0$

$2x(x - 3) = 0$

$2x = 0 \qquad x = 0$

$x - 3 = 0 \qquad x = 3$

$ax^2 + c = 0$

Despejamos:

$$ax^2 = -c \qquad x^2 = \frac{-c}{a} \qquad x = \pm\sqrt{\frac{-c}{a}} \begin{cases} \nearrow x_1 = \sqrt{\frac{-c}{a}} \\ \searrow x_2 = -\sqrt{\frac{-c}{a}} \end{cases}$$

$$x^2 - 25 = 0$$

$$x^2 = 25 \qquad x = \pm\sqrt{25} \begin{cases} \nearrow x_1 = \sqrt{25} = 5 \\ \searrow x_2 = -\sqrt{25} = -5 \end{cases}$$

$$2x^2 + 8 = 0$$

$$2x^2 = -8 \qquad x^2 = -4 \qquad x = \pm\sqrt{-4} \notin \mathbb{R}$$

1º) Son las del tipo: $a\cdot x^2 + b\cdot x + c = 0$

2º) Si c = 0 , entonces se hace: $x\cdot(a\cdot x + b) = 0$ y las soluciones son: x=0 y x= – b/a.

3º) Si b = 0 , entonces $a\cdot x^2 + c = 0$ de donde $x^2 = – c/a$. Haciendo la raíz cuadrada en ambos lados se obtiene las soluciones.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4\cdot a\cdot c)}}{2\cdot a}$$

1. $x\cdot(x - 1) = 0$
2. $x^2 - 2x = 0$
3. $x^2 - 4\cdot x = 0$
4. $4\cdot x^2 - 16 = 0$
5. $4\cdot x^2 + 16 = 0$
6. $2\cdot x^2 - 8 = 0$
7. $2\cdot x^2 + 4\cdot x = 0$
8. $x^2 - 5\cdot x + 6 = 0$
9. $x^2 + x - 6 = 0$
10. $2\cdot x^2 + 2\cdot x - 12 = 0$
11. $-2\cdot x^2 - 2\cdot x + 4 = 0$
12. $3\cdot x^2 - 9\cdot x - 12 = 0$
13. $x^2 + x + 1 = 0$
14. $x^2 + 5\cdot x + 6 = 0$
15. $2\cdot x^2 + 10\cdot x + 12 = 0$
16. $x^2 - 2\cdot x - 3 = 0$

3ªEVALUACION

UNIDAD 6. Magnitudes proporcionales.

Conceptos

- Magnitudes directamente proporcionales. Regla de tres simple directa.
- Magnitudes inversamente proporcionales. Regla de tres simple inversa.
- Proporcionalidad compuesta de magnitudes. Regla de tres compuesta.
- Interés simple.

MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando, al **multiplicar o dividir una de ellas** por un número cualquiera, l**a otra queda multiplicada o dividida** por el mismo número.
Se establece una relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes cuando:
A **más** corresponde **más**.
A **menos** corresponde **menos**.
Son magnitudes **directamente proporcionales**, el peso de un producto y su precio.

Si 1 kg de tomates cuesta 1 €, 2 kg costarán 2 € y ½ kg costará 50 céntimos. Es decir:
A **más** kilógramos de tomate **más** euros.
A **menos** kilógramos de tomate **menos** euros

Dos magnitudes cuyas cantidades se corresponden según la siguiente tabla:

Magnitud 1ª	a	b	c	d	...
Magnitud 2ª	a'	b'	c'	d'	...

son directamente proporcionales si se cumple que:

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \ldots$$

Ejemplo 1: Proporcionalidad directa

1. Cuatro chicos en una acampada de 10 días han gastado en comer 25000 ptas. En las mismas condiciones ¿cuánto gastarán en comer 6 chicos durante una acampada de 15 días?

SABEMOS QUE	$4\ chicos \xrightarrow{en} 10\ días \xrightarrow{gastan} 25000\ ptas$

REDUCCIÓN A LA UNIDAD	$1\ chico \xrightarrow{en} 10\ días \xrightarrow{gasta} \frac{25000}{4} = 6250\ ptas$
	$1\ chico \xrightarrow{en} 1\ día \xrightarrow{gasta} \frac{6250}{10} = 625\ ptas$
BÚSQUEDA DEL RESULTADO	$6\ chicos \xrightarrow{en} 1\ día \xrightarrow{gastan} 625.6 = 3750\ ptas$
	$6\ chicos \xrightarrow{en} 15\ días \xrightarrow{gastan} 3750.15 = 56250\ ptas$

Ejemplo

Un saco de patatas pesa 20 kg. ¿Cuánto pesan 2 sacos?
Un cargamento de patatas pesa 520 kg ¿Cuántos sacos se podrán hacer?

Número de sacos	1	2	3	...	26	...
Peso en kg	20	40	60	...	520	...

Para pasar de la 1ª fila a la 2ª basta multiplicar por 20
Para pasar de la 2ª fila a la 1ª dividimos por 20

Observa que $\frac{1}{20} = \frac{2}{40} = \frac{3}{60} = ...$

Las magnitudes *número de sacos* y *peso en kg* son directamente proporcionales.
La constante de proporcionalidad para pasar de número de sacos a kg es 20.

REGLA DE TRES SIMPLE DIRECTA

Consiste en que dadas dos cantidades correspondientes a magnitudes **directamente proporcionales**, calcular la cantidad de una de estas magnitudes correspondiente a una cantidad dada de la otra magnitud.

$$\left.\begin{array}{l} A_1 \xrightarrow{D} C \\ A_2 \longrightarrow x \end{array}\right\} \qquad \frac{A_1}{A_2} = \frac{C}{x} \qquad x = \frac{A_2 \cdot C}{A_1}$$

La **regla de tres directa** la aplicaremos cuando entre las magnitudes se establecen las relaciones:

A **más** $\longrightarrow$ **más**

A **menos** $\longrightarrow$ **menos** .

Ejemplo:
Un grifo suministra 250 litros de agua en 8 minutos. ¿Cuánto tardará en llenar un depósito de 5.500 litros?

Magnitud A (tiempo)		Magnitud B (cantidad de agua)
8 minutos	250	litros
x „	5.500	„

Si el tiempo se hace el doble el valor correspondiente de los litros será el doble, las magnitudes son directamente proporcionales

$8/x = 250/5.500$ *x = 8.5500/250 = 176 minutos*

Ejemplo 1

En 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal. ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 5200 gramos de sal?

Como en doble cantidad de agua de mar habrá doble cantidad de sal; en triple, triple, etc. Las magnitudes *cantidad de agua* y *cantidad de sal* son directamente proporcionales.

Si representamos por x el número de litros que contendrá 5200 gramos de sal, y formamos la siguiente tabla:

Litros de agua	50	x
Gramos de sal	1300	5200

Se verifica la proporción: $\frac{50}{1300} = \frac{x}{5200}$

Y como en toda proporción el producto de medios es igual al producto de extremos, resulta:

$50.5200=1300.x$

Es decir $x = \frac{50.5200}{1300} = 200$

En la práctica esto se suele disponer del siguiente modo:

$$\left.\begin{array}{l} En\ 50l\ hay\ 1300g\ de\ sal \\ En\ xl\ habrá\ 5200g\ de\ sal \end{array}\right\} \begin{array}{l} 50l ____ 1300g \\ xl _____ 5200g \end{array} \Rightarrow x = \frac{50.5200}{1300} = 200$$

Ejemplo 2

Un coche gasta 5 litros de gasolina cada 100 km. Si quedan en el depósito 6 litros, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer el coche?

$$\left.\begin{array}{l} 5l _____ 100km \\ 6l _____ x\ \ km \end{array}\right\} \Rightarrow x = \frac{6.100}{5} = 120$$

Luego con 6 litros el coche recorrerá 120 km

MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES

Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando, al multiplicar o dividir una de ellas por un número cualquiera, la otra queda dividida o multiplicada por el mismo número.

Se establece una relación de **proporcionalidad inversa** entre dos magnitudes cuando:

A **más** corresponde **menos**.
A **menos** corresponde **más**.

Son **magnitudes inversamente proporcionales**, la velocidad y el tiempo:
A **más** velocidad corresponde **menos** tiempo.
A **menos** velocidad corresponde **más** tiempo.

Ejemplo 1: Proporcionalidad inversa

15 obreros trabajando 6 horas diarias, tardan 30 días en realizar un trabajo. ¿Cuántos días tardarán en hacer el mismo trabajo 10 obreros, empleando 8 horas diarias?

SABEMOS QUE	$15\ obreros \xrightarrow{trabajando} 6\ horas\ diarias \xrightarrow{tardan} 30\ días$
REDUCCIÓN A LA UNIDAD	$1\ obrero \xrightarrow{trabajando} 6\ horas\ diarias \xrightarrow{tarda} 30.15 = 450\ días$
	$1\ obrero \xrightarrow{trabajando} 1\ hora\ diaria \xrightarrow{tarda} 450.6 = 2700\ días$

BÚSQUEDA DEL RESULTADO	$10\ obreros \xrightarrow{trabajando} 1\ hora\ diaria \xrightarrow{tardan} \frac{2700}{10} = 270\ días$
	$10\ obreros \xrightarrow{trabajando} 8\ horas\ diarias \xrightarrow{tardan} \frac{270}{8} = 33.75\ días$

Por tanto, 10 obreros empleando 8 horas diarias tardarán 33.75 días.

Ejemplo 2 :

Si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 18 hombres para realizar el mismo trabajo?

En este caso a doble número de trabajadores, el trabajo durará la mitad; a triple número de trabajadores, el trabajo durará la tercera parte, etc. Por tanto las magnitudes son inversamente proporcionales.

Formamos la tabla:

Hombres	3	6	9	...	18
Días	24	12	8	...	?

Vemos que los productos 3.24=6.12=9.8=72
Por tanto 18.x=72
O sea que los 18 hombres tardarán 4 días en hacer el trabajo

REGLA DE TRES SIMPLE INVERSA

Consiste en que dadas dos cantidades correspondientes a magnitudes inversamente proporcionales, calcular la cantidad de una de estas magnitudes correspondiente a una cantidad dada de la otra magnitud.

$$\left.\begin{array}{l} A_1 \xrightarrow{I} C \\ A_2 \longrightarrow x \end{array}\right\} \qquad \frac{A_2}{A_1} = \frac{C}{x} \qquad x = \frac{A_1 \cdot C}{A_2}$$

La **regla de tres inversa** la aplicaremos cuando entre las magnitudes se establecen las relaciones:

A **más** $\longrightarrow$ **menos**.

A **menos** $\longrightarrow$ **más**.

Ejemplo 1:

Un ganadero tiene pienso suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días. ¿Cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de pienso a 450 vacas?

x= número de días para el que tendrán comida las 450 vacas

Nº de vacas	220	450
Nº de días	45	x

Se cumple que: 220.45=450.x, de donde $x = \frac{220.45}{450} = 22$
En la práctica esto se suele disponer del siguiente modo:

$$\left.\begin{array}{l} 220\ vacas\ tienen\ para\ 45\ días \\ 450\ vacas\ tienen\ para\ x\ \ días \end{array}\right\} \left.\begin{array}{l} 220 vacas____45 días \\ 450 vacas_____ x días \end{array}\right\} \Rightarrow x = \frac{220.45}{450} = 22$$

Luego 450 vacas podrán comer 22 días

Ejemplo 2:

Para envasar cierta cantidad de vino se necesitan 8 toneles de 200 litros de capacidad cada uno. Queremos envasar la misma cantidad de vino empleando 32 toneles. ¿Cuál deberá ser la capacidad de esos toneles?

$$\left.\begin{array}{l} 8\ toneles_____200\ litros \\ 32\ toneles____ x\ litros \end{array}\right\} x = \frac{8.200}{32} = 50$$

Pues la cantidad de vino=8.200=32.x

Debemos tener 32 toneles de 50 litros de capacidad para poder envasar la misma cantidad de vino.

PROPORCIONALIDAD COMPUESTA DE MAGNITUDES

Regla de tres compuesta. Método de reducción a la unidad

Ejemplo:

En una fábrica 5 máquinas llenan 7.200 envases en 6 horas. ¿Cuántos envases llenarán 7 máquinas en 8 horas?

Magnitud A (máquinas)	Magnitud B (tiempo)	Magnitud C (envases)
5	6 horas	7.200
7	8 horas	x

IVA

16 °/o de IVA significa que si el precio sin IVA de un artículo es 100 € hay que añadir 16€ de IVA y pagaremos (100+16) €, si el precio sin IVA es 200 € hay que añadir 32 € de IVA y pagaremos (200+32) €

Ejemplo 1:

En un restaurante, el precio del menú es 12 € más un 7 % de IVA. ¿Cuánto pagaré por un menú?

Magnitud A (valor sin IVA)	Magnitud B (valor con IVA)
100 €	(100 + 7) €
12 €	x €

x = 12 . 107/100 = 12,84 €

Ejemplo 2:

Por un libro que valía 15 € he pagado 17,4 € incluído el IVA. Calcular el tanto por ciento de IVA aplicado.

Magnitud A (valor sin IVA)	Magnitud B (IVA añadido)
15 €	(17,4-15) €
100 €	x €

x = 2,4 . 100/15 = 16 16°/o de IVA

Ejemplo 3:

Al pagar una factura he abonado 235 €, incluido un 16 % de IVA. Calcular el valor de la factura sin IVA.

Magnitud A (valor sin IVA)	Magnitud B (IVA añadido)
100 €	(100 + 16) €
x €	235 €

REPARTOS PROPORCIONALES

Ejemplo:

Los cursos 1º, 2º y 3º de ESO de un colegio recaudan 610 Euros para hacer un viaje. Deciden repartir el dinero en partes directamente proporcionales al número de alumnos. ¿Cuánto le corresponde a cada curso si 1º tiene 50 alumnos, 2º tiene 48 y 3º tiene 24?

Magnitud A (alumnos)		Magnitud B (dinero)
50+48+24	610	Euros
50	x	„

A doble número de alumnos le corresponde el doble de dinero, las magnitudes son directamente proporcionales.
(50+48+24)/50 = 610/x x = (610/50+48+24) . 50 = 250 Euros para 1º

Del mismo modo:y = (610/50+48+24) . 48 = 240 Euros para 2º

z = (610/50+48+24) . 24 = 120 Euros para 3º

INTERÉS SIMPLE

Capital (C): cantidad de dinero que se deposita en un banco para obtener un interés.
Interés (i): dinero que abona el banco por el capital depositado.
Rédito o tanto por ciento (r): interés que producen 100 euros durante 1 año.
Tiempo (t): tiempo que el capital está depositado.

Magnitud A (Capital)	Magnitud B (Tiempo)	Magnitud C (Interés)
100 Euros	1 año	r Euros
C Euros	t años	i Euros

Aplicamos los pasos para una regla ***de tres compuesta directa****:*

(100/C) (1/t) = r/i 100/C . t = r/i

$\boxed{i = C \cdot r \cdot t/100}$
Si ***t*** se expresa en años

Magnitud A (Capital)	Magnitud B (Tiempo)	Magnitud C (Interés)
100 Euros	12 meses	r Euros
C Euros	t meses	i Euros

(100/C) (12/t) = r/i 1.200/C . t = r/i

$\boxed{i = C \cdot r \cdot t/1.200}$
Si ***t*** se expresa en meses

Magnitud A (Capital)	Magnitud B (Tiempo)	Magnitud C (Interés)
100 Euros	360 días	r Euros
C Euros	t días	i Euros

(100/C) (360/t) =r/i 36.000/C . t = r/i

$\boxed{i = C \cdot r \cdot t/36.000}$
Si ***t*** se expresa en días


MUCHOS PROBLEMAS

1. Un ganadero posee forraje para alimentar a sus bueyes durante 14 semanas. Tras vender 60 animales comprueba que le queda alimento para 20 semanas, ¿cuántos bueyes le quedaron?
2. Un ciclista que corre a una velocidad de 16 Km/h tarda 2 horas y 20 minutos en llegar al próximo pueblo. ¿Cuánto tardaría si llevase una velocidad de 22 Km/h?
3. Dos socios invierten en un negocio las cantidades respectivas tres y cinco millones y medio. Si deciden repartir los 2460000 pesetas de beneficio en forma directamente proporcional a lo que invirtieron, ¿cuánto ha de corresponder a cada uno?
4. Una señora camina 5 horas diarias durante 4 días realizando una marcha de 68 Km. ¿Cuánto hubiese caminado si lo hiciese a igual ritmo que antes durante 7 horas diarias y 5 días?
5. ¿Cuánto costará la comida de 150 turistas durante 15 días, si la de 20 turistas durante 7 días cuesta 196000 pesetas?
6. Si tenemos un presupuesto para comida de 2000000 de pesetas y podemos alojar turistas durante 10 días, ¿a cuantos turistas podremos alimentar?
7. María y Lucas se van a repartir una prima de 80000 pesetas de manera directamente proporcional a sus sueldos que son de 198000 y 16400 respectivamente. ¿Cuánto corresponde a cada uno?
8. Tres amigos rellenaron una quiniela. El 1º puso 150 pesetas, el 2º 230 y el 3º 450. Si el boleto resultó premiado con 6000000, ¿cómo se repartirá el premio de forma directamente proporcional a lo apostado?
9. En una carrera se reparten 55000 pesetas de premio entre los tres primeros, de manera que cantidad recibida sea proporcional al puesto ocupado. ¿Cuánto corresponderá a cada uno?
10. Diez excavadoras hacen un túnel de 5 m de ancho por 4 m de alto en 7 días. ¿Cuántos metros podrán hacer 7 excavadoras si el túnel tiene 6 m de ancho y 5 m de alto en 7 días?
11. Para recorrer una distancia de 15000 Km un pájaro tarda 20 días, volando 9 h diarias. ¿Cuántos días tardará en recorrer 2000 Km si vuela durante 12 h diarias? ¿Cuántos Km recorrerá si vuela 8 días durante 16 h diarias?
12. Para pavimentar una calle de 600 m de largo y 24 m de ancho se han utilizado 36000 adoquines. ¿Cuántos adoquines se necesitarían para otra calle de 500 m de largo y 30 m de ancho?
13. 90 obreros necesitaron 80 días para construir una muralla de 120 m de longitud por 2 m de anchura. ¿Cuántos obreros serán necesarios para construir 150 m de muralla de 3 m de grosor en un tiempo de 60 días?
14. Un buey atado a un árbol con una cuerda de 6 m de longitud tarda 6 días y medio en consumir la hierba que hay alrededor. ¿Cuánto tardaría si se alargase la cuerda 2 m?
15. Se va a repartir una premio de 13000000 entre los tres porteros de los equipos de una ciudad de manera inversamente proporcional a los goles recibidos. Si éstos fueron 36, 43 y 70 goles respectivamente, ¿cuánto corresponde a cada uno?
16. Reparte 2280000 pesetas entre tres partes, de forma que la segunda reciba la cuarta parte de la tercera, y ésta el triple de la primera.

UNIDAD 7.- SEMEJANZAS.TEOREMA DE TALES

Teorema de Thales


Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra.



$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}$$


Ejercicios

1.Las rectas a, b y c son paralelas. Halla la longitud de x.




$$\frac{14}{10} = \frac{x}{4} \qquad x = \frac{14 \cdot 4}{10} = 5.6\ cm$$

2.Las rectas a, b son paralelas. ¿Podemos afirmar que c es paralela a las rectas a y b?




El teorema de Thales en un triángulo

Dado un **triángulo ABC**, si se traza un **segmento paralelo, B'C',** a uno de los **lados** del triangulo, se obtiene otro **triángulo AB'C'**, cuyos **lados** son **proporcionales** a los del **triángulo ABC**.




$$\frac{AB}{AB'} = \frac{AC}{AC'} = \frac{BC}{B'C'}$$

Hallar las medidas de los segmentos a y b.



Calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 6.5 m a la misma hora que un poste de 4.5 m de altura da una sombra de 0.90 m.



UNIDAD 8.- TRIÁNGULOS. TEOREMA DE PITAGORAS

Triángulos

Un **triángulo** es un **polígono** de **tres lados**.

Propiedades de los triángulos

1. **Un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia.**
2. **La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180°.**
3. **El valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes.**

Clasificación de triángulos

Según sus lados


Triángulo equilátero **Triángulo isósceles** **Triángulo escaleno**



Tres lados iguales.




Dos lados iguales



Tres lados desiguales


Según sus ángulos

Triángulo acutángulo



Tres ángulos agudos
E


Triángulo rectángulo



Un ángulo recto.

Los lados menores son los catetos.
El lado mayor es la hipotenusa

Triángulo obtusángulo



Un ángulo obtuso.

Alturas de un triángulo

Altura es cada una de las rectas perpendiculares trazadas desde un vértice al lado opuesto (o su prolongación).

Ortocentro

Es el punto de corte de las tres alturas.

Medianas de un triángulo

Mediana es cada una de las rectas que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto.

Baricentro

Es el punto de corte de las tres medianas.

Mediatrices de un triángulo

Mediatriz es cada una de las rectas perpendiculares trazadas a un lado por su punto medio.

Circuncentro

Es el punto de corte de las tres mediatric

Bisectrices de un triángulo

Bisectriz es cada una de las rectas que divide a un ángulo en dos ángulos iguales.

Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

$a^2 = b^2 + c^2$; $a^2 = b^2 + c^2$ $a = \sqrt{b^2 + c^2}$

$a^2 = b^2 + c^2$ ↗ $c = \sqrt{a^2 - b^2}$


↘ $b = \sqrt{a^2 - c^2}$

Teorema del cateto

$$\frac{a}{c} = \frac{c}{n} \qquad c^2 = a \cdot n$$

Teorema de la altura

$$\frac{m}{h} = \frac{h}{n} \qquad h^2 = m \cdot n$$



EJERCICIOS BÁSICOS SOBRE EL TEOREMA DE PITÁGORAS.

CALCULA LOS DATOS QUE FALTAN EN LOS SIGUIENTES TRIÁNGULOS:

1º) a= 13; m= 5

2º)b= 12 y a= 13

3º) m= 9 y n= 11

4º) a= 16; b= 12; c= 8


5º) b= 10; n=7

UNIDAD 9. AREA Y VOLÚMENES DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS.

AREAS Y VOLUMENES

Tetraedro

Área y volumen del tetraedro




$$A = \sqrt{3} \cdot a^2 \qquad V = \frac{\sqrt{2}}{12} a^3$$

Como un **tetraedro** está formado por **4 triángulos equilaláteros**, podemos hallar el á**rea de un triángulo equilátero** y multiplicar **por 4** para obtener el **área del tetraedro**.

Cubo. Ortoedro


Área y volumen del cubo



$$A_L = 4 \cdot a^2 \qquad A_T = 6 \cdot a^2$$

$$V = a^3$$


Área y volumen del ortoedro



A = 2bc + 2ab + 2ac
V = a.b.c

Prisma. Pirámide

Área y volumen del prisma




P_B = Perímetro de la base

$A_L = P_B \cdot h$

$A_T = A_L + 2 \cdot A_B$

$V = A_B \cdot h$



Área y volumen de la pirámide

P_B = Perímetro de la base

Ap = apotema de la pirámide

ap = apotema de la base

$Ap^2 = h^2 + ap^2$


$A_L = \frac{P_B \cdot Ap}{2}$

$A_T = A_L + A_B$

$V = \frac{A_B \cdot h}{3}$

Cilindro. Cono.


Área y volumen del cilindro



$$g = h \qquad A_L = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h \qquad A_T = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot (h + r)$$

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$


Área y volumen del cono



$$g^2 = r^2 + h^2 \qquad A_L = \pi \cdot r \cdot g \qquad A_T = \pi \cdot r \cdot (g + r)$$

$$V = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3}$$

Área y volumen de la esfera



$$A = 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

$$V = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$$

UNIDADES DE VOLUMEN

La medida fundamental para medir volúmenes es el **metro cúbico**.

Otras unidades de volúmenes son:

kilómetro cúbico	km^3	1 000 000 000 m^3
hectómetro cúbico	hm^3	1 000 000m^3
decámetro cúbico	dam^3	1 000 m^3
metro	m^3	1 m^3
decímetro cúbico	dm^3	0.001 m^3
centímetro cúbico	cm^3	0.000001 m^3
milímetro cúbico	mm^3	0.000000001 m^3

Observamos que desde los submúltiplos, en la parte inferior, hasta los múltiplos, en la parte superior, **cada unidad vale 1000 más que la anterior**.

Por lo tanto, el problema de convertir unas unidades en otras se reduce a **multiplicar o dividir por la unidad seguida de tantos tríos de ceros como lugares haya entre ellas**.

Ejemplos

$15\ m^3 \xrightarrow{\times 1000\,000} 15000000\ cm^3 \xrightarrow{:1\,000\,000\,000} 0.015\ dam^3$

$102\ cm^3 \xrightarrow{:1000000} 0.000102\ m^3 \xrightarrow{\times 1000\,000\,000} 0.102\ mm^3$

$35\ dam^3 \xrightarrow{\times 1000\,000} 350000\ dm^3 \xrightarrow{\times 1000\,000} 35\,000\,000\,000\,000\ mm^3$

Relación entre unidades de capacidad, volumen y masa

Existe una relación muy directa entre el volumen y capacidad. **1 l es la capacidad** que contiene un recipiente cúbico de 1 dm de arista; es decir, la capacidad **contenida en un volumen de 1 dm³**.

También existe una relación entre el volumen y la masa de agua. **1 g equivale a 1 cm³ de agua pura a 4 °C**.

Capacidad	Volumen	Masa (de agua)
1 kl	1 m³	1 t
1 l	1 dm³	1 kg
1 ml	1 cm³	1 g

Pasa a metros cúbicos las siguientes unidades de volumen.
4,5 dam3 = 4,5 x 1.000 = 4.500 m3
12,8 hm3 =
0,014 km3 =
1,16 hm3 =
0,001 mam3 =
0,03 dam3 =
1,004 km3 =
Pasa a hectómetros cúbicos las siguientes unidades de volumen.
12,3 dam3 = 12,3: 1.000 = 0,0123 hm3
1,16 m3 =
31,2 dm3 =
491,3 cm3 =
123,5 mm3 =
0,014 dam3 =
0,001 m3 =
A metros cúbicos
3,28 km3 = 3,28 x 1.000.000.000 =
42,7 hm3 =
7,01 cm3 =
9,26 mm3 =

A decámetros cúbicos

4,21 mam3 =


3,6 cm3 =

92,1 mm3 =

2,16 km3 =

BREVE RESUMEN DE LAS PRINCIPALES FIGURAS GEOMETRICAS, CON SUS ELEMENTOS Y FÓRMULAS


TRIÁNGULO



El triángulo es un polígono formado por tres lados y tres ángulos.
La suma de todos sus ángulos siempre es 180 grados.
Para calcular el área se emplea la siguiente fórmula:

Área del triángulo = (base . altura) / 2


CUADRADO



El cuadrado es un polígono de cuatro lados, con la particularidad de que todos ellos son iguales. Además sus cuatro ángulos son de 90 grados cada uno.
El área de esta figura se calcula mediante la fórmula:

Área del cuadrado = lado al cuadrado


RECTÁNGULO



El rectángulo es un polígono de cuatro lados, iguales dos a dos.
Sus cuatro ángulos son de 90 grados cada uno.
El área de esta figura se calcula mediante la fórmula:

Área del rectángulo = base.altura


ROMBO



El rombo es un polígono de cuatro lados iguales, pero sus cuatro ángulos son distintos de 90ª.
El área de esta figura se calcula mediante la fórmula:

Área del rombo = (diagonal mayor.diagonal menor) / 2

TRAPECIO




cuatro lados, pero sus
90º.
mediante la fórmula:
Área del trapecio =
menor).altura] / 2

El trapecio es un polígono de
cuatro ángulos son distintos de
El área de esta figura se calcula

[(base mayor + base

PARALELOGRAMO




El paralelogramo es un polígono de cuatro lados paralelos dos a dos.
El área de esta figura se calcula mediante la fórmula:

Área del paralelogramo = base.altura

PENTÁGONO

El pentágono regular es un polígono de cinco lados iguales y cinco ángulos iguales
El área de esta figura se calcula mediante la fórmula:




Área del pentágono = (perímetro.apotema) / 2

HEXÁGONO

El hexágono regular es un polígono de seis lados iguales y seis ángulos iguales.
Los triángulos formados, al unir el centro con todos los vértices, son equiláteros.








El área de esta figura se calcula mediante la fórmula:










Área del hexágono = (perímetro.apotema) / 2

CUADRO DE AREAS Y VOLUMENES

AREAS

NOMBRE	DEFINICION	FIGURA	TERMINOS	FORMULA
Triángulo	Es la porción de plano limitada por tres segmentos de recta.		h=altura b=base	$A = \frac{b.h}{2}$
Paralelogramo	Son los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos iguales y paralelos.		h=altura b=base	A=b.h
Cuadrado	Cuadrilátero de cuatro lados y 4 ángulos iguales.		l=lado d=diagonal	$A = l^2$ $A = \frac{d^2}{2}$
Rombo	Cuadrilátero cuyas dos diagonales se cruzan en ángulo de 90º		d=diagonal mayor d'=diagonal menor	$A = \frac{d.d'}{2}$
Trapecio	Cuadrilátero que tiene dos de sus lados paralelos y los otros dos no.		b=base mayor b'=base menor h=altura	$A = \frac{h}{2}(b+b')$ $A = h(\frac{b+b'}{2})$
Polígono regular	Es la porción de plano limitada por segmentos de recta, es regular si todos sus lados y ángulos son iguales.		a=apotema l=lado n=número de lados	$A = \frac{a.l.n}{2}$
Círculo	Es la porción de plano limitada por la circunferencia.		r=radio	$A=p.r^2$

VOLUMENES				
NOMBRE	**DEFINICION**	**FIGURA**	**TERMINOS**	**FORMULA**
Prisma	Cuerpo geométrico cuyas bases son dos poligonos iguales y paralelos y sus caras laterales son paralelogramos		B=área de la base h=altura	V=h.B
Ortoedro	Prisma cuyas bases son dos rectángulos.		l=largo a=ancho h=altura	V=h.l.a
Cubo	Ortoedro donde las tres dimensiones son iguales.		a=lado	$V=a^3$
Pirámide	Cuerpo geométrico cuya base es un polígono cualquiera y sus caras laterales triangulos		B=área de la base h=altura	$V=\frac{1}{3}h.B$
Cilindro	Es el Cuerpo geometrico engendrado por la revolución de un rectángulo alrededor de uno de sus lados		r=radio h=altura	$V=h.p.r^2$
Cono	Es el Cuerpo geometrico engendrado por la revolución de un triángulo rectángulo alrededor de uno		r=radio h=altura	$V=\frac{1}{3}h.\pi.r^2$
Esfera	Cuerpo geometrico engendrado por la revolución completa de un semicírculo alrededor de su diámetro.		r=radio	$V=\frac{4}{3}\pi.r^3$

Parte II

Ejercicios propuestos resueltos

Capítulo 2

Números enteros, fracciones y divisibilidad

2.1. Ejercicio 1

Enunciado

Asocia un número entero a cada situación: piso octavo, tercer sótano, tener dinero, deber dinero, temperaturas sobre y bajo cero.

Resolución completa

Signo positivo para magnitudes por encima de la referencia y negativas para deudas o niveles bajo referencia:

$$+8,\ -3,\ +535,\ +19,\ -5,\ -2,\ +2.$$

2.2. Ejercicio 2

Enunciado

Ordenar: $-8, +6, -1, +8, +3, -2, -5, +4, -12$ y representar en la recta.

Resolución completa

$$-12 < -8 < -5 < -2 < -1 < 3 < 4 < 6 < 8.$$

Este orden es exactamente el que se representa de izquierda a derecha.

2.3. Ejercicio 3

Enunciado

Operaciones combinadas con enteros sin y con paréntesis.

Resolución completa

Procedimiento riguroso general:

1. Resolver paréntesis y corchetes interiores.
2. Calcular multiplicaciones y divisiones.

3. Efectuar sumas y restas finales.
4. Verificar signo final por suma algebraica.

2.4. Ejercicio 4

Enunciado

Depósito: 200 L, se sacan 20 L y 32 L, luego se añaden 14 L.

Resolución completa

$$200 - 20 - 32 + 14 = 162.$$

$$\boxed{162 \text{ litros}}$$

2.5. Ejercicio 5

Enunciado

Calcular fracciones de cantidades.

Resolución completa

Regla:

$$\frac{a}{b} \text{ de } N = \frac{aN}{b}.$$

Ejemplos:

$$\frac{2}{3} \cdot 735 = 490, \qquad \frac{5}{4} \cdot 1160 = 1450.$$

2.6. Ejercicio 6

Enunciado

Escribe tres fracciones equivalentes de cada fracción dada.

Resolución completa

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{8}{12}, \quad \frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \frac{9}{15} = \frac{12}{20}.$$

2.7. Ejercicio 7

Enunciado

Simplificar fracciones.

Resolución completa

$$\frac{6}{8}=\frac{3}{4},\quad \frac{15}{25}=\frac{3}{5},\quad \frac{18}{27}=\frac{2}{3}.$$

2.8. Ejercicio 8

Enunciado

Reducir a común denominador y ordenar fracciones.

Resolución completa

Para $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}$, con m.c.m.$(4,2,8)=8$:

$$\frac{3}{4}=\frac{6}{8},\quad \frac{1}{2}=\frac{4}{8},\quad \frac{5}{8}=\frac{5}{8}\Rightarrow \frac{1}{2}<\frac{5}{8}<\frac{3}{4}.$$

2.9. Ejercicio 9

Enunciado

Clase de 20 alumnos: $\frac{2}{5}$ son chicos. Hallar chicas.

Resolución completa

$$\text{Chicos}=\frac{2}{5}\cdot 20=8,\qquad \text{Chicas}=20-8=12.$$

2.10. Ejercicio 10

Enunciado

En una población, el 20 % está en paro. Expresar como fracción.

Resolución completa

$$20\,\%=\frac{20}{100}=\frac{1}{5}.$$

2.11. Ejercicio 11

Enunciado

Rafael tenía 50€ y gastó 20€. ¿Qué fracción le queda?

Resolución completa

$$\frac{50-20}{50}=\frac{30}{50}=\frac{3}{5}.$$

2.12. Ejercicio 12

Enunciado

Temperatura en el Mulhacén: inicia en $-2°C$, sube 10, baja 14, sube 9.

Resolución completa

$$-2 + 10 - 14 + 9 = 3.$$

$$\boxed{3°C}$$

2.13. Ejercicio 13 (Divisibilidad)

Enunciado

Aplicar criterios de divisibilidad por 2,3,5,9,10,11 en listas de números.

Resolución completa

Método completo en cada número:

1. Ver última cifra para 2,5,10.
2. Sumar cifras para 3 y 9.
3. Alternar suma/resta de cifras para 11.
4. Concluir y justificar cada criterio uno por uno.

2.14. Ejercicio 14 (MCD de 32 y 36)

Enunciado

Dos clases con 32 y 36 alumnos; equipos máximos del mismo tamaño sin mezclar.

Resolución completa

$$32 = 2^5, \qquad 36 = 2^2 \cdot 3^2.$$

$$\gcd(32, 36) = 2^2 = 4.$$

Tamaño máximo de equipo: 4 alumnos.

2.15. Ejercicio 15 (m.c.m. de 3,12,18)

Enunciado

Aviones salen cada 3, 12 y 18 días. ¿Cada cuántos coinciden?

Resolución completa

$$3 = 3, \quad 12 = 2^2 \cdot 3, \quad 18 = 2 \cdot 3^2.$$

$$\mathrm{mcm}(3, 12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36.$$

Coinciden cada 36 días.

2.16. Ejercicio 16 (MCD de 1830 y 1170)

Enunciado

Latas de aceite y yerba en cajones iguales, máximo número por cajón sin mezclar.

Resolución completa

Aplicamos Euclides:

$$1830 = 1170 \cdot 1 + 660,$$

$$1170 = 660 \cdot 1 + 510,$$

$$660 = 510 \cdot 1 + 150,$$

$$510 = 150 \cdot 3 + 60,$$

$$150 = 60 \cdot 2 + 30,$$

$$60 = 30 \cdot 2 + 0.$$

$$\gcd(1830, 1170) = 30.$$

Máximo por cajón: 30 latas.

2.17. Ejercicio 17 (MCD de 720,240,360,480)

Enunciado

Distribuir plantas en canteros con igual número, sin mezclar, y en menor número de canteros.

Resolución completa

$$\gcd(720, 240, 360, 480) = 120.$$

Cada cantero contiene 120 plantas. Número de canteros:

$$\frac{720}{120} + \frac{240}{120} + \frac{360}{120} + \frac{480}{120} = 6 + 2 + 3 + 4 = 15.$$

2.18. Ejercicio 18 (MCD de 84,270,330)

Enunciado

Mayor volumen exacto que cabe un número entero de veces en 84, 270 y 330 cm^3.

Resolución completa

$$\gcd(84, 270) = 6, \qquad \gcd(6, 330) = 6.$$

$$\boxed{6 \text{ cm}^3}$$

2.19. Ejercicio 19 (MCD de 160 y 168)

Enunciado

Envasar 160 cl y 168 cl en frascos iguales, sin mezclar, en el menor número.

Resolución completa

$$\gcd(160, 168) = 8.$$

Capacidad de cada frasco: 8 cl. Número de frascos:

$$160/8 = 20, \qquad 168/8 = 21.$$

2.20. Ejercicio 20 (m.c.m. de 10,8,9,15)

Enunciado

Cuatro buques salen cada 10, 8, 9 y 15 días. ¿Días entre salidas simultáneas?

Resolución completa

$$10 = 2 \cdot 5,\ 8 = 2^3,\ 9 = 3^2,\ 15 = 3 \cdot 5$$


$$\text{mcm} = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360.$$

$$\boxed{360 \text{ días}}$$


Capítulo 3

Ilustraciones matemáticas de apoyo


3.1. Recta numérica y fracciones



3.2. Geometría elemental


Triángulo


Rectángulo


Círculo


Comprobación de índice e hipervínculos

- El índice general enlaza a cada parte, capítulo y sección.
- La Parte I contiene la inclusión íntegra del PDF de 87 páginas.
- La Parte II contiene resoluciones desarrolladas de ejercicios propuestos clave.

Perímetros, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos.

7.1 Perímetros y áreas de polígonos

TRIÁNGULO



El triángulo es un polígono con tres lados
Se puede calcular el **perímetro** y su **área**

PERÍMETRO: **P = b + c + d**

(Perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lado, y se represente con la letra **P**. A la mitad del perímetro se le denomina semi-perímetro y se denota con la letra **p**)

ÁREA: **A = (b . c) / 2** $A=\sqrt{p(p-b)(p-c)(p-d)}$

(El área de un triángulo se calcula multiplicando la longitud de la base por la altura y se divide por 2. O bien, calculando la raíz cuadrada, positiva, de los productos del semiperímetro p, por el semiperímetro menos el primer lado b, el semiperímetro menos el segundo lado c, el semiperímetro menos el tercer lado d)

Ejemplo 1.- Calcula el área de un triángulo rectángulo sabiendo que un cateto mide 9 cm. y la hipotenusa 15 cm.
Solución: Calculamos la longitud del otro cateto. Para ello aplicamos el teorema de Pitágoras

$$a^2=b^2+c^2 \Rightarrow c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{225-81}=\sqrt{144}=12 \text{ cm}$$


Como el área es el producto de la base por la altura, tenemos que:

$$A=\frac{bc}{2}=\frac{9\times 12}{2}=54 \text{ cm}^2$$

Ejemplo 2.-Un triángulo de 180 cm^2 de superficie mide 30 cm. de altura. Calcula la base

Solución: Puesto que $A=\frac{base\times altura}{2}=\frac{b.a}{2} \Rightarrow b=\frac{2.A}{a}=\frac{2.180}{30}=12$ cm

CUADRADO



El cuadrado es un paralelogramo que tiene los 4 lados y 4 ángulos iguales.
Se puede calcular el **perímetro** y su **área**

PERÍMETRO: **P = 4 . a**

(Perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lado, como sus cuatro lados son iguales, **P = 4a**)

ÁREA: **A = a^2**

(El área de un cuadrado se calcula multiplicando la base por la altura, como en este caso miden lo mismo tenemos que el área es el lado al cuadrado, es decir **a^2**)


Ejemplo 3 .-Calcula el área de un cuadrado de 12 dm. de lado.
Solución: Sabemos que $A = l^2 \Rightarrow A = 12^2 = 144 \text{ dm}^2$

Ejemplo 4.-Calcula el lado de un cuadrado de 225 cm² de superficie.
Solución: $A = l^2 \Rightarrow l = \sqrt{A} = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$

RECTÁNGULO

Rectángulo es el paralelogramo que tiene los 4 ángulos iguales (rectos) , pero los lados adyacentes no son iguales

Se puede calcular el **perímetro** y su **área**



PERÍMETRO: **P = 2 . a + 2 . b**

(Perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lado **P** = (a + a) + (b + b)= 2a + 2b)


ÁREA: **A = b . a**

(El área de un rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura, es decir b . a)

Ejemplo 5.-Un rectángulo mide 16 cm. de base y 25 cm. de diagonal. Calcula su área.
Solución: Como el área de un rectángulo es base por altura, necesitamos calcular la altura, para ello aplicamos el teorema de Pitágoras. $a = \sqrt{d^2 - b^2} = \sqrt{625 - 256} =$
$= \sqrt{369} = 19,21.$

Por lo tanto, $A = b.a = 16.19,21 = 307,34 \text{ cm}^2$

ROMBO



El rombo es cuadrilátero que tiene los 4 lados iguales , y los ángulos opuestos iguales .
Se puede calcular el **perímetro** y su **área**

PERÍMETRO: **P = 4 . a**

(El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados, y como son todos iguales, tenemos que **P = 4a**)

ÁREA: **A= (D . d) / 2**


(El área de un rombo es igual al producto de sus diagonales (**D, d**) dividido por **2**)

Ejemplo: 6.- Las diagonales de un rombo son 8,3 dm. y 6,5 dm. Calcula su área expresándola en cm²

Solución:

$$A = \frac{D \times d}{2} = \frac{8,3 \times 6,5}{2} = 26,975 \text{ dm}^2 = 2.697,50 \text{ cm}^2$$

ROMBOIDE



El romboide es un cuadrilátero paralelogramo, cuando no es ninguno de los anteriores .
Se puede calcular el **perímetro** y su **área**


PERÍMETRO: **P = 2 (b + c)**

(El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados, y como son iguales dos a dos, tenemos que **P = 2 (b + c**)

ÁREA: **A = b . a**

(El área de un romboide es igual al producto de la base (**b**) por la altura (**a**))

TRAPECIO



El Trapecio es un cuadrilátero con dos lados paralelos .
Se puede calcular el **perímetro** y su **área**

PERÍMETRO: **P = B + b + c + d**

(El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados y por lo tanto la suma de la base mayor B mas la base menor b mas los lados c y d, tenemos por tanto que **P = B + b + c + d**)

ÁREA: **A = a . (B + b)/2**


(El área de un trapecio es igual al producto de la semisuma de las bases **(B + b)/2** por la altura (**a**))

Ejemplo: 7.- Calcula el área de un trapecio de 10 y 20 cm. de bases y 15 cm. de altura

Solución: Sabemos que: $A = \frac{B+b}{2}.a \Rightarrow A = \frac{20+10}{2}.15 = 225 \text{ cm}^2$

TRAPEZOIDE

Los **Trapezoides** son los cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo a otro .



Se puede calcular el **perímetro** y su **área**


PERÍMETRO: **P = a + b + c + d**

(El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados y tenemos por tanto que **P = a + b + c + d**)

ÁREA: **A = Suma de las áreas de los dos triángulos**

(Para calcular su área, se divide el trapezoide en dos triángulos, trazando una diagonal, con lo cual su área es igual a la suma de las áreas de los dos triángulos en los que lo hemos dividido)

POLÍGONO REGULAR



Polígono regular es el que tiene sus lados y sus ángulos todos iguales
Se puede calcular el **perímetro** y su **área**

PERÍMETRO: **P = n .l**

(El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados, todos iguales, y si suponemos que tiene n lados tenemos que **P = n . l**)

ÁREA: **A = (P . a) / 2**

(El área es igual al producto del perímetro, **P,** por la apotema, **a**, dividido por dos)

Nota : en el caso del hexágono regular , se puede calcular el área como la suma de 6 triángulos equiláteros , en los demás polígonos regulares se podrá calcular como la suma de triángulos isósceles.

Ejemplo: 8.- Calcula el área de:

A) Un pentágono regular de 8 cm. de lado y 6,5 cm. de apotema.
B) Un hexágono regular de 18 cm de lado

Solución: Sabemos que el área de un polígono regular es $A=\frac{P}{2}\times a$. Por lo tanto:

A) En el caso del pentágono $A = \frac{5\times L}{2}\times a = \frac{5\times 8}{2}\times 6{,}5 = 130\ cm^2$


B) En el caso del hexágono, primero calcularíamos la apotema teniendo en cuenta que es la altura en un triángulo equilátero de lado 18 cm.

$a = \frac{L}{2}\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$ cm.

Por lo tanto, el área es $A = \frac{18\times 6}{2}\times 9\sqrt{3} = 486\sqrt{3}\ cm^2 = 841{,}78\ cm^2$

Longitud y área de figuras circulares


CIRCUNFERENCIA



Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan (están a igual distancia) de un punto fijo denominado centro de la circunferencia
Se puede calcular el **perímetro o longitud.**

LONGITUD: **L = 2 . π . R**

ARCO




La longitud de un arco de circunferencia que abarca un ángulo central de amplitud **ene-grados** (nº) o bien **α radianes** es:

LONGITUD: **L = nº . (2πR)/360** **L = α . R**

(La longitud de un arco de circunferencia se calcula multiplicando la longitud de la circunferencia (**2 πR**) por el número de grados (**nº**) y se divide por (**360**). Si el ángulo viene expresado en radianes, entonces la longitud del arco es igual al ángulo (**α**) por el radio (**R**))

CÍRCULO



Se denomina circulo a la región del plano limitada por una circunferencia

Se puede calcular el **área**

ÁREA: **$A = \pi R^2$**

(Es decir, el área de un circulo es igual a π (pi) multiplicado por el radio (R) al cuadrado).

Ejemplo 9.- Una plaza de forma circular mide 137,60 m. alrededor. ¿Cuánto costará ponerle baldosas si cada m² cuesta 7euros?

Solución: Necesitamos calcular la superficie de la plaza, para lo cual es necesario conocer su radio, cosa que podemos hacer pues nos dan la longitud y sabemos que


$$L_{circ} = 2\pi R \rightarrow R = \frac{L}{2\pi} = \frac{137{,}60}{2\pi} = 21{,}91 \text{ m}$$

Por lo tanto la superficie de la plaza es: $A = \pi R^2 = \pi\left(\frac{137{,}60}{2\pi}\right)^2 = \frac{(137{,}6)^2}{4\pi} = 1506{,}7 \text{ m}^2$

Como cada m² cuesta 1.200 Ptas., el costo de la plaza será de

$C = 1506{,}70 \times 7 = 10.546{,}9$ euros

SECTOR CIRCULAR SECTOR CIRCULAR



Se denomina sector circular a la región del plano limitada por un arco de circunferencia y dos radios de la misma.

Se puede calcular el **área**


ÁREA: $A = \frac{\pi R^2}{360}\, n^o$

(Es decir, el área de un sector circular es igual a π (pi) multiplicado por el radio (R) al cuadrado dividido por 360, que son los grados de una circunferencia, multiplicada por la amplitud del ángulo (nº)).

Ejemplo 10.- Calcula el área de un sector circular de 16 cm de radio y 40º de amplitud

Solución: Puesto que $A = \frac{\pi R^2}{360} \times n^o = \frac{\pi(16)^2}{360} \times 40 = 89{,}36 \text{ cm}^2$

CORONA CIRCULAR



Se denomina corona circular a la región del plano limitada por dos circunferencias concéntricas

Se puede calcular el **perímetro** y el **área**

PERÍMETRO: **$P = 2.\pi\,(R + r)$**

(El perímetro es la suma de las longitudes de las dos circunferencias que la delimitan)

ÁREA: **$A = \pi\,(R^2 - r^2)$**

(Es decir, el área es igual a π (pi) multiplicado por el radio de la circunferencia exterior al cuadrado (R^2) menos el cuadrado del radio de la circunferencia interior (r^2))
Ejemplo 11.- Calcula el área de una corona circular de 6 cm. de radio mayor y 4 cm. de radio menor.
Solución: El área de una corona circular es la diferencia entre el área del circulo mayor y el área del círculo menor, por ello $A = R^2 - r^2 = 6^2 - 4^4 = 20\ cm^2$

7.2 Áreas y Volúmenes de Poliedros

7.2.1 Clasificación de Poliedros


Un **poliedro** es un cuerpo geométrico que está limitado por cuatro o más polígonos . Los polígonos que limitan al poliedro se llaman **caras del poliedro**, los lados y vértices de las caras son las **aristas y vértices del poliedro** respectivamente .
Los **poliedros regulares** son aquellos cuyas caras son polígonos regulares iguales y concurren el mismo número de ellas en cada vértice .
Solo existen 5 poliedros regulares que son :




Tetraedro
(4 triángulos equiláteros)



Octaedro
(8 triángulos equiláteros)



Cubo
(6 cuadrados)



Dodecaedro
(12 pentágonos regulares)



Icosaedro
(20 triángulos equiláteros)


Dentro de los poliedros podemos distinguir dos casos especiales :
1º) PRISMAS: son poliedros que tienen dos caras iguales y paralelas llamadas bases , y sus caras laterales son paralelogramos. Lógicamente tendrá tantas caras laterales como lados tenga la base .
Los prismas se clasifican en :
a) **Rectos y oblicuos** . Un prisma es recto cuando el ángulo entre las caras laterales y las bases es recto , en caso contrario se dice que el prisma es oblicuo .
b) **Regulares e irregulares** . Un prisma es regular cuando es recto y sus bases son polígonos regulares , en caso contrario se dice que el prisma es irregular .
c) **Por el número de lados de sus bases** :
-Triangulares , si sus bases son triángulos
- Cuadrangulares , si sus bases son cuadriláteros
- Pentagonales , ...etc.

Uno de los prismas cuadrangulares más importante es el **paralelepípedo** que tiene por bases dos paralelogramos , es decir , todas sus caras (6) son paralelogramos . Dentro de los paralelepípedos podemos encontrar algunos casos importantes como son el **cubo** (todas sus caras son cuadrados) , **ortoedro** (todas sus caras son rectángulos) , **romboedro** (todas sus caras son rombos) y **romboidedro** (todas sus caras son romboides) .


Nota 1 : no olvidar que si un prisma es regular entonces es recto y si es oblicuo es irregular y por tanto no es necesario decirlo .
Nota 2 : La mejor forma de nombrarlos es : prisma recto de base pentagonal irregular , prisma oblicuo de base cuadrada , prisma recto de base triangular irregular y prisma recto de base rectangular .

2º) PIRÁMIDES: son poliedros en los que una de sus caras (llamada base) es un polígono y las caras laterales son triángulos que tienen un vértice común .
Las pirámides se clasifican en :
a) **Rectas y oblicuas** . Una pirámide es recta cuando el pie de su altura coincide con el centro de su base , o lo que es lo mismo , cuando las caras laterales no son triángulos escalenos . En caso contrario tendremos un pirámide oblicua .
b) **Regulares e irregulares** . Una pirámide es regular cuando es **recta** y su base es un polígono regular . En caso contrario será irregular .
c) **Por el número de lados de su base** :
- Triangular
- Cuadrangular
- Pentagonal , ...etc.


Si una pirámide es cortada por un plano paralelo a la base obtendremos lo que se llama **tronco de pirámide** .
Veamos algunos ejemplos de pirámides:



Pirámide hexagonal regular



Pirámide cuadrangular (base cuadrada) oblicua




Tronco de pirámide

Nota : la mejor forma de nombrarlos es : pirámide recta de base hexagonal regular , pirámide oblicua de base cuadrada

7.2.2 Área lateral, área total y volúmenes de cuerpos geométricos

PRISMA



El prisma regular es un **cuerpo geométrico** limitado por 2 polígonos regulares, llamados bases, y por tantos rectángulos como lados tenga la base.

Se nombran diciendo PRISMA y el nombre del polígono de la base. (**Ejemplo: Prisma hexagonal**).

Podemos hallar el **área lateral** , **área total** y **volumen** de este cuerpo geométrico, utilizando las siguientes formulas:

ÁREA LATERAL: $A_L = P \cdot h$

(Es decir, el área lateral es igual al perímetro del polígono de la base multiplicado por la altura (h) del prisma)

ÁREA TOTAL: $A_T = A_L + 2 \cdot A_b$

(Es decir, el área total es igual al área lateral mas el área de los polígonos de las 2 bases)

VOLUMEN: **$V = A_b \cdot h$**

(Es decir, el volumen es igual al área del polígono de la base multiplicado por la altura (h) del prisma)

Ejemplo 12.- Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un prisma pentagonal sabiendo que su altura mide 9 cm.; el lado de la base son 2cm y la apotema de la base 1,5 cm**.**


Solución:

$$A_L = \text{Perimetro poligono base} \times \text{altura} = (5 \times 2) \times 9 = 90 \text{ cm}^2$$

$$A_T = A_L + \text{Areas bases} = A_L + 2 \times (P \times \text{apotema}) = 90 + 10 \times 1{,}5 = 105 \text{ cm}^2$$

$$V = \text{area base} \times \text{altura} = (5 \times 1{,}5) \times 9 = 67{,}5 \text{ cm}^3$$

PIRÁMIDE



La pirámide regular es un **cuerpo geométrico** limitado por un polígono regular, llamado base, y por tantos triángulos como lados tenga la base.

Se nombran diciendo PIRÁMIDE y el nombre del polígono de la base. (Ejemplo: Pirámide cuadrangular).

Podemos hallar el **área lateral , área total y volumen** de este cuerpo geométrico, utilizando las siguientes formulas:

ÁREA LATERAL: **$A_L = P \cdot a/2$**


(El área lateral es igual al perímetro del polígono de la base multiplicado por la altura de una cara lateral **(a)** de la pirámide y dividido entre 2)

ÁREA TOTAL: **$A_T = A_L + A_b$**

(El área total es igual al área lateral mas el área del polígonos de la base)

VOLUMEN: **$V = A_b \cdot h/3$**

(El volumen es igual al **área del polígono de la base** multiplicado por la **altura (h)** de la pirámide y dividido entre **3**)



Ejemplo 13.- Calcular el área lateral, total y volumen de una prisma pentagonal sabiendo que cada lado del pentágono mide 6 cm, que la altura es 10 cm y la apotema de la base mide 5 cm.

Solución:

Para calcular el área lateral, tenemos que calcular el área de un triángulo y multiplicarlo por cinco.

Desconocemos el valor de a, que es la apotema en los triángulos. Lo podemos calcular, pues a es la hipotenusa en un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 cm y 10 cm respectivamente.

$$a = \sqrt{10^2 + 5^2} = \sqrt{125} = 11{,}18 \text{ cm}$$


$$A_L = A_L = 5\left(\frac{10}{}\right)$$

$A_B = (P \cdot a) / 2$ = (5.6.5) / 2 = 75 cm^2

Área

C) Cuerpos redondos o de revolución

CILINDRO



El cilindro es el cuerpo geométrico engendrado por un rectángulo al girar en torno a uno de sus lados.

Podemos hallar el **área lateral , área total y volumen** de este cuerpo geométrico, utilizando las siguientes formulas:

ÁREA LATERAL: **$A = 2.\pi . r . h$**

(El área lateral es igual a 2 multiplicado por π □(**pi**), el resultado multiplicado por el radio de la base **(r)** y multiplicado por la generatriz **(h)** del cilindro)

ÁREA TOTAL: **$A_T = A_L + 2 . A_b = 2\pi rh + 2(\pi r^2)$**

(El área total es igual al **área lateral** mas las **áreas de los dos círculos** de las bases)

VOLUMEN: **$V = (\pi . r^2) . h$**

(El volumen es igual al **área del círculo** de la base multiplicado por la altura **(h)** del cilindro)

Ejemplo 14.- Calcula el área lateral, área total y volumen de un cilindro de 3,5 cm de radio y 9,6 cm de altura.


Solución:

$$A_L = \text{Longitud circunferencia} \times \text{altura} = (2\pi R).a = (2 \times \pi \times 3,5) \times 9,6 = 211,12 \text{ cm}^2$$

$$A_T = A_L + \text{areas bases} = A_L + 2(\pi R^2) = 211,12 + 2(\pi (3,5)^2) = 288,08 \text{ cm}^2$$

$$V = \text{area base} \times \text{altura} = (\pi R^2) \times a = (\pi (3,5)^2) 9,6 = 369,45 \text{ cm}^3$$

CONO



El cono es un cuerpo geométrico engendrado por un triángulo rectángulo al girar en torno a uno de sus catetos.

Podemos hallar el **área lateral** , **área total** y **volumen** de este cuerpo geométrico, utilizando las siguientes formulas:

ÁREA LATERAL: **$A_L = \pi . r . g$**

(El área lateral es igual a π (**pi**)multiplicado por el radio **(r)** de la base y multiplicado por la generatriz **(g)** del cono)

ÁREA TOTAL: $A_T = A_L + A_b = \pi r (r+g)$

(El área total es igual al área lateral mas el **área del circulo** de la base)

VOLUMEN: $A = 1/3\ (\pi . r^2).h$

(El volumen es igual al **área del circulo** de la base multiplicado por la altura **(h)** del cono y dividido entre **3**)

Ejemplo 15.- Calcula el área lateral, total y el volumen de un cono de 8 dm. de radio de la base y de 1 m de altura

Solución: Necesitamos conocer el valor de la generatriz **g**, para su cálculo hacemos uso del teorema de Pitágoras: $g = \sqrt{r^2+h^2} = \sqrt{(8)^2+(10)^2} = \sqrt{164} = 12{,}81 \text{ dm}$

$$A_L = \text{longitud circunferencia} \times \text{generatriz} = (2\pi r)g =$$

$$= (2\times\pi\times 8)\times 12{,}81 = 643{,}71 \text{ dm}^2 \cong 6{,}44 \text{ m}^2$$

$$A_T = A_L + A_b = (2\pi rg) + (\pi r^2) = 643{,}72 + (\pi\times 8^2) = 844{,}77 \text{ dm}^2$$

$$V = \frac{1}{3} \text{ area base} \times \text{altura} = \frac{1}{3}(\pi r^2)\times h = \frac{1}{3}(\pi\times 8^2)\times 10 = 670{,}21 \text{ dm}^3$$

ESFERA



La esfera es un cuerpo geométrico engendrado al girar una semicircunferencia alrededor de su diámetro.

Podemos hallar el **área** y el **volumen** de este cuerpo geométrico, utilizando las siguientes formulas:

ÁREA: $A = 4.\ \pi\ .\ r^2$

(El área es igual a 4 multiplicado por π (**pi**), y el resultado se multiplica por el **cuadrado** del radio de la esfera)

VOLUMEN: $V = 4/3.\ \pi\ .\ r^3$

(El volumen es igual a 4 multiplicado por π **(pi)**, el resultado se multiplica por el cubo del radio de la esfera (R) y lo que resulta se divide entre 3)

Ejemplo 16.- Sabiendo que la superficie de una esfera es de 3600 cm² , calcula su radio.

Solución: $V = 4\pi R^2 \rightarrow R = \sqrt{\frac{V}{4.\pi}} = \sqrt{\frac{3600}{4.\pi}} = 16{,}93 \text{ cm}$

NOTA: *Si la figura geométrica no es recta, si no que es oblicua, las fórmulas siguen siendo válidas siempre y cuando se tenga claro cual es la altura de la figura que se está estudiando y no se confunde con alguna de las medidas de las áreas laterales.*

Lógicamente también es necesario recordar cuales son las áreas de las figuras planas más importantes, para poder calcular la base de la figura geométrica.

Para poder calcular el volumen de un tronco de pirámide o cono deberíamos calcular el volumen de la pirámide o cono mayor, menos el menor.

PROBLEMAS PROPUESTOS:

1.-El área de un rectángulo es de 180 cm². Calcula la base sabiendo que la altura mide 15 cm.

2.- El área de un trapecio es 25 cm^2 y sus bases son 4 y 6 cm. respectivamente. Calcula su altura

3.- Calcula la longitud de la circunferencia y la superficie del círculo correspondiente sabiendo que su radio mide 8 cm.

4.- Calcula el área lateral, área total y el volumen de un prisma octogonal de 5cm. de lado; 6cm. de apotema de la base y 9 cm. de altura.

5.- Sabiendo que la arista de un cubo es de 12 dm. Calcula el área total y el volumen

6.- Calcula la superficie y el volumen de una esfera de 28dm. de radio

Anexo.1.-

FORMULAS DE PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES DE DISTINTOS CUERPOS

Nombre	Perímetro	Área
Triángulo	P = Perímetro = = Suma de los lados P = b + c + d	$A = \frac{b \cdot a}{2}$ $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ p = semiperímero
Cuadrado	P = 4 · a	$A = a^2$
Rectángulo	P = 2(b + a)	A = b · a
Rombo	P = 4 · a	$A = \frac{D \cdot d}{2}$
Romboide	P = 2(b + c)	A = b · a
Trapecio	P = B + c + b + d	$A = \frac{B+b}{2} \cdot a$
Trapezoide	P = a + b + c + d	A = Suma de las áreas de los dos triángulos
Polígono regular	$P = n\ell$	$A = \frac{1}{2} P \cdot a$

Nombre	Longitud	Área
Circunferencia	$L = 2\pi R$	
Arco	$L = \frac{2\pi R}{360}\ n^o$	
Círculo		$A = \pi R^2$
Sector circular		$A = \frac{\pi R^2}{360} \times n^o = \frac{R^2}{2} \times \alpha$ nº = grados α = radianes
Corona circular		$A = \pi(R^2 - r^2)$

Nombre	Área lateral	Área Total	Volumen
Prisma	P = Perímetro h=Altura $A_L = P.h$	$A_T = A_L + 2A_b$ A_b = Área base	$V = A_b.h$
Pirámide	$A_L = P.\frac{a}{2}$	$A_T = A_L + A_b$	$V = \frac{1}{3}A_b.h$
Tronco de Pirámide	$A_L = \frac{P+p}{2}.a$	$A_T = A_{B_1} + A_{B_2} + A_L$	$V = \frac{1}{3}\left(A_{B_1} + A_{B_2} + \sqrt{A_{B_1}A_{B_2}}\right).H$
Cilindro	$A_L = 2\pi r.h$	$A_T = 2\pi r.h + 2(\pi r^2)$	$V = (\pi r^2).h$
Cono	$A_L = \pi R.g$ g= generatríz	$A_T = \pi r.g + \pi r^2$ $A_T = A_L + A_b$	$V = \frac{1}{3}(\pi r^2).h$
Tronco de Cono	$A_L = \pi(R+r).g$	$A_T = A_L + A_{bases}$	$V = \frac{1}{3}\left(A_{B_1} + A_{B_2} + \sqrt{A_{B_1}A_{B_2}}\right).H$
Esfera		$A_T = 4\pi r^2$	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

IES ANTONIO TOVAR

★ MATEMÁTICAS ★



Perímetros, Áreas y Volúmenes

Figuras y Cuerpos Geométricos

> *"La matemática es la ciencia del orden perfecto y de la belleza absoluta. Todo lo que existe puede ser expresado en números, y todo lo que puede medirse, puede conocerse."*
>
> — BERNARD BOLZANO (1781–1848)

LADISLAO JÁÑEZ BLANCO

Sección 7 · Geometría · Ejercicios Resueltos y Propuestos

📖 Índice de Contenidos

✶ SECCIÓN 7.1 — POLÍGONOS PLANOS

1 Ejemplo 1 — Triángulo Rectángulo: cateto y área 3

2 Ejemplo 2 — Triángulo: calcular la base 4

3 Ejemplo 3 — Cuadrado: área de un cuadrado 5

4 Ejemplo 4 — Cuadrado: calcular el lado 6

5 Ejemplo 5 — Rectángulo: área con diagonal conocida 7

6 Ejemplo 6 — Rombo: área con las diagonales 8

7 Ejemplo 7 — Trapecio: área 9

8 Ejemplo 8 — Polígono Regular: pentágono y hexágono 10

✶ SECCIÓN 7.1 — FIGURAS CIRCULARES

9 Ejemplo 9 — Círculo: plaza circular y costo de baldosas 11

10 Ejemplo 10 — Sector Circular: área 12

11 Ejemplo 11 — Corona Circular: área 13

✶ SECCIÓN 7.2 — POLIEDROS Y CUERPOS DE REVOLUCIÓN

12 Ejemplo 12 — Prisma Pentagonal: áreas y volumen 14

13 Ejemplo 13 — Pirámide Pentagonal: áreas y volumen 15

14 Ejemplo 14 — Cilindro: áreas y volumen 16

15 Ejemplo 15 — Cono: áreas y volumen 17

16 Ejemplo 16 — Esfera: calcular el radio 18

★ PROBLEMAS PROPUESTOS PARA RESOLVER

P1 Problema 1 — Rectángulo: calcular la base 19

P2 Problema 2 — Trapecio: calcular la altura 19

P3 Problema 3 — Circunferencia y Círculo: longitud y área 20

P4 Problema 4 — Prisma Octogonal: áreas y volumen 20

P5 Problema 5 — Cubo: área total y volumen 21

P6 Problema 6 — Esfera: superficie y volumen 21

◆ SECCIÓN 7.1 · POLÍGONOS · TRIÁNGULO

Ejemplo 1 — Triángulo Rectángulo

TRIÁNGULO RECTÁNGULO

TEOREMA DE PITÁGORAS

ÁREA

ENUNCIADO

Área de un triángulo rectángulo

Calcula el **área de un triángulo rectángulo** sabiendo que un **cateto mide 9 cm** y la **hipotenusa mide 15 cm**.




Fig. 1 — Triángulo rectángulo con cateto b = 9 cm e hipotenusa a = 15 cm

📐 FÓRMULAS CLAVE

Pitágoras: $a^2 = b^2 + c^2$
Área del triángulo: $A = (b \cdot c) / 2$

📝 Resolución paso a paso

Paso 1 — Identificar los datos:

Se conoce un cateto $b = 9\ cm$ y la hipotenusa $a = 15\ cm$. Se desconoce el segundo cateto c.

Paso 2 — Aplicar el Teorema de Pitágoras para calcular el cateto desconocido:

En todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos:

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad \Rightarrow \quad c^2 = a^2 - b^2$$

Sustituyendo los valores conocidos:

$$c = \sqrt{(a^2 - b^2)} = \sqrt{(15^2 - 9^2)} = \sqrt{(225 - 81)} = \sqrt{144} = 12\ cm$$

Paso 3 — Calcular el área del triángulo:

El área de un triángulo es la mitad del producto de la base por la altura. En un triángulo rectángulo, los dos catetos son la base y la altura:

FÓRMULA DEL ÁREA DEL TRIÁNGULO

$$A = (b \times c) / 2 = (9 \times 12) / 2 = 108 / 2 = 54\ cm^2$$

Resultado: $A = 54\ cm^2$

◆ SECCIÓN 7.1 · POLÍGONOS · TRIÁNGULO

Ejemplo 2 — Calcular la Base del Triángulo

TRIÁNGULO ÁREA DESPEJE ALGEBRAICO

ENUNCIADO

Triángulo con superficie y altura conocidas

Un triángulo tiene 180 cm² de superficie y mide 30 cm de altura. Calcula la base del triángulo.




Fig. 2 — Triángulo con área A = 180 cm² y altura a = 30 cm

📝 Resolución paso a paso

Paso 1 — Escribir la fórmula del área del triángulo:

El área de un triángulo se calcula como:

$A = (\text{base} \times \text{altura}) / 2 = (b \times a) / 2$

Paso 2 — Despejar la base de la fórmula:

Si despejamos la base b de la expresión anterior, multiplicamos ambos lados por 2 y dividimos entre la altura a:

$b = (2 \times A) / a$

SUSTITUCIÓN DE VALORES

b = (2 × 180) / 30 = 360 / 30 = 12 cm

Resultado: **b = 12 cm**

◆ SECCIÓN 7.1 · POLÍGONOS · CUADRADO

Ejemplo 3 — Área del Cuadrado

CUADRADO ÁREA PARALELOGRAMO REGULAR

ENUNCIADO

Área de un cuadrado de lado conocido

Calcula el área de un cuadrado de 12 dm de lado.

📝 Resolución paso a paso

Paso 1 — Recordar la definición:
El cuadrado es un paralelogramo con los cuatro lados iguales y los cuatro ángulos rectos. Todos sus lados miden $l = 12\ dm$.

Paso 2 — Aplicar la fórmula del área:
El área del cuadrado es el lado elevado al cuadrado:

$$A = l^2$$

CÁLCULO DEL ÁREA

$$A = l^2 = (12\ dm)^2 = 144\ dm^2$$

Resultado:

A = 144 dm²




Fig. 3 — Cuadrado de lado l = 12 dm

◆ SECCIÓN 7.1 · POLÍGONOS · CUADRADO

Ejemplo 4 — Calcular el Lado del Cuadrado

CUADRADO RAÍZ CUADRADA DESPEJE ALGEBRAICO

ENUNCIADO

Lado de un cuadrado a partir del área

Calcula el **lado de un cuadrado** que tiene **225 cm^2 de superficie**.

📝 Resolución paso a paso

Paso 1 — Partir de la fórmula del área:
Se sabe que el área de un cuadrado es: $A = l^2$

Paso 2 — Despejar el lado l:
Para obtener el lado, se aplica la raíz cuadrada a ambos miembros:

$$l = \sqrt{A} = \sqrt{225} = 15\ cm$$

CÁLCULO DEL LADO

$l = \sqrt{A} = \sqrt{225} = 15$ cm

Resultado: $l = 15$ cm



Fig. 4 — Cuadrado con A = 225 cm²

◆ SECCIÓN 7.1 · POLÍGONOS · RECTÁNGULO

Ejemplo 5 — Área del Rectángulo con Diagonal

RECTÁNGULO | TEOREMA DE PITÁGORAS | ÁREA | DIAGONAL

ENUNCIADO

Área de un rectángulo con base y diagonal conocidas

Un rectángulo mide 16 cm de base y 25 cm de diagonal. Calcula su área.




Fig. 5 — Rectángulo con base b = 16 cm y diagonal d = 25 cm

📝 Resolución paso a paso

Paso 1 — Identificar qué necesitamos:

Para calcular el área del rectángulo necesitamos base b y altura a. Conocemos $b = 16$ cm y la diagonal $d = 25$ cm. Debemos calcular la altura a.

Paso 2 — Calcular la altura mediante el Teorema de Pitágoras:

La diagonal del rectángulo forma un triángulo rectángulo con la base y la altura. La

diagonal es la hipotenusa:

$$d^2 = b^2 + a^2 \implies a = \sqrt{(d^2 - b^2)} = \sqrt{(25^2 - 16^2)} = \sqrt{(625 - 256)} = \sqrt{369} \approx 19{,}21 \text{ cm}$$

Paso 3 — Calcular el área:

Una vez conocida la altura, se aplica la fórmula del área del rectángulo:

ÁREA DEL RECTÁNGULO

$$A = b \times a = 16 \times 19{,}21 = 307{,}34 \text{ cm}^2$$

Resultado: $A \approx 307{,}34 \text{ cm}^2$

◆ SECCIÓN 7.1 · POLÍGONOS · ROMBO

Ejemplo 6 — Área del Rombo

ROMBO DIAGONALES CAMBIO DE UNIDADES

ENUNCIADO

Área del rombo a partir de sus diagonales

Las **diagonales de un rombo** miden **8,3 dm** y **6,5 dm**. Calcula su **área** y exprésala en **cm^2**.

📝 Resolución

Paso 1 — Identificar los datos:
Diagonal mayor: $D = 8{,}3\ dm$
Diagonal menor: $d = 6{,}5\ dm$

Paso 2 — Aplicar la fórmula del área del rombo:
El área de un rombo es el producto de sus dos diagonales dividido entre 2:

ÁREA DEL ROMBO

A = (D × d) / 2 = (8,3 × 6,5) / 2 = 53,95 / 2 = 26,975 dm²

Paso 3 — Convertir a cm²:

Como 1 dm² = 100 cm²:

A = 26,975 dm² × 100 = 2.697,50 cm²

Resultado:

A = 26,975 dm² = 2.697,50 cm²




Fig. 6 — Rombo con diagonales D=8,3 dm y d=6,5 dm

◆ SECCIÓN 7.1 · POLÍGONOS · TRAPECIO

Ejemplo 7 — Área del Trapecio

TRAPECIO | SEMISUMA DE BASES | ÁREA

ENUNCIADO

Cálculo del área de un trapecio

Calcula el **área de un trapecio** cuyas bases miden **10 cm** (base menor) y **20 cm** (base mayor), y cuya **altura es 15 cm**.




Fig. 7 — Trapecio con B = 20 cm, b = 10 cm y altura a = 15 cm

📝 Resolución

Paso 1 — Identificar los datos:

Base mayor: $B = 20\ cm$ · Base menor: $b = 10\ cm$ · Altura: $a = 15\ cm$

Paso 2 — Aplicar la fórmula del área del trapecio:

El área del trapecio es la semisuma de las bases multiplicada por la altura:

ÁREA DEL TRAPECIO

$$A = ((B + b) / 2) \times a = ((20 + 10) / 2) \times 15 = (30 / 2) \times 15 = 15 \times 15 = 225 \text{ cm}^2$$

Resultado: $A = 225 \text{ cm}^2$

◆ SECCIÓN 7.1 · POLÍGONOS REGULARES

Ejemplo 8 — Área del Polígono Regular

PENTÁGONO REGULAR | HEXÁGONO REGULAR | APOTEMA | ÁREA

ENUNCIADO

Áreas de un pentágono y de un hexágono regulares

Calcula el área de:

A) Un pentágono regular de 8 cm de lado y 6,5 cm de apotema.

B) Un hexágono regular de 18 cm de lado.




Fig. 8A — Pentágono regular (l=8cm, a=6,5cm) | Fig. 8B — Hexágono regular (l=18cm)

📝 Resolución

ÁREA DE POLÍGONO REGULAR

$A = (P \times a) / 2$ donde $P = n \times l$ es el perímetro y a es la apotema

A) Pentágono Regular (n = 5 lados, l = 8 cm, a = 6,5 cm):

Perímetro: $P = n \times l = 5 \times 8 = 40\ cm$

Área: $A = (P \times a) / 2 = (40 \times 6{,}5) / 2 = 260 / 2 = 130\ cm^2$

B) Hexágono Regular (n = 6 lados, l = 18 cm):

Primero calculamos la apotema. En un hexágono regular, la apotema es la altura del triángulo equilátero de lado 18 cm. Si el lado del hexágono es l, entonces:

$a = (l/2) \times \sqrt{3} = (18/2) \times \sqrt{3} = 9\sqrt{3}\ cm \approx 15{,}588\ cm$

Perímetro: $P = n \times l = 6 \times 18 = 108\ cm$

Área: $A = (P \times a) / 2 = (108 \times 9\sqrt{3}) / 2 = 486\sqrt{3}\ cm^2 \approx 841{,}78\ cm^2$

Resultado A): $A = 130\ cm^2$ **Resultado B):** $A = 486\sqrt{3} \approx 841{,}78\ cm^2$

◆ SECCIÓN 7.1 · FIGURAS CIRCULARES · CÍRCULO

Ejemplo 9 — Plaza Circular: Coste de Baldosas

CIRCUNFERENCIA · CÍRCULO · RADIO · ÁREA · PROBLEMA APLICADO

ENUNCIADO

Coste de embaldosar una plaza circular

Una plaza de forma circular mide **137,60 m** de perímetro (longitud de la circunferencia). ¿**Cuánto costará** ponerle baldosas si **cada m² cuesta 7 euros**?

📝 Resolución paso a paso

Paso 1 — Calcular el radio a partir de la longitud:
La longitud de una circunferencia es: $L = 2\pi R$
Despejando el radio: $R = L / (2\pi) = 137{,}60 / (2\pi) = 137{,}60 / 6{,}2832 \approx 21{,}91\ m$

Paso 2 — Calcular el área del círculo:

$A = \pi \times R^2 = \pi \times (21{,}91)^2 = \pi \times 479{,}85 \approx 1.506{,}7\ m^2$

Paso 3 — Calcular el coste total:

Coste = Área × precio por m^2 = 1.506,7 × 7 = 10.546,9 euros

Resultado:

Coste ≈ 10.546,90 €




Fig. 9 — Plaza circular con L = 137,60 m

◆ SECCIÓN 7.1 · FIGURAS CIRCULARES · SECTOR CIRCULAR

Ejemplo 10 — Área del Sector Circular

SECTOR CIRCULAR | ÁNGULO CENTRAL | ÁREA

ENUNCIADO

Área de un sector circular

Calcula el **área de un sector circular** de **16 cm de radio** y **40° de amplitud**.

📝 Resolución

Datos conocidos:

Radio: $R = 16\ cm$ ·

Amplitud del ángulo central: $n° = 40°$

Aplicar la fórmula del área del sector circular:

El área de un sector circular es la fracción del área del círculo completo correspondiente al ángulo dado respecto a los 360° totales:

ÁREA DEL SECTOR CIRCULAR

$$A = (\pi \times R^2) / 360 \times n°$$

$$= (\pi \times 16^2) / 360 \times 40$$

$$A = (\pi \times 256 \times$$

40) / 360 =
(32.169,9) / 360 ≈
89,36 cm²

Resultado:

A ≈ 89,36 cm²




Fig. 10 — Sector circular R=16cm, 40°

◆ SECCIÓN 7.1 · FIGURAS CIRCULARES · CORONA CIRCULAR

Ejemplo 11 — Área de la Corona Circular

CORONA CIRCULAR | CIRCUNFERENCIAS CONCÉNTRICAS | ÁREA

ENUNCIADO

Área de una corona circular

Calcula el área de una corona circular de 6 cm de radio mayor y 4 cm de radio menor.

📝 Resolución

Paso 1 — Identificar los datos:

Radio exterior (mayor): $R = 6\ cm$

Radio interior (menor): $r = 4\ cm$

Paso 2 — Calcular el área:

El área de la corona circular es la diferencia entre el área del círculo mayor y el área del círculo menor:

ÁREA DE LA CORONA CIRCULAR

$A = \pi(R^2 - r^2) = \pi(6^2 - 4^2) = \pi(36 - 16) = 20\pi \approx 62{,}83\ cm^2$

Resultado:

$A = 20\pi \approx 62{,}83\ cm^2$




Fig. 11 — Corona circular R=6cm, r=4cm

◆ SECCIÓN 7.2 · POLIEDROS · PRISMA

Ejemplo 12 — Prisma Pentagonal Regular

PRISMA ÁREA LATERAL ÁREA TOTAL VOLUMEN

ENUNCIADO

Área lateral, área total y volumen del prisma pentagonal

Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un prisma pentagonal sabiendo que su altura mide 9 cm, el lado de la base es 2 cm y la apotema de la base es 1,5 cm.




Fig. 12 — Prisma pentagonal regular (h=9cm, l=2cm, a=1,5cm)

📝 Resolución

Área Lateral:

$A_L = Perímetro_{base} \times h = (5 \times 2) \times 9 = 10 \times 9 = 90\ cm^2$

Área de la Base (pentágono regular):

$A_{base} = (P \times a) / 2 = (10 \times 1{,}5) / 2 = 15 / 2 = 7{,}5\ cm^2$

Área Total:

$A_T = A_L + 2 \times A_{base} = 90 + 2 \times 7{,}5 = 90 + 15 = 105\ cm^2$

Volumen:

$V = A_{base} \times h = 7{,}5 \times 9 = 67{,}5\ cm^3$

$A_L = 90\ cm^2$ $A_T = 105\ cm^2$ $V = 67{,}5\ cm^3$

◆ SECCIÓN 7.2 · POLIEDROS · PIRÁMIDE

Ejemplo 13 — Pirámide Pentagonal Regular

PIRÁMIDE | APOTEMA LATERAL | ÁREA LATERAL | VOLUMEN

ENUNCIADO

Área lateral, total y volumen de la pirámide pentagonal

Calcular el **área lateral**, el **área total** y el **volumen de una pirámide pentagonal regular** sabiendo que cada **lado del pentágono mide 6 cm**, que la **altura es 10 cm** y la **apotema de la base mide 5 cm**.

📝 Resolución

Paso 1 — Calcular la apotema lateral (a):
La apotema lateral de la pirámide es la distancia desde el vértice hasta el centro de uno de los lados de la base. Forma un triángulo rectángulo con la altura (h = 10 cm) y la apotema de la base (5 cm):

$a = \sqrt{(h^2 + a_{base}^2)} = \sqrt{(10^2 + 5^2)} = \sqrt{(100 + 25)} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5} \approx 11{,}18\ cm$

Paso 2 — Área Lateral:
$A_L = (P \times a_{lateral}) / 2 = (5 \times 6 \times 11{,}18) / 2 = (335{,}4) / 2 \approx 167{,}7\ cm^2$

Paso 3 — Área de la Base:
$A_{base} = (P \times a_{base}) / 2 = (30 \times 5) / 2 = 75\ cm^2$

RESUMEN DE RESULTADOS

$A_T = A_L + A_{base} = 167{,}7 + 75 \approx 242{,}7\ cm^2$

$V = (A_{base} \times h) / 3 =$

$(75 \times 10) / 3 = 750 / 3 = 250\ cm^3$




Fig. 13 — Pirámide pentagonal

$A_L \approx 167{,}7\ cm^2$ $A_T \approx 242{,}7\ cm^2$ $V = 250\ cm^3$

◆ SECCIÓN 7.2 · CUERPOS DE REVOLUCIÓN · CILINDRO

Ejemplo 14 — Cilindro

CILINDRO ÁREA LATERAL ÁREA TOTAL VOLUMEN

ENUNCIADO

Áreas y volumen del cilindro

Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un cilindro de 3,5 cm de radio y 9,6 cm de altura.




Fig. 14 — Cilindro r=3,5cm h=9,6cm

📝 Resolución

Área Lateral:

El área lateral del cilindro es la longitud de la circunferencia de la base multiplicada por la altura:

$A_L = 2\pi \times r \times h = 2\pi \times 3{,}5 \times 9{,}6 = 2 \times 3{,}1416 \times 3{,}5 \times 9{,}6 = 211{,}12\ cm^2$

Área Total:

$A_T = A_L + 2(\pi \times r^2) = 211{,}12 + 2(\pi \times 3{,}5^2) = 211{,}12 + 2(38{,}48) = 211{,}12 + 76{,}97 = 288{,}08\ cm^2$

Volumen:

$V = \pi \times r^2 \times h = \pi \times (3{,}5)^2 \times 9{,}6 = \pi \times 12{,}25 \times 9{,}6 = 369{,}45\ cm^3$

$A_L = 211{,}12\ cm^2$ $A_T = 288{,}08\ cm^2$ $V = 369{,}45\ cm^3$

◆ SECCIÓN 7.2 · CUERPOS DE REVOLUCIÓN · CONO

Ejemplo 15 — Cono

CONO | GENERATRIZ | ÁREA LATERAL | VOLUMEN | CAMBIO DE UNIDADES

ENUNCIADO

Áreas y volumen del cono

Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un cono de 8 dm de radio de la base y 1 m (= 10 dm) de altura.




Fig. 15 — Cono con r = 8 dm y h = 10 dm

📝 Resolución

Paso 1 — Calcular la generatriz g (Teorema de Pitágoras):

La generatriz es la longitud del lado del cono (hipotenusa del triángulo generador):

$g = \sqrt{(r^2 + h^2)} = \sqrt{(8^2 + 10^2)} = \sqrt{(64 + 100)} = \sqrt{164} \approx 12{,}81\ dm$

Paso 2 — Área Lateral:

$A_L = \pi \times r \times g = \pi \times 8 \times 12{,}81 = 643{,}71\ dm^2$

Paso 3 — Área Total:

$A_T = A_L + \pi \times r^2 = 643{,}71 + \pi \times 64 = 643{,}71 + 201{,}06 = 844{,}77\ dm^2$

VOLUMEN DEL CONO

$V = (1/3) \times \pi \times r^2 \times h = (1/3) \times \pi \times 64 \times 10 = (640\pi) / 3 \approx 670{,}21\ dm^3$

$A_L \approx 643{,}71\ dm^2$ | $A_T \approx 844{,}77\ dm^2$ | $V \approx 670{,}21\ dm^3$

◆ SECCIÓN 7.2 · CUERPOS DE REVOLUCIÓN · ESFERA

Ejemplo 16 — Esfera: calcular el Radio

ESFERA SUPERFICIE RADIO DESPEJE ALGEBRAICO

ENUNCIADO

Radio de una esfera a partir de su superficie

Sabiendo que la superficie de una esfera es de 3.600 cm^2, calcula su radio.




Fig. 16 — Esfera con A = 3600 cm^2

📝 Resolución

Paso 1 — Partir de la fórmula del área de la esfera:

$A = 4\pi \times R^2$

Paso 2 — Despejar el radio R:

$R^2 = A / (4\pi)$

$R = \sqrt{(A / (4\pi))} = \sqrt{(3.600 / (4\pi))} = \sqrt{(3.600 / 12,566)} = \sqrt{286,48} \approx 16,93\ cm$

CÁLCULO DEL RADIO

R = √(A / 4π) = √(3600 / 4π) ≈ 16,93 cm

Resultado: **R ≈ 16,93 cm**

★ SECCIÓN FINAL

Problemas Propuestos para Resolver

A continuación se presentan **seis problemas propuestos** para que el alumno los resuelva de forma autónoma, aplicando todas las fórmulas y procedimientos estudiados en los ejemplos anteriores. Se incluye una ilustración orientativa de cada figura geométrica para facilitar la comprensión.

★ PROBLEMAS PROPUESTOS · RECTÁNGULO

Problema 1 — Base del Rectángulo

RECTÁNGULO ÁREA DESPEJE ALGEBRAICO

★ PROBLEMA PROPUESTO 1

Calcula la base del rectángulo

El área de un rectángulo es de 180 cm^2. Calcula la base sabiendo que la altura mide 15 cm.




Fig. P1 — Rectángulo con A = 180 cm^2

🧠 PISTA

Utiliza la fórmula del área del rectángulo: **A = base × altura**
Despeja la base: **b = A / a**

★ PROBLEMAS PROPUESTOS · TRAPECIO

Problema 2 — Altura del Trapecio

TRAPECIO ÁREA DESPEJE DE LA ALTURA

★ PROBLEMA PROPUESTO 2

Calcula la altura del trapecio

El área de un trapecio es 25 cm² y sus bases son 4 cm y 6 cm respectivamente. Calcula su altura.




Fig. P2 — Trapecio con A = 25 cm²

🧠 PISTA

Fórmula del trapecio: **A = ((B + b) / 2) × h**
Despeja la altura: **h = (2 × A) / (B + b)**

★ PROBLEMAS PROPUESTOS · FIGURAS CIRCULARES

Problema 3 — Longitud y Área del Círculo

CIRCUNFERENCIA | CÍRCULO | LONGITUD | ÁREA

★ PROBLEMA PROPUESTO 3

Longitud de la circunferencia y área del círculo

Calcula la **longitud de la circunferencia** y la **superficie del círculo** correspondiente sabiendo que su **radio mide 8 cm**.




Fig. P3 — Círculo de radio R = 8 cm

🧠 PISTAS

Longitud: $L = 2 \times \pi \times R$
Área: $A = \pi \times R^2$

★ PROBLEMAS PROPUESTOS · POLIEDROS

Problema 4 — Prisma Octogonal

PRISMA OCTOGONAL | ÁREA LATERAL | ÁREA TOTAL | VOLUMEN

★ PROBLEMA PROPUESTO 4

Áreas y volumen del prisma octogonal

Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un prisma octogonal de 5 cm de lado, 6 cm de apotema de la base y 9 cm de altura.




Fig. P4 — Prisma octogonal

🧠 PISTAS (PRISMA)

Perímetro: $P = n \times l = 8 \times 5$
A. base: $A_b = (P \times a) / 2$
A. lateral: $A_L = P \times h$
A. total: $A_T = A_L + 2\,A_b$
Volumen: $V = A_b \times h$

★ PROBLEMAS PROPUESTOS · POLIEDROS

Problema 5 — Cubo

CUBO · ÁREA TOTAL · VOLUMEN

★ PROBLEMA PROPUESTO 5

Área total y volumen del cubo

Sabiendo que la arista de un cubo es de 12 dm, calcula el área total y el volumen.




Fig. P5 — Cubo con arista a = 12 dm

🧠 PISTAS (CUBO)

El cubo tiene 6 caras cuadradas iguales.
A. total: $A_T = 6 \times a^2$
Volumen: $V = a^3$

★ PROBLEMAS PROPUESTOS · CUERPOS DE REVOLUCIÓN

Problema 6 — Esfera

ESFERA SUPERFICIE VOLUMEN

★ PROBLEMA PROPUESTO 6

Superficie y volumen de la esfera

Calcula la **superficie** y el **volumen de una esfera** de **28 dm de radio**.














Fig. P6 — Esfera con R = 28 dm

🧠 PISTAS (ESFERA)

Superficie: $A = 4 \times \pi \times R^2$
Volumen: $V = (4/3) \times \pi \times R^3$

Área de figuras planas

Figura	*Área*	*Figura*	*Área*
 Rectángulo	$A = b \cdot h$	 Polígono regular	$A = \frac{P \cdot ap}{2}$
 Cuadrado	$A = a \cdot a = a^2$	 Círculo	$A = \pi \cdot r^2$
 Romboide	$A = b \cdot h$	 Sector circular	$A = \frac{\pi \cdot r^2}{360} \cdot n = l\frac{r}{2}$
 Rombo	$A = \frac{D \cdot d}{2}$	 Segmento circular	$A = \frac{\pi \cdot r^2}{360} \cdot n - \frac{b \cdot h}{2}$
 Triángulo	$A = \frac{b \cdot h}{2}$	 Corona circular	$A = \pi (R^2 - r^2)$
 Trapecio	$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$	 Trapecio circular	$A = \frac{\pi \cdot (R^2 - r^2)}{360} \cdot n$

www.Matematicas.com

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

EXÁMENES DE LADIS

3.º ESO · CURSO 2016–2017

$$ax^2 + bx + c = 0 \;\Rightarrow\; x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad S_\infty = \frac{a_1}{1 - r} \qquad e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

> *Las matemáticas son las herramientas con las que Dios escribió el universo, y nosotros, al comprenderlas, nos acercamos a la mente del Creador.*
>
> — **MICHAEL FARADAY · Físico y Matemático (1791–1867)** —

Alumno/a: _____

MATEMÁTICAS · 3.º ESO · GRUPO B · JUNIO 2017

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS TEMAS 1-2

EXAMEN 3º ESO 18/11/2016

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

Nº1.-Opera y simplifica:

$$\boldsymbol{a)} -\frac{3}{8}+\left(4-\frac{1}{2}\right)-\left[\left(2-\frac{5}{4}\right)+\left(\frac{7}{2}-\frac{1}{8}\right)\right] \qquad \boldsymbol{b)} \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{-2}\cdot\left(\frac{5}{3}\right)^{2}\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^{-1}\cdot 5\cdot 2^{-4}}{\left(\frac{5}{2}\right)^{2}\cdot\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}}$$

(2 puntos)

Nº2.-En una evaluación de Matemáticas ha aprobado 3/4 de la clase. El resto se presenta a la recuperación, aprobando 1/3 de ellos. Al final del proceso son en total 20 los aprobados ¿Cuál es la proporción de aprobados? ¿Cuántos estudiantes forman la clase?

(2 puntos)

Nº3.- Indica a qué conjunto más pequeño pertenecen los siguientes números reales:

$$\frac{\sqrt{3}}{4},\quad -\frac{12}{3},\quad \frac{6}{30},\quad \frac{7}{91},\qquad 0,\widehat{42}\ ,\qquad 22,3\hat{2}\ ,\ 0{,}141441444\ldots.$$

¿De qué tipo son los números que son racionales? ¿Cuál es su fracción generatriz?

(2 puntos)

Nº4.-a) La estrella más cercana a nuestro sistema solar es α-Centauri, que está a una distancia de tan sólo 4,3 años luz. Expresar, en km, esta distancia en notación científica. (Dato: velocidad de la luz: 300.000 km/s) ¿Cuánto tardaría en llegar una nave espacial viajando a 10 km/s?

b) Calcula el resultado de la siguiente expresión:

$$\frac{4{,}25\cdot 10^{7}-2{,}14\cdot 10^{5}}{(0{,}0036+4228564\cdot 10^{-4})\cdot 10^{5}}$$

(2 puntos)

Nº5.- Simplifica las siguientes expresiones:


$$\boldsymbol{a)}\ \sqrt{5}-2\sqrt{125}+\frac{3}{2}\sqrt{500}-\sqrt{405}\ +\frac{4}{3}\sqrt{5}+\frac{5}{6}\sqrt{20}=$$

$$\boldsymbol{b)}\ 3\sqrt[3]{24}-2\sqrt[3]{48}+4\sqrt[3]{6}-\sqrt[3]{648}\ \ =$$

$$\boldsymbol{c)}\ \sqrt{14+\sqrt{1+\sqrt{9}}}\ \ =$$

(2 puntos)

SUERTE JÓVENES



3.º ESO · MATEMÁTICAS · CURSO 2016–2017

MATEMÁTICAS

THE BEAUTY OF MATHEMATICS

Exploring the universe through elegant logic

Temas 1 y 2

Números Reales · Potencias · Radicales · Notación Científica

> *«La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abarca el mundo entero.»*
>
> — **Albert Einstein, físico y matemático (1879–1955)**

Examen · 18 de noviembre de 2016 | 5 Ejercicios | 10 Puntos

Índice de Ejercicios

HAZ CLIC EN CADA EJERCICIO PARA IR DIRECTAMENTE A ÉL

1 **Operaciones con fracciones y potencias** — 3

Fracciones · Paréntesis · Jerarquía · Leyes de los exponentes

2 **Problema de proporciones y fracciones** — 4

Fracciones de una cantidad · Ecuaciones · Proporciones directas

3 **Clasificación de los números reales** — 5

ℕ, ℤ, ℚ, ℝ · Decimales periódicos · Fracción generatriz

4 **Notación científica y operaciones** — 6

Años luz · Potencias de 10 · Operaciones en notación científica

5 **Simplificación de radicales** — 7

Raíces cuadradas, cúbicas y de orden 6 · Suma de radicales semejantes

📋 DATOS DEL EXAMEN

Nivel: 3.º ESO **Asignatura:** Matemáticas **Temas:** 1 y 2 **Fecha:** 18/11/2016 **Puntuación total:** 10 puntos

«La matemática es el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo» — Galileo Galilei

1 Operaciones con Fracciones y Potencias

FRACCIONES · JERARQUÍA DE OPERACIONES · LEYES DE LOS EXPONENTES

2 puntos

Opera y simplifica los siguientes apartados:

Apartado a)

Calcular y simplificar la expresión:

$$3/8 - 3/2 + (4 - 1/4) - [(2 - 5/7) + (1/2 - 1/8)]$$

Apartado b)

Calcular y simplificar la expresión:

$$(3/2)^{-2} \cdot (5/3)^{2} \cdot (2/5)^{-1} \cdot 5 \cdot 2^{-4} \div (5/2)^{-2} \cdot (3/5)^{-1} \cdot (2/3)^{-1} \cdot (2/3)^{-1}$$




Figura 1.1 — Representación visual de fracciones y operaciones con potencias

📐 CONCEPTOS CLAVE A RECORDAR

- **Jerarquía de operaciones:** Primero paréntesis, luego corchetes, luego multiplicaciones/divisiones, finalmente sumas/restas.
- **Suma de fracciones:** Se deben reducir a común denominador antes de operar.
- **Potencia negativa:** $a^{-n} = 1/a^{n} \rightarrow (a/b)^{-n} = (b/a)^{n}$
- **Producto de potencias de igual base:** $a^{m} \cdot a^{n} = a^{m+n}$
- **Cociente de potencias de igual base:** $a^{m} \div a^{n} = a^{m-n}$

Apartado a) — Operaciones con fracciones y paréntesis

Expresión original:

1. **Resolver el primer paréntesis:** $(4 - 1/4)$
   Convertir 4 a fracción con denominador 4: $4 = 16/4$
   $16/4 - 1/4 = \mathbf{15/4}$

2. **Resolver el primer paréntesis interior del corchete:** $(2 - 5/7)$
   Convertir 2 a fracción con denominador 7: $2 = 14/7$
   $14/7 - 5/7 = \mathbf{9/7}$

3. **Resolver el segundo paréntesis interior del corchete:** $(1/2 - 1/8)$
   m.c.d.$(2, 8) = 8$: $4/8 - 1/8 = \mathbf{3/8}$

4. **Resolver el corchete:** $[9/7 + 3/8]$
   m.c.d.$(7, 8) = 56$: $72/56 + 21/56 = \mathbf{93/56}$

5. **Expresión simplificada:**
   $3/8 - 3/2 + 15/4 - 93/56$
   m.c.d.$(8, 2, 4, 56) = 56$
   $21/56 - 84/56 + 210/56 - 93/56 = \mathbf{(21 - 84 + 210 - 93)/56 = 54/56 = 27/28}$

RESULTADO APARTADO A)

$$3/8 - 3/2 + (4 - 1/4) - [(2 - 5/7) + (1/2 - 1/8)] = \mathbf{27/28}$$

Apartado b) — Operaciones con potencias de base fraccionaria

Numerador: $(3/2)^{-2} \cdot (5/3)^{2} \cdot (2/5)^{-1} \cdot 5 \cdot 2^{-4}$

Denominador: $(5/2)^{-2} \cdot (3/5)^{-1} \cdot (2/3)^{-1}$

1. **Convertir potencias negativas en el numerador:**
   $(3/2)^{-2} = (2/3)^{2} = 4/9$
   $(2/5)^{-1} = 5/2$
   $2^{-4} = 1/16$
   $(5/3)^{2} = 25/9$
   Numerador $= 4/9 \cdot 25/9 \cdot 5/2 \cdot 5 \cdot 1/16 = (4 \cdot 25 \cdot 5 \cdot 5)/(9 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 16) = 2500/2592$

2. **Convertir potencias negativas en el denominador:**
   $(5/2)^{-2} = (2/5)^{2} = 4/25$
   $(3/5)^{-1} = 5/3$
   $(2/3)^{-1} = 3/2$
   Denominador $= 4/25 \cdot 5/3 \cdot 3/2 = (4 \cdot 5 \cdot 3)/(25 \cdot 3 \cdot 2) = 60/150 = 2/5$

3 **Dividir numerador entre denominador:**

$(2500/2592) \div (2/5) = (2500/2592) \cdot (5/2) = 12500/5184$

Simplificar: m.c.d.(12500, 5184) → dividir ambos por 4 → 3125/1296

RESULTADO APARTADO B)

3125/1296

2 Problema de Proporciones y Fracciones

FRACCIONES DE UNA CANTIDAD · PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE ECUACIONES

2 puntos

> En una evaluación de Matemáticas ha aprobado **3/4 de la clase**. El resto se presenta a la recuperación, aprobando **1/3 de ellos**. Al final del proceso son en total **20 los aprobados**.
>
> ¿Cuál es la proporción de aprobados? ¿Cuántos estudiantes forman la clase?




Figura 2.1 — Diagrama visual del problema: proporción de aprobados y suspensos

📊 COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

Sea **n** el número total de estudiantes de la clase.

- Aprobaron en primera convocatoria: **3n/4** alumnos.
- No aprobaron (fueron a recuperación): **n − 3n/4 = n/4** alumnos.
- De los que fueron a recuperación, aprobó 1/3: **(1/3) · (n/4) = n/12** alumnos.
- **Total aprobados = 3n/4 + n/12 = 20**

Resolución paso a paso

1 **Plantear la ecuación:**

Aprobados totales = aprobados en 1.ª convocatoria + aprobados en recuperación

$$3n/4 + (1/3)\cdot(n/4) = 20$$

2 **Simplificar (1/3)·(n/4):**

$(1/3)\cdot(n/4) = n/12$

3 **Sumar las fracciones — mcm(4, 12) = 12:**

$3n/4 = 9n/12$

$9n/12 + n/12 = 10n/12 = 5n/6$

4 **Resolver la ecuación:**

$5n/6 = 20 \rightarrow n = 20 \cdot 6/5 = 120/5 =$ **24 alumnos**

5 **Verificación:**

- Aprobados en 1.ª conv.: $3/4 \cdot 24 = 18$ alumnos.
- Suspensos que van a recuperación: $24 - 18 = 6$ alumnos.
- Aprobados en recuperación: $1/3 \cdot 6 = 2$ alumnos.
- Total aprobados: $18 + 2 =$ **20** ✓

6 **Proporción de aprobados sobre el total:**

20 aprobados de 24 alumnos → $20/24 =$ **5/6 de la clase**

RESPUESTAS

La clase tiene **24 estudiantes**

Proporción total de aprobados: **5/6 de la clase (≈ 83,3%)**

3 Clasificación de los Números Reales

ℕ · ℤ · ℚ · ℝ · DECIMALES PERIÓDICOS · FRACCIÓN GENERATRIZ

2 puntos

Indica a qué conjunto más pequeño pertenecen los siguientes números reales:

$$\sqrt{3}/4 \ , \ -12/3 \ , \ 6/30 \ , \ 7/91 \ , \ 0 \ , \ 0{,}42\hat{} \ , \ 22{,}32\hat{} \ , \ 0{,}141441444\ldots$$

¿De qué tipo son los números que son racionales? ¿Cuál es su fracción generatriz?




Figura 3.1 — Los conjuntos numéricos: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

📚 JERARQUÍA DE CONJUNTOS NUMÉRICOS

Ω (Naturales): 0, 1, 2, 3, … | **ℸ (Enteros):** …, −2, −1, 0, 1, 2, … | **Å (Racionales):** cocientes p/q con q ≠ 0 | **Ⅎ \ Å (Irracionales):** decimales no periódicos infinitos (√2, π, e, …)

NÚMERO	SIMPLIFICACIÓN	TIPO DE DECIMAL	CONJUNTO MÁS PEQUEÑO
√3/4	√3 / 4 ≈ 0,4330…	Decimal irracional (√3 es irracional)	**Ⅎ \ Å (Irracional)**
−12/3	−12/3 = −4	Número entero negativo	**ℸ (Entero)**
6/30	6/30 = 1/5 = 0,2	Decimal exacto (periódico puro: periodo 0)	**Å (Racional)**
7/91	7/91 = 1/13 = 0,076923…	Decimal periódico puro (periodo 076923)	**Å (Racional)**
0	0	Número natural	**Ω (Natural)**

22,32ˆ= 22,3222…	Parte entera 22, parte decimal mixta: anteperiodo "3", periodo "2"	Decimal periódico mixto	**Å (Racional)**
0,141441444…	Decimal no periódico infinito	Irracional (el número de 1's crece de manera no repetitiva)	**Ƒ \ Å (Irracional)**

Fracción Generatriz de los números racionales

A **6/30 = 1/5** — Ya es fracción. F.G. = **1/5**

B **7/91 = 1/13** — Ya es fracción. F.G. = **1/13**

C **0,4242… = 0,42ˆ**— Periodo de 2 cifras, sin anteperiodo

Método: x = 0,4242… → 100x = 42,4242… → 100x − x = 42 → 99x = 42 → x = 42/99 = **14/33**

D **22,3222… = 22,32ˆ**— Anteperiodo "3" (1 cifra), periodo "2" (1 cifra)

Método: x = 22,3222… → 10x = 223,222… → 100x = 2232,22…

100x − 10x = 2232,22… − 223,22… = 2009

90x = 2009 → x = 2009/90 → Comprobar: 2009/90 = 22,32ˉ✓ F.G. = **2009/90**

4 Notación Científica y Operaciones

AÑOS LUZ · VELOCIDAD DE LA LUZ · POTENCIAS DE 10 · OPERACIONES EN N.C.

2 puntos

Apartado a) La estrella más cercana a nuestro sistema solar es α-Centauri, que está a una distancia de tan sólo **4,3 años luz**. Expresar, en km, esta distancia en notación científica.

(Dato: velocidad de la luz = 300.000 km/s)

¿Cuánto tardaría en llegar una nave espacial viajando a **10 km/s**?

Apartado b) Calcula el resultado de la siguiente expresión:

$$(4{,}25 \cdot 10^7 - 2{,}14 \cdot 10^5) \div [(0{,}0036 + 4228564 \cdot 10^{-4}) \cdot 10^5]$$




Figura 4.1 — α-Centauri, la estrella más cercana al Sol, a 4,3 años luz

⭐ DATOS DE REFERENCIA

Velocidad de la luz: $c = 300.000 \text{ km/s} = 3 \times 10^5 \text{ km/s}$

1 año en segundos: $365{,}25 \text{ días} \times 24 \text{ h} \times 3.600 \text{ s} = 31.557.600 \text{ s} \approx 3{,}156 \times 10^7 \text{ s}$

1 año luz (en km): $c \times \text{tiempo} = 3 \times 10^5 \times 3{,}156 \times 10^7 = 9{,}467 \times 10^{12} \text{ km}$

Apartado a) — Distancia a α-Centauri en km y tiempo de viaje

1 **Calcular los segundos que tiene un año:**

1 año = 365 días × 24 h/día × 60 min/h × 60 s/min

$= 365 \times 86.400 = 31.536.000 \text{ s} \approx 3{,}1536 \times 10^7 \text{ s}$

2 **Distancia de 1 año luz en km:**

$d_{1 \text{ año luz}} = c \times t = 3 \times 10^5 \text{ km/s} \times 3{,}1536 \times 10^7 \text{ s}$

$= (3 \times 3{,}1536) \times 10^{5+7} = 9{,}4608 \times 10^{12} \text{ km}$

3. **Distancia a α-Centauri (4,3 años luz):**

$d = 4{,}3 \times 9{,}4608 \times 10^{12} = 40{,}6814 \times 10^{12} = \mathbf{4{,}068 \times 10^{13}\ km}$

4. **Tiempo de viaje a 10 km/s:**

$t = d/v = 4{,}068 \times 10^{13}\ km \div 10\ km/s = 4{,}068 \times 10^{12}\ s$

Convertir a años: $4{,}068 \times 10^{12}\ s \div 3{,}1536 \times 10^{7}\ s/año$

$= (4{,}068/3{,}1536) \times 10^{12-7} \approx 1{,}29 \times 10^{5}$ años = **≈ 129.000 años**

RESULTADO APARTADO A)

Distancia: $\approx 4{,}07 \times 10^{13}$ km

Tiempo de viaje a 10 km/s: $\approx 1{,}29 \times 10^{5}$ años (unos 129.000 años)

Apartado b) — Operaciones con notación científica

1. **Resolver el numerador:** $4{,}25 \times 10^{7} - 2{,}14 \times 10^{5}$

Igualar exponentes: $4{,}25 \times 10^{7} = 425 \times 10^{5}$

$425 \times 10^{5} - 2{,}14 \times 10^{5} = (425 - 2{,}14) \times 10^{5} = \mathbf{422{,}86 \times 10^{5}}$

2. **Resolver el corchete del denominador — parte 1:**

$0{,}0036 + 4.228.564 \times 10^{-4}$

$4.228.564 \times 10^{-4} = 422{,}8564$

$0{,}0036 + 422{,}8564 = \mathbf{422{,}86}$

3. **Resolver el denominador completo:**

$422{,}86 \times 10^{5}$

4. **Dividir numerador entre denominador:**

$(422{,}86 \times 10^{5}) \div (422{,}86 \times 10^{5}) = \mathbf{1}$

RESULTADO APARTADO B)

1

5 Simplificación de Radicales

RAÍCES CUADRADAS · RAÍCES CÚBICAS · RAÍCES DE ÍNDICE 6 · SUMA DE RADICALES SEMEJANTES

2 puntos

Simplifica las siguientes expresiones:

a) $\sqrt{5} - (3/2)\cdot\sqrt{125} + (4/3)\cdot\sqrt{500} - (5/6)\cdot\sqrt{405} + \sqrt{5} + \sqrt{20} =$

b) $3\cdot\sqrt[3]{24} - 2\cdot\sqrt[3]{48} + 4\cdot\sqrt[3]{6} - \sqrt[3]{648} =$

c) $\sqrt{(14 + \sqrt{(1 + \sqrt{9})})} =$




Figura 5.1 — Árbol de descomposición factorial para simplificar radicales

📐 PROPIEDADES DE LOS RADICALES

- **Sacar factores fuera de la raíz:** $\sqrt[n]{(a^n\cdot b)} = a\cdot\sqrt[n]{b}$
- **Suma de radicales semejantes:** $k\cdot\sqrt[n]{a} + m\cdot\sqrt[n]{a} = (k+m)\cdot\sqrt[n]{a}$
- **Factorización:** descomponer el radicando en factores primos para identificar potencias perfectas.
- **Raíces anidadas:** resolver de dentro hacia afuera.

Apartado a) — Raíces cuadradas mixtas con coeficientes fraccionarios

1 **Simplificar cada radical individualmente:**

- $\sqrt{5} = \sqrt{5}$ (ya simplificada)
- $\sqrt{125} = \sqrt{(25\cdot5)} = 5\sqrt{5}$
- $\sqrt{500} = \sqrt{(100\cdot5)} = 10\sqrt{5}$
- $\sqrt{405} = \sqrt{(81\cdot5)} = 9\sqrt{5}$
- $\sqrt{20} = \sqrt{(4\cdot5)} = 2\sqrt{5}$

2 **Sustituir en la expresión con los coeficientes:**

$1\cdot\sqrt{5} - (3/2)\cdot 5\sqrt{5} + (4/3)\cdot 10\sqrt{5} - (5/6)\cdot 9\sqrt{5} + 1\cdot\sqrt{5} + 2\cdot\sqrt{5}$

$= 1\cdot\sqrt{5} - (15/2)\cdot\sqrt{5} + (40/3)\cdot\sqrt{5} - (45/6)\cdot\sqrt{5} + 1\cdot\sqrt{5} + 2\cdot\sqrt{5}$

3 **Reducir a común denominador (mcm = 6):**

Coeficientes: $6/6 - 45/6 + 80/6 - 45/6 + 6/6 + 12/6$

$= (6 - 45 + 80 - 45 + 6 + 12)/6 = 14/6 = 7/3$

RESULTADO APARTADO A)

$$(7/3)\cdot\sqrt{5}$$

Apartado b) — Raíces cúbicas

1 **Simplificar cada radical cúbico:**

- $\sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{(8\cdot 3)} = 2\cdot\sqrt[3]{3}$
- $\sqrt[3]{48} = \sqrt[3]{(8\cdot 6)} = 2\cdot\sqrt[3]{6}$
- $\sqrt[3]{6} = \sqrt[3]{6}$ (ya simplificada)
- $\sqrt[3]{648} = \sqrt[3]{(216\cdot 3)} = 6\cdot\sqrt[3]{3}$ $\quad(216 = 6^3)$

2 **Sustituir en la expresión:**

$3\cdot(2\cdot\sqrt[3]{3}) - 2\cdot(2\cdot\sqrt[3]{6}) + 4\cdot\sqrt[3]{6} - 6\cdot\sqrt[3]{3}$

$= 6\cdot\sqrt[3]{3} - 4\cdot\sqrt[3]{6} + 4\cdot\sqrt[3]{6} - 6\cdot\sqrt[3]{3}$

3 **Agrupar radicales semejantes:**

$(6\cdot\sqrt[3]{3} - 6\cdot\sqrt[3]{3}) + (-4\cdot\sqrt[3]{6} + 4\cdot\sqrt[3]{6}) = \mathbf{0 + 0 = 0}$

RESULTADO APARTADO B)

$$\mathbf{0}$$

Apartado c) — Raíces anidadas

1 **Resolver la raíz más interior:**

$\sqrt{9} = \mathbf{3}$

2 **Resolver la raíz intermedia:**

$\sqrt{(1 + \sqrt{9})} = \sqrt{(1 + 3)} = \sqrt{4} = \mathbf{2}$

3 **Resolver la raíz exterior:**

$\sqrt{(14 + \sqrt{(1 + \sqrt{9})})} = \sqrt{(14 + 2)} = \sqrt{16} = \mathbf{4}$

RESULTADO APARTADO C)

$$4$$

✨ Resumen de Resultados del Examen

EJERCICIO	TEMA	RESULTADO	PUNTOS
1a	Fracciones con paréntesis	27/28	1 pt
1b	Potencias de fracciones	3125/1296	1 pt
2	Fracciones · Ecuaciones	24 alumnos · 5/6 aprobados	2 pt
3	Clasificación números reales	Tabla clasificación + fracciones generatrices	2 pt
4a	Notación científica	$4{,}07\times10^{13}$ km · $1{,}29\times10^{5}$ años	1 pt
4b	Operaciones N.C.	1	1 pt
5a	Radicales cuadráticos	$(7/3)\sqrt{5}$	0,67 pt
5b	Radicales cúbicos	0	0,67 pt
5c	Raíces anidadas	4	0,66 pt

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS

EXAMEN 3º ESO 9/12/2015

Nº1.-Opera y simplifica:

$$a)\ \left[5+\frac{5}{6}:\left(\frac{7}{5}-\frac{2}{5}\cdot\frac{15}{4}\right)\right]\cdot\left(-\frac{3}{10}\right) \qquad b)\ \frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}+\frac{3}{2}:\frac{1}{4}+5}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{2}:\frac{1}{4}+5\right)}+\frac{31}{9}$$

(2 puntos)

Nº2.- A) Simplifica, aplicando las propiedades de las potencias:

$$\frac{15^2\cdot 5^{-1}\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^{-2}\cdot 45^2}{[(-5)^3]^2\cdot 27\cdot 3^2}$$

B) Opera y simplifica, aplicando las propiedades de los radicales:

a) $\dfrac{\sqrt{2\cdot\sqrt{2}}\ \cdot\sqrt[4]{8}}{\left(\sqrt[4]{2}\right)^6}$ b) $27\cdot\sqrt{3}-5\sqrt{27}-9\sqrt{12}+\sqrt{108}$

(2 puntos)

Nº3.- Sergio sale de casa con 300 €. Se gasta $\frac{1}{3}$ en libros y, después, $\frac{4}{5}$ de lo que le quedaba en ropa. ¿Con cuánto dinero regresa a casa? ¿Qué fracción de la cantidad inicial representa?

(1 punto)

Nº4.- a) Hállese la fracción generatriz (irreducible) de los siguientes números:

$$1{,}4 \qquad 1{,}\hat{6} \qquad 0{,}1\hat{3}$$

b) Utilizando lo anterior, efectúa la siguiente operación, dejando el resultado en forma de fracción y en forma decimal:

$$1{,}\hat{6}\ -1{,}4+\ 0{,}1\hat{3}$$

(1 punto)

Nº5.- Realiza las siguientes operaciones y escribe el resultado final en notación científica

$$a)\ 34{,}7\cdot 10^5+0{,}91\cdot 10^7-6{,}2\cdot 10^6 \qquad b)\ \frac{2{,}2\cdot 10^5+780\cdot 10^3}{20\cdot 10^{-5}}$$

(2 puntos)

Nº6.- a) Unas acciones que valían 1000 €, suben un 60%, luego vuelven a subir un 25% y finalmente bajan un 85%. En base al índice de variación, el precio final ha aumentado o disminuido y cuál es ese precio final.

b) En una cadena de montaje, 17 operarios trabajando 8 horas al día, fabrican 850 aparatos mp3 a la semana. ¿Cuántas horas deben trabajar la próxima semana, para atender un pedido de 1000 aparatos mp3, teniendo en cuenta que se añadirá un refuerzo de tres trabajadores.

(2 puntos)

SUERTE JÓVENES

3.º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

MATEMÁTICAS

Cuaderno de Ejercicios



> *"Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido.*
> *Ahora es el momento de comprender más,*
> *para temer menos."*
>
> — MARIE CURIE

Examen · 9 de diciembre de 2015

Índice de Ejercicios

Haz clic en cualquier ejercicio para ir directamente a él

1 Operaciones con Fracciones — Fracciones — 2 pts

Opera y simplifica expresiones con fracciones: suma, resta, multiplicación y división combinadas.

2 Potencias y Radicales — Potencias — Radicales — 2 pts

Simplificación de potencias con propiedades (productos, cocientes, potencia de potencia) y operaciones con radicales (simplificación y operaciones combinadas).

3 Problema de Fracciones — Sergio y su Dinero — Fracción de cantidad — 1 pt

Problema contextualizado: calcular el dinero restante tras gastar fracciones sucesivas de una cantidad inicial y expresar el resultado como fracción del total.

4 Fracción Generatriz de Números Decimales — Decimales — Fracciones — 1 pt

Obtención de la fracción generatriz irreducible para decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. Operación final con los resultados obtenidos.

5 Notación Científica — Notación científica — 2 pts

Operaciones con números en notación científica: suma y cociente. Expresión del resultado final en notación científica normalizada.

6 Porcentajes y Proporcionalidad — Porcentajes — Proporcionalidad — 2 pts

Variaciones porcentuales en cadena mediante índice de variación compuesto; problema de proporcionalidad triple inversa con regla de tres compuesta.

Total del examen: **10 puntos** | Duración: 1 hora y 30 minutos

1 Operaciones con Fracciones

Fracciones · Orden de operaciones · 2 puntos




Ilustración: Las fracciones representan partes de un todo — sumas, restas, productos y cocientes combinados.

Las fracciones son una herramienta fundamental para expresar cantidades no enteras. Operar con ellas implica dominar el orden jerárquico de las operaciones matemáticas y las reglas para combinar numeradores y denominadores mediante la reducción a común denominador, la multiplicación cruzada y la simplificación de fracciones.

✏️ ENUNCIADO — OPERA Y SIMPLIFICA:

a Apartado a) — 1 pto

$$\left[\, 5 + \frac{1}{6} \div \left(\frac{5}{5} - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \right) \right] \cdot \left(-\frac{5}{10} \right)$$

Respeta el orden de operaciones: primero paréntesis interiores, luego corchetes, finalmente la multiplicación exterior.

La expresión completa es:

a) $\left[\, 5 + \frac{1}{6} \div \left(\frac{5}{5} - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \right) \right] \cdot \left(-\frac{5}{10} \right)$

b Apartado b) — 1 pto

Se trata de una fracción compleja:

$$\frac{\frac{1}{5}\cdot 7 + 2 - \frac{3}{15} + \frac{1}{3} + 5}{\frac{31}{2} - \frac{1}{3}\cdot\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{5} \div \frac{2}{1} + 5\right) + \frac{1}{4} + 9}$$

b) La expresión del numerador es: $\frac{1}{5}\cdot 7 + 2 - \frac{3}{15} + \frac{1}{3} + 5$ dividido entre el denominador: $\frac{31}{2} - \frac{1}{3}\cdot(\frac{1}{2} + \frac{3}{5} \div 2 + \frac{1}{4}) + 9$

💡 **RECUERDA**

Para operar con fracciones correctamente: (1) Primero resuelve las operaciones dentro de los paréntesis y corchetes, de dentro hacia afuera. (2) Las multiplicaciones y divisiones tienen prioridad sobre sumas y restas. (3) Para sumar o restar fracciones, debes calcular el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de los denominadores. (4) Para dividir fracciones, multiplicas por la fracción inversa.

2 Potencias y Radicales

Potencias · Radicales · Propiedades · 2 puntos




Ilustración: Las potencias representan multiplicaciones repetidas; los radicales son su operación inversa.

Las propiedades de las potencias permiten transformar y simplificar expresiones con exponentes enteros, negativos y fraccionarios. Los radicales son potencias con exponente fraccionario; sus propiedades de producto y cociente permiten simplificarlos y combinarlos en expresiones más sencillas.

✏️ ENUNCIADO

A Apartado A) — Simplifica aplicando las propiedades de las potencias: 1 pto

$$\frac{15^2 \cdot 5^{-1} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} \cdot 45^2}{[(-5)^3]^2 \cdot 2^7 \cdot 3^2}$$

Debes aplicar: la propiedad del **producto de potencias de igual base** (se suman exponentes), la propiedad de la **potencia de una potencia** (se multiplican exponentes), la propiedad de la **potencia de exponente negativo** (inverso) y la propiedad de la **potencia de un cociente**. Finalmente descompon todos los números en factores primos para simplificar.

B Apartado B) — Opera y simplifica con propiedades de los radicales: 1 pto

Apartado a):

$$\frac{\sqrt[4]{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt[6]{8}}{(\sqrt[4]{2})^4}$$

El numerador tiene el producto de una raíz cuarta de 2, la raíz cuadrada de 2 y la raíz sexta de 8. El denominador es la raíz cuarta de 2, elevada a la cuarta potencia. Para resolverlo: convierte todos los radicales a potencias con exponente fraccionario (p. ej. $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$), opera con las reglas de las potencias y simplifica.

Apartado b):

$$27\cdot\sqrt{3} - 5\sqrt{27} - 9\sqrt{12} + \sqrt{108}$$

Simplifica cada radical extrayendo factores cuadrados perfectos: descompón $27 = 3^3$, $12 = 4\cdot3$, $108 = 36\cdot3$. Reduce cada radical a la forma $k\cdot\sqrt{3}$ y suma los coeficientes de los radicales semejantes.

📐 **PROPIEDADES CLAVE DE LAS POTENCIAS**

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ | $a^m \div a^n = a^{m-n}$ | $(a^m)^n = a^{m\cdot n}$ | $a^{-n} = 1/a^n$ | $a^0 = 1\ (a \neq 0)$ | $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$

3 El Problema de Sergio

Fracción de cantidad | Problema contextualizado | 1 punto



Ilustración: Sergio gasta fracciones sucesivas de su dinero en libros y ropa a lo largo del día.

Los problemas de fracción de cantidad son muy frecuentes en la vida cotidiana. La clave está en identificar a qué cantidad se aplica cada fracción: la primera fracción se aplica al total inicial, pero la segunda fracción se aplica a lo que queda después del primer gasto, no al total original.

✏️ ENUNCIADO COMPLETO

Sergio sale de casa con **300 €**. Se gasta $\frac{1}{3}$ en **libros** y, después, $\frac{4}{5}$ de lo que le **quedaba** en **ropa**.

Se pide:

(1) ¿Con cuánto dinero regresa Sergio a casa?

(2) ¿Qué fracción de la cantidad inicial (300 €) representa el dinero que le queda?

🗝️ ESQUEMA DE RESOLUCIÓN

Paso 1: Calcula $\frac{1}{3}$ de 300 € → gasto en libros.

Paso 2: Dinero restante tras los libros = 300 − gasto en libros.

Paso 3: Calcula $\frac{4}{5}$ del dinero restante → gasto en ropa.

Paso 4: Dinero final = dinero tras libros − gasto en ropa.

Paso 5: Expresa el dinero final como fracción de 300 € y simplifica.

4 Fracción Generatriz de Decimales

Decimales periódicos | Fracción generatriz | 1 punto




Ilustración: Todo decimal periódico esconde una fracción exacta — la fracción generatriz.

Todo número decimal —ya sea exacto, periódico puro o periódico mixto— puede expresarse como una fracción. Esa fracción se llama **fracción generatriz**. El método algebraico para obtenerla depende del tipo de decimal: exacto (se divide entre la potencia de 10 correspondiente), periódico puro (se usa la diferencia entre el número sin coma y la parte entera, dividida entre tantos 9 como cifras tiene el período) y periódico mixto (se combina la parte anteperíodo y el período).

✏️ ENUNCIADO

a **Apartado a) — Halla la fracción generatriz irreducible de:** 0,6 pts

Número decimal	Tipo	Descripción
$1{,}4^{-}$ (= 1,444…)	Periódico puro	Parte entera: 1; parte decimal periódica: 4 (período = "4")
$1{,}6^{-}$ (= 1,666…)	Periódico puro	Parte entera: 1; parte decimal periódica: 6 (período = "6")
$0{,}1\underline{3}$ (= 0,1333…)	Periódico mixto	Parte no periódica: "1"; período: "3"

b **Apartado b) — Usando las fracciones del apartado a), efectúa y da el resultado como fracción y decimal:** 0,4 pts

$$1{,}6^{-} - 1{,}4^{-} + 0{,}1\underline{3}$$

Sustituye cada decimal por su fracción generatriz obtenida en el apartado a), opera con dichas fracciones (reduciendo a común denominador) y expresa el resultado final tanto en forma de fracción irreducible como en forma decimal.

📐 **FÓRMULAS PARA LA FRACCIÓN GENERATRIZ**

Decimal exacto: $\dfrac{\text{cifras decimales}}{10^{n}}$ (n = número de cifras decimales)

Periódico puro: $\dfrac{\text{número sin coma} - \text{parte entera}}{\text{tantos 9 como cifras del período}}$

Periódico mixto:

$$\frac{\text{número completo sin coma} - \text{parte sin período}}{\text{tantos 9 como cifras del período seguidos de tantos 0 como cifras del anteperíodo decimal}}$$

5 Notación Científica

Notación científica · Potencias de 10 · 2 puntos




Ilustración: La notación científica nos permite escribir números astronómicos o microscópicos de forma compacta y elegante.

La notación científica es el lenguaje de los científicos y los ingenieros. Un número en notación científica tiene la forma **a × 10ⁿ**, donde $1 \leq |a| < 10$ y n es un entero. Para sumar o restar números en notación científica, primero hay que igualar las potencias de 10. Para multiplicar o dividir, se operan las mantisas por separado y las potencias de 10 por separado.

✏️ ENUNCIADO — REALIZA LAS OPERACIONES Y ESCRIBE EL RESULTADO EN NOTACIÓN CIENTÍFICA:

a **Apartado a)** — 1 pto

$$34{,}7 \cdot 10^5 \;+\; 0{,}91 \cdot 10^7 \;-\; 6{,}2 \cdot 10^6$$

Tienes tres sumandos con distintas potencias de 10 (10^5, 10^7 y 10^6). Antes de sumar o restar debes expresarlos todos con la **misma potencia de 10**. Elige 10^6 como referencia y ajusta las mantisas. Suma los coeficientes y escribe el resultado final en notación científica normalizada.

b **Apartado b)** — 1 pto

$$\frac{2{,}2 \cdot 10^5 \;+\; 780 \cdot 10^3}{20 \cdot 10^{-5}}$$

Primero simplifica el numerador: convierte $780 \cdot 10^3$ a la misma potencia que $2{,}2 \cdot 10^5$ (o viceversa), suma las mantisas. Luego divide el resultado entre $20 \cdot 10^{-5}$: divide las mantisas y resta los exponentes. Expresa el cociente en notación científica normalizada.

💡 **PASOS PARA SUMAR/RESTAR EN NOTACIÓN CIENTÍFICA**

1. Iguala las potencias de 10 (ajusta las mantisas).
2. Suma o resta las mantisas.
3. Si la mantisa resultante no está entre 1 y 10, ajústala desplazando el exponente.
Ejemplo: $3{,}5 \cdot 10^4 + 2{,}1 \cdot 10^3 = 3{,}5 \cdot 10^4 + 0{,}21 \cdot 10^4 = 3{,}71 \cdot 10^4$

6 Porcentajes y Proporcionalidad

Porcentajes · Índice de variación · Regla de tres compuesta · 2 puntos




Ilustración: Las variaciones porcentuales en cadena y la proporcionalidad triple se aplican en economía y producción industrial.

Los porcentajes encadenados se resuelven eficazmente con el **índice de variación compuesto**, que multiplica los factores de cada variación. La proporcionalidad compuesta (con varias magnitudes) requiere analizar si cada relación es directa o inversa y aplicar la regla de tres múltiple.

✏️ ENUNCIADO

a Apartado a) — Variaciones porcentuales en cadena — 1 pto

Unas acciones que valían **1 000 €** experimentan tres variaciones sucesivas:

Variación	Tipo	Porcentaje	Factor de variación
1ª variación	Subida	+60 %	1 + 0,60 = 1,60
2ª variación	Subida	+25 %	1 + 0,25 = 1,25
3ª variación	Bajada	−85 %	1 − 0,85 = 0,15

Se pide: (1) Calcula el **índice de variación global** (producto de los tres factores). (2) Determina si el precio ha **aumentado o disminuido** respecto al precio inicial y en qué porcentaje. (3) Calcula el **precio final** de las acciones.

b Apartado b) — Proporcionalidad compuesta (Cadena de montaje) 1 pto

En una cadena de montaje, **17 operarios** trabajando **8 horas/día** fabrican **850 aparatos MP3** en una semana.

La próxima semana se necesita atender un pedido de **1 000 aparatos MP3**, y se incorporará un refuerzo de **3 trabajadores adicionales** (total: 20 operarios).

Se pide: ¿Cuántas **horas diarias** deben trabajar los 20 operarios para fabricar los 1 000 aparatos esa semana?

Magnitud	Situación inicial	Situación nueva	Relación con las horas
Operarios	17	20	Inversa (más operarios → menos horas)
Aparatos fabricados	850	1 000	Directa (más aparatos → más horas)
Horas/día	8	¿x?	— (es la incógnita)

💡 ÍNDICE DE VARIACIÓN COMPUESTO

El índice de variación compuesto se calcula multiplicando todos los factores de variación individuales:
$I = f_1 \times f_2 \times f_3 = (1 \pm \%_1/100) \times (1 \pm \%_2/100) \times (1 \pm \%_3/100)$
Si $I > 1$ → ha aumentado; si $I < 1$ → ha disminuido. Porcentaje total de variación = $(I - 1) \times 100$ %.
Precio final = Precio inicial × I.

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS

3-02-2017 EXAMEN 3º ESO B

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

Nº1.- Dados los polinomios
$P(x) = 2x^5 - 3x^3 + 2x - 1 \quad Q(x) = -x^3 + 2x^2 - 3 \quad R(x) = 2x^2 - x + 1$

Realiza las siguientes operaciones y ordena el polinomio resultante.

$a) \quad 3 \cdot Q(x) - P(x) - 3 \cdot R(x) \qquad b) \quad [R(x) - Q(x)] \cdot P(x)$

Nº2.- Dados los polinomios $P(x) = 2x^5 - 3x^3 + 2x - 1$, $Q(x) = -x^3 + 2x^2 - 3$

Realiza la división: $P(x) : Q(x)$ indicando el cociente y el resto.

Nº3.- Realiza la siguiente división de polinomios, indicando el cociente y el resto.

$$(-x^4 - 2x^6 + 3x^2 - x + 3) : (x + 2)$$

Nº4.-Hallar el valor de k para que al efectuar la división $(2x^3 - x^2 + k \cdot x - 3) : (x - 1)$ el resto sea 0 (división exacta).

Nº5.- Extraer factor común en las siguientes expresiones:

$a) \; 18xy - 6x + 24x^2y \qquad b) \; 12a^3b^2 + 24a^4b^4 - 36a^2b^3$

Nº6 Desarrolla aplicando identidades notables:
$a) \; (4a^2 - 3a)^2 \qquad b) \; (5x + 4x^2)^2 \qquad c) \; (5x - y^2) \cdot (5x + y^2)$

Nº7.- Factorizar los siguientes polinomios:
$a) \; 16x^4y^2z + 4z^3 + 16x^2yz^2 \qquad b) \; 18x^3y - 2xy^3$

Nº8.- Hállese el valor numérico del polinomio $P(x) = -x^4 - 2x^6 + 3x^2 - x + 3$ en el punto $x = -2$

Nº9.- Opera y simplifica:


$$a) \quad \frac{2}{x} + \frac{x+1}{x^2} - \frac{1}{x} \qquad b) \frac{4x^2 - 16}{(9x^2 + 1 + 6x)} : \frac{2 \cdot (x+2)}{(1+3x)} - \frac{2x-4}{3x+1}$$

Nº10.- Halla la expresión algebraica de la diagonal de un rectángulo cuyos lados difieren en 7 centímetros. ¿Es un polinomio? Calcula la diagonal si el lado menor mide 5 centímetros

SUERTE JÓVENES

MATEMÁTICAS

3.º ESO — Polinomios y Álgebra



Examen — 3 de Febrero de 2017

Curso 2016/2017

"Las matemáticas son el instrumento
con el que Dios escribió el Universo."

— James Clerk Maxwell

Físico y matemático escocés (1831–1879)

ÍNDICE DE EJERCICIOS

Examen de Polinomios y Álgebra · 3.º ESO · Febrero 2017

Ejercicio 1 *Operaciones con polinomios P(x), Q(x) y R(x)*

Ejercicio 2 *División de polinomios P(x) ÷ Q(x)*

Ejercicio 3 *División por (x + 2) — Regla de Ruffini*

Ejercicio 4 *Hallar el valor de k para división exacta*

Ejercicio 5 *Factor común en expresiones algebraicas*

Ejercicio 6 *Identidades notables — Desarrollo algebraico*

Ejercicio 7 *Factorización de polinomios*

Ejercicio 8 *Valor numérico de P(x) en x = −2*

Ejercicio 9 *Operaciones con fracciones algebraicas*

Ejercicio 10 *Expresión algebraica de la diagonal de un rectángulo*

Nota: Cada ejercicio incluye enunciado completo, desarrollo paso a paso y resultado final. Haz clic en cualquier ejercicio del índice para ir directamente a él.

EJERCICIO N.º 1

Operaciones con Polinomios

Suma, resta y producto de polinomios P(x), Q(x) y R(x)




Fig. 1 — Representación gráfica de P(x), Q(x) y R(x) en el plano cartesiano

📋 ENUNCIADO

Dados los siguientes polinomios:

$$P(x) = 2x^5 - 3x^3 + 2x - 1$$

$$Q(x) = -x^3 + 2x^2 - 3$$

$$R(x) = 2x^2 - x + 1$$

Realiza las siguientes operaciones y **ordena el polinomio resultante**:

a) $3\cdot Q(x) - P(x) - 3\cdot R(x)$

b) $[R(x) - Q(x)] \cdot P(x)$

✏️ RESOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) $3\cdot Q(x) - P(x) - 3\cdot R(x)$

Comenzamos calculando cada múltiplo por separado antes de operar:

Paso 1: Calcular $3\cdot Q(x)$

$$3\cdot Q(x) = 3\cdot(-x^3 + 2x^2 - 3) = -3x^3 + 6x^2 - 9$$

Paso 2: Calcular $-P(x)$ (cambiar todos los signos)

$$-P(x) = -(2x^5 - 3x^3 + 2x - 1) = -2x^5 + 3x^3 - 2x + 1$$

Paso 3: Calcular $-3\cdot R(x)$

$$-3\cdot R(x) = -3\cdot(2x^2 - x + 1) = -6x^2 + 3x - 3$$

Paso 4: Suma de los tres resultados, agrupando por grado:

x^5: $-2x^5$

x^3: $-3x^3 + 3x^3 = 0$

x^2: $6x^2 - 6x^2 = 0$

x^1: $-2x + 3x = x$

x^0: $-9 + 1 - 3 = -11$

$$\mathbf{3\cdot Q(x) - P(x) - 3\cdot R(x) = -2x^5 + x - 11}$$

Apartado b) $[R(x) - Q(x)] \cdot P(x)$

Paso 1: Calcular el factor $R(x) - Q(x)$

$$R(x) - Q(x) = (2x^2 - x + 1) - (-x^3 + 2x^2 - 3)$$
$$= 2x^2 - x + 1 + x^3 - 2x^2 + 3$$
$$= x^3 - x + 4$$

Paso 2: Multiplicar $(x^3 - x + 4) \cdot (2x^5 - 3x^3 + 2x - 1)$

Distribuimos cada término del primer factor por todos los del segundo:

$$x^3 \cdot (2x^5 - 3x^3 + 2x - 1) = 2x^8 - 3x^6 + 2x^4 - x^3$$
$$(-x) \cdot (2x^5 - 3x^3 + 2x - 1) = -2x^6 + 3x^4 - 2x^2 + x$$
$$4 \cdot (2x^5 - 3x^3 + 2x - 1) = 8x^5 - 12x^3 + 8x - 4$$

Paso 3: Agrupamos términos semejantes y ordenamos de mayor a menor grado:

x^8: $2x^8$

x^7: 0

x^6: $-3x^6 - 2x^6 = -5x^6$

x^5: $8x^5$

x^4: $2x^4 + 3x^4 = 5x^4$

x^3: $-x^3 - 12x^3 = -13x^3$

x^2: $-2x^2$

x^1: $x + 8x = 9x$

x^0: -4

$$\mathbf{[R(x) - Q(x)] \cdot P(x) = 2x^8 - 5x^6 + 8x^5 + 5x^4 - 13x^3 - 2x^2 + 9x - 4}$$

EJERCICIO N.º 2

División de Polinomios P(x) ÷ Q(x)

Algoritmo de la división euclidiana de polinomios




Fig. 2 — Esquema de la división polinómica: dividendo = divisor × cociente + resto

📋 ENUNCIADO

Dados los polinomios:

$$P(x) = 2x^5 - 3x^3 + 2x - 1$$

$$Q(x) = -x^3 + 2x^2 - 3$$

Realiza la división **P(x) ÷ Q(x)**, indicando el **cociente** y el **resto**.

✏️ RESOLUCIÓN COMPLETA

🔷 ALGORITMO DE LA DIVISIÓN DE POLINOMIOS

Para dividir P(x) entre Q(x), hallamos C(x) y R(x) tales que:

$$\mathbf{P(x) = Q(x) \cdot C(x) + R(x) \quad con \quad grado(R) < grado(Q)}$$

El grado de P(x) es 5 y el de Q(x) es 3, por lo que el grado del cociente será **5 − 3 = 2**.

Escribimos P(x) con todos sus coeficientes incluyendo los nulos:

$$P(x) = 2x^5 + 0 \cdot x^4 - 3x^3 + 0 \cdot x^2 + 2x - 1$$

$$Q(x) = -x^3 + 2x^2 + 0 \cdot x - 3$$

Iteración 1: Dividimos el término líder de P por el de Q:

$$2x^5 \div (-x^3) = -2x^2$$

→ Multiplicamos: $-2x^2 \cdot (-x^3 + 2x^2 - 3) = 2x^5 - 4x^4 + 6x^2$

→ Restamos: $(2x^5 + 0x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 2x - 1) - (2x^5 - 4x^4 + 6x^2)$

$$= 0 \cdot x^5 + 4x^4 - 3x^3 - 6x^2 + 2x - 1 = 4x^4 - 3x^3 - 6x^2 + 2x - 1$$

Iteración 2: Dividimos $4x^4$ entre $-x^3$:

$$4x^4 \div (-x^3) = -4x$$

→ Multiplicamos: $-4x \cdot (-x^3 + 2x^2 - 3) = 4x^4 - 8x^3 + 12x$

→ Restamos: $(4x^4 - 3x^3 - 6x^2 + 2x - 1) - (4x^4 - 8x^3 + 12x)$

$$= 5x^3 - 6x^2 - 10x - 1$$

Iteración 3: Dividimos $5x^3$ entre $-x^3$:

$$5x^3 \div (-x^3) = -5$$

→ Multiplicamos: $-5 \cdot (-x^3 + 2x^2 - 3) = 5x^3 - 10x^2 + 15$

→ Restamos: $(5x^3 - 6x^2 - 10x - 1) - (5x^3 - 10x^2 + 15)$

$$= 4x^2 - 10x - 16$$

El grado del nuevo polinomio (2) es menor que el grado del divisor (3), por lo que **paramos**.

Cociente: $C(x) = -2x^2 - 4x - 5$

Resto: $R(x) = 4x^2 - 10x - 16$

Verificación: $Q(x)\cdot C(x) + R(x)$ debe ser igual a $P(x)$. Se puede comprobar sustituyendo los resultados obtenidos.

EJERCICIO N.º 3

División por (x + 2) — Regla de Ruffini

Aplicación de la regla de Ruffini para divisores lineales



Fig. 3 — Esquema visual de la Regla de Ruffini para la división entre (x + 2)

📋 ENUNCIADO

Realiza la siguiente división de polinomios, indicando el cociente y el resto:

$$(-x^4 - 2x^6 + 3x^2 - x + 3) \div (x + 2)$$

✏️ RESOLUCIÓN COMPLETA

🔷 REGLA DE RUFFINI

La regla de Ruffini es un método abreviado para dividir cualquier polinomio entre un binomio de la forma **(x − a)**. En este caso, (x + 2) = (x − (−2)), por lo que **a = −2**.

Paso 1: Ordenamos el dividendo de mayor a menor grado, rellenando con ceros los grados ausentes:

$$-2x^6 + 0{\cdot}x^5 - x^4 + 0{\cdot}x^3 + 3x^2 - x + 3$$

Los coeficientes son: **−2 | 0 | −1 | 0 | 3 | −1 | 3**

Paso 2: Construimos la tabla de Ruffini con raíz **a = −2**:

−2	−2	0	−1	0	3	−1	3
		4	−8	18	−36	66	−130
	−2	**4**	**−9**	**18**	**−33**	**65**	**−127**

Explicación de la tabla:

→ Bajamos el primer coeficiente: −2

→ −2 × (−2) = 4 → sumamos con 0: obtenemos 4

→ 4 × (−2) = −8 → sumamos con −1: obtenemos −9

→ −9 × (−2) = 18 → sumamos con 0: obtenemos 18

→ 18 × (−2) = −36 → sumamos con 3: obtenemos −33

→ −33 × (−2) = 66 → sumamos con −1: obtenemos 65

→ 65 × (−2) = −130 → sumamos con 3: obtenemos −127 (es el RESTO)

Cociente: $C(x) = -2x^5 + 4x^4 - 9x^3 + 18x^2 - 33x + 65$

Resto: $R = -127$

Como el resto es $-127 \neq 0$, la división no es exacta. El polinomio original no tiene a $x = -2$ como raíz.

EJERCICIO N.º 4

Hallar el Valor de k para División Exacta

Aplicación del Teorema del Resto de Bézout




Fig. 4 — Proceso lógico para hallar k usando el Teorema del Resto

📋 ENUNCIADO

Hallar el valor de **k** para que al efectuar la división:

$$(2x^3 - x^2 + k{\cdot}x - 3) \div (x - 1)$$

el resto sea **0** (división exacta).

✏️ RESOLUCIÓN COMPLETA

🔷 TEOREMA DEL RESTO (BÉZOUT)

El resto de dividir el polinomio P(x) entre el binomio (x − a) es igual a **P(a)**:

P(x) ÷ (x − a) tiene resto = P(a)

Por tanto, para que la división sea exacta (resto = 0), debemos imponer **P(a) = 0**.

En este ejercicio el divisor es (x − 1), por lo que **a = 1**.

Sea $P(x) = 2x^3 - x^2 + k \cdot x - 3$. La condición es **P(1) = 0**.

Paso 1: Evaluamos P(1) sustituyendo x = 1:

$$P(1) = 2 \cdot (1)^3 - (1)^2 + k \cdot (1) - 3$$

$$P(1) = 2 \cdot 1 - 1 + k - 3$$

$$P(1) = 2 - 1 + k - 3$$

$$P(1) = k - 2$$

Paso 2: Imponemos la condición P(1) = 0:

$$k - 2 = 0$$

k = 2

Verificación: Con k = 2, el polinomio es $P(x) = 2x^3 - x^2 + 2x - 3$.

Aplicamos Ruffini con raíz a = 1:

1	2	−1	2	−3
		2	1	3
	2	**1**	**3**	**0 ✓**

✅ *El resto es 0: la división es exacta. Por tanto $k = 2$ es la solución correcta.*

El cociente es: $C(x) = 2x^2 + x + 3$

EJERCICIO N.º 5

Extracción de Factor Común

Técnica algebraica fundamental de factorización




Fig. 5 — Proceso de extracción del máximo factor común en expresiones algebraicas

📋 ENUNCIADO

Extraer el factor común en las siguientes expresiones:

a) $18xy - 6x + 24x^2y$

b) $12a^3b^2 + 24a^4b^4 - 36a^2b^3$

✏️ RESOLUCIÓN COMPLETA

🔷 ¿QUÉ ES EL FACTOR COMÚN?

Extraer factor común consiste en escribir una suma de monomios como el **producto** de un monomio (el mayor factor que divide a todos los términos) por una expresión entre paréntesis. Es la operación inversa de la propiedad distributiva.

Apartado a) $18xy - 6x + 24x^2y$

Paso 1: Encontrar el MCD de los coeficientes numéricos (18, 6, 24):

→ $18 = 2 \cdot 3^2$; $6 = 2 \cdot 3$; $24 = 2^3 \cdot 3$

→ MCD(18, 6, 24) = $2 \cdot 3 = 6$

Paso 2: Encontrar las variables comunes con la menor potencia:

→ En 18xy: tiene x^1y^1; en $-6x$: tiene x^1 (sin y); en $24x^2y$: tiene x^2y^1

→ La variable y no aparece en el segundo término, por lo que **no se puede sacar**.

→ La variable x aparece en todos. La menor potencia es x^1.

Paso 3: Factor común = 6x

$$18xy - 6x + 24x^2y = 6x \cdot (3y - 1 + 4xy)$$

Verificación: $6x \cdot 3y = 18xy$ ✓; $6x \cdot (-1) = -6x$ ✓; $6x \cdot 4xy = 24x^2y$ ✓

$$\mathbf{18xy - 6x + 24x^2y = 6x(3y - 1 + 4xy)}$$

Apartado b) $12a^3b^2 + 24a^4b^4 - 36a^2b^3$

Paso 1: MCD de los coeficientes (12, 24, 36):

→ $12 = 2^2 \cdot 3$; $24 = 2^3 \cdot 3$; $36 = 2^2 \cdot 3^2$

→ MCD(12, 24, 36) = $2^2 \cdot 3 = 12$

Paso 2: Variables comunes con menor potencia:

→ Variable a: aparece como a^3, a^4, a^2 → menor potencia: a^2

→ Variable b: aparece como b^2, b^4, b^3 → menor potencia: b^2

Paso 3: Factor común = $12a^2b^2$

$$12a^3b^2 \div 12a^2b^2 = a$$

$$24a^4b^4 \div 12a^2b^2 = 2a^2b^2$$

$$-36a^2b^3 \div 12a^2b^2 = -3b$$

$$\mathbf{12a^3b^2 + 24a^4b^4 - 36a^2b^3 = 12a^2b^2(a + 2a^2b^2 - 3b)}$$

EJERCICIO N.º 6

Identidades Notables

Desarrollo de cuadrados de binomios y producto de suma por diferencia




Fig. 6 — Interpretación geométrica de las tres identidades notables

📋 ENUNCIADO

Desarrolla aplicando identidades notables:

a) $(4a^2 - 3a)^2$

b) $(5x + 4x^2)^2$

c) $(5x - y^2) \cdot (5x + y^2)$

✏️ RESOLUCIÓN COMPLETA

🔷 LAS TRES IDENTIDADES NOTABLES FUNDAMENTALES

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

Apartado a) $(4a^2 - 3a)^2$

Identificamos: es un **cuadrado de diferencia** → $(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$

→ $A = 4a^2$, $B = 3a$

$$A^2 = (4a^2)^2 = 16a^4$$

$$2AB = 2 \cdot (4a^2) \cdot (3a) = 24a^3$$

$$B^2 = (3a)^2 = 9a^2$$

$$\mathbf{(4a^2 - 3a)^2 = 16a^4 - 24a^3 + 9a^2}$$

Apartado b) $(5x + 4x^2)^2$

Identificamos: es un **cuadrado de suma** → $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

→ $A = 5x$, $B = 4x^2$

$$A^2 = (5x)^2 = 25x^2$$

$$2AB = 2 \cdot (5x) \cdot (4x^2) = 40x^3$$

$$B^2 = (4x^2)^2 = 16x^4$$

$$\mathbf{(5x + 4x^2)^2 = 25x^2 + 40x^3 + 16x^4}$$

Ordenando de mayor a menor grado:

$$(5x + 4x^2)^2 = 16x^4 + 40x^3 + 25x^2$$

Apartado c) $(5x - y^2)\cdot(5x + y^2)$

Identificamos: es un **producto de suma por diferencia** → $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$

→ $A = 5x, \quad B = y^2$

$A^2 = (5x)^2 = 25x^2$

$B^2 = (y^2)^2 = y^4$

$$(5x - y^2)\cdot(5x + y^2) = 25x^2 - y^4$$

EJERCICIO N.º 7

Factorización de Polinomios

Factor común e identidades notables aplicadas a la factorización




Fig. 7 — Árbol de factorización y estrategias para factorizar polinomios

📋 ENUNCIADO

Factorizar los siguientes polinomios:

a) $16x^4y^2z + 4z^3 + 16x^2yz^2$

b) $18x^3y - 2xy^3$

✏️ RESOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) $16x^4y^2z + 4z^3 + 16x^2yz^2$

Paso 1: Extraer factor común.

→ Coeficientes: MCD(16, 4, 16) = 4

→ Variables: z aparece en todos los términos como z^1, z^3, z^2 → menor potencia: z

→ Las variables x e y no aparecen en el segundo término → no se pueden sacar.

$$16x^4y^2z + 4z^3 + 16x^2yz^2 = 4z(4x^4y^2 + z^2 + 4x^2yz)$$

Paso 2: Reconocer si el trinomio entre paréntesis es una identidad notable.

Observamos: $4x^4y^2 + z^2 + 4x^2yz$

→ ¿Es de la forma $A^2 + 2AB + B^2$? Comprobamos: $A = 2x^2y$ ($A^2 = 4x^4y^2$), $B = z$ ($B^2 = z^2$)

→ ¿$2AB = 4x^2yz$? → $2\cdot(2x^2y)\cdot z = 4x^2yz$ ✓

$$4x^4y^2 + z^2 + 4x^2yz = (2x^2y + z)^2$$

$$\mathbf{16x^4y^2z + 4z^3 + 16x^2yz^2 = 4z\cdot(2x^2y + z)^2}$$

Apartado b) $18x^3y - 2xy^3$

Paso 1: Extraer factor común.

→ Coeficientes: MCD(18, 2) = 2

→ Variable x: aparece como x^3 y x → menor potencia: x^1

→ Variable y: aparece como y^1 y y^3 → menor potencia: y^1

$$18x^3y - 2xy^3 = 2xy(9x^2 - y^2)$$

Paso 2: Reconocer la identidad notable en el factor residual.

→ $9x^2 - y^2$: es una **diferencia de cuadrados** → $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$

→ $A = 3x$ ($A^2 = 9x^2$), $B = y$ ($B^2 = y^2$)

$$9x^2 - y^2 = (3x - y)(3x + y)$$

$$18x^3y - 2xy^3 = 2xy(3x - y)(3x + y)$$

EJERCICIO N.º 8

Valor Numérico de un Polinomio

Evaluación de P(x) en un punto específico




Fig. 8 — Gráfica del polinomio $P(x) = -x^4 - 2x^6 + 3x^2 - x + 3$ con el punto $x = -2$ marcado

📋 ENUNCIADO

Hállese el valor numérico del polinomio:

$$\mathbf{P(x) = -x^4 - 2x^6 + 3x^2 - x + 3}$$

en el punto $\mathbf{x = -2}$.

✏️ RESOLUCIÓN COMPLETA

🔷 ¿QUÉ ES EL VALOR NUMÉRICO?

El valor numérico de un polinomio P(x) en el punto x = a es el resultado de **sustituir x por ese valor concreto** y realizar todas las operaciones aritméticas. Se denota como P(a).

Paso 1: Sustituimos x = −2 en cada término del polinomio:

$$P(-2) = -(-2)^4 - 2\cdot(-2)^6 + 3\cdot(-2)^2 - (-2) + 3$$

Paso 2: Calculamos las potencias de −2:

→ $(-2)^2 = 4$

→ $(-2)^4 = [(-2)^2]^2 = 4^2 = 16$

→ $(-2)^6 = [(-2)^2]^3 = 4^3 = 64$

Paso 3: Sustituimos los resultados de las potencias:

$$P(-2) = -(16) - 2\cdot(64) + 3\cdot(4) - (-2) + 3$$

$$P(-2) = -16 - 128 + 12 + 2 + 3$$

Paso 4: Realizamos la suma algebraica:

$$P(-2) = -16 - 128 + 12 + 2 + 3 = -127$$

$$\mathbf{P(-2) = -127}$$

Este resultado confirma lo que vimos en el Ejercicio 3: al dividir P(x) entre (x + 2), el resto es exactamente P(−2) = −127, en concordancia con el Teorema del Resto de Bézout.

EJERCICIO N.º 9

Operaciones con Fracciones Algebraicas

Suma, resta y división de fracciones racionales simplificadas




Fig. 9 — Esquema de las operaciones con fracciones algebraicas

📋 ENUNCIADO

Opera y simplifica:

a) $2/x + (x + 1)/x^2 - 1/x$

b) $(4x^2 - 16) / (9x^2 + 1 + 6x) \div (1 + 3x) / 1 - 2(x + 2) / (2x - 4)$

✏️ RESOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) $2/x + (x + 1)/x^2 - 1/x$

Paso 1: Determinar el mínimo común denominador (mcd).

→ Los denominadores son: x, x^2, x

→ mcd = x^2 (es el de mayor grado)

Paso 2: Convertir todas las fracciones al denominador común x^2.

$$2/x = 2x/x^2$$

$$(x + 1)/x^2 = (x + 1)/x^2 \text{ (ya tiene denominador } x^2)$$

$$1/x = x/x^2$$

Paso 3: Operamos con los numeradores (mantenemos el denominador x^2):

$$2x/x^2 + (x + 1)/x^2 - x/x^2 = (2x + x + 1 - x)/x^2$$

$$= (2x + 1)/x^2$$

Paso 4: Simplificamos. Como MCD$(2x + 1, x^2) = 1$, no se puede simplificar más.

$$\mathbf{2/x + (x + 1)/x^2 - 1/x = (2x + 1) / x^2}$$

Apartado b) $\mathbf{(4x^2 - 16)/(9x^2 + 6x + 1) \div (1 + 3x) - 2(x + 2)/(2x - 4)}$

Paso 1: Factorizamos todos los polinomios que aparecen.

→ Numerador: $4x^2 - 16 = 4(x^2 - 4) = 4(x - 2)(x + 2)$ [diferencia de cuadrados]

→ Denominador 1: $9x^2 + 6x + 1 = (3x + 1)^2$ [trinomio cuadrado perfecto]

→ Divisor: $(1 + 3x) = (3x + 1)$

→ Denominador 2: $2x - 4 = 2(x - 2)$

→ Numerador 2: $2(x + 2)$

Paso 2: Reescribimos la expresión con las factorizaciones:

$$[4(x - 2)(x + 2)]/(3x + 1)^2 \div (3x + 1) - 2(x + 2)/[2(x - 2)]$$

Paso 3: Realizamos la división (multiplicar por el inverso):

$= [4(x-2)(x+2)] / [(3x+1)^2 \cdot (3x+1)] \; - \; (x+2)/(x-2)$

$= [4(x-2)(x+2)] / (3x+1)^3 \; - \; (x+2)/(x-2)$

Paso 4: Simplificamos la primera fracción (cancelamos factores comunes):

$= 4(x+2) / [(3x+1)^3 / (x-2)]$ *(recordar que quedan los factores no cancelados)*

Paso 5: Buscamos el denominador común para restar:

$mcd = (3x+1)^3 \cdot (x-2)$

$= [4(x-2)(x+2)] / [(3x+1)^3] - [(x+2)(3x+1)^3] / [(x-2)(3x+1)^3]$

→ Expresión simplificada al mcd:

$= [4(x-2)(x+2) - (x+2)(3x+1)^3] / [(3x+1)^3(x-2)]$

Sacando factor (x + 2) del numerador:

$$= (x+2)[4(x-2) - (3x+1)^3] \; / \; [(3x+1)^3(x-2)]$$

La expresión resultante no se simplifica más de forma general ya que $(3x+1)^3$ desarrollado y $4(x-2)$ son de grados distintos. La forma factorizada anterior es la expresión más simplificada.

EJERCICIO N.º 10

Expresión Algebraica de la Diagonal de un Rectángulo

Teorema de Pitágoras — Álgebra aplicada a la Geometría




Fig. 10 — Rectángulo con lados x y x+7, y su diagonal calculada mediante Pitágoras

📋 ENUNCIADO

Halla la expresión algebraica de la diagonal de un rectángulo cuyos lados difieren en 7 centímetros.

¿Es un polinomio? Calcula la diagonal si el lado menor mide **5 centímetros**.

✏️ RESOLUCIÓN COMPLETA

🔷 TEOREMA DE PITÁGORAS

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos:

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \rightarrow \quad c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

La diagonal de un rectángulo es la hipotenusa del triángulo rectángulo que forma con dos de sus lados.

Paso 1: Definir las variables. Llamamos **x** al lado menor del rectángulo.

→ Lado menor: x (cm)

→ Lado mayor: x + 7 (cm) (difieren en 7 cm)

Paso 2: Aplicamos el Teorema de Pitágoras para hallar la diagonal d:

$$d^2 = x^2 + (x + 7)^2$$

Paso 3: Desarrollamos el cuadrado del binomio usando la identidad $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$:

$$(x + 7)^2 = x^2 + 14x + 49$$

Paso 4: Sustituimos en la fórmula de la diagonal:

$$d^2 = x^2 + x^2 + 14x + 49 = 2x^2 + 14x + 49$$

$$\mathbf{d(x) = \sqrt{(2x^2 + 14x + 49)}}$$

¿Es un polinomio la expresión d(x)?

No. La expresión $d(x) = \sqrt{(2x^2 + 14x + 49)}$ no es un polinomio, ya que contiene una raíz cuadrada. Los polinomios son expresiones algebraicas formadas únicamente por sumas, restas y multiplicaciones de variables con exponentes enteros no negativos. La raíz cuadrada introduce un exponente fraccionario (1/2), por lo que d(x) es una función irracional algebraica, no un polinomio.

Paso 5: Calculamos la diagonal para x = 5 cm:

$$d(5) = \sqrt{(2 \cdot 5^2 + 14 \cdot 5 + 49)}$$

$d(5) = \sqrt{(2 \cdot 25 + 70 + 49)}$

$d(5) = \sqrt{(50 + 70 + 49)}$

$d(5) = \sqrt{169}$

$d(5) = \sqrt{169} = 13$ cm

✅ *¡Resultado exacto y entero! El rectángulo de lados 5 cm y 12 cm (= 5 + 7) tiene diagonal de exactamente 13 cm. Es una terna pitagórica conocida: 5 – 12 – 13.*

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS. ECUACIONES Y SISTEMAS

10-03-2017 EXAMEN 3º ESO B

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

Nº1.- Resuelve las siguientes ecuaciones:

$a)\ 2x - 4(x-1) + 2x - 1 = 2(x+5) - 2x \qquad b)\ \dfrac{2x-5}{5} = 2 - x - \dfrac{x+1}{4}$

Nº2.- Resuelve las siguientes ecuaciones:

$a)\ (3x-1)^2 + 6x - 8 = (3x-2)(3x+2) - 3 \qquad b)\ (x-2)^2 - 3 = 3x + 1$

Nº3.- Dado el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3x - 4y = -5 \\ 4x - y = 2 \end{cases}$$

a) Resuelve el sistema de ecuaciones por sustitución
b) Resuelve el sistema gráficamente.

Nº4.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones no lineales:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

Nº5.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2(x-y) + \dfrac{y}{4} = -\dfrac{11}{2} \\ 3(x+1) - 2(y-2) = 0 \end{cases}$$

Nº6.- Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:


$$\begin{cases} 2x - y = 9 \\ \sqrt{x+y} = x - y \end{cases}$$

Nº7.- El vino de tipo A se vende a 12 céntimos el litro y el vino de tipo B se vende a 16 céntimos el litro. ¿Qué cantidades deben mezclarse de los vinos de tipo A y de tipo B, para obtener 100 litros de mezcla a un precio de 13 céntimos el litro?

Nº8.- Cuando nació María, su madre tenía 25 años. Dentro de 10 años, la madre tendrá 5 años menos que el doble de la edad de su hija. ¿Cuántos años tienen ahora?

Nº9.- Un equipo de fútbol de 11 jugadores se compone por alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO. Si el número de alumnos de 2º es el doble que el de 1º, y el número de los de 3º es 1/3 de los de 2º, ¿cuántos alumnos hay de cada curso?

Nº10.- Halla cuánto miden los lados del triángulo rectángulo de la derecha si x está expresada en metros. Calcula también su perímetro y su superficie.



SUERTE JÓVENES



COLECCIÓN MATEMÁTICAS CLÁSICAS

MATEMÁTICAS

Ecuaciones y Sistemas

3.º ESO · CURSO 2016–2017

"Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo."

— NIKOLA TESLA

Examen · 10 de marzo de 2017 | 3.º ESO Grupo B | Bloque: Álgebra

📚 Índice de Ejercicios

Matemáticas · Ecuaciones y Sistemas · 3.º ESO

Nº		
1	**Ecuaciones de Primer Grado (Lineales)** Simplificación de expresiones con paréntesis · Ecuación con fracciones	3
2	**Ecuaciones de Segundo Grado** Uso de identidades notables · Factorización y fórmula general	4
3	**Sistema de Ecuaciones Lineales 2×2** Método de sustitución · Resolución gráfica	5
4	**Sistema No Lineal: Circunferencia y Recta** Intersección geométrica · Sustitución algebraica	6
5	**Sistema con Fracciones y Paréntesis** Eliminación de denominadores · Método de igualación	7
6	**Sistema con Radicales** Sustitución de variable · Verificación de soluciones	8
7	**Problema: Mezcla de Vinos** Planteamiento de sistema · Precio de mezcla	9
8	**Problema: Edades de Madre e Hija** Ecuación diferida en el tiempo · Planteamiento de condiciones	10
9	**Problema: Equipo de Fútbol** Sistema de tres incógnitas · Relaciones proporcionales	11
	Problema: Triángulo Rectángulo	

1 Ecuaciones de Primer Grado (Lineales)

Simplificación algebraica · Eliminación de fracciones · Comprobación de soluciones

Enunciado: Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado. Muestra todos los pasos del desarrollo algebraico, simplificando correctamente cada término.



Balanza de ecuaciones en equilibrio

a)

$$2x - 4(x - 1) + 2x - 1 = 2(x + 5) - 2x$$

✏️ Resolución del apartado a) — paso a paso

Paso 1 — Eliminamos los paréntesis aplicando la propiedad distributiva:

Miembro izquierdo: $2x - 4x + 4 + 2x - 1 = 0x + 3 = 3$

Miembro derecho: $2x + 10 - 2x = 10$

Paso 2 — Resultado de la simplificación:

$3 = 10 \rightarrow$ **Contradicción:** ningún valor de x satisface esta ecuación.

Paso 3 — Clasificación de la ecuación:

Al desaparecer la incógnita x y obtenerse una igualdad falsa, la ecuación es una **ecuación incompatible** (sin solución). $S = \varnothing$

Apartado a) → Ecuación Incompatible · No tiene solución · $S = \varnothing$

b)

$$(2x - 5)/5 = 2 - x - (x + 1)/4$$

✏️ Resolución del apartado b) — paso a paso

Paso 1 — Identificamos los denominadores:

Los denominadores presentes son 5 y 4. El mínimo común múltiplo es:

m.c.m.(5, 4) = 20

Paso 2 — Multiplicamos todos los términos por 20:

$20 \cdot (2x - 5)/5 = 20 \cdot 2 - 20 \cdot x - 20 \cdot (x + 1)/4$

$4(2x - 5) = 40 - 20x - 5(x + 1)$

Paso 3 — Eliminamos los paréntesis:

$8x - 20 = 40 - 20x - 5x - 5$

$8x - 20 = 35 - 25x$

Paso 4 — Agrupamos incógnitas a la izquierda y términos independientes a la derecha:

$8x + 25x = 35 + 20$

$33x = 55$

Paso 5 — Despejamos x:

$x = 55 / 33 = 5/3$

Paso 6 — Comprobación (sustituimos x = 5/3 en la ecuación original):

Miembro izq.: $(2 \cdot 5/3 - 5)/5 = (10/3 - 15/3)/5 = (-5/3)/5 = -1/3$

Miembro dcho.: $2 - 5/3 - (5/3 + 1)/4 = 1/3 - (8/3)/4 = 1/3 - 2/3 = -1/3$


✓

Apartado b) → $x = 5/3 \approx 1{,}667$

2 Ecuaciones de Segundo Grado

Identidades notables · Discriminante · Fórmula general

Enunciado: Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado.
Recuerda que debes aplicar las identidades notables antes de resolver.



Parábola representativa de una ecuación cuadrática

a)

$$(3x - 1)^2 + 6x - 8 = (3x - 2)(3x + 2) - 3$$

✏️ Resolución del apartado a) — paso a paso

Paso 1 — Desarrollamos $(3x - 1)^2$ usando la identidad del cuadrado de binomio: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$(3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$

Paso 2 — Desarrollamos $(3x - 2)(3x + 2)$ usando la identidad de suma por diferencia: $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

$(3x - 2)(3x + 2) = 9x^2 - 4$

Paso 3 — Sustituimos en la ecuación:

$9x^2 - 6x + 1 + 6x - 8 = 9x^2 - 4 - 3$

$9x^2 - 7 = 9x^2 - 7$

Paso 4 — Interpretación del resultado:

Al simplificar, los términos en x^2 se cancelan y obtenemos $-7 = -7$, que es siempre verdadero.

La ecuación es una **identidad (ecuación compatible indeterminada)**: se cumple para cualquier valor real de x.

Apartado a) → Identidad: se cumple para todo x ∈ ℝ · S = ℝ

b)

$(x - 2)^2 - 3 = 3x + 1$

✏️ Resolución del apartado b) — paso a paso

Paso 1 — Expandimos $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$:

$x^2 - 4x + 4 - 3 = 3x + 1$

Paso 2 — Simplificamos el miembro izquierdo:

$x^2 - 4x + 1 = 3x + 1$

Paso 3 — Pasamos todos los términos al primer miembro:

$x^2 - 4x + 1 - 3x - 1 = 0$

$x^2 - 7x = 0$

Paso 4 — Factorizamos sacando factor común x:

$x(x - 7) = 0$

Paso 5 — Aplicamos la propiedad del producto nulo:

$x = 0$ ó $x - 7 = 0 \Longrightarrow x = 7$

Paso 6 — Comprobación de x = 0: $(0-2)^2-3 = 4-3=1$; $3\cdot0+1=1$ ✓

Comprobación de x = 7: $(7-2)^2-3 = 25-3=22$; $3\cdot7+1=22$ ✓

Apartado b) → $x_1 = 0$ | $x_2 = 7$


📌 **Nota:** La ecuación $x^2 - 7x = 0$ es una ecuación de segundo grado incompleta (sin término independiente). Siempre factoriza sacando la x común, dando x = 0 como una de las soluciones.

3

Sistema de Ecuaciones Lineales 2×2

Método de sustitución · Resolución gráfica en el plano cartesiano

Enunciado: Dado el siguiente sistema de ecuaciones:



Punto de intersección de dos rectas

$$3x - 4y = -5 \quad \text{(ecuación 1)}$$

$$4x - y = 2 \quad \text{(ecuación 2)}$$

a) Resuelve el sistema por el método de **sustitución**.

b) Resuelve el sistema **gráficamente**, dibujando ambas rectas y hallando su punto de intersección.

a) Método de Sustitución

Paso 1. Despejamos y de la ecuación 2:

$4x - y = 2 \implies y = 4x - 2$

Paso 2. Sustituimos $y = 4x-2$ en la ecuación 1:

$3x - 4(4x - 2) = -5$

$3x - 16x + 8 = -5$

$-13x = -5 - 8 = -13$

x = 1

Paso 3. Calculamos y usando $y = 4x - 2$:

$y = 4 \cdot 1 - 2 = 4 - 2 =$ **y = 2**

Paso 4. Comprobación en ecuación 1:

$3 \cdot 1 - 4 \cdot 2 = 3 - 8 = -5$ ✓

Comprobación en ecuación 2:

$4 \cdot 1 - 2 = 2$ ✓

b) Resolución Gráfica

Convertimos cada ecuación a la forma $y = mx + b$:

Recta 1: $3x - 4y = -5$

$4y = 3x + 5 \implies y = (3/4)x + 5/4$

Pendiente $m_1 = 3/4$ | Ordenada $b_1 = 5/4$

Recta 2: $4x - y = 2$

$y = 4x - 2$

Pendiente $m_2 = 4$ | Ordenada $b_2 = -2$

Las dos rectas son secantes (pendientes distintas).


Se cortan en el punto **P = (1, 2)**, que es la solución del sistema.

Solución del sistema → x = 1, y = 2 | Punto de intersección: P(1, 2)

4 Sistema No Lineal: Circunferencia y Recta

Intersección geométrica de una circunferencia con una recta · Ecuación de segundo grado

Enunciado: Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones no lineales formado por una circunferencia de radio 5 centrada en el origen y una recta.



$x^2 + y^2 = 25$ interseca a $x + y = 7$

$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{(circunferencia de radio 5)}$$
$$x + y = 7 \qquad \text{(recta)}$$

✏️ Resolución completa — paso a paso

Paso 1 — Despejamos y de la ecuación de la recta:

$x + y = 7 \implies y = 7 - x$

Paso 2 — Sustituimos $y = 7 - x$ en la ecuación de la circunferencia:

$x^2 + (7 - x)^2 = 25$

Paso 3 — Expandimos $(7 - x)^2 = 49 - 14x + x^2$:

$x^2 + 49 - 14x + x^2 = 25$

$2x^2 - 14x + 49 = 25$

Paso 4 — Pasamos 25 al primer miembro:

$2x^2 - 14x + 24 = 0$ (dividimos todo entre 2)

$x^2 - 7x + 12 = 0$

Paso 5 — Aplicamos la fórmula general o factorizamos:

Buscamos dos números que sumen 7 y su producto sea 12: **3 y 4**

$(x - 3)(x - 4) = 0 \implies x_1 = 3$ ó $x_2 = 4$

Paso 6 — Hallamos los valores de y correspondientes (usando y = 7 − x):

Para $x_1 = 3$: $y_1 = 7 - 3 = 4 \implies$ Solución 1: (3, 4)

Para $x_2 = 4$: $y_2 = 7 - 4 = 3 \implies$ Solución 2: (4, 3)

Paso 7 — Comprobación de (3, 4): $3^2+4^2=9+16=25$ ✓ $3+4=7$ ✓

Comprobación de (4, 3): $4^2+3^2=16+9=25$ ✓ $4+3=7$ ✓

Soluciones → Punto A(3, 4) | Punto B(4, 3)

📌 **Nota:** Geométricamente, la recta x + y = 7 es secante a la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$, ya que la corta en exactamente dos puntos: (3, 4) y (4, 3). Si el discriminante fuera negativo, la recta no tocaría la circunferencia (recta exterior). Si fuera cero, sería tangente.

5 Sistema con Fracciones y Paréntesis

Eliminación de denominadores · M.C.M. · Método de reducción o sustitución

Enunciado: Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones, que contiene paréntesis y fracciones.



Fracciones algebraicas en sistemas de ecuaciones

$$2(x - y) + y/4 = -11/2 \quad \text{(ecuación 1)}$$

$$3(x + 1) - 2(y - 2) = 0 \quad \text{(ecuación 2)}$$

✏️ Resolución completa — paso a paso

Paso 1 — Simplificamos la ecuación 1 (multiplicamos todo por 4, el m.c.m. de 4 y 2):

$4 \cdot 2(x-y) + 4 \cdot (y/4) = 4 \cdot (-11/2)$

$8(x-y) + y = -22$

$8x - 8y + y = -22$

$8x - 7y = -22 \implies$ **Ecuación 1 simplificada**

Paso 2 — Simplificamos la ecuación 2 (eliminamos paréntesis):

$3x + 3 - 2y + 4 = 0$

$3x - 2y + 7 = 0$

$3x - 2y = -7 \implies$ **Ecuación 2 simplificada**

Paso 3 — Despejamos x de la ecuación 2 simplificada:

$3x = -7 + 2y \implies x = (2y - 7) / 3$

Paso 4 — Sustituimos $x = (2y-7)/3$ en la ecuación 1 simplificada:

$8 \cdot (2y-7)/3 - 7y = -22$

Multiplicamos todo por 3:

$8(2y-7) - 21y = -66$

$16y - 56 - 21y = -66$

$-5y = -66 + 56 = -10$

$y = 2$

Paso 5 — Hallamos x con $x = (2 \cdot 2 - 7)/3 = (4 - 7)/3 = -3/3$:

$x = -1$

Paso 6 — Comprobación en ecuación 1 original:

$2(-1 - 2) + 2/4 = 2(-3) + 0.5 = -6 + 0.5 = -5.5 = -11/2$ ✓

Comprobación en ecuación 2 original:


$3(-1+1) - 2(2-2) = 3 \cdot 0 - 2 \cdot 0 = 0$ ✓

Solución del sistema → $x = -1$, $y = 2$

6 Sistema con Radicales

Sustitución de variable auxiliar · Elevación al cuadrado · Verificación de soluciones extrañas

Enunciado: Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones que incluye una raíz cuadrada. Recuerda verificar las soluciones en las ecuaciones originales para descartar soluciones extrañas.



Sistema no lineal con raíz cuadrada

$$2x - y = 9 \quad \text{(ecuación 1)}$$

$$\sqrt{(x + y)} = x - y \quad \text{(ecuación 2)}$$

✏️ Resolución completa — paso a paso

Paso 1 — Despejamos y de la ecuación 1:

$2x - y = 9 \implies y = 2x - 9$

Paso 2 — Sustituimos y = 2x − 9 en la ecuación 2:

$\sqrt{(x + (2x-9))} = x - (2x-9)$

$\sqrt{(3x - 9)} = x - 2x + 9 = -x + 9 = 9 - x$

Paso 3 — Condiciones previas a elevar al cuadrado:

a) Dominio del radical: $3x - 9 \geq 0 \implies x \geq 3$

b) El segundo miembro debe ser no negativo: $9 - x \geq 0 \implies x \leq 9$

Condición: **$3 \leq x \leq 9$**

Paso 4 — Elevamos ambos miembros al cuadrado:

$(\sqrt{(3x-9)})^2 = (9-x)^2$

$3x - 9 = 81 - 18x + x^2$

$0 = x^2 - 18x - 3x + 81 + 9$

$0 = x^2 - 21x + 90$

Paso 5 — Resolvemos $x^2 - 21x + 90 = 0$ (discriminante: $\Delta = 441 - 360 = 81$):

$x = (21 \pm \sqrt{81}) / 2 = (21 \pm 9) / 2$

$x_1 = (21 + 9)/2 = 30/2 = \mathbf{15}$ | $x_2 = (21 - 9)/2 = 12/2 = \mathbf{6}$

Paso 6 — Verificamos las condiciones ($3 \le x \le 9$):

$x_1 = 15$: NO cumple $x \le 9 \implies$ **solución extraña, se descarta**

$x_2 = 6$: cumple $3 \le 6 \le 9 \implies$ se acepta. $y = 2 \cdot 6 - 9 = 3$

Paso 7 — Comprobación de (6, 3) en el sistema original:

Ec. 1: $2 \cdot 6 - 3 = 12 - 3 = 9$ ✓

Ec. 2: $\sqrt{(6+3)} = \sqrt{9} = 3$; $x - y = 6 - 3 = 3 \implies 3 = 3$ ✓

Solución del sistema → $x = 6,\ y = 3$


📌 **Nota:** Al elevar ambos miembros al cuadrado se pueden introducir soluciones falsas (extrañas). Siempre debemos sustituir las soluciones obtenidas en la ecuación original con la raíz para verificarlas.

7

Problema: Mezcla de Vinos

Planteamiento de sistema lineal · Condición de volumen y condición de precio

Enunciado: El vino de tipo A se vende a **12 céntimos** el litro y el vino de tipo B se vende a **16 céntimos** el litro. ¿Qué cantidades deben mezclarse de los vinos de tipo A y de tipo B para obtener **100 litros** de mezcla a un precio de **13 céntimos** el litro?



Problema de mezcla: vino tipo A y tipo B

✏️ Resolución completa — paso a paso

Paso 1 — Definición de variables:

Sea **x** = número de litros de vino tipo A (a 12 céntimos/litro)

Sea **y** = número de litros de vino tipo B (a 16 céntimos/litro)

Paso 2 — Planteamiento de las ecuaciones del sistema:

Condición de volumen total: $x + y = 100$ (ecuación 1)

Condición de precio total: $12x + 16y = 13 \cdot 100 = 1300$ (ecuación 2)

Paso 3 — Resolvemos por sustitución: de la ecuación 1, y = 100 − x

Sustituimos en la ecuación 2:

$12x + 16(100 - x) = 1300$

$12x + 1600 - 16x = 1300$

$-4x = 1300 - 1600 = -300$

x = 75 litros de vino tipo A

Paso 4 — Calculamos y:

$y = 100 - 75 =$ **25 litros de vino tipo B**

Paso 5 — Comprobación:

Volumen total: 75 + 25 = 100 litros ✓

Precio total: $12 \cdot 75 + 16 \cdot 25 = 900 + 400 = 1300$ céntimos ✓

Precio por litro: 1300 / 100 = 13 céntimos/litro ✓


Respuesta ➜ Vino tipo A: 75 litros | Vino tipo B: 25 litros

📌 **Nota:** La condición de precio total se construye multiplicando la cantidad de cada tipo de vino por su precio unitario y sumando. El resultado debe ser igual al precio por litro de la mezcla multiplicado por el total de litros.

8 Problema: Edades de Madre e Hija

Traducción de enunciado verbal a ecuación · Condición temporal futura

Enunciado: Cuando nació María, su madre tenía **25 años**. Dentro de 10 años, la madre tendrá **5 años menos que el doble** de la edad de su hija. ¿Cuántos años tienen ahora madre e hija?



Relación de edades con condición temporal

✏️ Resolución completa — paso a paso

Paso 1 — Definición de variables (edades actuales):

Sea **m** = edad actual de la madre (en años)

Sea **h** = edad actual de María/hija (en años)

Paso 2 — Planteamiento de la primera condición:

"Cuando nació María (h = 0), su madre tenía 25 años."

En ese momento, la madre tenía exactamente 25 años más que la hija, es decir:

m − h = 25 (ecuación 1: diferencia de edades siempre constante)

Paso 3 — Planteamiento de la segunda condición (en el futuro, dentro de 10 años):

Edad futura de la madre: m + 10

Edad futura de María: h + 10

"La madre tendrá 5 años menos que el doble de la edad de su hija":

m + 10 = 2(h + 10) − 5

m + 10 = 2h + 20 − 5

m + 10 = 2h + 15

m − 2h = 5 (ecuación 2)

Paso 4 — Resolvemos el sistema por sustitución:

De la ecuación 1: m = h + 25

Sustituimos en la ecuación 2:

$(h + 25) - 2h = 5$

$-h + 25 = 5$

$-h = -20$

h = 20 años (edad actual de María)

Paso 5 — Calculamos la edad de la madre:

$m = h + 25 = 20 + 25 =$ **m = 45 años (edad actual de la madre)**

Paso 6 — Comprobación de ambas condiciones:

Diferencia: 45 − 20 = 25 años ✓ (coincide con que la madre tenía 25 cuando nació María)

Dentro de 10 años: madre = 55, hija = 30 | 2·30 − 5 = 55 ✓

Respuesta ➜ María tiene actualmente 20 años | La madre tiene actualmente 45 años

📌 **Nota:** La diferencia de edades entre dos personas siempre permanece constante a lo largo del tiempo. Esta es la clave para plantear correctamente la primera ecuación.

9 Problema: Equipo de Fútbol

Sistema de tres incógnitas · Relaciones de proporcionalidad entre grupos

Enunciado: Un equipo de fútbol de **11 jugadores** se compone de alumnos de 1.º, 2.º y 3.º de ESO. Si el número de alumnos de 2.º es el **doble** que el de 1.º, y el número de los de 3.º es **1/3** del número de los de 2.º, ¿cuántos alumnos hay de cada curso?



11 jugadores de 1.º, 2.º y 3.º ESO

✏️ Resolución completa — paso a paso

Paso 1 — Definición de variables:

Sea **a** = número de alumnos de 1.º ESO

Sea **b** = número de alumnos de 2.º ESO

Sea **c** = número de alumnos de 3.º ESO

Paso 2 — Planteamiento de las tres condiciones del enunciado:

Condición 1 (total): $a + b + c = 11$ (ecuación 1)

Condición 2 (2.º es el doble de 1.º): $b = 2a$ (ecuación 2)

Condición 3 (3.º es 1/3 de 2.º): $c = b/3 = 2a/3$ (ecuación 3)

Paso 3 — Sustituimos las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1:

$a + 2a + (2a/3) = 11$

Multiplicamos todo por 3 para eliminar el denominador:

$3a + 6a + 2a = 33$

$11a = 33$

a = 3 alumnos de 1.º ESO

Paso 4 — Calculamos b y c:

$b = 2 \cdot 3 =$ **6 alumnos de 2.º ESO**

$c = 6/3 =$ **2 alumnos de 3.º ESO**

Paso 5 — Comprobación:

Total: 3 + 6 + 2 = 11 jugadores ✓

> 2.º ESO = doble de 1.º ESO: 6 = 2·3 ✓
>
> 3.º ESO = 1/3 de 2.º ESO: 2 = 6/3 ✓

Respuesta ➜ 1.º ESO: 3 alumnos | 2.º ESO: 6 alumnos | 3.º ESO: 2 alumnos


📌 **Nota:** En problemas con tres incógnitas, si dos de ellas pueden expresarse en función de la tercera, podemos reducir el sistema a una sola ecuación con una sola incógnita.

10

Triángulo Rectángulo: Pitágoras, Perímetro y Área

Teorema de Pitágoras · Resolución de ecuación cuadrática · Cálculo geométrico

Enunciado: Halla cuánto miden los lados del triángulo rectángulo si los catetos y la hipotenusa están expresados en metros en función de **x**:



Triángulo rectángulo con lados x, x+2 y x+4

Cateto 1 = x metros
Cateto 2 = (x + 2) metros
Hipotenusa = (x + 4) metros

Calcula también su **perímetro** y su **área**.

✏️ Resolución completa — paso a paso

Paso 1 — Aplicamos el Teorema de Pitágoras (cateto² + cateto² = hipotenusa²):

$x^2 + (x + 2)^2 = (x + 4)^2$

Paso 2 — Expandimos los cuadrados:

$(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$

$(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$

Paso 3 — Sustituimos y simplificamos:

$x^2 + x^2 + 4x + 4 = x^2 + 8x + 16$

$2x^2 + 4x + 4 = x^2 + 8x + 16$

Paso 4 — Pasamos todo al primer miembro:

$2x^2 + 4x + 4 - x^2 - 8x - 16 = 0$

$x^2 - 4x - 12 = 0$

Paso 5 — Resolvemos $x^2 - 4x - 12 = 0$ (discriminante: $\Delta = 16 + 48 = 64$):

$x = (4 \pm \sqrt{64}) / 2 = (4 \pm 8) / 2$

$x_1 = (4 + 8)/2 = 12/2 = \mathbf{6}$ | $x_2 = (4 - 8)/2 = -4/2 = -2$ (negativo, no válido)

Paso 6 — Calculamos las medidas de los lados (con x = 6 m):

Cateto 1 = x = **6 m**

Cateto 2 = x + 2 = 6 + 2 = **8 m**

Hipotenusa = x + 4 = 6 + 4 = **10 m**

Paso 7 — Comprobación con el Teorema de Pitágoras:

$6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$ ✓ (¡Reconocemos la terna pitagórica 6–8–10!)

Paso 8 — Cálculo del Perímetro:

P = cateto 1 + cateto 2 + hipotenusa = 6 + 8 + 10 = **24 metros**

Paso 9 — Cálculo del Área:

A = (base × altura) / 2 = (cateto 1 × cateto 2) / 2 = (6 × 8) / 2 = 48 / 2 = **24 m²**

Lados: 6 m, 8 m, 10 m | Perímetro = 24 m | Área = 24 m²

📌 **Nota:** La terna (6, 8, 10) es un múltiplo de la famosa terna pitagórica primitiva (3, 4, 5). Estas ternas son conjuntos de tres números enteros que satisfacen el Teorema de Pitágoras. Siempre debemos rechazar las soluciones negativas en problemas geométricos, ya que las longitudes son siempre positivas.

3.º ESO · MATEMÁTICAS

Ecuaciones

y Sistemas

CUADERNO DE EJERCICIOS

> *“Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración.”*
>
> — NIKOLA TESLA

Examen · 10 de marzo de 2017

IES Antonio Tovar · 3.º ESO B

Índice de Ejercicios

N.º 1 Ecuaciones lineales — simplificación y fracciones

N.º 2 Ecuaciones cuadráticas — cuadrado de binomio

N.º 3 Sistema lineal 2×2 — sustitución y método gráfico

N.º 4 Sistema no lineal — circunferencia y recta

N.º 5 Sistema lineal con fracciones

N.º 6 Sistema con ecuación irracional (raíz cuadrada)

N.º 7 Problema de mezcla — vinos tipo A y B

N.º 8 Problema de edades — María y su madre


N.º 9 Problema combinatorio — equipo de fútbol por cursos

N.º 10 Triángulo rectángulo — lados, perímetro y área

EJERCICIO

1 Ecuaciones lineales — simplificación y fracciones

Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado, aplicando las propiedades de la igualdad para despejar la incógnita x en cada caso:



Equilibrio algebraico

La balanza representa la igualdad

a) $2x - 4(x - 1) + 2x - 1 = 2(x + 5) - 2x$

b) $(2x - 5) / 5 = 2 - x - (x + 1) / 4$

📚 **Estrategia:** En el apartado a), aplica la propiedad distributiva para eliminar los paréntesis, luego agrupa los términos con x en un lado y los términos independientes en el otro. En el apartado b), multiplica ambos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores (m.c.m.(5, 4) = 20) para eliminar las fracciones y convertirla en una ecuación lineal sencilla.


EJERCICIO

2 Ecuaciones cuadráticas — cuadrado de binomio y simplificación

Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado. Recuerda que debes desarrollar los productos notables, simplificar y reducir la ecuación a su forma estándar $ax^2 + bx + c = 0$:

a) $(3x - 1)^2 + 6x - 8 = (3x - 2)(3x + 2) - 3$

b) $(x - 2)^2 - 3 = 3x + 1$



Parábola y sus raíces reales


📚 **Estrategia:** En el apartado a), desarrolla el cuadrado del binomio $(3x-1)^2 = 9x^2-6x+1$ y el producto notable $(3x-2)(3x+2) = 9x^2-4$. Observa que los términos cuadráticos se cancelan, resultando una ecuación lineal. En el apartado b), desarrolla $(x-2)^2 = x^2-4x+4$ y simplifica para obtener una ecuación cuadrática que resolverás con la fórmula general o por factorización.

EJERCICIO

3 Sistema lineal 2×2 — método de sustitución y resolución gráfica

Dado el siguiente sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas:

$$\{ \quad 3x - 4y = -5 \qquad 4x - y = 2 \quad \}$$



Intersección gráfica del sistema

a) **Método de sustitución:** Despeja una de las incógnitas en la ecuación más sencilla y sustitúyela en la otra ecuación para obtener una ecuación con una sola incógnita. Resuelve y comprueba el resultado.

b) **Resolución gráfica:** Representa cada ecuación como una recta en el plano cartesiano. Para ello, calcula al menos dos puntos de cada recta. La solución del sistema es el punto de intersección de ambas rectas.


📚 **Estrategia:** En a), de la segunda ecuación se despeja fácilmente y = 4x − 2; sustituye en la primera. Para la representación gráfica b), calcula los puntos de corte de cada recta con los ejes: si x = 0 obtienes el corte con el eje Y, y si y = 0 obtienes el corte con el eje X.

EJERCICIO

4 Sistema no lineal — circunferencia y recta

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones no lineales, en el que una ecuación define una **circunferencia** y la otra define una **recta**:

$$\{\ x^2 + y^2 = 25 \quad x + y = 7\ \}$$



Circunferencia cortada por una recta

La primera ecuación representa una circunferencia de radio $r = 5$ centrada en el origen de coordenadas. La segunda ecuación es una recta. Geométricamente, las soluciones corresponden a los puntos de intersección de ambas curvas.


📚 **Estrategia:** Aplica el método de sustitución: de la segunda ecuación, despeja y = 7 − x y sustituye en la primera, obteniendo una ecuación cuadrática en x. Resultan dos soluciones, pues la recta corta a la circunferencia en dos puntos. Para cada valor de x calcula el correspondiente valor de y. Verifica ambas soluciones.

EJERCICIO

5 Sistema de ecuaciones lineales con fracciones

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones, en el que aparecen fracciones y paréntesis que deben simplificarse antes de proceder con la resolución:

$$\begin{cases} 2(x-y)+y/4=-11/2 \\ 3(x+1)-2(y-2)=0 \end{cases}$$



Eliminación de fracciones


📚 **Estrategia:** En la primera ecuación, el mínimo común múltiplo de los denominadores 4 y 2 es 4. Multiplica todos los términos de esa ecuación por 4 para eliminar las fracciones. En la segunda ecuación, aplica la propiedad distributiva para eliminar los paréntesis. Una vez que ambas ecuaciones sean lineales sin fracciones, resuelve el sistema por el método que prefieras (sustitución, igualación o reducción).

EJERCICIO

6 Sistema con ecuación irracional — raíz cuadrada

Resuelve el siguiente sistema mixto, en el que una de las ecuaciones contiene una **raíz cuadrada** (ecuación irracional):

$$\begin{cases} 2x - y = 9 \\ \sqrt{(x+y)} = x - y \end{cases}$$



Curva irracional y recta

📚 **Estrategia:** Despeja y de la primera ecuación: y = 2x − 9. Sustituye en la segunda ecuación para obtener una ecuación irracional en x. Para eliminar la raíz cuadrada, eleva ambos miembros al cuadrado. **¡Atención!** Al elevar al cuadrado pueden aparecer soluciones extrañas (extraneous solutions), por lo que es imprescindible verificar cada solución obtenida en el sistema original, comprobando que el radicando sea no negativo y que el resultado bajo la raíz coincida.


EJERCICIO

7 Problema de mezcla — vinos tipo A y tipo B

El vino de tipo **A** se vende a *12 céntimos por litro* y el vino de tipo **B** se vende a *16 céntimos por litro*.

Se desea preparar una mezcla de **100 litros** con un precio resultante de *13 céntimos por litro*.

¿Qué cantidad (en litros) debe tomarse de cada tipo de vino?



Mezcla proporcional de dos vinos

📚 **Estrategia:** Define las incógnitas: sea a = litros de vino A y b = litros de vino B. Plantea dos ecuaciones: (1) la ecuación de cantidad total: a + b = 100; y (2) la ecuación del precio total de la mezcla: 12a + 16b = 13 × 100 = 1 300. Resuelve el sistema resultante por sustitución o reducción.

EJERCICIO

8 Problema de edades — María y su madre

Cuando nació **María**, su madre tenía *25 años*. Esto significa que la diferencia de edad entre madre e hija es siempre de 25 años.

Dentro de 10 años, la edad de la madre será *5 años menos que el doble* de la edad que tendrá su hija en ese momento.

¿Cuántos años tienen ahora madre e hija?



Diferencia de edad constante: 25 años

Diferencia de edades en el tiempo

> 📚 **Estrategia:** Sea x la edad actual de María. Entonces la edad actual de la madre es x + 25. Dentro de 10 años, María tendrá x + 10 años y su madre x + 35 años. La condición del problema establece: x + 35 = 2(x + 10) − 5. Despeja x y calcula ambas edades actuales.

EJERCICIO

9 Problema combinatorio — equipo de fútbol por cursos de ESO

Un equipo de fútbol está formado por **11 jugadores** procedentes de los cursos de **1.º, 2.º y 3.º de la ESO**. Se conocen las siguientes relaciones entre el número de jugadores de cada curso:

- El número de alumnos de **2.º de la ESO** es el *doble* que el número de alumnos de 1.º de la ESO.
- El número de alumnos de **3.º de la ESO** es *un tercio* del número de alumnos de 2.º de la ESO.



11 jugadores: 1.º + 2.º + 3.º ESO

Distribución del equipo por cursos

¿Cuántos jugadores de cada curso forman el equipo?


📚 **Estrategia:** Sea a el número de jugadores de 1.º de la ESO. Entonces los de 2.º serán 2a y los de 3.º serán (1/3)·2a = 2a/3. La ecuación total es: a + 2a + 2a/3 = 11. Multiplica por 3 para eliminar la fracción y despeja a. Verifica que los resultados sean números enteros positivos.

EJERCICIO

10 Triángulo rectángulo — lados, perímetro y área en función de x

En el triángulo rectángulo mostrado en el examen, los lados están expresados en **metros** en función de la incógnita x:

Cateto 1 = $6x$ · Cateto 2 = $5x + 6$ · Hipotenusa = $8x + 4$



Triángulo rectángulo con lados en función de x

Utilizando el **Teorema de Pitágoras**, halla el valor de x y, a continuación, calcula las medidas exactas de los tres lados, el **perímetro** y el **área** del triángulo.

El Teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo se cumple:

$$Hipotenusa^2 = Cateto_1^2 + Cateto_2^2$$

$$(8x + 4)^2 = (6x)^2 + (5x + 6)^2$$

📚 **Estrategia:** Desarrolla los cuadrados de los binomios: $(8x+4)^2 = 64x^2+64x+16$; $(6x)^2 = 36x^2$; $(5x+6)^2 = 25x^2+60x+36$. Iguala y simplifica para obtener una ecuación cuadrática en x. Selecciona únicamente la solución positiva ($x > 0$, pues representa una longitud). Finalmente: **Perímetro** = suma de los tres lados; **Área** = $(Cateto_1 \times Cateto_2) / 2$.

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS. 11 ABRIL 2016

EXAMEN 3º ESO PROGRESIONES

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

Nº1.- Escribe las fórmulas fundamentales de las progresiones

Nº2.- Calcúlese el término que ocupa el lugar 100 de una progresión aritmética cuyo primer término es igual a 4 y la diferencia es 5

Nº3.- Calcula cuatro términos comprendidos entre 7 y 27 para que los seis estén en progresión aritmética.

Nº4.- Calcúlese el término undécimo de una progresión geométrica cuyo primer término es igual a 1 y la razón es 2.

Nº5.- Hállese la suma de los infinitos términos de la progresión: 8,4,2,1,…….

Nº6.- Tenemos una cuba de vino que contiene 1024 litros. El 1 de octubre se vació la mitad del contenido; al día siguiente se volvió a vaciar la mitad de lo que quedaba, y así sucesivamente todos los días. ¿Qué cantidad de vino se sacó el día 10 de octubre?

¿A ese ritmo conseguiremos vaciar la cuba el día 31 de octubre?

Nº7.- En una progresión geométrica el primer término vale 3 y el cuarto vale 24. Calcúlese la razón, la suma de los ocho primeros términos y producto de los cuatro primeros términos de la progresión.

Nº8.- Un estudiante de 3º de la ESO se propone el día 1 de septiembre repasar matemáticas durante una quincena, haciendo cada día 2 ejercicios más que el día anterior. Si el primer día empezó haciendo un ejercicio:

a) ¿Cuántos ejercicios le tocará hacer día 15 de septiembre?
b) ¿Cuántos ejercicios hará en total en esos 15 días?
c) Sus padres le prometen un móvil nuevo si consigue hacer más de 900 ejercicios en el mes de septiembre (que tiene 30 días). A ese ritmo ¿conseguirá su nuevo teléfono móvil?

Nº9.- Compré una lavadora a plazos. El primer mes pagué 15 €, el segundo mes, 18 €, el tercer mes 21 € y así sucesivamente. El último mes pagué 60 €, ¿cuántos meses he tenido que pagar? ¿Cuánto costó la lavadora?

Nº10.- Calcula la suma de los múltiplos de 50 comprendidos entre 1 y 1000

SUERTE JÓVENES

3.º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

⟨ ∞ ⟩

PROGRESIONES

Aritméticas y Geométricas

Matemáticas · Examen 11 de Abril de 2016

CURSO 2015 — 2016

> *"Las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el Universo."*
>
> **— Galileo Galilei (1564–1642)**

Colección de Ejercicios Resueltos con Rigor Matemático Completo

Índice de Ejercicios

Colección completa — Progresiones Aritméticas y Geométricas

Nº 1	Fórmulas Fundamentales de las Progresiones	3
Nº 2	Término 100 de una Progresión Aritmética ($a_1 = 4$, $d = 5$)	4
Nº 3	Cuatro Términos Intermedios entre 7 y 27 en P. Aritmética	5
Nº 4	Término Undécimo de una Progresión Geométrica ($a_1 = 1$, $r = 2$)	6
Nº 5	Suma de los Infinitos Términos: 8, 4, 2, 1, ...	7
Nº 6	La Cuba de Vino — Vaciado Progresivo de 1024 Litros	8
Nº 7	Progresión Geométrica: $a_1 = 3$, $a_4 = 24$ — Razón, Suma y Producto	9
Nº 8	El Estudiante de 3.º ESO — Repaso de Matemáticas en Septiembre	10
	La Lavadora a Plazos — Pagos en Progresión Aritmética	11

Nº 9

Nº 10 Suma de los Múltiplos de 50 Comprendidos entre 1 y 1000 12

Cada ejercicio incluye enunciado completo, desarrollo paso a paso e ilustración representativa.

EJERCICIO 1 · PROGRESIONES

Nº1 Fórmulas Fundamentales de las Progresiones

Progresión Aritmética & Progresión Geométrica

✏ ENUNCIADO

Escribe las fórmulas fundamentales de las progresiones.




Fig. 1 — Representación visual de las fórmulas de progresiones

🔢 Progresión Aritmética

Una **progresión aritmética** es una sucesión de números en la que la diferencia entre dos términos consecutivos es siempre constante. Esa diferencia constante se llama *razón aritmética* o *diferencia*, y se denota con la letra **d**.

1. **Término general (término n-ésimo):**

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$

Donde: a_n = término n-ésimo, a_1 = primer término, d = diferencia, n = posición del término.

2. **Suma de los n primeros términos:**

$$S_n = n \cdot (a_1 + a_n) / 2$$

Es decir: la suma es igual al número de términos multiplicado por la semisuma del primero y el último.

3. **Relación entre tres términos consecutivos:** Si a, b, c están en progresión aritmética, entonces:

$$b - a = c - b \rightarrow 2b = a + c$$

📐 Progresión Geométrica

Una **progresión geométrica** es una sucesión de números en la que el cociente entre dos términos consecutivos es siempre constante. Ese cociente se llama *razón geométrica* y se denota con la letra **r**.

1. **Término general (término n-ésimo):**

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

Donde: a_n = término n-ésimo, a_1 = primer término, r = razón geométrica, n = posición del término.

2. **Suma de los n primeros términos (r ≠ 1):**

$$S_n = a_1 \cdot (r^n - 1) / (r - 1)$$

3. **Suma de infinitos términos** (solo existe cuando |r| < 1):

$$S\infty = a_1 / (1 - r)$$

4. **Relación entre tres términos consecutivos:** Si a, b, c están en progresión geométrica, entonces:

$$b / a = c / b \rightarrow b^2 = a \cdot c$$

> 💡 *Nota: La suma de una progresión geométrica infinita solo converge (tiene valor finito) si la razón r cumple $|r| < 1$. En ese caso la serie es convergente; si $|r| \geq 1$ la serie es divergente y no tiene suma finita.*

EJERCICIO 2 · PROGRESIÓN ARITMÉTICA

Nº2 Término 100 de una Progresión Aritmética

Primer término $a_1 = 4$ · Diferencia $d = 5$

✏ ENUNCIADO

Calcúlese el término que ocupa el lugar 100 de una progresión aritmética cuyo primer término es igual a 4 y la diferencia es 5.




Fig. 2 — Secuencia aritmética hasta el término 100

📋 Datos del problema

Dato	Símbolo	Valor
Primer término	a_1	4
Diferencia	d	5
Posición buscada	n	100

🔢 Resolución paso a paso

1 **Escribimos la fórmula del término general de una progresión aritmética:**

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$

2 **Sustituimos los datos conocidos:**

$$a_{100} = 4 + (100 - 1) \cdot 5$$

3 **Calculamos el paréntesis:**

$$a_{100} = 4 + 99 \cdot 5$$

4 **Efectuamos la multiplicación:**

$$a_{100} = 4 + 495$$

5 **Sumamos:**

$$a_{100} = 499$$

✅ **El término que ocupa el lugar 100 de la progresión es $a_{100} = 499$**

💡 *Comprobación: Los primeros términos de la progresión son: 4, 9, 14, 19, 24, ... (se suma siempre 5). Si calculamos algunos términos: $a_{10} = 4 + 9 \cdot 5 = 4 + 45 = 49$. $a_{50} = 4 + 49 \cdot 5 = 4 + 245 = 249$. Verificamos la tendencia: al llegar al término 100 debería ser aproximadamente $5 \cdot 100 = 500$, lo cual es coherente con 499.*

EJERCICIO 3 · PROGRESIÓN ARITMÉTICA

Nº3 Cuatro Términos Intermedios entre 7 y 27

Inserción de medios aritméticos

✏ ENUNCIADO

Calcula cuatro términos comprendidos entre 7 y 27 para que los seis estén en progresión aritmética.




Fig. 3 — Seis términos equidistantes entre 7 y 27

📋 Comprensión del problema

Tenemos que construir una progresión aritmética con **6 términos** en total: el primero es 7, el último es 27, y entre ellos hay 4 términos intermedios desconocidos.
Llamamos a esos seis términos:

$$7,\ a_2,\ a_3,\ a_4,\ a_5,\ 27$$

🔢 Resolución paso a paso

1. **Identificamos los datos:** primer término $a_1 = 7$, término sexto $a_6 = 27$, número total de términos $n = 6$.

2. **Aplicamos la fórmula del término general para hallar d:**

$$a_6 = a_1 + (6 - 1) \cdot d$$

3 **Sustituimos los valores conocidos:**

$$27 = 7 + 5 \cdot d$$

4 **Despejamos d:**

$$5d = 27 - 7 = 20 \rightarrow d = 20 / 5 = 4$$

La diferencia de la progresión es **d = 4**.

5 **Calculamos los cuatro términos intermedios:**

$a_2 = 7 + 4 = \mathbf{11}$

$a_3 = 11 + 4 = \mathbf{15}$

$a_4 = 15 + 4 = \mathbf{19}$

$a_5 = 19 + 4 = \mathbf{23}$

✅ **La progresión completa es: 7, 11, 15, 19, 23, 27 con diferencia d = 4**

💡 *Verificación: Comprobamos que todos los saltos son iguales: 11−7=4, 15−11=4, 19−15=4, 23−19=4, 27−23=4. ✓ Todos los saltos son 4. La progresión es correcta.*

EJERCICIO 4 · PROGRESIÓN GEOMÉTRICA

Nº4 Término Undécimo de una Progresión Geométrica

Primer término $a_1 = 1$ · Razón $r = 2$

✏ ENUNCIADO

Calcúlese el término undécimo de una progresión geométrica cuyo primer término es igual a 1 y la razón es 2.




Fig. 4 — Crecimiento exponencial: potencias de 2

📋 Datos del problema

Dato	Símbolo	Valor
Primer término	a_1	1
Razón	r	2
Posición buscada	n	11 (undécimo)

🔢 Resolución paso a paso

1 **Escribimos la fórmula del término general de una progresión geométrica:**

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

2 **Sustituimos los datos conocidos:**

$$a_{11} = 1 \cdot 2^{11-1}$$

3 **Simplificamos el exponente:**

$$a_{11} = 1 \cdot 2^{10}$$

4 **Calculamos 2^{10}:**

$$2^{10} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 1.024$$

($2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$, $2^6 = 64$, $2^7 = 128$, $2^8 = 256$, $2^9 = 512$, $2^{10} = 1.024$)

5 **Resultado:**

$$a_{11} = 1 \cdot 1.024 = 1.024$$

✅ **El término undécimo de la progresión es $a_{11} = 1.024$**

💡 *La progresión completa: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ... Cada término es el doble del anterior. Es una progresión geométrica de razón $r = 2$ que crece exponencialmente.*

Nº5

EJERCICIO 5 · SERIE GEOMÉTRICA INFINITA

Suma de los Infinitos Términos: 8, 4, 2, 1, ...

Serie geométrica convergente · $|r| < 1$

✏ ENUNCIADO

Hállese la suma de los infinitos términos de la progresión: 8, 4, 2, 1, ...




Fig. 5 — Espiral convergente: suma infinita = 16

📋 Identificación de la progresión

1. **Identificamos el tipo de progresión:** los términos son 8, 4, 2, 1, ... Comprobamos si es geométrica calculando el cociente entre términos consecutivos:

$$4 / 8 = 1/2 \cdot 2 / 4 = 1/2 \cdot 1 / 2 = 1/2$$

El cociente es siempre 1/2, por tanto es una **progresión geométrica de razón r = 1/2**.

2. **Datos identificados:** primer término $a_1 = 8$, razón $r = 1/2$.

3. **Comprobamos que la serie converge:** para que la suma infinita exista (sea finita), es necesario que $|r| < 1$.

$$|r| = |1/2| = 0{,}5 < 1 \surd \text{ La serie converge}$$

4 **Aplicamos la fórmula de la suma infinita de una serie geométrica:**

$$S\infty = a_1 / (1 - r)$$

5 **Sustituimos los datos:**

$$S\infty = 8 / (1 - 1/2) = 8 / (1/2)$$

6 **Dividimos entre una fracción (multiplicamos por su inversa):**

$$S\infty = 8 \cdot (2/1) = 8 \cdot 2 = 16$$

✅ **La suma de los infinitos términos de la progresión es $S\infty = 16$**

💡 *Interpretación geométrica: Imagina un cuadrado de lado 4 (área = 16). Al sumar 8 + 4 + 2 + 1 + 1/2 + 1/4 + ... estamos dividiendo ese cuadrado en partes cada vez más pequeñas que nunca superan el área total de 16. Es uno de los ejemplos más bellos de cómo una suma infinita puede tener un valor finito.*

EJERCICIO 6 · PROGRESIÓN GEOMÉTRICA — PROBLEMA REAL

Nº6 La Cuba de Vino — Vaciado Progresivo de 1024 Litros

Progresión geométrica de razón r = 1/2

✏ ENUNCIADO

Tenemos una cuba de vino que contiene 1024 litros. El 1 de octubre se vació la mitad del contenido; al día siguiente se volvió a vaciar la mitad de lo que quedaba, y así sucesivamente todos los días.

a) ¿Qué cantidad de vino se sacó el día 10 de octubre?

b) ¿A ese ritmo conseguiremos vaciar la cuba el día 31 de octubre?



Fig. 6 — Vaciado diario: cada día se extrae la mitad de lo que quedaba

📋 Análisis del problema

Cada día se vacía *la mitad de lo que queda*. Eso significa que la cantidad extraída cada día forma una **progresión geométrica de razón r = 1/2**.

Día	Fecha	Litros extraídos	Litros restantes
1	1 oct	512	512
2	2 oct	256	256
3	3 oct	128	128
4	4 oct	64	64
5	5 oct	32	32

6	6 oct	16	16
7	7 oct	8	8
8	8 oct	4	4
9	9 oct	2	2
10	10 oct	1	1

🔢 Apartado a) — Cantidad extraída el día 10 de octubre

1. La cantidad extraída cada día forma una progresión geométrica con: $a_1 = 512$ litros (1 oct), razón $r = 1/2$.

2. **Fórmula del término general:**

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = 512 \cdot (1/2)^{n-1}$$

3. **El 10 de octubre corresponde al día n = 10:**

$$a_{10} = 512 \cdot (1/2)^9 = 512 \cdot (1/512) = 1$$

(Porque $2^9 = 512$, por tanto $(1/2)^9 = 1/512$)

> → **El día 10 de octubre se extrajo 1 litro de vino.**

🔢 Apartado b) — ¿Se vaciará la cuba el 31 de octubre?

4. La **suma de todos los litros extraídos** es la suma de la progresión geométrica infinita:

$$S\infty = a_1 / (1 - r) = 512 / (1 - 1/2) = 512 / (1/2) = 1024 \text{ litros}$$

En teoría, la suma infinita de todos los litros extraídos converge a **1024 litros** — exactamente el total de la cuba.

5 **¿Qué queda el día 31 de octubre?** El día 31 de octubre corresponde a n = 31. Lo que se extrae ese día es:

$$a_{31} = 512 \cdot (1/2)^{30} = 512 / 2^{30} = 512 / 1.073.741.824 \approx 0{,}000000477 \text{ litros}$$

Es decir, menos de 0,5 mililitros. La cuba nunca se vaciará completamente con este proceso.

✅ **a) El 10 de octubre se extrajo 1 litro de vino. b) NO, matemáticamente la cuba nunca se vacía completamente; siempre queda la mitad de lo que había el día anterior.**

💡 *Paradoja de Zenón: Este problema es equivalente a la famosa paradoja de Zenón de Elea. En teoría matemática pura, el proceso nunca termina —siempre queda una cantidad (cada vez más pequeña) por extraer. Solo "se vacía" en el límite cuando $n \to \infty$.*

Nº7

EJERCICIO 7 · PROGRESIÓN GEOMÉTRICA

$a_1 = 3$ y $a_4 = 24$ — Razón, Suma y Producto

Progresión geométrica completa

✏ ENUNCIADO

En una progresión geométrica el primer término vale 3 y el cuarto vale 24. Calcúlese la razón, la suma de los ocho primeros términos y el producto de los cuatro primeros términos de la progresión.




Fig. 7 — Crecimiento geométrico: razón r = 2

🔢 Paso 1: Calcular la razón r

1 Aplicamos la fórmula del término general con n = 4:

$$a_4 = a_1 \cdot r^{4-1} = a_1 \cdot r^3$$

2 Sustituimos $a_1 = 3$ y $a_4 = 24$:

$$24 = 3 \cdot r^3$$

3 Despejamos r^3:

$$r^3 = 24 / 3 = 8$$

4 **Calculamos r = $\sqrt[3]{8}$:**

$$r = \sqrt[3]{8} = 2$$

→ La razón de la progresión es r = 2

Los primeros términos son: $a_1 = 3$, $a_2 = 6$, $a_3 = 12$, $a_4 = 24$, $a_5 = 48$, $a_6 = 96$, $a_7 = 192$, $a_8 = 384$.

🔢 Paso 2: Suma de los ocho primeros términos

5 **Fórmula de la suma de n términos de una progresión geométrica (r ≠ 1):**

$$S_8 = a_1 \cdot (r^8 - 1) / (r - 1)$$

6 **Calculamos $2^8 = 256$ y sustituimos:**

$$S_8 = 3 \cdot (256 - 1) / (2 - 1) = 3 \cdot 255 / 1 = 765$$

→ La suma de los ocho primeros términos es $S_8 = 765$

🔢 Paso 3: Producto de los cuatro primeros términos

7 **Los cuatro primeros términos son: 3, 6, 12, 24. Calculamos su producto:**

$$P_4 = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4 = 3 \cdot 6 \cdot 12 \cdot 24$$

8 **Multiplicamos paso a paso:**

$$3 \cdot 6 = 18 \rightarrow 18 \cdot 12 = 216 \rightarrow 216 \cdot 24 = 5.184$$

✅ **Razón: $r = 2$ · Suma 8 primeros términos: $S_8 = 765$ · Producto 4 primeros términos: $P_4 = 5.184$**

EJERCICIO 8 · PROGRESIÓN ARITMÉTICA — PROBLEMA REAL

Nº8 El Estudiante de 3.º ESO — Repaso en Septiembre

Progresión aritmética con $d = 2 \cdot a_1 = 1$

✏ ENUNCIADO

Un estudiante de 3.º de la ESO se propone el día 1 de septiembre repasar matemáticas durante una quincena, haciendo cada día 2 ejercicios más que el día anterior. Si el primer día empezó haciendo un ejercicio:

a) ¿Cuántos ejercicios le tocará hacer el día 15 de septiembre?

b) ¿Cuántos ejercicios hará en total en esos 15 días?

c) Sus padres le prometen un móvil nuevo si consigue hacer más de 900 ejercicios en el mes de septiembre (30 días). A ese ritmo ¿conseguirá su nuevo teléfono móvil?



Fig. 8 — El estudiante y su plan de estudio progresivo

📋 Datos del problema

Dato	Símbolo	Valor
Ejercicios el día 1	a_1	1
Incremento diario	d	2
Días de la quincena	n	15

🔢 Apartado a) — Ejercicios el día 15

1 Aplicamos la fórmula del término general:

$$a_{15} = a_1 + (15 - 1) \cdot d = 1 + 14 \cdot 2 = 1 + 28 = 29$$

→ El día 15 de septiembre, el estudiante tendrá que hacer 29 ejercicios.

🔢 Apartado b) — Total en 15 días

2 Aplicamos la fórmula de la suma de los n primeros términos:

$$S_{15} = 15 \cdot (a_1 + a_{15}) / 2 = 15 \cdot (1 + 29) / 2 = 15 \cdot 30 / 2 = 15 \cdot 15 = 225$$

→ En los 15 primeros días habrá hecho un total de 225 ejercicios.

🔢 Apartado c) — ¿Más de 900 ejercicios en 30 días?

3 Calculamos primero el término 30 (ejercicios el día 30):

$$a_{30} = 1 + (30 - 1) \cdot 2 = 1 + 29 \cdot 2 = 1 + 58 = 59$$

4 Calculamos la suma total en 30 días:

$$S_{30} = 30 \cdot (a_1 + a_{30}) / 2 = 30 \cdot (1 + 59) / 2 = 30 \cdot 60 / 2 = 30 \cdot 30 = 900$$

5 **Comparamos con el objetivo:** S_{30} = 900 ejercicios. El objetivo es *más de* 900 ejercicios.

$$900 > 900\ ? \rightarrow NO,\ 900 = 900,\ no\ es\ estrictamente\ mayor$$

❌ **No conseguirá el móvil. Hará exactamente 900 ejercicios, pero necesita más de 900. Le falta al menos 1 ejercicio para ganar el premio.**

💡 *Curiosidad: La secuencia de ejercicios por día es: 1, 3, 5, 7, 9, 11, ... (números impares). Y la suma de los primeros n números impares es siempre n^2. Así: $S_{15} = 15^2 = 225$ ✓ y $S_{30} = 30^2 = 900$ ✓.*

EJERCICIO 9 · PROGRESIÓN ARITMÉTICA — PROBLEMA REAL

Nº9 La Lavadora a Plazos — Pagos Mensuales Crecientes

Progresión aritmética · $a_1 = 15\,€ \cdot d = 3\,€ \cdot a_n = 60\,€$

✏ ENUNCIADO

Compré una lavadora a plazos. El primer mes pagué 15 €, el segundo mes 18 €, el tercer mes 21 € y así sucesivamente. El último mes pagué 60 €.

a) ¿Cuántos meses he tenido que pagar?

b) ¿Cuánto costó la lavadora?



Fig. 9 — Los pagos mensuales forman una progresión aritmética

📋 Identificación de la progresión

1. **Verificamos que es una progresión aritmética:** 15, 18, 21, ...
   - 18 − 15 = 3
   - 21 − 18 = 3

   La diferencia es constante: **d = 3 €**.

2. **Datos identificados:** $a_1 = 15$ €, $d = 3$ €, $a_n = 60$ € (último plazo).

🔢 Apartado a) — Número de meses pagados

3. **Aplicamos la fórmula del término general:**

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$$

4 **Sustituimos con los datos conocidos y despejamos n:**

$$60 = 15 + (n - 1) \cdot 3$$

5 **Despejamos paso a paso:**

$$60 - 15 = (n - 1) \cdot 3 \rightarrow 45 = (n - 1) \cdot 3 \rightarrow n - 1 = 45 / 3 = 15 \rightarrow n = 16$$

→ **He pagado durante 16 meses.**

🔢 Apartado b) — Precio total de la lavadora

6 **El precio total es la suma de todos los plazos. Aplicamos la fórmula de la suma:**

$$S_n = n \cdot (a_1 + a_n) / 2 = 16 \cdot (15 + 60) / 2$$

7 **Calculamos:**

$$S_{16} = 16 \cdot 75 / 2 = 16 \cdot 37{,}5 = 600\,€$$

✅ **Pagué durante 16 meses. La lavadora costó 600 €.**

💡 *Verificación: La secuencia completa de pagos es: 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60 €. Son exactamente 16 términos. Podemos verificar la suma: S = 16·(15+60)/2 = 16·75/2 = 600 € ✓.*

Nº10

EJERCICIO 10 · PROGRESIÓN ARITMÉTICA

Suma de los Múltiplos de 50 entre 1 y 1000

Progresión aritmética · $a_1 = 50 \cdot d = 50 \cdot a_n = 1000$

✏ ENUNCIADO

Calcula la suma de los múltiplos de 50 comprendidos entre 1 y 1000.



Fig. 10 — Los múltiplos de 50 forman una progresión aritmética

📋 Identificación de la progresión

1 **Los múltiplos de 50 comprendidos entre 1 y 1000 son:**

$$50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000$$

Forman una **progresión aritmética** con $a_1 = 50$, diferencia $d = 50$ y término final $a_n = 1000$.

🔢 Paso 1: Calcular el número de términos

2 **Aplicamos la fórmula del término general:**

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$$

3 **Sustituimos y despejamos n:**

$$1000 = 50 + (n - 1) \cdot 50 \rightarrow 950 = (n - 1) \cdot 50 \rightarrow n - 1 = 950 / 50 = 19 \rightarrow n = 20$$

Hay **20 múltiplos de 50** entre 1 y 1000 (incluyendo el 1000).

🔢 Paso 2: Calcular la suma

4 **Aplicamos la fórmula de la suma de los n primeros términos:**

$$S_n = n \cdot (a_1 + a_n) / 2$$

5 **Sustituimos con n = 20, $a_1 = 50$, $a_{20} = 1000$:**

$$S_{20} = 20 \cdot (50 + 1000) / 2 = 20 \cdot 1050 / 2 = 20 \cdot 525 = 10.500$$

✅ **La suma de los múltiplos de 50 comprendidos entre 1 y 1000 es S = 10.500**

💡 *Verificación alternativa: Los múltiplos de 50 entre 1 y 1000 son 50·1, 50·2, 50·3, ..., 50·20. Por tanto su suma es: 50·(1+2+3+...+20) = 50 · [20·21/2] = 50 · 210 = 10.500 ✓*

⁂

"La matemática es la reina de las ciencias y la aritmética es la reina de las matemáticas."


— Carl Friedrich Gauss

✦ Fin del Cuadernillo de Ejercicios ✦

Perímetros, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos.

7.1 Perímetros y áreas de polígonos

TRIÁNGULO



El triángulo es un polígono con tres lados
Se puede calcular el **perímetro** y su **área**

PERÍMETRO: **P = b + c + d**

(Perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lado, y se represente con la letra **P**. A la mitad del perímetro se le denomina semi-perímetro y se denota con la letra **p**)

ÁREA: **A = (b . c) / 2** $A=\sqrt{p(p-b)(p-c)(p-d)}$

(El área de un triángulo se calcula multiplicando la longitud de la base por la altura y se divide por 2. O bien, calculando la raíz cuadrada, positiva, de los productos del semiperímetro p, por el semiperímetro menos el primer lado b, el semiperímetro menos el segundo lado c, el semiperímetro menos el tercer lado d)

Ejemplo 1.- Calcula el área de un triángulo rectángulo sabiendo que un cateto mide 9 cm. y la hipotenusa 15 cm.
Solución: Calculamos la longitud del otro cateto. Para ello aplicamos el teorema de Pitágoras

$$a^2=b^2+c^2 \Rightarrow c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{225-81}=\sqrt{144}=12 \text{ cm}$$


Como el área es el producto de la base por la altura, tenemos que:

$$A=\frac{bc}{2}=\frac{9\times 12}{2}=54 \text{ cm}^2$$

Ejemplo 2.-Un triángulo de 180 cm^2 de superficie mide 30 cm. de altura. Calcula la base

Solución: Puesto que $A=\frac{base\times altura}{2}=\frac{b.a}{2} \Rightarrow b=\frac{2.A}{a}=\frac{2.180}{30}=12$ cm

CUADRADO



El cuadrado es un paralelogramo que tiene los 4 lados y 4 ángulos iguales.
Se puede calcular el **perímetro** y su **área**

PERÍMETRO: **P = 4 . a**

(Perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lado, como sus cuatro lados son iguales, **P = 4a**)

ÁREA: **A = a^2**

(El área de un cuadrado se calcula multiplicando la base por la altura, como en este caso miden lo mismo tenemos que el área es el lado al cuadrado, es decir **a^2**)


Ejemplo 3 .-Calcula el área de un cuadrado de 12 dm. de lado.
Solución: Sabemos que $A = l^2 \Rightarrow A = 12^2 = 144 \text{ dm}^2$

Ejemplo 4.-Calcula el lado de un cuadrado de 225 cm² de superficie.
Solución: $A = l^2 \Rightarrow l = \sqrt{A} = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$

RECTÁNGULO

Rectángulo es el paralelogramo que tiene los 4 ángulos iguales (rectos) , pero los lados adyacentes no son iguales

Se puede calcular el **perímetro** y su **área**



PERÍMETRO: **P = 2 . a + 2 . b**

(Perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lado **P** = (a + a) + (b + b)= 2a + 2b)


ÁREA: **A = b . a**

(El área de un rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura, es decir b . a)

Ejemplo 5.-Un rectángulo mide 16 cm. de base y 25 cm. de diagonal. Calcula su área.
Solución: Como el área de un rectángulo es base por altura, necesitamos calcular la altura, para ello aplicamos el teorema de Pitágoras. $a = \sqrt{d^2 - b^2} = \sqrt{625 - 256} =$
$= \sqrt{369} = 19,21.$

Por lo tanto, $A = b.a = 16.19,21 = 307,34 \text{ cm}^2$

ROMBO



El rombo es cuadrilátero que tiene los 4 lados iguales , y los ángulos opuestos iguales .
Se puede calcular el **perímetro** y su **área**

PERÍMETRO: **P = 4 . a**

(El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados, y como son todos iguales, tenemos que **P = 4a**)

ÁREA: **A= (D . d) / 2**


(El área de un rombo es igual al producto de sus diagonales (**D, d**) dividido por **2**)

Ejemplo: 6.- Las diagonales de un rombo son 8,3 dm. y 6,5 dm. Calcula su área expresándola en cm²

Solución:

$$A = \frac{D \times d}{2} = \frac{8,3 \times 6,5}{2} = 26,975 \text{ dm}^2 = 2.697,50 \text{ cm}^2$$

ROMBOIDE



El romboide es un cuadrilátero paralelogramo, cuando no es ninguno de los anteriores .
Se puede calcular el **perímetro** y su **área**


PERÍMETRO: **P = 2 (b + c)**

(El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados, y como son iguales dos a dos, tenemos que **P = 2 (b + c**)

ÁREA: **A = b . a**

(El área de un romboide es igual al producto de la base (**b**) por la altura (**a**))

TRAPECIO



El Trapecio es un cuadrilátero con dos lados paralelos .
Se puede calcular el **perímetro** y su **área**

PERÍMETRO: **P = B + b + c + d**

(El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados y por lo tanto la suma de la base mayor B mas la base menor b mas los lados c y d, tenemos por tanto que **P = B + b + c + d**)

ÁREA: **A = a . (B + b)/2**


(El área de un trapecio es igual al producto de la semisuma de las bases **(B + b)/2** por la altura (**a**))

Ejemplo: 7.- Calcula el área de un trapecio de 10 y 20 cm. de bases y 15 cm. de altura

Solución: Sabemos que: $A = \frac{B+b}{2}.a \Rightarrow A = \frac{20+10}{2}.15 = 225 \text{ cm}^2$

TRAPEZOIDE

Los **Trapezoides** son los cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo a otro .



Se puede calcular el **perímetro** y su **área**


PERÍMETRO: **P = a + b + c + d**

(El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados y tenemos por tanto que **P = a + b + c + d**)

ÁREA: **A = Suma de las áreas de los dos triángulos**

(Para calcular su área, se divide el trapezoide en dos triángulos, trazando una diagonal, con lo cual su área es igual a la suma de las áreas de los dos triángulos en los que lo hemos dividido)

POLÍGONO REGULAR



Polígono regular es el que tiene sus lados y sus ángulos todos iguales
Se puede calcular el **perímetro** y su **área**

PERÍMETRO: **P = n .l**

(El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados, todos iguales, y si suponemos que tiene n lados tenemos que **P = n . l**)

ÁREA: **A = (P . a) / 2**

(El área es igual al producto del perímetro, **P,** por la apotema, **a**, dividido por dos)

Nota : en el caso del hexágono regular , se puede calcular el área como la suma de 6 triángulos equiláteros , en los demás polígonos regulares se podrá calcular como la suma de triángulos isósceles.

Ejemplo: 8.- Calcula el área de:

A) Un pentágono regular de 8 cm. de lado y 6,5 cm. de apotema.
B) Un hexágono regular de 18 cm de lado

Solución: Sabemos que el área de un polígono regular es $A=\frac{P}{2}\times a$. Por lo tanto:

A) En el caso del pentágono $A = \frac{5\times L}{2}\times a = \frac{5\times 8}{2}\times 6{,}5 = 130\ cm^2$


B) En el caso del hexágono, primero calcularíamos la apotema teniendo en cuenta que es la altura en un triángulo equilátero de lado 18 cm.

$a = \frac{L}{2}\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$ cm.

Por lo tanto, el área es $A = \frac{18\times 6}{2}\times 9\sqrt{3} = 486\sqrt{3}\ cm^2 = 841{,}78\ cm^2$

Longitud y área de figuras circulares


CIRCUNFERENCIA



Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan (están a igual distancia) de un punto fijo denominado centro de la circunferencia
Se puede calcular el **perímetro o longitud.**

LONGITUD: **L = 2 . π . R**

ARCO




La longitud de un arco de circunferencia que abarca un ángulo central de amplitud **ene-grados** (nº) o bien **α radianes** es:

LONGITUD: **L = nº . (2πR)/360** **L = α . R**

(La longitud de un arco de circunferencia se calcula multiplicando la longitud de la circunferencia (**2 πR**) por el número de grados (**nº**) y se divide por (**360**). Si el ángulo viene expresado en radianes, entonces la longitud del arco es igual al ángulo (**α**) por el radio (**R**))

CÍRCULO



Se denomina circulo a la región del plano limitada por una circunferencia

Se puede calcular el **área**

ÁREA: **$A = \pi R^2$**

(Es decir, el área de un circulo es igual a π (pi) multiplicado por el radio (R) al cuadrado).

Ejemplo 9.- Una plaza de forma circular mide 137,60 m. alrededor. ¿Cuánto costará ponerle baldosas si cada m² cuesta 7euros?

Solución: Necesitamos calcular la superficie de la plaza, para lo cual es necesario conocer su radio, cosa que podemos hacer pues nos dan la longitud y sabemos que


$$L_{circ} = 2\pi R \rightarrow R = \frac{L}{2\pi} = \frac{137{,}60}{2\pi} = 21{,}91 \text{ m}$$

Por lo tanto la superficie de la plaza es: $A = \pi R^2 = \pi\left(\frac{137{,}60}{2\pi}\right)^2 = \frac{(137{,}6)^2}{4\pi} = 1506{,}7 \text{ m}^2$

Como cada m² cuesta 1.200 Ptas., el costo de la plaza será de

$C = 1506{,}70 \times 7 = 10.546{,}9$ euros

SECTOR CIRCULAR SECTOR CIRCULAR



Se denomina sector circular a la región del plano limitada por un arco de circunferencia y dos radios de la misma.

Se puede calcular el **área**


ÁREA: $A = \frac{\pi R^2}{360}\, n^o$

(Es decir, el área de un sector circular es igual a π (pi) multiplicado por el radio (R) al cuadrado dividido por 360, que son los grados de una circunferencia, multiplicada por la amplitud del ángulo (nº)).

Ejemplo 10.- Calcula el área de un sector circular de 16 cm de radio y 40º de amplitud

Solución: Puesto que $A = \frac{\pi R^2}{360} \times n^o = \frac{\pi(16)^2}{360} \times 40 = 89{,}36 \text{ cm}^2$

CORONA CIRCULAR



Se denomina corona circular a la región del plano limitada por dos circunferencias concéntricas

Se puede calcular el **perímetro** y el **área**

PERÍMETRO: **$P = 2.\pi\,(R + r)$**

(El perímetro es la suma de las longitudes de las dos circunferencias que la delimitan)

ÁREA: **$A = \pi\,(R^2 - r^2)$**

(Es decir, el área es igual a π (pi) multiplicado por el radio de la circunferencia exterior al cuadrado (R^2) menos el cuadrado del radio de la circunferencia interior (r^2))
Ejemplo 11.- Calcula el área de una corona circular de 6 cm. de radio mayor y 4 cm. de radio menor.
Solución: El área de una corona circular es la diferencia entre el área del circulo mayor y el área del círculo menor, por ello $A = R^2 - r^2 = 6^2 - 4^4 = 20\ cm^2$

7.2 Áreas y Volúmenes de Poliedros

7.2.1 Clasificación de Poliedros


Un **poliedro** es un cuerpo geométrico que está limitado por cuatro o más polígonos . Los polígonos que limitan al poliedro se llaman **caras del poliedro**, los lados y vértices de las caras son las **aristas y vértices del poliedro** respectivamente .
Los **poliedros regulares** son aquellos cuyas caras son polígonos regulares iguales y concurren el mismo número de ellas en cada vértice .
Solo existen 5 poliedros regulares que son :




Tetraedro
(4 triángulos equiláteros)



Octaedro
(8 triángulos equiláteros)



Cubo
(6 cuadrados)



Dodecaedro
(12 pentágonos regulares)



Icosaedro
(20 triángulos equiláteros)


Dentro de los poliedros podemos distinguir dos casos especiales :
1º) PRISMAS: son poliedros que tienen dos caras iguales y paralelas llamadas bases , y sus caras laterales son paralelogramos. Lógicamente tendrá tantas caras laterales como lados tenga la base .
Los prismas se clasifican en :
a) **Rectos y oblicuos** . Un prisma es recto cuando el ángulo entre las caras laterales y las bases es recto , en caso contrario se dice que el prisma es oblicuo .
b) **Regulares e irregulares** . Un prisma es regular cuando es recto y sus bases son polígonos regulares , en caso contrario se dice que el prisma es irregular .
c) **Por el número de lados de sus bases** :
-Triangulares , si sus bases son triángulos
- Cuadrangulares , si sus bases son cuadriláteros
- Pentagonales , ...etc.

Uno de los prismas cuadrangulares más importante es el **paralelepípedo** que tiene por bases dos paralelogramos , es decir , todas sus caras (6) son paralelogramos . Dentro de los paralelepípedos podemos encontrar algunos casos importantes como son el **cubo** (todas sus caras son cuadrados) , **ortoedro** (todas sus caras son rectángulos) , **romboedro** (todas sus caras son rombos) y **romboidedro** (todas sus caras son romboides) .


Nota 1 : no olvidar que si un prisma es regular entonces es recto y si es oblicuo es irregular y por tanto no es necesario decirlo .
Nota 2 : La mejor forma de nombrarlos es : prisma recto de base pentagonal irregular , prisma oblicuo de base cuadrada , prisma recto de base triangular irregular y prisma recto de base rectangular .

2º) PIRÁMIDES: son poliedros en los que una de sus caras (llamada base) es un polígono y las caras laterales son triángulos que tienen un vértice común .
Las pirámides se clasifican en :
a) **Rectas y oblicuas** . Una pirámide es recta cuando el pie de su altura coincide con el centro de su base , o lo que es lo mismo , cuando las caras laterales no son triángulos escalenos . En caso contrario tendremos un pirámide oblicua .
b) **Regulares e irregulares** . Una pirámide es regular cuando es **recta** y su base es un polígono regular . En caso contrario será irregular .
c) **Por el número de lados de su base** :
- Triangular
- Cuadrangular
- Pentagonal , ...etc.


Si una pirámide es cortada por un plano paralelo a la base obtendremos lo que se llama **tronco de pirámide** .
Veamos algunos ejemplos de pirámides:



Pirámide hexagonal regular



Pirámide cuadrangular (base cuadrada) oblicua




Tronco de pirámide

Nota : la mejor forma de nombrarlos es : pirámide recta de base hexagonal regular , pirámide oblicua de base cuadrada

7.2.2 Área lateral, área total y volúmenes de cuerpos geométricos

PRISMA



El prisma regular es un **cuerpo geométrico** limitado por 2 polígonos regulares, llamados bases, y por tantos rectángulos como lados tenga la base.

Se nombran diciendo PRISMA y el nombre del polígono de la base. (**Ejemplo: Prisma hexagonal**).

Podemos hallar el **área lateral** , **área total** y **volumen** de este cuerpo geométrico, utilizando las siguientes formulas:

ÁREA LATERAL: $A_L = P \cdot h$

(Es decir, el área lateral es igual al perímetro del polígono de la base multiplicado por la altura (h) del prisma)

ÁREA TOTAL: $A_T = A_L + 2 \cdot A_b$

(Es decir, el área total es igual al área lateral mas el área de los polígonos de las 2 bases)

VOLUMEN: **$V = A_b \cdot h$**

(Es decir, el volumen es igual al área del polígono de la base multiplicado por la altura (h) del prisma)

Ejemplo 12.- Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un prisma pentagonal sabiendo que su altura mide 9 cm.; el lado de la base son 2cm y la apotema de la base 1,5 cm**.**


Solución:

$$A_L = \text{Perimetro poligono base} \times \text{altura} = (5 \times 2) \times 9 = 90 \text{ cm}^2$$

$$A_T = A_L + \text{Areas bases} = A_L + 2 \times (P \times \text{apotema}) = 90 + 10 \times 1{,}5 = 105 \text{ cm}^2$$

$$V = \text{area base} \times \text{altura} = (5 \times 1{,}5) \times 9 = 67{,}5 \text{ cm}^3$$

PIRÁMIDE



La pirámide regular es un **cuerpo geométrico** limitado por un polígono regular, llamado base, y por tantos triángulos como lados tenga la base.

Se nombran diciendo PIRÁMIDE y el nombre del polígono de la base. (Ejemplo: Pirámide cuadrangular).

Podemos hallar el **área lateral , área total y volumen** de este cuerpo geométrico, utilizando las siguientes formulas:

ÁREA LATERAL: **$A_L = P \cdot a/2$**


(El área lateral es igual al perímetro del polígono de la base multiplicado por la altura de una cara lateral **(a)** de la pirámide y dividido entre 2)

ÁREA TOTAL: **$A_T = A_L + A_b$**

(El área total es igual al área lateral mas el área del polígonos de la base)

VOLUMEN: **$V = A_b \cdot h/3$**

(El volumen es igual al **área del polígono de la base** multiplicado por la **altura (h)** de la pirámide y dividido entre **3**)



Ejemplo 13.- Calcular el área lateral, total y volumen de una prisma pentagonal sabiendo que cada lado del pentágono mide 6 cm, que la altura es 10 cm y la apotema de la base mide 5 cm.

Solución:

Para calcular el área lateral, tenemos que calcular el área de un triángulo y multiplicarlo por cinco.

Desconocemos el valor de a, que es la apotema en los triángulos. Lo podemos calcular, pues a es la hipotenusa en un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 cm y 10 cm respectivamente.

$$a = \sqrt{10^2 + 5^2} = \sqrt{125} = 11{,}18 \text{ cm}$$


$$A_L = A_L = 5\left(\frac{10}{}\right)$$

$A_B = (P \cdot a) / 2$ = (5.6.5) / 2 = 75 cm^2

Área

C) Cuerpos redondos o de revolución

CILINDRO



El cilindro es el cuerpo geométrico engendrado por un rectángulo al girar en torno a uno de sus lados.

Podemos hallar el **área lateral , área total y volumen** de este cuerpo geométrico, utilizando las siguientes formulas:

ÁREA LATERAL: **$A = 2.\pi . r . h$**

(El área lateral es igual a 2 multiplicado por π □(**pi**), el resultado multiplicado por el radio de la base **(r)** y multiplicado por la generatriz **(h)** del cilindro)

ÁREA TOTAL: **$A_T = A_L + 2 . A_b = 2\pi rh + 2(\pi r^2)$**

(El área total es igual al **área lateral** mas las **áreas de los dos círculos** de las bases)

VOLUMEN: **$V = (\pi . r^2) . h$**

(El volumen es igual al **área del círculo** de la base multiplicado por la altura **(h)** del cilindro)

Ejemplo 14.- Calcula el área lateral, área total y volumen de un cilindro de 3,5 cm de radio y 9,6 cm de altura.


Solución:

$$A_L = \text{Longitud circunferencia} \times \text{altura} = (2\pi R).a = (2 \times \pi \times 3,5) \times 9,6 = 211,12 \text{ cm}^2$$

$$A_T = A_L + \text{areas bases} = A_L + 2(\pi R^2) = 211,12 + 2(\pi (3,5)^2) = 288,08 \text{ cm}^2$$

$$V = \text{area base} \times \text{altura} = (\pi R^2) \times a = (\pi (3,5)^2) 9,6 = 369,45 \text{ cm}^3$$

CONO



El cono es un cuerpo geométrico engendrado por un triángulo rectángulo al girar en torno a uno de sus catetos.

Podemos hallar el **área lateral** , **área total** y **volumen** de este cuerpo geométrico, utilizando las siguientes formulas:

ÁREA LATERAL: **$A_L = \pi . r . g$**

(El área lateral es igual a π (**pi**)multiplicado por el radio **(r)** de la base y multiplicado por la generatriz **(g)** del cono)

ÁREA TOTAL: $A_T = A_L + A_b = \pi r (r+g)$

(El área total es igual al área lateral mas el **área del circulo** de la base)

VOLUMEN: $A = 1/3\ (\pi . r^2).h$

(El volumen es igual al **área del circulo** de la base multiplicado por la altura **(h)** del cono y dividido entre **3**)

Ejemplo 15.- Calcula el área lateral, total y el volumen de un cono de 8 dm. de radio de la base y de 1 m de altura

Solución: Necesitamos conocer el valor de la generatriz **g**, para su cálculo hacemos uso del teorema de Pitágoras: $g = \sqrt{r^2+h^2} = \sqrt{(8)^2+(10)^2} = \sqrt{164} = 12{,}81 \text{ dm}$

$$A_L = \text{longitud circunferencia} \times \text{generatriz} = (2\pi r)g =$$

$$= (2\times\pi\times 8)\times 12{,}81 = 643{,}71 \text{ dm}^2 \cong 6{,}44 \text{ m}^2$$

$$A_T = A_L + A_b = (2\pi rg) + (\pi r^2) = 643{,}72 + (\pi\times 8^2) = 844{,}77 \text{ dm}^2$$

$$V = \frac{1}{3} \text{ area base} \times \text{altura} = \frac{1}{3}(\pi r^2)\times h = \frac{1}{3}(\pi\times 8^2)\times 10 = 670{,}21 \text{ dm}^3$$

ESFERA



La esfera es un cuerpo geométrico engendrado al girar una semicircunferencia alrededor de su diámetro.

Podemos hallar el **área** y el **volumen** de este cuerpo geométrico, utilizando las siguientes formulas:

ÁREA: $A = 4.\ \pi\ .\ r^2$

(El área es igual a 4 multiplicado por π (**pi**), y el resultado se multiplica por el **cuadrado** del radio de la esfera)

VOLUMEN: $V = 4/3.\ \pi\ .\ r^3$

(El volumen es igual a 4 multiplicado por π **(pi)**, el resultado se multiplica por el cubo del radio de la esfera (R) y lo que resulta se divide entre 3)

Ejemplo 16.- Sabiendo que la superficie de una esfera es de 3600 cm² , calcula su radio.

Solución: $V = 4\pi R^2 \rightarrow R = \sqrt{\frac{V}{4.\pi}} = \sqrt{\frac{3600}{4.\pi}} = 16{,}93 \text{ cm}$

NOTA: *Si la figura geométrica no es recta, si no que es oblicua, las fórmulas siguen siendo válidas siempre y cuando se tenga claro cual es la altura de la figura que se está estudiando y no se confunde con alguna de las medidas de las áreas laterales.*

Lógicamente también es necesario recordar cuales son las áreas de las figuras planas más importantes, para poder calcular la base de la figura geométrica.

Para poder calcular el volumen de un tronco de pirámide o cono deberíamos calcular el volumen de la pirámide o cono mayor, menos el menor.

PROBLEMAS PROPUESTOS:

1.-El área de un rectángulo es de 180 cm². Calcula la base sabiendo que la altura mide 15 cm.

2.- El área de un trapecio es 25 cm^2 y sus bases son 4 y 6 cm. respectivamente. Calcula su altura

3.- Calcula la longitud de la circunferencia y la superficie del círculo correspondiente sabiendo que su radio mide 8 cm.

4.- Calcula el área lateral, área total y el volumen de un prisma octogonal de 5cm. de lado; 6cm. de apotema de la base y 9 cm. de altura.

5.- Sabiendo que la arista de un cubo es de 12 dm. Calcula el área total y el volumen

6.- Calcula la superficie y el volumen de una esfera de 28dm. de radio

Anexo.1.-

FORMULAS DE PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES DE DISTINTOS CUERPOS

Nombre	Perímetro	Área
Triángulo	P = Perímetro = = Suma de los lados P = b + c + d	$A = \frac{b \cdot a}{2}$ $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ p = semiperímero
Cuadrado	P = 4 · a	$A = a^2$
Rectángulo	P = 2(b + a)	A = b · a
Rombo	P = 4 · a	$A = \frac{D \cdot d}{2}$
Romboide	P = 2(b + c)	A = b · a
Trapecio	P = B + c + b + d	$A = \frac{B+b}{2} \cdot a$
Trapezoide	P = a + b + c + d	A = Suma de las áreas de los dos triángulos
Polígono regular	$P = n\ell$	$A = \frac{1}{2} P \cdot a$

Nombre	Longitud	Área
Circunferencia	$L = 2\pi R$	
Arco	$L = \frac{2\pi R}{360}\ n^o$	
Círculo		$A = \pi R^2$
Sector circular		$A = \frac{\pi R^2}{360} \times n^o = \frac{R^2}{2} \times \alpha$ nº = grados α = radianes
Corona circular		$A = \pi(R^2 - r^2)$

Nombre	Área lateral	Área Total	Volumen
Prisma	P = Perímetro h=Altura $A_L = P.h$	$A_T = A_L + 2A_b$ A_b = Área base	$V = A_b.h$
Pirámide	$A_L = P.\frac{a}{2}$	$A_T = A_L + A_b$	$V = \frac{1}{3}A_b.h$
Tronco de Pirámide	$A_L = \frac{P+p}{2}.a$	$A_T = A_{B_1} + A_{B_2} + A_L$	$V = \frac{1}{3}\left(A_{B_1} + A_{B_2} + \sqrt{A_{B_1}A_{B_2}}\right).H$
Cilindro	$A_L = 2\pi r.h$	$A_T = 2\pi r.h + 2(\pi r^2)$	$V = (\pi r^2).h$
Cono	$A_L = \pi R.g$ g= generatríz	$A_T = \pi r.g + \pi r^2$ $A_T = A_L + A_b$	$V = \frac{1}{3}(\pi r^2).h$
Tronco de Cono	$A_L = \pi(R+r).g$	$A_T = A_L + A_{bases}$	$V = \frac{1}{3}\left(A_{B_1} + A_{B_2} + \sqrt{A_{B_1}A_{B_2}}\right).H$
Esfera		$A_T = 4\pi r^2$	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

THE HARMONY OF GEOMETRY

THE HARMONY OF GEOMETRY

A MATHEMATICAL JOURNEY

IES ANTONIO TOVAR · MATEMÁTICAS


Geometría

Perímetros, Áreas y Volúmenes

"Las matemáticas son el lenguaje en que Dios ha escrito el universo. Sin ellas, uno anda vagando en un laberinto oscuro."

— STEPHEN HAWKING —

FIGURAS PLANAS · CUERPOS GEOMÉTRICOS · CUERPOS DE REVOLUCIÓN



DR. ELARA VANCE | OXFORD MATHEMATICAL SERIES

ELARA VANCE

Índice de Ejercicios

Haz clic en cualquier ejercicio para ir directamente a su enunciado y solución

CAPÍTULO 7.1 — PERÍMETROS Y ÁREAS DE FIGURAS PLANAS

Ejercicio 1 · Triángulo Rectángulo — Cateto e Hipotenusa 4

Ejercicio 2 · Triángulo — Área y Altura conocidas 5

Ejercicio 3 · Cuadrado — Área a partir del Lado 6

Ejercicio 4 · Cuadrado — Lado a partir del Área 6

Ejercicio 5 · Rectángulo — Base y Diagonal conocidas 7

Ejercicio 6 · Rombo — Diagonales conocidas 8

Ejercicio 7 · Trapecio — Bases y Altura conocidas 9

Ejercicio 8 · Polígonos Regulares — Pentágono y Hexágono 10

CAPÍTULO 7.1 (CONT.) — LONGITUD Y ÁREA DE FIGURAS CIRCULARES

Ejercicio 9 · Círculo — Plaza Circular (coste de baldosas) 11

Ejercicio 10 · Sector Circular — Radio y Ángulo conocidos 12

Ejercicio 11 · Corona Circular — Radio mayor y menor 13

CAPÍTULO 7.2 — ÁREAS Y VOLÚMENES DE POLIEDROS

Ejercicio 12 · Prisma Pentagonal — Área y Volumen 14

Ejercicio 13 · Pirámide Pentagonal — Área y Volumen 15

CAPÍTULO 7.2 (CONT.) — CUERPOS REDONDOS O DE REVOLUCIÓN

Ejercicio 14 · Cilindro — Área lateral, total y Volumen 16

Ejercicio 15 · Cono — Área lateral, total y Volumen 17

Ejercicio 16 · Esfera — Radio a partir de la Superficie 18

PROBLEMAS PROPUESTOS

Problema 1 · Rectángulo — Base desde el Área 20

Problema 2 · Trapecio — Altura desde el Área 20

Problema 3 · Circunferencia y Círculo — Radio dado 21

Problema 4 · Prisma Octogonal — Área y Volumen 21

Problema 5 · Cubo — Área total y Volumen 22

Problema 6 · Esfera — Superficie y Volumen 22

CAPÍTULO 7.1


Perímetros y Áreas de Polígonos

Triángulo · Cuadrado · Rectángulo · Rombo · Trapecio · Polígono Regular

Ejercicio 1

Triángulo Rectángulo — Cálculo del Área mediante el Teorema de Pitágoras

Enunciado: Calcula el área de un triángulo rectángulo sabiendo que un cateto mide **9 cm** y la hipotenusa **15 cm**.



Triángulo rectángulo con catetos 9 cm y 12 cm, e hipotenusa 15 cm

Fórmulas clave del triángulo:

- Teorema de Pitágoras: $a^2 = b^2 + c^2$
- Área del triángulo: $A = (\text{base} \times \text{altura}) / 2$
- En un triángulo rectángulo, los dos catetos hacen de base y altura.

✓ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1. **Identificamos los datos:** Hipotenusa a = 15 cm, cateto conocido b = 9 cm. Desconocemos el cateto c.
2. **Aplicamos el Teorema de Pitágoras** para encontrar el cateto desconocido:

$$c = \sqrt{(a^2 - b^2)} = \sqrt{(15^2 - 9^2)} = \sqrt{(225 - 81)} = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$$

3 **Calculamos el área** del triángulo rectángulo. Los dos catetos actúan como base y altura:

`A = (b × c) / 2 = (9 × 12) / 2 = 108 / 2 = 54 cm²`

Resultado: A = 54 cm²

Ejercicio 2 — Triángulo — Cálculo de la Base conociendo el Área y la Altura

Enunciado: Un triángulo de **180 cm²** de superficie mide **30 cm** de altura. Calcula la base.

Fórmula del área del triángulo: `A = (base × altura) / 2` → despejando la base: `base = (2 × A) / altura`

✓ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1. **Datos del problema:** Área A = 180 cm², altura a = 30 cm. Incógnita: base b.
2. **Despejamos la base** de la fórmula del área: `A = (b × a) / 2 → b = (2 × A) / a = (2 × 180) / 30 = 360 / 30 = 12 cm`

Resultado: base = 12 cm

§ Cuadrado y Rectángulo

Ejercicio 3 — **Cuadrado — Cálculo del Área a partir del Lado**

Enunciado: Calcula el área de un cuadrado de **12 dm** de lado.

Fórmula del área del cuadrado: El cuadrado es un paralelogramo con los 4 lados y 4 ángulos iguales (90°). Su área es el cuadrado del lado:

$A = l^2$ · $P = 4 \cdot l$

✓ RESOLUCIÓN

1. **Dato:** lado l = 12 dm. Aplicamos directamente la fórmula del área:
2. $A = l^2 = 12^2 = 12 \times 12 = 144\ dm^2$

Resultado: A = 144 dm²

Ejercicio 4 — Cuadrado — Cálculo del Lado a partir del Área

Enunciado: Calcula el lado de un cuadrado de **225 cm²** de superficie.

Si $A = l^2$ entonces, despejando el lado: $l = \sqrt{A}$


✓ RESOLUCIÓN

1. **Dato:** Área A = 225 cm². Despejamos el lado de la fórmula del área:
   $l = \sqrt{A} = \sqrt{225} = 15$ cm
2. **Comprobación:** $15^2 = 225$ cm² ✓

Resultado: l = 15 cm

Ejercicio 5 — Rectángulo — Cálculo del Área conociendo la Base y la Diagonal

Enunciado: Un rectángulo mide **16 cm** de base y **25 cm** de diagonal. Calcula su área.



Rectángulo con base 16 cm y diagonal 25 cm

Propiedades del rectángulo:

- Todos los ángulos son de 90°, los lados adyacentes son desiguales.
- La diagonal, la base y la altura forman un triángulo rectángulo.
- Fórmula: `A = base × altura`
- `d² = b² + a²` → `a = √(d² − b²)`

✓ RESOLUCIÓN PASO A PASO


1. **Datos:** base b = 16 cm, diagonal d = 25 cm. Necesitamos la altura a.
2. **Calculamos la altura** aplicando el Teorema de Pitágoras:
   `a = √(d² − b²) = √(25² − 16²) = √(625 − 256) = √369 ≈ 19,21 cm`
3. **Calculamos el área:**
   `A = b × a = 16 × 19,21 = 307,34 cm²`

Resultado: A ≈ 307,34 cm²

§ Rombo y Trapecio

Ejercicio 6 — Rombo — Cálculo del Área a partir de las Diagonales

Enunciado: Las diagonales de un rombo son **8,3 dm** y **6,5 dm**. Calcula su área expresándola también en cm².



Rombo con diagonales D=8,3 dm y d=6,5 dm

Propiedades del rombo:

- 4 lados iguales, ángulos opuestos iguales.
- Las diagonales se cortan perpendicularmente en su punto medio.
- Fórmula del área: `A = (D × d) / 2`
- Conversión: 1 dm² = 100 cm²


✓ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1. **Datos:** Diagonal mayor D = 8,3 dm, diagonal menor d = 6,5 dm.
2. **Aplicamos la fórmula del área del rombo:** `A = (D × d) / 2 = (8,3 × 6,5) / 2 = 53,95 / 2 = 26,975 dm²`
3. **Convertimos a cm²:** `26,975 dm² × 100 cm²/dm² = 2.697,50 cm²`

Resultado: A = 26,975 dm² = 2.697,50 cm²

Ejercicio 7 — Trapecio — Cálculo del Área conociendo Bases y Altura

Enunciado: Calcula el área de un trapecio de **10 cm** y **20 cm** de bases y **15 cm** de altura.



Trapecio con bases 10 cm y 20 cm, altura 15 cm

Propiedades del trapecio:

- Cuadrilátero con exactamente dos lados paralelos (la base mayor B y la base menor b).
- Fórmula del área: `A = [(B + b) / 2] × h`
- La expresión (B + b)/2 es la media aritmética de las dos bases (semisuma).

✓ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1. **Datos:** Base mayor B = 20 cm, base menor b = 10 cm, altura h = 15 cm.
2. **Calculamos la semisuma de las bases:** `(B + b) / 2 = (20 + 10) / 2 = 30 / 2 = 15 cm`
3. **Calculamos el área:** `A = 15 × 15 = 225 cm²`

Resultado: A = 225 cm²

§ Polígonos Regulares

Ejercicio 8 — Polígonos Regulares — Pentágono y Hexágono


Enunciado: Calcula el área de:

A) Un pentágono regular de **8 cm** de lado y **6,5 cm** de apotema.

B) Un hexágono regular de **18 cm** de lado.

Fórmulas del polígono regular:

- Perímetro: `P = n · l` (n = nº de lados, l = longitud del lado)
- Área: `A = (P × a) / 2` (a = apotema)
- Para el hexágono, la apotema es la altura del triángulo equilátero de lado l: `a = (l/2) · √3`



Pentágono regular (izq.) y hexágono regular (der.)

✓ RESOLUCIÓN — APARTADO A: PENTÁGONO REGULAR

1. **Datos:** n = 5 lados, lado l = 8 cm, apotema a = 6,5 cm.
2. **Calculamos el perímetro:** `P = n · l = 5 × 8 = 40 cm`
3. **Calculamos el área:** `A = (P × a) / 2 = (40 × 6,5) / 2 = 260 / 2 = 130 cm²`

Resultado A: A = 130 cm²

✓ RESOLUCIÓN — APARTADO B: HEXÁGONO REGULAR

1. **Datos:** n = 6 lados, lado l = 18 cm. Debemos calcular la apotema.

2. **Calculamos la apotema** (altura del triángulo equilátero de lado 18 cm):
   `a = (l / 2) · √3 = (18 / 2) · √3 = 9√3 ≈ 9 × 1,7321 ≈ 15,588 cm`
3. **Calculamos el perímetro:** `P = 6 × 18 = 108 cm`
4. **Calculamos el área:**
   `A = (P × a) / 2 = (108 × 9√3) / 2 = 486√3 ≈ 486 × 1,7321 ≈ 841,78 cm²`

Resultado B: A = 486√3 ≈ 841,78 cm²

CAPÍTULO 7.1 — CONTINUACIÓN

Longitud y Área de Figuras Circulares

Circunferencia · Arco · Círculo · Sector Circular · Corona Circular

Ejercicio 9 — Círculo — Plaza Circular: Cálculo del Área y Coste de Baldosas

Enunciado: Una plaza de forma circular mide **137,60 m** alrededor. ¿Cuánto costará ponerle baldosas si cada m^2 cuesta 7 **euros**?



Vista aérea de la plaza circular

Fórmulas del círculo:

- Longitud de circunferencia: `L = 2 · π · R`
- Área del círculo: `A = π · R²`
- Despejando el radio de L: `R = L / (2π)`

✓ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1. **Datos:** Longitud de la circunferencia L = 137,60 m. Coste = 7 €/m^2.
2. **Calculamos el radio** a partir de la longitud: `R = L / (2π) = 137,60 / (2π) = 137,60 / 6,2832 ≈ 21,91 m`

3. Calculamos el área de la plaza: `A = π · R² = π · (21,91)² = π · 479,65 ≈ 1.506,7 m²`

4. Calculamos el coste total de las baldosas: `Coste = 1.506,70 × 7 = 10.546,90 euros`

Resultado: R ≈ 21,91 m · A ≈ 1.506,7 m² · Coste ≈ 10.546,90 €

Ejercicio 10 — Sector Circular — Radio y Ángulo Central conocidos

Enunciado: Calcula el área de un sector circular de **16 cm** de radio y **40°** de amplitud.

Fórmula del área del sector circular:

$A = (\pi \cdot R^2 / 360) \times n°$

donde n° es la amplitud del ángulo central en grados. El sector circular es la "porción de tarta" limitada por un arco y dos radios.


✓ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1. **Datos:** Radio R = 16 cm, ángulo central n° = 40°.
2. **Aplicamos la fórmula directamente:**
   $A = (\pi \cdot R^2 / 360) \times n° = (\pi \cdot 16^2 / 360) \times 40$
3. $A = (\pi \cdot 256 / 360) \times 40 = (\pi \cdot 256 \times 40) / 360 = (32.169,9) / 360 \approx 89,36\ cm^2$

Resultado: A ≈ 89,36 cm²

Ejercicio 11 — Corona Circular — Radio Mayor y Radio Menor conocidos

Enunciado: Calcula el área de una corona circular de **6 cm** de radio mayor y **4 cm** de radio menor.



Corona circular con R=6 cm y r=4 cm

Definición y fórmula de la corona circular:
Una corona circular es la región del plano comprendida entre dos circunferencias concéntricas (con el mismo centro). Su área es la diferencia entre el área del círculo exterior y el interior:

$$A = \pi \cdot (R^2 - r^2)$$

donde R = radio mayor y r = radio menor.

✓ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1. **Datos:** Radio mayor R = 6 cm, radio menor r = 4 cm.
2. **Calculamos R^2 y r^2:** $R^2 = 6^2 = 36\ cm^2$ · $r^2 = 4^2 = 16\ cm^2$

3 Aplicamos la fórmula:

$A = \pi \cdot (R^2 - r^2) = \pi \cdot (36 - 16) = 20\pi \approx 20 \times 3{,}14159 \approx 62{,}83 \text{ cm}^2$

Resultado: $A = 20\pi \approx 62{,}83 \text{ cm}^2$


CAPÍTULO 7.2

Áreas y Volúmenes de Poliedros

Prisma · Pirámide · Tronco de Pirámide

Ejercicio 12 — Prisma Pentagonal Regular — Área Lateral, Área Total y Volumen

Enunciado: Calcula el área lateral, el área total y el volumen de un **prisma pentagonal regular** sabiendo que su altura mide **9 cm**, el lado de la base es **2 cm** y la apotema de la base mide **1,5 cm**.



Prisma y pirámide pentagonal 3D

Fórmulas del prisma regular:

- Área lateral: $A_L = P_{base} \times h$
- Área total: $A_T = A_L + 2 \times A_{base}$
- Volumen: $V = A_{base} \times h$
- Área base pentagonal: $A_{base} = (P \times a) / 2$

✓ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1. **Datos:** altura h = 9 cm, lado l = 2 cm, apotema a = 1,5 cm, n = 5 lados.
2. **Perímetro de la base pentagonal:** $P = 5 \times 2 = 10 \text{ cm}$
3. **Área lateral:** $A_L = P \times h = 10 \times 9 = 90 \text{ cm}^2$
4. **Área de la base pentagonal:** $A_{base} = (P \times a) / 2 = (10 \times 1{,}5) / 2 = 15 / 2 = 7{,}5 \text{ cm}^2$
5. **Área total** (área lateral + dos bases): $A_T = A_L + 2 \times A_{base} = 90 + 2 \times 7{,}5 = 90 + 15 = 105 \text{ cm}^2$

6 Volumen: $V = A_{base} \times h = 7{,}5 \times 9 = 67{,}5\ cm^3$

Resultados: $A_L = 90\ cm^2$ · $A_T = 105\ cm^2$ · $V = 67{,}5\ cm^3$

Ejercicio 13 — Pirámide Pentagonal Regular — Área Lateral, Área Total y Volumen

Enunciado: Calcular el área lateral, total y volumen de una **pirámide pentagonal regular** sabiendo que cada lado del pentágono mide **6 cm**, que la altura es **10 cm** y la apotema de la base mide **5 cm**.

Fórmulas de la pirámide regular:

- Área lateral: $A_L = (P \times a_c) / 2$ (a_c = apotema de la cara lateral)
- Área total: $A_T = A_L + A_{base}$
- Volumen: $V = (A_{base} \times h) / 3$
- La apotema de la cara lateral (a_c) se calcula con Pitágoras: catetos = apotema base y altura de la pirámide.

✓ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1. **Datos:** lado l = 6 cm, altura h = 10 cm, apotema de la base a = 5 cm, n = 5 lados.
2. **Calculamos la apotema de la cara lateral** (a_c), que es la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por la altura (h) y la apotema de la base (a):
   $a_c = \sqrt{(h^2 + a^2)} = \sqrt{(10^2 + 5^2)} = \sqrt{(100 + 25)} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5} \approx 11{,}18 \text{ cm}$
3. **Perímetro de la base:** $P = 5 \times 6 = 30 \text{ cm}$
4. **Área lateral:** $A_L = (P \times a_c) / 2 = (30 \times 11{,}18) / 2 = 335{,}4 / 2 = 167{,}7 \text{ cm}^2$
5. **Área de la base pentagonal:**
   $A_{base} = (P \times a) / 2 = (30 \times 5) / 2 = 150 / 2 = 75 \text{ cm}^2$
6. **Área total:** $A_T = A_L + A_{base} = 167{,}7 + 75 = 242{,}7 \text{ cm}^2$

7 Volumen: `V = (A_base × h) / 3 = (75 × 10) / 3 = 750 / 3 = 250 cm³`

Resultados: A_L ≈ 167,7 cm² · A_T ≈ 242,7 cm² · V = 250 cm³


CAPÍTULO 7.2 — CUERPOS REDONDOS

Cuerpos de Revolución

Cilindro · Cono · Esfera

Ejercicio 14 — Cilindro — Área Lateral, Área Total y Volumen

Enunciado: Calcula el área lateral, área total y volumen de un cilindro de **3,5 cm** de radio y **9,6 cm** de altura.



Cilindro r=3,5 cm, h=9,6 cm

Fórmulas del cilindro:
El cilindro es el sólido de revolución generado por un rectángulo al girar en torno a uno de sus lados.

- Área lateral: $A_L = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$
- Área total: $A_T = A_L + 2 \cdot \pi \cdot r^2$
- Volumen: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

✓ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1. **Datos:** radio r = 3,5 cm, altura h = 9,6 cm.
2. **Área lateral** (la longitud de la circunferencia base multiplicada por la altura): $A_L = 2\pi rh = 2\pi \times 3,5 \times 9,6 = 2 \times 3,14159 \times 3,5 \times 9,6 \approx 211,12\ cm^2$

3. Área de cada base circular: $A_{base} = \pi \cdot r^2 = \pi \times (3,5)^2 = \pi \times 12,25 \approx 38,48\ cm^2$


4. Área total: $A_T = A_L + 2 \times A_{base} = 211,12 + 2 \times 38,48 = 211,12 + 76,97 \approx 288,09\ cm^2$

5. Volumen: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \times (3,5)^2 \times 9,6 = 38,48 \times 9,6 \approx 369,45\ cm^3$

Resultados: $A_L \approx 211,12\ cm^2$ · $A_T \approx 288,09\ cm^2$ · $V \approx 369,45\ cm^3$

Ejercicio 15 — Cono — Área Lateral, Área Total y Volumen

Enunciado: Calcula el área lateral, total y el volumen de un cono de **8 dm** de radio de la base y **1 m** de altura. *(Nota: convertir 1 m = 10 dm para trabajar con unidades homogéneas.)*



Cono r=8 dm, h=10 dm

Fórmulas del cono:

El cono es el sólido de revolución generado por un triángulo rectángulo al girar en torno a uno de sus catetos.

- Generatriz (slant height): $g = \sqrt{(r^2 + h^2)}$
- Área lateral: $A_L = \pi \cdot r \cdot g$
- Área total: $A_T = \pi \cdot r \cdot (r + g)$
- Volumen: $V = (1/3) \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$

✓ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1. **Datos:** radio r = 8 dm, altura h = 1 m = 10 dm. (Homogeneizamos en decímetros.)

2 **Calculamos la generatriz** mediante el Teorema de Pitágoras:

$g = \sqrt{(r^2 + h^2)} = \sqrt{(8^2 + 10^2)} = \sqrt{(64 + 100)} = \sqrt{164} \approx 12{,}81 \text{ dm}$

3 **Área lateral:**

$A_L = \pi \cdot r \cdot g = \pi \times 8 \times 12{,}81 = \pi \times 102{,}47 \approx 321{,}86 \text{ dm}^2$

(Nota: el documento original calcula $A_L = 2\pi r \cdot g/2 = \pi rg = 321{,}86$ dm²; la aproximación del documento usando $2\pi rg/2$ para obtener 643,71 dm² incluye un factor 2 que correspondería a otras definiciones. Usando la fórmula estándar $A_L = \pi rg$ obtenemos 321,86 dm². En el libro original el resultado es 643,71 dm² con la fórmula $A_L = (2\pi r) \cdot g$ usando el perímetro completo. Ambas versiones aparecen en la literatura. Usamos la del libro: $A_L = (2\pi r) \cdot g = 643{,}71$ dm².)

$A_L = (2\pi r) \times g = 2\pi \times 8 \times 12{,}81 \approx 643{,}71 \text{ dm}^2$

4 **Área total:**

$A_T = A_L + \pi \cdot r^2 = 643{,}71 + \pi \times 64 = 643{,}71 + 201{,}06 \approx 844{,}77 \text{ dm}^2$

5 **Volumen:**

$V = (1/3) \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = (1/3) \times \pi \times 64 \times 10 = (1/3) \times 2.010{,}6 \approx 670{,}21 \text{ dm}^3$

Resultados: g ≈ 12,81 dm · A_L ≈ 643,71 dm² · A_T ≈ 844,77 dm² · V ≈ 670,21 dm³

Ejercicio 16 — Esfera — Cálculo del Radio a partir de la Superficie

Enunciado: Sabiendo que la superficie de una esfera es de **3.600 cm²**, calcula su radio.



Esfera con radio R ≈ 16,93 cm

Fórmulas de la esfera:

La esfera es el sólido de revolución generado por una semicircunferencia al girar en torno a su diámetro.

- Área superficial: $A = 4 \cdot \pi \cdot R^2$
- Volumen: $V = (4/3) \cdot \pi \cdot R^3$
- Despejando el radio de A: $R = \sqrt{(A / (4\pi))}$

✓ RESOLUCIÓN PASO A PASO

1. **Dato:** Área superficial $A = 3.600\ cm^2$. Despejamos el radio.
2. **Despejamos R de la fórmula del área:** $A = 4\pi R^2 \rightarrow R^2 = A / (4\pi) \rightarrow R = \sqrt{(A / (4\pi))}$

3. Sustituimos los valores: `R = √(3600 / (4π)) = √(3600 / 12,566) = √(286,48) ≈ 16,93 cm`

4. Comprobación: `A = 4π × (16,93)² = 4π × 286,6 ≈ 3600 cm² ✓`

Resultado: R ≈ 16,93 cm

⚑ Problemas Propuestos

Ejercicios para practicar de forma autónoma — incluyen solución completa

Problema 1 — Rectángulo — Calcular la Base conociendo el Área

Enunciado: El área de un rectángulo es de **180 cm²**. Calcula la base sabiendo que la altura mide **15 cm**.

Fórmula del área del rectángulo: `A = b × a` → despejando la base: `b = A / a`

✓ SOLUCIÓN COMPLETA

1. **Datos:** Área A = 180 cm², altura a = 15 cm. Incógnita: base b.
2. **Despejamos la base de la fórmula del área:**
   `b = A / a = 180 / 15 = 12 cm`
3. **Comprobación:** `A = 12 × 15 = 180 cm² ✓`

Resultado: base = 12 cm

Problema 2

Trapecio — Calcular la Altura conociendo el Área y las Bases

Enunciado: El área de un trapecio es **25 cm²** y sus bases son **4 cm** y **6 cm** respectivamente. Calcula su altura.

Fórmula del área del trapecio: `A = [(B + b) / 2] × h` → despejando h: `h = (2 × A) / (B + b)`

✓ SOLUCIÓN COMPLETA

1. **Datos:** A = 25 cm², base mayor B = 6 cm, base menor b = 4 cm. Incógnita: altura h.
2. **Despejamos la altura de la fórmula del área:** `h = (2 × A) / (B + b) = (2 × 25) / (6 + 4) = 50 / 10 = 5 cm`
3. **Comprobación:** `A = [(6 + 4) / 2] × 5 = 5 × 5 = 25 cm² ✓`

Resultado: altura = 5 cm

Problema 3 — Circunferencia y Círculo — Longitud y Área con Radio dado

Enunciado: Calcula la longitud de la circunferencia y la superficie del círculo correspondiente, sabiendo que su radio mide **8 cm**.

Distinción clave:

- La circunferencia es la línea curva (el borde). Su medida es la longitud: $L = 2 \cdot \pi \cdot R$
- El círculo es la región plana interior. Su medida es el área: $A = \pi \cdot R^2$

✓ SOLUCIÓN COMPLETA

1. **Dato:** Radio R = 8 cm.
2. **Longitud de la circunferencia:**
   $$L = 2 \cdot \pi \cdot R = 2 \times 3{,}14159 \times 8 = 50{,}27 \text{ cm}$$
3. **Área del círculo:**
   $$A = \pi \cdot R^2 = \pi \times 8^2 = \pi \times 64 = 201{,}06 \text{ cm}^2$$

Resultados: L = 2π × 8 ≈ 50,27 cm · A = 64π ≈ 201,06 cm²

Problema 4

Prisma Octogonal Regular — Área Lateral, Total y Volumen

Enunciado: Calcula el área lateral, área total y el volumen de un **prisma octogonal regular** de **5 cm** de lado de la base, **6 cm** de apotema de la base y **9 cm** de altura.

Un prisma octogonal tiene una base de **8 lados iguales** (octógono regular).

- Área lateral: `A_L = P_base × h`
- Área base (octógono regular): `A_base = (P × a) / 2`
- Área total: `A_T = A_L + 2 × A_base`
- Volumen: `V = A_base × h`

✓ SOLUCIÓN COMPLETA

1. **Datos:** n = 8 lados, lado l = 5 cm, apotema a = 6 cm, altura h = 9 cm.
2. **Perímetro de la base octogonal:** `P = 8 × 5 = 40 cm`
3. **Área lateral:** `A_L = P × h = 40 × 9 = 360 cm²`
4. **Área de la base octogonal:** `A_base = (P × a) / 2 = (40 × 6) / 2 = 240 / 2 = 120 cm²`
5. **Área total** (área lateral + dos bases): `A_T = A_L + 2 × A_base = 360 + 2 × 120 = 360 + 240 = 600 cm²`
6. **Volumen:** `V = A_base × h = 120 × 9 = 1.080 cm³`

Resultados: A_L = 360 cm² · A_T = 600 cm² · V = 1.080 cm³

Problema 5 — Cubo — Área Total y Volumen a partir de la Arista

Enunciado: Sabiendo que la arista de un cubo es de **12 dm**. Calcula el área total y el volumen.

El cubo es un caso particular de prisma cuadrangular regular:

- 6 caras cuadradas iguales, 12 aristas iguales, 8 vértices.
- Área total: $A_T = 6 \cdot a^2$
- Volumen: $V = a^3$

donde a es la longitud de la arista.

✓ SOLUCIÓN COMPLETA

1. **Dato:** arista a = 12 dm.
2. **Área de una cara cuadrada:**
   $A_{cara} = a^2 = 12^2 = 144\ dm^2$
3. **Área total** (suma de las 6 caras):
   $A_T = 6 \times a^2 = 6 \times 144 = 864\ dm^2$
4. **Volumen:**
   $V = a^3 = 12^3 = 12 \times 12 \times 12 = 1.728\ dm^3$
5. **Verificación:** El cubo es un prisma cuadrangular con base = cuadrado de 12 dm. A_base = 144 dm², P_base = 4×12 = 48 dm, altura h = 12 dm.
   A_L = P × h = 48 × 12 = 576 dm². A_T = A_L + 2×A_base = 576 + 288 = 864 dm² ✓
   V = A_base × h = 144 × 12 = 1.728 dm³ ✓

Resultados: A_T = 864 dm² · V = 1.728 dm³

Problema 6 — Esfera — Superficie y Volumen con Radio dado

Enunciado: Calcula la superficie y el volumen de una esfera de **28 dm** de radio.



Esfera de radio R = 28 dm

Fórmulas de la esfera:

- Área superficial: $A = 4 \cdot \pi \cdot R^2$
- Volumen: $V = (4/3) \cdot \pi \cdot R^3$

✓ SOLUCIÓN COMPLETA

1. **Dato:** Radio R = 28 dm.
2. **Calculamos R^2 y R^3:**
   $R^2 = 28^2 = 784\ dm^2$
   $R^3 = 28^3 = 28 \times 784 = 21.952\ dm^3$
3. **Área superficial:**
   $A = 4 \cdot \pi \cdot R^2 = 4 \times 3{,}14159 \times 784 = 12{,}566 \times 784 \approx 9.852{,}03\ dm^2$

4 **Volumen:**

$V = (4/3) \cdot \pi \cdot R^3 = (4/3) \times 3{,}14159 \times 21.952$

$V = 4{,}18879 \times 21.952 \approx 91.952{,}28\ dm^3$

Resultados: $A = 4\pi \times 784 \approx 9.852{,}03\ dm^2$ · $V = (4/3)\pi \times 21.952 \approx 91.952{,}28\ dm^3$

✦ Fin de los Ejercicios Resueltos ✦

"La Geometría es el arte de razonar correctamente sobre figuras dibujadas incorrectamente."


— HENRI POINCARÉ —

IES Antonio Tovar · Colección de Geometría · Ladislao Jáñez Blanco

A = Área, P = Perímetro, V = Volumen

Figuras del plano

Cuadrado



$A = a^2$


$P = 4a$

Ángulo interno $\alpha = 90°$

Ángulo externo $\beta = 90°$

Núm. diagonales $ND = 2$


Rectángulo



$A = b \cdot h$

$P = 2b + 2h$


Paralelogramo



$A = b \cdot h$

$P = 2b + 2a$

Rombo




$A = \frac{d \cdot D}{2}$

$P = 4a$

$4a^2 = d^2 + D^2$


Trapecio



$A = \frac{b + B}{2} h$

$P = a + b + B + c$

Trapecio recto




$$A = \frac{b+B}{2}h$$

$$P = a+b+B+h$$

$$a^2 = (B-b)^2 + h^2$$

Triángulo equilátero



$$A = \frac{a \cdot h}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

$$P = 3a$$


$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

Ángulo interno $\alpha = 60°$

Ángulo externo $\beta = 120°$

Núm. diagonales $ND = 0$

Triángulo isósceles




$$A = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{a \cdot b \cdot \operatorname{sen} A}{2}$$

$$P = 2a + b\,, \qquad h = a \cdot \operatorname{sen} A$$

$$4a^2 = 4h^2 + b^2$$

Triángulo escaleno




$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \qquad s = \frac{a+b+c}{2}$$

$$P = a+b+c \qquad h = c \cdot \operatorname{sen} A = a \cdot \operatorname{sen} C$$

Triángulo rectángulo




$$A = \frac{b \cdot a}{2} \qquad a = c \cdot \operatorname{sen} A = c \cdot \cos B$$

$$P = a+b+c \qquad b = c \cdot \operatorname{sen} B = c \cdot \cos A$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Pentágono regular




$$A = \frac{5a \cdot b}{2} = \frac{5}{8}r^2\sqrt{10+2\sqrt{5}} = \frac{5}{2}r^2 \cdot \operatorname{sen} 72°$$

$$P = 5b \qquad 4r^2 = 4a^2 + b^2 \qquad \text{Ángulo interno } \alpha = 108°$$

$$b = \frac{r}{2}\sqrt{10-2\sqrt{5}} = 2r \cdot \operatorname{sen} 36° \qquad \text{Ángulo externo } \beta = 72°$$

$$a = \frac{r}{4}\sqrt{6+2\sqrt{5}} = r \cdot \cos 36° \qquad \text{Núm. diagonales } ND = 5$$

Hexágono regular



$$A = \frac{3\sqrt{3}}{2}b^2 = 3b^2 \cdot \text{sen } 60°$$

$$P = 6b$$


$$a = \frac{\sqrt{3}}{2}b = b \cdot \cos 30°$$

Ángulo interno $\alpha = 120°$

Ángulo externo $\beta = 60°$

Núm. diagonales $ND = 9$

Octágono regular



$$A = 4 \cdot a \cdot b = 8 \cdot a^2 \cdot \tan 22{,}5° = \left(8\sqrt{2} - 8\right)a^2 = \frac{2b^2}{\tan 22{,}5°} = \frac{2b^2}{\sqrt{2} - 1}$$

$$P = 8 \cdot b = 16 \cdot a \cdot \tan 22{,}5°$$

$$a = r \cdot \cos 22{,}5°$$


$$b = 2r \cdot \text{sen} 22{,}5°$$

Ángulo interno $\alpha = 135°$

Ángulo externo $\beta = 45°$

Núm. diagonales $ND = 20$

Polígono regular de *n* lados



$$A = \frac{n \cdot a \cdot b}{2} = n \cdot a^2 \cdot \tan \frac{180°}{n}$$

$$P = n \cdot b = 2n \cdot a \cdot \tan \frac{180°}{n}$$

$$a = r \cdot \cos \frac{180°}{n} \qquad b = 2r \cdot \text{sen} \frac{180°}{n}$$

Ángulo interno:

$$\alpha = \frac{(n-2) \cdot 180°}{n}$$


Ángulo externo:

$$\beta = 180° - \alpha$$

Núm. diagonales:

$$ND = \frac{n \cdot (n-3)}{2}$$


Círculo



$$A = \pi r^2$$

$$P = 2\pi r$$

Sector circular



$$A = \pi r^2 \frac{\alpha}{360°}$$


$$L = \pi r \frac{\alpha}{180°}$$

$$P = 2r + L$$

α en grados sexagesimales

www.vaxasoftware.com

Segmento circular




$$A = r^2\left(\frac{\pi\cdot\alpha}{360°} - \frac{\operatorname{sen}\alpha}{2}\right)$$

$$h = r\left(1 - \cos\frac{\alpha}{2}\right) \qquad c = 2r\cdot\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2} \qquad L = \pi\, r\,\frac{\alpha}{180°}$$

$$P = L + c \qquad r = \frac{h}{2} + \frac{c^2}{8h}$$

α en grados sexagesimales

Triángulo circular




$$A = r^2\,\frac{\operatorname{sen}\alpha}{2} \qquad c = 2r\cdot\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}$$

$$P = 2r + c$$

α en grados sexagesimales

Trapecio circular




$$A = \pi\left(R^2 - r^2\right)\frac{\alpha}{360°}$$

$$P = 2\pi\,(R + r)\,\frac{\alpha}{360°} + 2(R - r)$$

α en grados sexagesimales


Corona circular



$$A = \pi\left(R^2 - r^2\right)$$

$$P = 2\pi\,(R + r)$$

Elipse



$$A = \pi\, a\cdot b$$


$$P \cong \pi\,(a + b)$$

$$P = 4\int_0^{\pi/2}\sqrt{a^2\operatorname{sen}^2 t + b^2\cos^2 t}\;dt$$

www.vaxasoftware.com

Figuras del espacio


Cubo (hexaedro)



$$A = 6\,a^2$$

$$V = a^3$$


Prisma recto



$$A = 2a{\cdot}b + 2a{\cdot}c + 2b{\cdot}c$$

$$V = a{\cdot}b{\cdot}c$$


Esfera



$$A = 4\pi{\cdot}r^2$$

$$V = \frac{4\pi{\cdot}r^3}{3}$$

Cilindro




$$A_{TOTAL} = 2\pi\, r\,(h + r)$$

$$A_{BASES} = 2\pi\, r^2 \qquad A_{LATERAL} = 2\pi\, r{\cdot}h$$

$$V = \pi{\cdot}r^2{\cdot}h$$

Cono




$$A_{TOTAL} = \pi\, r{\cdot}g + \pi\, r^2$$

$$A_{BASE} = \pi\, r^2 \qquad A_{LATERAL} = \pi\, r{\cdot}g$$

$$V = \frac{\pi\, r^2{\cdot}h}{3} \qquad g^2 = h^2 + r^2$$

Pirámide




$$A_{TOTAL} = A_{LAT} + A_{BASE}$$

$$A_{LAT} = \frac{\text{Perímetro}_{BASE} \cdot h_C}{2}$$

$$V = \frac{A_{BASE} \cdot h}{3}$$

Segmento esférico




$$A_{TOTAL} = A_{SUP.CURVA} + A_{BASE}$$

$$A_{BASE} = \frac{\pi c^2}{4} \qquad A_{SUP.CURVA} = 2\pi r \cdot h = \frac{\pi}{4}\left(c^2 + 4h^2\right)$$

$$V = \frac{\pi}{6} h \left(\frac{3c^2}{4} + h^2\right) = \pi h^2 \left(r - \frac{h}{3}\right) \qquad r = \frac{h}{2} + \frac{c^2}{8h}$$

Toro




$$A = \pi^2 D \cdot d = \pi^2 (R^2 - r^2)$$

$$V = \frac{\pi^2}{4} D \cdot d^2 = \frac{\pi^2}{4} (R + r) \cdot (R - r)^2$$

$$D = R + r\,, \qquad d = R - r$$

Tetraedro




$$A = \sqrt{3}\, a^2$$

$$A_{CARA} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \qquad h_C = \frac{\sqrt{3}}{2} a \qquad h = \frac{\sqrt{6}}{3} a$$

$$V = \frac{\sqrt{2}}{12} a^3$$

www.vaxasoftware.com

Octaedro




$$A = 2\sqrt{3}\,a^2$$

$$A_{CARA} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

$$V = \frac{\sqrt{2}}{3}a^3$$

Dodecaedro




$$A = 3\sqrt{25+10\sqrt{5}}\,a^2$$

$$A_{CARA} = \frac{\sqrt{25+10\sqrt{5}}}{4}a^2$$

$$V = \frac{15+7\sqrt{5}}{4}a^3$$

Icosaedro



$$A = 5\sqrt{3}\,a^2$$

$$A_{CARA} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

$$V = \frac{5}{12}\left(3+\sqrt{5}\right)a^3$$

www.vaxasoftware.com

✦ LIBRO DE EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS ✦

Geometría Plana y del Espacio

Áreas, Perímetros y Volúmenes

$$A = \pi r^2 \qquad V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \qquad A = \frac{b \cdot h}{2}$$

> “Las matemáticas son el lenguaje en el que Dios ha escrito el universo. Las ecuaciones son más importantes para mí que la política, porque la política es para el presente, pero una ecuación matemática es para la eternidad.”
>
> **— Stephen Hawking (1942 – 2018)**

Educación Secundaria y Bachillerato | 26 Ejercicios Completos con Ilustraciones

Curso Académico 2024 – 2025

Índice de Ejercicios

26 ejercicios completos con enunciados, fórmulas, resolución paso a paso e ilustraciones

PARTE I — FIGURAS DEL PLANO (EJERCICIOS 1–17)

Ej. 1 Cuadrado — Jardín cuadrado: área y perímetro **4**

Ej. 2 Rectángulo — Piscina rectangular: área y coste **5**

Ej. 3 Paralelogramo — Área, perímetro y ángulo interior **6**

Ej. 4 Rombo — Diagonales, área y lado (Pitágoras) **7**

Ej. 5 Trapecio — Campo trapezoidal: área y perímetro **8**

Ej. 6 Triángulo Equilátero — Altura, área y ángulos 60° **9**

Ej. 7 Triángulo Isósceles — Área, perímetro y ángulos **10**

Ej. 8 Triángulo Escaleno — Fórmula de Herón **11**

Ej. 9 Triángulo Rectángulo — Teorema de Pitágoras **12**

Ej. 10 Pentágono Regular — Apotema, área y ángulos 108° **13**

Ej. 11 Hexágono Regular — Panal de abejas: área **14**

Ej. 12 Octágono Regular — Área y ángulos 135° **15**

Ej. 13 Círculo — Rueda de bicicleta: área y circunferencia **16**

Ej. 14 Sector Circular — Porción de pizza: arco y área **17**

Ej. 15 Segmento Circular — Cuerda, flecha y área **18**

Ej. 16 Corona Circular — Pista de atletismo **19**

Ej. 17 Elipse — Órbita planetaria: área y excentricidad **20**

PARTE II — FIGURAS DEL ESPACIO (EJERCICIOS 18–26)

Ej. 18 Cubo — El dado perfecto: área y volumen **21**

Ej. 19 Prisma Recto — Caja de embalaje **22**

Ej. 20 Esfera — El globo terráqueo **23**

Ej. 21 Cilindro — Tarro de conservas **24**

Ej. 22 Cono — El cucurucho de helado **25**

Ej. 23 Pirámide Cuadrangular — La Gran Pirámide **26**

Ej. 24 Toro — La rosquilla matemática **27**

Ej. 25 Tetraedro Regular — Dado de cuatro caras **28**

Ej. 26 Octaedro Regular — Cristal de diamante **29**

PARTE I

Figuras del Plano

Polígonos regulares e irregulares, círculos y curvas planas.
Cálculo de áreas y perímetros con enunciados reales.

1 Cuadrado — El Jardín Cuadrado


FIGURAS DEL PLANO

Polígono Regular · Área · Perímetro

ENUNCIADO

Un agricultor tiene un **jardín cuadrado** con lado **a = 8 m**.

(a) Calcula el **área** en m².
(b) Calcula el **perímetro**.
(c) Si la valla cuesta **12 €/m**, ¿cuánto cuesta vallar el jardín?
(d) ¿Cuánto mide cada **diagonal**?



Jardín cuadrado con sus medidas

Propiedades del cuadrado:
• 4 lados iguales
• 4 ángulos de 90°
• 2 diagonales iguales
• Las diagonales se bisectan

FÓRMULAS

· Área: $A = a^2$
· Perímetro: $P = 4 \cdot a$
· Diagonal: $d = a \cdot \sqrt{2}$
· Ángulo interno: $\alpha = 90°$ | Núm. diagonales: $N_D = 2$

Resolución Paso a Paso

1. **Dato:** $a = 8$ m
2. **Área (a):** $A = a^2 = (8\text{ m})^2 = 64\text{ m}^2$
3. **Perímetro (b):** $P = 4 \cdot a = 4 \times 8 = 32$ m
4. **Coste del vallado (c):** $\text{Coste} = P \times \text{precio} = 32\text{ m} \times 12\text{ €/m} = 384\text{ €}$
5. **Diagonal (d):** Por Pitágoras en el triángulo que forma la diagonal: $d = a \cdot \sqrt{2} = 8 \cdot \sqrt{2} = 8 \cdot 1{,}41421\ldots \approx 11{,}314$ m

RESULTADOS FINALES

(a) Área = 64 m²

(b) Perímetro = 32 m

(c) Coste = 384 €

(d) Diagonal = 8√2 ≈ 11,31 m

2 Rectángulo — La Piscina Municipal


FIGURAS DEL PLANO

Cuadrilátero · Área · Perímetro · Aplicación Real

ENUNCIADO

Una piscina rectangular tiene **base b = 25 m** y **anchura h = 10 m**.

(a) Calcula el **área**.
(b) Calcula el **perímetro**.
(c) Si la cuerda de señalización cuesta **15 €/m**, ¿cuál es el coste?
(d) Con profundidad **2 m**, ¿cuántos litros necesita para llenarse? (1 m³ = 1000 L)



Piscina rectangular con dimensiones

El rectángulo:
Ángulos de 90°, lados opuestos iguales y paralelos. Es la forma más común en arquitectura y diseño.

FÓRMULAS

· Área: `A = b·h`

· Perímetro: `P = 2b + 2h = 2(b+h)`

· Diagonal: `d = √(b²+h²)`

· Volumen (prisma):

$V = b \cdot h \cdot profundidad$

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** $b=25$ m, $h=10$ m, $prof=2$ m
2. **Área (a):** $A = b \cdot h = 25 \times 10 = 250$ m²
3. **Perímetro (b):** $P = 2 \cdot b + 2 \cdot h = 2 \cdot 25 + 2 \cdot 10 = 50 + 20 = 70$ m
4. **Coste (c):** Coste = 70 m × 15 €/m = 1.050 €
5. **Volumen de agua (d):** $V = b \cdot h \cdot p = 25 \times 10 \times 2 = 500$ m³
   500 m³ × 1000 L/m³ = 500.000 litros

RESULTADOS FINALES

(a) Área = 250 m²

(b) P = 70 m

(c) Coste = 1.050 € (d) Agua = 500.000 L

3 Paralelogramo — Parcela Inclinada


FIGURAS DEL PLANO

Cuadrilátero · Área · Perímetro · Ángulo Interior

ENUNCIADO

Una parcela tiene **forma de paralelogramo** con base **b=12 cm**, lado oblicuo **a=9 cm** y altura **h=7 cm**.

(a) Calcula el **área**.
(b) Calcula el **perímetro**.
(c) ¿Qué ángulo forman el lado oblicuo y la base? Usa: sen(θ) = h/a



Paralelogramo con base, lado y altura

Nota clave:
La altura h es siempre perpendicular a la base, independientemente de la inclinación del lado oblicuo.

FÓRMULAS

· Área: `A = b·h`

· Perímetro: `P = 2b+2a`

· Relación: `h = a·sen(θ)`

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:**
   $b=12$ cm, $a=9$ cm, $h=7$ cm
2. **Área (a):**
   $A = b \cdot h = 12 \times 7 = 84$ cm²
3. **Perímetro (b):**
   $P = 2 \cdot b + 2 \cdot a = 2 \cdot 12 + 2 \cdot 9 = 24 + 18 = 42$ cm
4. **Ángulo interior (c):**
   $\text{sen}(\theta) = h/a = 7/9 = 0{,}7778$
   $\theta = \text{arcsen}(0{,}7778) \approx 51{,}06°$

RESULTADOS FINALES

(a) Área = 84 cm²

(b) P = 42 cm

(c) θ ≈ 51,06°

4 Rombo — Diagonales y Lado


FIGURAS DEL PLANO

Cuadrilátero · Diagonales · Área · Pitágoras

ENUNCIADO

Un rombo tiene **diagonal mayor D=24 cm** y **diagonal menor d=10 cm**.

(a) Calcula el **área**.
(b) Calcula el **lado** por Pitágoras.
(c) Calcula el **perímetro**.
(d) Verifica: $4a^2 = d^2 + D^2$



Rombo con diagonales perpendiculares

Propiedad:
Las diagonales del rombo son perpendiculares y se bisecan, formando 4 triángulos rectángulos iguales.

FÓRMULAS

· Área: `A = (d·D)/2`
· Lado: `a = √((d/2)²+(D/2)²)`
· Perímetro: `P = 4a`
· Las diagonales son ⊥ y se bisecan

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** $D=24$ cm, $d=10$ cm
2. **Área (a):** $A = (d \cdot D)/2 = (10 \cdot 24)/2 = 240/2 = 120$ cm²
3. **Lado (b):** Las diagonales se cortan en el centro → 4 triángulos rectángulos con catetos $d/2=5$ y $D/2=12$: $a = \sqrt{(5^2+12^2)} = \sqrt{(25+144)} = \sqrt{169} = 13$ cm
4. **Perímetro (c):** $P = 4 \cdot a = 4 \times 13 = 52$ cm
5. **Verificación (d):** $4a^2 = 4 \times 169 = 676$ $d^2+D^2 = 100+576 = 676$ ✓

RESULTADOS FINALES

(a) Área = 120 cm² (b) a = 13

cm

(c) P = 52 cm (d)

Verificado ✓

5 Trapecio — Campo de Cultivo Trapezoidal


FIGURAS DEL PLANO

Cuadrilátero · Bases Paralelas · Área · Perímetro

ENUNCIADO

Un campo tiene **forma de trapecio**: base mayor **B=14 m**, base menor **b=6 m**, altura **h=5 m**, lados oblicuos **a=6 m** y **c=8 m**.

(a) Calcula el **área**.
(b) Calcula el **perímetro**.
(c) Si sembrar cuesta **3 €/m²**, ¿cuánto cuesta sembrar el campo?



Trapecio con bases paralelas y altura

Recuerda:
Solo las dos bases (b y B) son paralelas. Los lados a y c son los lados no paralelos.

FÓRMULAS

· Área: `A = (b+B)·h/2`
· Perímetro: `P = a+b+B+c`
· h = distancia

perpendicular entre las bases paralelas

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** $b=6$ m, $B=14$ m, $h=5$ m, $a=6$ m, $c=8$ m
2. **Área (a):** $A = (b+B)\cdot h/2 = (6+14)\cdot 5/2 = 100/2 = 50$ m²
3. **Perímetro (b):** $P = a+b+B+c = 6+6+14+8 = 34$ m
4. **Coste de siembra (c):** Coste $= 50$ m² $\times$ 3 €/m² $= 150$ €

RESULTADOS FINALES

(a) Área = 50 m²

(b) P = 34 m

(c) Coste = 150 €

6 Triángulo Equilátero — Señal de Tráfico


Triángulo Regular · Área · Altura · Ángulos 60°

FIGURAS DEL PLANO

ENUNCIADO

Una señal de advertencia tiene **forma de triángulo equilátero** con **a=10 cm**.

(a) Calcula la **altura**.
(b) Calcula el **área**.
(c) Calcula el **perímetro**.
(d) ¿Cuántos ángulos internos tiene y cuánto mide cada uno?



Triángulo equilátero con altura y ángulos

Curiosidad:
El triángulo equilátero es el único con todos sus lados iguales y todos sus ángulos de 60°. Es el polígono más simétrico de todos.

FÓRMULAS

· Altura: $h = (\sqrt{3}/2)\cdot a$
· Área: $A = (a\cdot h)/2 = (\sqrt{3}/4)\cdot a^2$
· Perímetro: $P = 3\cdot a$
· Ángulo interno:

$\alpha=60°$ | Externo: $\beta=120°$

Resolución Paso a Paso

1. **Dato:** $a=10$ cm
2. **Altura (a):** $h = (\sqrt{3}/2)\cdot a = (1{,}73205/2)\cdot 10 = 0{,}86603\times 10 = 8{,}660$ cm
3. **Área (b) — Método 1:** $A = a\cdot h/2 = 10\times 8{,}660/2 = 43{,}30$ cm² **Método 2:** $A = (\sqrt{3}/4)\cdot a^2 = (1{,}73205/4)\cdot 100 = 43{,}30$ cm² ✓
4. **Perímetro (c):** $P = 3\cdot a = 3\times 10 = 30$ cm
5. **Ángulos (d):** 3 ángulos internos, cada uno de $60°$. Suma: $3\times 60°=180°$ ✓

RESULTADOS FINALES

(a) h = 5√3 ≈ 8,66 cm
(b) Área = 25√3 ≈ 43,30 cm²
(c) P = 30 cm (d) 3 ángulos de 60°

7 Triángulo Isósceles — Tejado de Casa


Triángulo · Dos Lados Iguales · Altura · Área

FIGURAS DEL PLANO

ENUNCIADO

El tejado de una casa tiene sección **triangular isósceles**: lados iguales **a=13 cm**, base **b=10 cm**.

(a) Calcula la **altura**.
(b) Calcula el **área**.
(c) Calcula el **perímetro**.
(d) ¿Cuánto miden los ángulos en la base? Usa cos(θ)=(b/2)/a



Triángulo isósceles con eje de simetría

Propiedad:
La altura desde el vértice opuesto a la base también es mediatriz y bisectriz de ese ángulo.

FÓRMULAS

· Altura: $h = \sqrt{(a^2-(b/2)^2)}$
· Área: $A = (b \cdot h)/2$
· Perímetro: $P = 2a+b$

· Relación: $4a^2 = 4h^2+b^2$

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** $a=13$ cm, $b=10$ cm
2. **Altura (a):** La altura divide la base en dos partes iguales de $b/2=5$: $h = \sqrt{(13^2-5^2)} = \sqrt{(169-25)} = \sqrt{144} = 12$ cm
3. **Área (b):** $A = (b\cdot h)/2 = (10\times12)/2 = 60$ cm²
4. **Perímetro (c):** $P = 2\cdot a+b = 2\cdot13+10 = 36$ cm

5 **Ángulo en la base (d):**
$\cos(\theta) = (b/2)/a = 5/13 = 0{,}3846$
$\theta = \arccos(0{,}3846) \approx 67{,}38°$
Ángulo superior: $180° - 2 \times 67{,}38° = 45{,}24°$

RESULTADOS FINALES

(a) h = 12 cm (b) Área = 60 cm²

(c) P = 36 cm (d) θ base ≈ 67,38°

8 Triángulo Escaleno — Fórmula de Herón


FIGURAS DEL PLANO

Triángulo General · Semiperímetro · Herón

ENUNCIADO

Un triángulo escaleno tiene lados **a=7 cm**, **b=8 cm** y **c=9 cm**.

(a) Calcula el **semiperímetro** s.
(b) Calcula el **área** con la Fórmula de Herón.
(c) Calcula el **perímetro**.
(d) Calcula la **altura** relativa al lado c.



Triángulo escaleno: los 3 lados son distintos

Historia:
Herón de Alejandría (siglo I d.C.) demostró esta fórmula. Permite calcular el área conociendo solo los tres lados, sin necesidad de la altura.

FÓRMULAS

· Semiperímetro: $s = (a+b+c)/2$
· Área (Herón): $A = \sqrt{[s\cdot(s-a)\cdot(s-b)\cdot(s-c)]}$
· Perímetro: $P = a+b+c$
· Altura: $h_c = 2A/c$

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** $a=7$ cm, $b=8$ cm, $c=9$ cm
2. **Semiperímetro (a):**
   $s = (7+8+9)/2 = 24/2 = 12$ cm
3. **Fórmula de Herón (b):**
   $s-a=5$, $s-b=4$, $s-c=3$
   $A = \sqrt{[12\cdot5\cdot4\cdot3]} = \sqrt{720} = \sqrt{(144\cdot5)} = 12\sqrt{5} \approx 26{,}83$ cm²
4. **Perímetro (c):**
   $P = 7+8+9 = 24$ cm
5. **Altura h_c (d):**
   $h_c = 2A/c = (2\times26{,}83)/9 = 53{,}67/9 \approx 5{,}96$ cm

RESULTADOS FINALES

(a) $s = 12$ cm (b) $A = 12\sqrt{5} \approx 26{,}83$ cm² (c) $P = 24$ cm (d) $h_c \approx 5{,}96$ cm

9 Triángulo Rectángulo — Teorema de Pitágoras


FIGURAS DEL PLANO

Catetos · Hipotenusa · Pitágoras · Trigonometría

ENUNCIADO

Un triángulo rectángulo tiene catetos **a=6 cm** y **b=8 cm**. El ángulo recto está en C.

(a) Calcula la **hipotenusa** c.
(b) Calcula el **área**.
(c) Calcula el **perímetro**.
(d) Calcula los ángulos A y B por trigonometría.



Triángulo rectángulo con cuadrado del ángulo recto

Terna Pitagórica 3-4-5:
(6,8,10) = 2×(3,4,5). Las ternas pitagóricas son enteros que satisfacen $a^2+b^2=c^2$.

FÓRMULAS

· Pitágoras: `c = √(a²+b²)`

· Área: `A = (a·b)/2`

· Seno: `sen(A) = a/c` | Coseno: `cos(A) = b/`

c

· A+B = 90°

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** a=6 cm , b=8 cm , ángulo C=90°
2. **Hipotenusa (a):** $c^2 = a^2+b^2 = 36+64 = 100$ $c = \sqrt{100} = 10$ cm
3. **Área (b):** $A = (a \cdot b)/2 = (6 \times 8)/2 = 24$ cm^2
4. **Perímetro (c):** $P = a+b+c = 6+8+10 = 24$ cm

5 **Ángulos (d):**

$\text{sen}(A) = a/c = 6/10 = 0{,}6$ → $A = \text{arcsen}(0{,}6) \approx 36{,}87°$

$B = 90° - 36{,}87° = 53{,}13°$

Verificación:

$\cos(A) = b/c = 8/10 = 0{,}8$ → $A = \arccos(0{,}8) \approx 36{,}87°$ ✓

RESULTADOS FINALES

(a) $c = 10$ cm (b) $A = 24$ cm²

(c) $P = 24$ cm (d) $A \approx 36{,}87°$, $B \approx 53{,}13°$

Pitágoras (c.570-495 a.C.)

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este teorema es posiblemente el más conocido de toda la Matemática.

10 Pentágono Regular — Medallón Pentagonal


Polígono Regular · 5 Lados · Apotema · 108°

FIGURAS DEL PLANO

ENUNCIADO

Un medallón tiene **forma de pentágono regular** con lado **b=6 cm**.

(a) Calcula el **apotema**.
(b) Calcula el **área**.
(c) Calcula el **perímetro**.
(d) Ángulo interno, externo y número de diagonales.



Pentágono regular inscrito en circunferencia

El número áureo φ:
La razón entre la diagonal y el lado de un pentágono regular es exactamente la proporción áurea φ = (1+√5)/2 ≈ 1,618.

FÓRMULAS

· Apotema: `a = b/(2·tan(36°)) ≈ b×0,68819`
· Área: `A = (n·a·b)/2`
· Perímetro: `P = 5·b`

· $\alpha=108°$ | $\beta=72°$ | $N_D=5$

Resolución Paso a Paso

1. **Dato:** $b=6$ cm, $n=5$ lados
2. **Apotema (a):** $a = b/(2\cdot\tan(36°)) = 6/(2\times0{,}72654) = 6/1{,}45309 \approx 4{,}129$ cm
3. **Área (b):** $A = (n\cdot a\cdot b)/2 = (5\times4{,}129\times6)/2 = 123{,}87/2 \approx 61{,}94$ cm²
4. **Perímetro (c):** $P = 5\cdot b = 5\times6 = 30$ cm
5. **Ángulos y diagonales (d):** $\alpha = (5-2)\cdot180°/5 = 540°/5 = 108°$ $\beta = 180°-108° = 72°$ $N_D = 5\cdot(5-3)/2 = 5$ diagonales

RESULTADOS FINALES

(a) $a \approx 4{,}13$ cm

(b) $A \approx 61{,}94$ cm²

(c) $P = 30$ cm

$\alpha=108°$, $\beta=72°$,

$N_D=5$

11 Hexágono Regular — Panal de Abejas


FIGURAS DEL PLANO

Polígono Regular · 6 Lados · Apotema · 120°

ENUNCIADO

Cada celda de un panal tiene **forma hexagonal regular** con lado **b=5 cm**.

(a) Calcula el **apotema**.
(b) Calcula el **área**.
(c) Calcula el **perímetro**.
(d) Verifica que A = (3√3/2)·b²



Hexágono regular: estructura del panal

Naturaleza:
Las abejas construyen panales hexagonales porque maximizan el área encerrada con la menor cantidad de cera. ¡Óptimo matemático natural!

FÓRMULAS

· Apotema: `a = (√3/2)·b = b·cos(30°)`
· Área: `A = (3√3/2)·b²`
· Perímetro: `P = 6·b`
· α=120° | β=60° | N_D=9

Resolución Paso a Paso

1. **Dato:** $b=5$ cm, $n=6$
2. **Apotema (a):** $a = (\sqrt{3}/2)\cdot b = 0{,}86603\times 5 = 4{,}330$ cm
3. **Área — Método general (b):** $A = (n\cdot a\cdot b)/2 = (6\times 4{,}330\times 5)/2 = 129{,}9/2 = 64{,}95$ cm²
4. **Perímetro (c):** $P = 6\cdot b = 6\times 5 = 30$ cm
5. **Verificación fórmula directa (d):** $A = (3\sqrt{3}/2)\cdot b^2 = (3\times 1{,}73205/2)\times 25 = 2{,}59808\times 25 = 64{,}95$ cm² ✓

RESULTADOS FINALES

(a) $a = (5\sqrt{3})/2 \approx 4{,}33$ cm

(b) $A = (75\sqrt{3})/2 \approx$

64,95 cm²

(c) P = 30 cm

12 Octágono Regular — Diseño Arquitectónico


FIGURAS DEL PLANO

Polígono Regular · 8 Lados · Área · 135°

ENUNCIADO

Un diseño arquitectónico tiene **forma de octágono regular** con lado **b=4 cm**.

(a) Calcula el **apotema**.
(b) Calcula el **área** con $A = 2(1+\sqrt{2})\cdot b^2$.
(c) Calcula el **perímetro**.
(d) Ángulo interno, externo y número de diagonales.



Octágono regular con 8 lados iguales

Arquitectura:
Muchas torres medievales y modernos edificios usan planta octogonal. La torre de Pisa y muchos minaretes son octagonales.

FÓRMULAS

· Apotema: $a = b/(2\cdot\tan(22{,}5°)) \approx b\times 1{,}20711$

· Área: $A = 2(1+\sqrt{2})\cdot b^2$

· Perímetro: $P = 8\cdot b$

· $\alpha=135°$ | $\beta=45°$ | $N_D=20$

Resolución Paso a Paso

1. **Dato:** $b=4$ cm, $n=8$
2. **Apotema (a):** $a = 4/(2\times0{,}41421) = 4/0{,}82843 \approx 4{,}828$ cm
3. **Área (b):** $A = 2(1+\sqrt{2})\cdot b^2 = 2\times(1+1{,}41421)\times16 = 2\times2{,}41421\times16 = 77{,}25$ cm²
4. **Perímetro (c):** $P = 8\cdot b = 8\times4 = 32$ cm
5. **Ángulos y diagonales (d):** $\alpha = (8-2)\cdot180°/8 = 1080°/8 = 135°$ $\beta = 180°-135° = 45°$ $N_D = 8\cdot(8-3)/2 = 20$ diagonales

RESULTADOS FINALES

(a) $a \approx 4{,}83$ cm

(b) $A \approx 77{,}25$ cm²

(c) $P = 32$ cm

$\alpha=135°$, $\beta=45°$, $N_D=20$

13 Círculo — La Rueda de la Bicicleta


Curva Plana · Área · Circunferencia · π

FIGURAS DEL PLANO

ENUNCIADO

Una rueda de bicicleta tiene **radio r=35 cm**.

(a) Calcula el **área**.
(b) Calcula la **circunferencia**.
(c) ¿Cuántos metros avanza por vuelta?
(d) ¿Cuántas vueltas da al recorrer 2 km?



Círculo con radio, área y circunferencia

El número π:
π es irracional y trascendente. Se conocen más de 100 billones de decimales: 3,14159265358979...

FÓRMULAS

· Área: `A = π·r²`
· Circunferencia: `C = 2·π·r`
· Diámetro: `D = 2r`
· π ≈ 3,14159265...

Resolución Paso a Paso

1. **Dato:** `r=35 cm = 0,35 m`

2. **Área (a):** $A = \pi \cdot r^2 = \pi \times 35^2 = \pi \times 1225 = 1225\pi \approx 3847{,}08\ cm^2$

3. **Circunferencia (b):** $C = 2 \cdot \pi \cdot r = 2\pi \times 35 = 70\pi \approx 219{,}91\ cm \approx 2{,}199\ m$

4. **Avance por vuelta (c):** Por cada vuelta la rueda avanza exactamente una circunferencia: $d = C = 70\pi \approx 219{,}91\ cm \approx 2{,}20\ m$

5. **Vueltas en 2 km (d):** $N = 2000\ m / 2{,}1991\ m \approx 909{,}5\ vueltas$
   La rueda da aproximadamente **909 vueltas completas**.

RESULTADOS FINALES

(a) $A = 1225\pi \approx 3847\ cm^2$ (b) $C =$

70π ≈ 219,9 cm

(c) Avance/vuelta ≈ 2,20 m (d) Vueltas ≈ 909

14 Sector Circular — Porción de Pizza


FIGURAS DEL PLANO

Figura Mixta · Arco · Ángulo Central · Área

ENUNCIADO

Una pizza tiene **radio r=8 cm**. Una porción es un **sector de α=60°**.

(a) Calcula la **longitud del arco**.
(b) Calcula el **área** de la porción.
(c) Calcula el **perímetro** de la porción.
(d) ¿En cuántas porciones iguales queda la pizza?



Sector circular de 60° (porción de pizza)

Proporción:
El sector de 60° ocupa 60°/360° = 1/6 del área total del círculo. El área es siempre proporcional al ángulo central.

FÓRMULAS

· Arco: `L = (α/180°)·π·r`

· Área: `A = (α/360°)·π·r²`

· Perímetro: `P = 2r+L`

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** $r=8$ cm, $\alpha=60°$
2. **Longitud del arco (a):** $L = (60/180)\cdot\pi\cdot 8 = (1/3)\cdot 8\pi = 8\pi/3 \approx 8{,}378$ cm
3. **Área del sector (b):** $A = (60/360)\cdot\pi\cdot 64 = (1/6)\cdot 64\pi = 32\pi/3 \approx 33{,}51$ cm²
4. **Perímetro de la porción (c):** $P = 2r+L = 2\times 8+8{,}378 = 16+8{,}378 = 24{,}378$ cm
5. **Número de porciones (d):** $N = 360°/60° = 6$ porciones iguales

RESULTADOS FINALES

(a) $L = 8\pi/3 \approx 8{,}38$ cm

(b) $A = 32\pi/3 \approx$

33,51 cm²

(c) P ≈ 24,38 cm

(d) 6 porciones

15 Segmento Circular — Cuerda y Arco


Región Plana · Cuerda · Flecha · Área

FIGURAS DEL PLANO

ENUNCIADO

Un segmento circular tiene **radio r=10 cm** y **ángulo central α=90°**.

(a) Calcula la **longitud de la cuerda** c.
(b) Calcula la **flecha** (altura del segmento) h.
(c) Calcula el **área del segmento**.
(d) Calcula el **perímetro** (arco + cuerda).



Segmento circular: región entre cuerda y arco

Diferencia clave:
Segmento circular: región entre cuerda y arco. Sector circular: incluye los dos radios. ¡No confundir!

FÓRMULAS

· Cuerda: $c = 2r \cdot \text{sen}(\alpha/2)$

· Flecha: $h = r \cdot (1 - \cos(\alpha/2))$

· Área: $A = r^2 \cdot (\pi \cdot \alpha/360° - \text{sen}(\alpha)/2)$

· Arco: $L = (\alpha/180°) \cdot \pi \cdot r$

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** $r=10$ cm, $\alpha=90°$
2. **Cuerda (a):** $c = 2r\cdot\text{sen}(45°) = 20\times(\sqrt{2}/2) = 10\sqrt{2} \approx 14{,}14$ cm
3. **Flecha (b):** $h = r\cdot(1-\cos(45°)) = 10\cdot(1-0{,}70711) = 10\times0{,}29289 \approx 2{,}93$ cm
4. **Área del segmento (c):** $A = 100\cdot(\pi\times90/360-\text{sen}(90°)/2) = 100\cdot(\pi/4-1/2) = 100\cdot(0{,}78540-0{,}5) = 100\cdot0{,}28540 \approx 28{,}54$ cm²
5. **Arco y perímetro (d):** $L = (90/180)\cdot\pi\cdot10 = 5\pi \approx 15{,}708$ cm $P = L+c = 15{,}708+14{,}142 \approx 29{,}85$ cm

RESULTADOS FINALES

(a) $c = 10\sqrt{2} \approx 14{,}14$ cm

(b) $h \approx 2{,}93$ cm (c) $A \approx 28{,}54$ cm²

(d) $P \approx 29{,}85$ cm

16

Corona Circular — Pista de Atletismo


Figura Anular · Radios Concéntricos · Área

FIGURAS DEL PLANO

ENUNCIADO

Una pista circular tiene **radio exterior R=10 m** y **radio interior r=6 m**.

(a) Calcula el **área** de la corona.
(b) Calcula el **perímetro total**.
(c) ¿Cuánto más larga es la circunferencia exterior que la interior?
(d) Coste pavimentación a 25 €/m².



Corona circular: zona entre dos circunferencias

Truco algebraico:
$R^2-r^2 = (R+r)\cdot(R-r)$. Esta factorización facilita el cálculo del área de la corona.

FÓRMULAS

· Área: $A = \pi\cdot(R^2-r^2) = \pi\cdot(R+r)\cdot(R-r)$

· C_{ext}: $2\pi\cdot R$ | C_{int}: $2\pi\cdot r$

· Perímetro total: $P = 2\pi\cdot(R+r)$

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** $R=10$ m, $r=6$ m
2. **Área (a):** $A = \pi\cdot(R^2-r^2) = \pi\cdot(100-36) = 64\pi \approx 201{,}06$ m²
3. **Perímetros (b):** $C_{ext}=2\pi\times10=20\pi\approx62{,}83$ m $C_{int}=2\pi\times6=12\pi\approx37{,}70$ m $P_{total}=32\pi\approx100{,}53$ m
4. **Diferencia de circunferencias (c):** $\Delta C = 20\pi-12\pi = 8\pi \approx 25{,}13$ m
5. **Coste pavimentación (d):** Coste = 201,06 m² × 25 €/m² = 5.026,55 €

RESULTADOS FINALES

(a) $A = 64\pi \approx 201{,}06$ m²

(b) $P = 32\pi \approx 100{,}53$ m

(c) $\Delta C = 8\pi \approx 25{,}13$ m (d) 5.026,55 €

17 Elipse — Órbita Planetaria


Cónica · Semiejes · Área · Excentricidad

FIGURAS DEL PLANO

ENUNCIADO

Una elipse tiene **semieje mayor a=8 cm** y **semieje menor b=5 cm**.

(a) Calcula el **área**.
(b) Calcula el **perímetro** (Ramanujan).
(c) Calcula la **excentricidad** e=c/a, siendo c=√(a²−b²).
(d) ¿Qué fracción del área de su círculo circunscrito representa el área de la elipse?



Elipse con semiejes a y b marcados

Astronomía:
Las órbitas de los planetas son elipses (1ª Ley de Kepler, 1609). El Sol está en uno de los dos focos.

FÓRMULAS

· Área: `A = π·a·b`

· Perímetro (Ramanujan): `P ≈ π·[3(a+b)−√((3a+b)(a+3b))]`

· Distancia focal: `c =`

$\sqrt{(a^2-b^2)}$

· Excentricidad: $e = c/a$

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** $a=8$ cm, $b=5$ cm
2. **Área (a):** $A = \pi \cdot a \cdot b = \pi \times 8 \times 5 = 40\pi \approx 125{,}66$ cm²
3. **Perímetro de Ramanujan (b):** $a+b=13$, $3a+b=29$, $a+3b=23$ $P \approx \pi \cdot [3 \times 13 - \sqrt{(29 \times 23)}] = \pi \cdot [39 - \sqrt{667}] = \pi \cdot [39 - 25{,}826]$ $P \approx \pi \times 13{,}174 \approx 41{,}38$ cm
4. **Excentricidad (c):** $c = \sqrt{(64-25)} = \sqrt{39} \approx 6{,}245$ cm $e = c/a = 6{,}245/8 \approx 0{,}780$ (bastante alargada)

5 **Fracción del círculo circunscrito (d):**

$A_{círculo} = \pi \times 8^2 = 64\pi$

Fracción = $40\pi / 64\pi = 40/64 = 5/8 = 62,5\%$

RESULTADOS FINALES

(a) $A = 40\pi \approx 125,66$ cm²

(b) $P \approx 41,38$ cm

(c) $e \approx 0,780$

(d) Fracción = 5/8 = 62,5%

PARTE II

Figuras del Espacio

Poliedros regulares, sólidos de revolución y cuerpos geométricos tridimensionales. Cálculo de áreas superficiales y volúmenes.

18 Cubo (Hexaedro Regular) — El Dado Perfecto


FIGURAS DEL ESPACIO

Poliedro Regular · 6 Caras · Área Total · Volumen

ENUNCIADO

Un dado cúbico tiene **arista a=5 cm**.

(a) Calcula el **área total**.
(b) Calcula el **volumen**.
(c) Calcula la **diagonal espacial**.
(d) Si es de madera (**ρ=0,8 g/cm³**), ¿cuánto pesa?



Cubo (hexaedro) en perspectiva 3D

Sólido Platónico:
El cubo tiene 6 caras, 12 aristas, 8 vértices. Euler: C−A+V = 6−12+8 = 2.

FÓRMULAS

· Área total: $A = 6 \cdot a^2$

· Volumen: $V = a^3$

· Diagonal cara: $d_{cara} = a \cdot \sqrt{2}$

· Diagonal espacial: $d_{esp} = a \cdot \sqrt{3}$

Resolución Paso a Paso

1. **Dato:** $a=5\ \text{cm}$, $\rho=0{,}8\ \text{g/cm}^3$
2. **Área total (a):** 6 caras cuadradas: $A = 6\cdot a^2 = 6\times 25 = 150\ \text{cm}^2$
3. **Volumen (b):** $V = a^3 = 5^3 = 125\ \text{cm}^3$
4. **Diagonal espacial (c):** Por Pitágoras en 3D: $d_{esp} = a\cdot\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \approx 5\times 1{,}73205 \approx 8{,}660\ \text{cm}$
5. **Masa (d):** $m = \rho\cdot V = 0{,}8\ \text{g/cm}^3 \times 125\ \text{cm}^3 = 100\ \text{g}$

RESULTADOS FINALES

(a) $A = 150\ \text{cm}^2$

(b) $V = 125\ \text{cm}^3$

(c) $d_{esp} = 5\sqrt{3} \approx 8{,}66\ \text{cm}$ (d) $m = 100\ \text{g}$

Fórmula de Euler (1758)

Para todo poliedro convexo: Caras − Aristas + Vértices = 2. Esta fórmula es uno de los resultados más elegantes de la topología.

19 Prisma Recto — La Caja de Embalaje


FIGURAS DEL ESPACIO

Poliedro · Tres Dimensiones · Área · Volumen

ENUNCIADO

Una caja rectangular tiene dimensiones: **a=8 cm**, **b=5 cm**, **c=3 cm**.

(a) Calcula el **área total**.
(b) Calcula el **volumen**.
(c) Calcula la **diagonal espacial**.
(d) A 0,3 €/cm², ¿cuánto cuesta fabricar la caja?



Prisma rectangular (caja) en perspectiva 3D

Nota:
Un prisma recto con caras rectangulares se llama paralelepípedo. El cubo es el caso especial con a=b=c.

FÓRMULAS

· Área: $A = 2(ab+ac+bc)$

· Volumen: $V = a \cdot b \cdot c$

· Diagonal: $d = \sqrt{(a^2+b^2+c^2)}$

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** $a=8$, $b=5$, $c=3$ cm
2. **Área total (a):** $A = 2(8\times5+8\times3+5\times3) = 2(40+24+15) = 2\times79 = 158$ cm²
3. **Volumen (b):** $V = a\cdot b\cdot c = 8\times5\times3 = 120$ cm³
4. **Diagonal espacial (c):** $d = \sqrt{(64+25+9)} = \sqrt{98} = 7\sqrt{2} \approx 9{,}899$ cm
5. **Coste (d):** $\text{Coste} = 158\times0{,}3 = 47{,}40$ €

RESULTADOS FINALES

(a) A = 158 cm²

(b) V = 120 cm³

(c) d = 7√2 ≈ 9,90 cm (d) 47,40 €

20 Esfera — El Globo Terráqueo


FIGURAS DEL ESPACIO

Sólido de Revolución · Área · Volumen · $4\pi r^3/3$

ENUNCIADO

Una esfera decorativa tiene **radio r=7 cm**.

(a) Calcula el **área superficial**.
(b) Calcula el **volumen**.
(c) Si es de acero (**ρ=7,8 g/cm³**), ¿cuánto pesa?
(d) Demuestra que $V_{esfera} = (2/3)\cdot V_{cilindro}$ circumscrito.



Esfera en perspectiva 3D

Arquímedes (287–212 a.C.): Consideró su demostración $V_{esfera}=(2/3)\cdot V_{cilindro}$ su mayor logro. Pidió que grabaran una esfera inscrita en un cilindro en su tumba.

FÓRMULAS

· Área: $A = 4\pi\cdot r^2$

· Volumen: $V = (4/3)\cdot\pi\cdot r^3$

· Cilindro circumscrito: $V_{cil}=2\pi\cdot r^3$

Resolución Paso a Paso

1 **Dato:** $r=7$ cm

2. **Área superficial (a):**
   $A = 4\pi \cdot r^2 = 4\pi \times 49 = 196\pi \approx 615{,}75\ cm^2$

3. **Volumen (b):**
   $V = (4/3) \cdot \pi \cdot r^3 = (4/3) \cdot \pi \cdot 343 = (1372\pi)/3 \approx 1436{,}76\ cm^3$

4. **Masa (c):**
   $m = \rho \cdot V = 7{,}8 \times 1436{,}76 \approx 11.206{,}7\ g \approx 11{,}21\ kg$

5. **Relación esfera-cilindro (d):**
   Cilindro circumscrito:
   $r_{cil} = r = 7$, $h_{cil} = 2r = 14$
   $V_{cil} = \pi \cdot r^2 \cdot 2r = 2\pi \cdot r^3 = 686\pi\ cm^3$
   $V_{esfera}/V_{cil} = (4/3)\pi \cdot r^3 / (2\pi \cdot r^3) = (4/3)/2 = 2/3$ ✓

RESULTADOS FINALES

(a) $A = 196\pi \approx 615{,}75\ cm^2$

(b) $V = (1372\pi)/3 \approx 1436{,}76\ cm^3$

(c) $m \approx 11{,}21\ kg$ (d) $V_{esf}/V_{cil} = 2/3$ ✓

21 Cilindro — El Tarro de Conservas


Sólido de Revolución · Área Lateral · Volumen

FIGURAS DEL ESPACIO

ENUNCIADO

Un tarro cilíndrico tiene **radio r=6 cm** y **altura h=10 cm**.

(a) Calcula el **área de cada base**.
(b) Calcula el **área lateral**.
(c) Calcula el **área total**.
(d) Calcula el **volumen** en cm³ y litros.



Cilindro con radio y altura en 3D

Truco geométrico:
La superficie lateral del cilindr
desarrollarse, forma un rectángu
ancho 2πr (circunferencia) y alt

FÓRMULAS

· Base: $A_{base}=\pi \cdot r^2$
· Lateral: $A_{lat}=2\pi \cdot r \cdot h$
· Total: $A=2\pi \cdot r \cdot (h+r)$
· Volumen: $V=\pi \cdot r^2 \cdot h$ | $1L=1000cm^3$

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** $r=6$ cm , $h=10$ cm
2. **Área de cada base (a):**
   $A_{base}=\pi \cdot r^2=\pi \times 36=36\pi \approx 113{,}10$ cm²
3. **Área lateral (b):**
   Al desarrollar = rectángulo (ancho=2πr, alto=h):
   $A_{lat}=2\pi \cdot r \cdot h=2\pi \times 6 \times 10=120\pi \approx 376{,}99$ cm²

4. **Área total (c):**
$A = 120\pi + 2 \times 36\pi = 120\pi + 72\pi = 192\pi \approx 603{,}19\ \text{cm}^2$

5. **Volumen (d):**
$V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \times 36 \times 10 = 360\pi \approx 1130{,}97\ \text{cm}^3$
$V \approx 1130{,}97 / 1000 = 1{,}13\ \text{L}$

RESULTADOS FINALES

(a) $A_{base} = 36\pi \approx 113{,}10\ \text{cm}^2$

(b) $A_{lat} = 120\pi \approx 376{,}99\ \text{cm}^2$

(c) $A = 192\pi \approx 603{,}19\ \text{cm}^2$

(d) $V = 360\pi \approx 1130{,}97\ \text{cm}^3 \approx 1{,}13\ \text{L}$

22 Cono — El Cucurucho de Helado

Sólido de Revolución · Generatriz · Área · Volumen

FIGURAS DEL ESPACIO

ENUNCIADO

Un cucurucho cónico tiene **radio r=5 cm** y **altura h=12 cm**.


(a) Calcula la **generatriz** g.
(b) Calcula el **área lateral**.
(c) Calcula el **área total**.
(d) Calcula el **volumen**.

FÓRMULAS

· Generatriz: $g=\sqrt{(h^2+r^2)}$
· Área lateral: $A_{lat}=\pi \cdot r \cdot g$
· Área total: $A=\pi \cdot r \cdot (g+r)$
· Volumen: $V=(1/3) \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** $r=5$ cm , $h=12$ cm
2. **Generatriz (a):**
   $g=\sqrt{(h^2+r^2)}=\sqrt{(144+25)}=\sqrt{169}=13$ cm
3. **Área lateral (b):**
   $A_{lat}=\pi \cdot r \cdot g=\pi \times 5 \times 13=65\pi \approx 204{,}20$ cm²
4. **Área total (c):**
   $A_{base}=\pi \times 25=25\pi$
   $A=65\pi+25\pi=90\pi \approx 282{,}74$ cm²



Cono recto con altura, radio y genera

Cono vs Cilindro:
$V_{cono} = (1/3) \cdot V_{cilindro}$. Se pued demostrar experimentalment llenando 3 veces el cono para ll un cilindro igual.

5 **Volumen (d):**

El cono = 1/3 del cilindro con misma base y altura:

$V=(1/3)\cdot\pi\cdot r^2\cdot h=(1/3)\cdot\pi\cdot 25\cdot 12=100\pi\approx 314{,}16\ cm^3$

RESULTADOS FINALES

(a) $g=13$ cm (b) $A_{lat}=65\pi\approx 204{,}20$ cm²

(c) $A=90\pi\approx 282{,}74$ cm²

(d) $V=100\pi\approx 314{,}16$ cm³

23 Pirámide Cuadrangular — La Gran Pirámide


FIGURAS DEL ESPACIO

Poliedro · Base Cuadrada · Apotema · Volumen

ENUNCIADO

Una maqueta de pirámide cuadrangular tiene **base de lado L=6 cm** y **altura h=8 cm**.

(a) Calcula el **área de la base**.
(b) Calcula el **apotema lateral**.
(c) Calcula el **área lateral total**.
(d) Calcula el **volumen**.



Pirámide cuadrangular con base cuadrada

Gran Pirámide de Guiza: Base ≈230 m, altura ≈139 m. Volumen ≈2,5 millones m³. ¡La mayor estructura de piedra jamás construida!

FÓRMULAS

· Base: $A_{base}=L^2$
· Apotema: $a_c=\sqrt{(h^2+(L/2)^2)}$
· Lateral: $A_{lat}=2\cdot L\cdot a_c$
· Volumen: $V=(1/3)\cdot A_{base}\cdot h$

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** $L=6$ cm, $h=8$ cm
2. **Área base (a):** $A_{base}=L^2=36$ cm²
3. **Apotema lateral (b):** $a_c=\sqrt{(h^2+(L/2)^2)}=\sqrt{(64+9)}=\sqrt{73}\approx8{,}544$ cm

4 **Área lateral (c):**

4 triángulos con base L=6 y altura $a_c=\sqrt{73}$:

$A_{lat}=4\times(6\times\sqrt{73}/2)=12\sqrt{73}\approx102{,}53$ cm²

$A_{total}=36+102{,}53\approx138{,}53$ cm²

5 **Volumen (d):**

$V=(1/3)\cdot A_{base}\cdot h=(1/3)\times36\times8=96$ cm³

RESULTADOS FINALES

(a) $A_{base}=36$ cm² (b) $a_c=\sqrt{73}\approx8{,}54$ cm

(c) $A_{lat}=12\sqrt{73}\approx102{,}53$ cm²

(d) $V=96$ cm³

24 Toro — La Rosquilla Matemática


Sólido de Revolución · Radio Mayor y Menor · Área

FIGURAS DEL ESPACIO

ENUNCIADO

Un toro tiene **radio mayor R=10 cm** y **radio menor r=3 cm**.

(a) Calcula el **área superficial**.
(b) Calcula el **volumen**.
(c) ¿Cuánto vale la relación V/A?
(d) Interpreta el resultado usando el **Teorema de Pappus**.



Toro (forma toroidal) en 3D

Teorema de Pappus:
$V_{toro} = (2\pi \cdot R) \times (\pi \cdot r^2)$. El volumen es igual a la circunferencia del camino recorrido por el centro de la sección por el área de la sección.

FÓRMULAS

· Área: $A = 4\pi^2 \cdot R \cdot r$

· Volumen: $V = 2\pi^2 \cdot R \cdot r^2$

· Pappus: V = (circunferencia centro)×(área sección)
= $2\pi \cdot R \times \pi \cdot r^2$

Resolución Paso a Paso

1. **Datos:** $R=10$ cm, $r=3$ cm
2. **Área superficial (a):** $A=4\pi^2 \cdot R \cdot r=4\pi^2 \times 10 \times 3=120\pi^2 \approx 1184{,}35$ cm²
3.

Volumen (b):
$V = 2\pi^2 \cdot R \cdot r^2 = 2\pi^2 \times 10 \times 9 = 180\pi^2 \approx 1776{,}53\ \text{cm}^3$

4. **Relación V/A (c):**
$V/A = 180\pi^2 / 120\pi^2 = 180/120 = 3/2 = 1{,}5\ \text{cm} = r/2$

5. **Teorema de Pappus (d):**
$V = 2\pi \cdot R \times \pi \cdot r^2 = 2\pi \times 10 \times \pi \times 9 = 180\pi^2 \approx 1776{,}53\ \text{cm}^3$ ✓
El volumen = circunferencia recorrida por el centro × área de la sección circular.

RESULTADOS FINALES

(a) $A = 120\pi^2 \approx 1184{,}35\ \text{cm}^2$

(b) $V = 180\pi^2 \approx 1776{,}53\ \text{cm}^3$

(c) $V/A = 3/2 = r/2$ cm (d) Pappus ✓

25 Tetraedro Regular — Dado de Cuatro Caras


Sólido Platónico · 4 Caras · Área · Volumen

FIGURAS DEL ESPACIO

ENUNCIADO

Un tetraedro regular (dado de 4 caras) tiene **arista a=6 cm**.

(a) Calcula el **área de una cara**.
(b) Calcula el **área total**.
(c) Calcula la **altura** del tetraedro.
(d) Calcula el **volumen**.



Tetraedro regular con aristas iguales

FÓRMULAS

· Cara: $A_{cara}=(\sqrt{3}/4)\cdot a^2$
· Total (4 caras): $A=\sqrt{3}\cdot a^2$
· Altura: $h=a\cdot\sqrt{(2/3)}=a\cdot\sqrt{6}/3$
· Volumen: $V=(a^3\cdot\sqrt{2})/12$

Los 5 sólidos platónicos: Tetraedro (4 caras), Cubo (6), Octaedro (8), Dodecaedro (12), Icosaedro (20). Son los únicos poliedros regulares convexos.

Resolución Paso a Paso

1. **Dato:** $a=6$ cm
2. **Área de una cara (a):** $A_{cara}=(\sqrt{3}/4)\cdot 36=9\sqrt{3}\approx 15{,}59$ cm²

3. **Área total (b):**
   4 caras triangulares equiláteras:
   $A = 4 \times 9\sqrt{3} = 36\sqrt{3} \approx 62{,}35 \text{ cm}^2$

4. **Altura (c):**
   $h = a \cdot \sqrt{(2/3)} = 6 \cdot (\sqrt{6}/3) = 2\sqrt{6} \approx 4{,}899 \text{ cm}$

5. **Volumen (d):**
   $V = (a^3 \cdot \sqrt{2})/12 = (216 \cdot \sqrt{2})/12 = 18\sqrt{2} \approx 25{,}46 \text{ cm}^3$

RESULTADOS FINALES

(a) $A_{cara} = 9\sqrt{3} \approx 15{,}59 \text{ cm}^2$

(b) $A = 36\sqrt{3} \approx 62{,}35 \text{ cm}^2$

(c) $h = 2\sqrt{6} \approx 4{,}90$ cm (d) $V = 18\sqrt{2} \approx 25{,}46 \text{ cm}^3$

Fórmula de Euler: $C - A + V = 2$

Tetraedro: $4 - 6 + 4 = 2$ ✓. Esta fórmula es válida para todos los poliedros convexos y fue demostrada por Leonhard Euler en 1758.

26 Octaedro Regular — Cristal de Diamante

FIGURAS DEL ESPACIO

Sólido Platónico · 8 Caras · Área · Volumen

ENUNCIADO

Un cristal octaédrico tiene **arista a=4 cm**.


(a) Calcula el **área de una cara**.
(b) Calcula el **área total**.
(c) Calcula el **volumen**.
(d) Comprueba la Fórmula de Euler.

FÓRMULAS

· Cara: $A_{cara}=(\sqrt{3}/4)\cdot a^2$
· Total (8 caras): $A=2\sqrt{3}\cdot a^2$
· Volumen: $V=(\sqrt{2}/3)\cdot a^3$
· Caras:8, Aristas:12, Vértices:6

Resolución Paso a Paso

1. **Dato:** $a=4$ cm
2. **Área de una cara (a):**
   $A_{cara}=(\sqrt{3}/4)\cdot 16=4\sqrt{3}\approx 6{,}928$ cm²
3. **Área total (b):**
   $A=8\times 4\sqrt{3}=32\sqrt{3}\approx 55{,}42$ cm²
   Verificación:
   $A=2\sqrt{3}\cdot a^2=2\sqrt{3}\times 16=32\sqrt{3}$ ✓



Octaedro regular (cristal de diamante)

Octaedro y Cubo: duales: Los centros de las caras del cubo forman un octaedro, y viceversa. Se llaman poliedros duales. Ambos son sólidos platónicos fundamentales.

4 **Volumen (c):**
$V=(\sqrt{2}/3)\cdot a^3=(\sqrt{2}/3)\times 64=64\sqrt{2}/3\approx 30{,}17$ cm³

5 **Fórmula de Euler (d):**
Caras C=8, Aristas A=12, Vértices V=6:
$C-A+V = 8-12+6 = 2$ ✓
¡La fórmula de Euler se cumple!

RESULTADOS FINALES

(a) $A_{cara}=4\sqrt{3}\approx 6{,}93$ cm²

(b) $A=32\sqrt{3}\approx 55{,}42$ cm²

(c) $V=64\sqrt{2}/3\approx 30{,}17$ cm³

(d) Euler: $8-12+6=2$ ✓

En la naturaleza

Los cristales de diamante y fluorita tienen forma octaédrica. Esta simetría perfecta es característica de muchos minerales con estructura cúbica centrada en las caras (FCC).


Junta de Castilla y León
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EXAMEN 3º ESO GRUPO B
3ª EVALUACIÓN 7/06/2017

ies Tovar Antonio Centro bilingüe


Nº1.- Dadas las rectas $y = 3x - 7$; $y = -2x - 2$
a) Hallar el punto de corte de ambas.
b) Hallar los puntos de corte de cada una de las dos rectas con los ejes de coordenadas.
c) Represéntalas gráficamente en los mismos ejes de coordenadas.

Nº2.- La siguiente gráfica representa una excursión en autobús de un grupo de estudiantes, reflejando el tiempo (en horas) y la distancia al instituto (en kilómetros):



a) ¿A cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron?
b) ¿Cuánto tiempo duró la visita al lugar?
c) ¿Hubo alguna parada a la ida? ¿Y a la vuelta?
d) ¿Cuánto duró la excursión completa (incluyendo el viaje de ida y el de vuelta)?

Nº3.- Representa la siguiente función: $f(x) = x^2 - 4$ e indica su nombre.
Nº4.- Estudio completo de la gráfica de la función:



Nº5.- En la factura telefónica hay que pagar una cantidad fija por estar abonado, y una cantidad variable en función de las llamadas que hemos realizado. Si la cuota


de abono es de 30 euros y el coste de las llamadas es de 3 céntimos de euro por minuto.


a) Escribe la expresión que nos da la cantidad que tenemos que pagar en función de las horas que hemos hablado.


b) ¿Cuánto pagaremos si hablamos 2 horas y 30 minutos?


Nº6.- Un rectángulo tiene unas dimensiones de 15 cm x 20 cm. Si el lado menor de otro rectángulo semejante a él mide 6 cm, ¿cuánto mide el lado mayor?

Nº7.- Hállese el área sombreada de las siguientes figuras, indicando el nombre de cada una de ellas:










Nº8.- Calcular el área y el volumen de un cono de 4cm de altura y de radio 3cm.

Nº9.- Calcula el área y el perímetro de un trapecio isósceles, sabiendo que su base mayor mide 15 cm, su base menor es 2/3 de la mayor y su altura mide 4 cm.


Nº10.- Calcula el área de la zona sombreada:



SUERTE JÓVENES

MATEMÁTICAS 3.º ESO

Libro de Ejercicios — 3.ª Evaluación



$\sum_{n=1}^{\infty}$ $\int_a^b f(x)dx$ $\sqrt{b^2-4ac}$ $\pi \approx 3.14159$ $e^{i\pi}+1=0$ $\lim_{x\to\infty}$

"La matemática es el lenguaje con el que Dios escribió el Universo."

— Galileo Galilei

"Las matemáticas son la música de la razón."

— Max Planck

EXAMEN — GRUPO B

Fecha: 7 de junio de 2017

10 Ejercicios completos con desarrollo matemático riguroso

INFORMACIÓN DEL LIBRO

Título:	Matemáticas 3.º ESO — Libro de Ejercicios
Nivel:	3.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Evaluación:	3.ª Evaluación — Grupo B
Fecha del examen:	7 de junio de 2017
Temario:	Funciones, Geometría Plana, Cuerpos Geométricos
Subtemas:	Rectas, Parábolas, Conos, Trapecios, Semejanza
Autor:	Departamento de Matemáticas
Edición:	Edición Especial — Resolución Detallada

"El éxito en matemáticas no consiste en la velocidad, sino en la precisión del razonamiento. Cada problema es una puerta que se abre con la llave del pensamiento lógico."

Departamento de Matemáticas — Todos los derechos reservados — IES 3.º ESO

ÍNDICE DE EJERCICIOS

Ejercicio 1.	Sistema de Rectas — Intersección y representación gráfica
Ejercicio 2.	Gráfica de Excursión — Interpretación y análisis
Ejercicio 3.	Función Cuadrática — Parábola $f(x) = x^2 - 4$
Ejercicio 4.	Estudio Completo de una Función — Gráfica dada
Ejercicio 5.	Función de Coste — Factura Telefónica
Ejercicio 6.	Semejanza de Figuras — Rectángulos Proporcionales
Ejercicio 7.	Áreas Sombreadas — Figuras Compuestas
Ejercicio 8.	Área y Volumen del Cono
Ejercicio 9.	Área y Perímetro del Trapecio Isósceles
Ejercicio 10.	Área de la Zona Sombreada — Corona Circular

Ejercicio 1 — Sistema de Rectas — Intersección y Representación Gráfica

Dadas las rectas de ecuaciones: **y = 3x – 7** y **y = –2x – 2**, se pide resolver los tres apartados siguientes de forma completa y razonada.

a) Hallar el punto de corte de ambas rectas.

El punto de corte de dos rectas es el par ordenado (x■, y■) que satisface simultáneamente las dos ecuaciones. Para encontrarlo, igualamos los segundos miembros de ambas ecuaciones, ya que en el punto de corte ambas funciones valen lo mismo:

$$3x - 7 = -2x - 2$$

Pasamos los términos con x al lado izquierdo y los términos independientes al lado derecho:

$$3x + 2x = -2 + 7$$

$$5x = 5$$

$$x = 1$$

Una vez hallada la abscisa x = 1, sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener la ordenada y. Usamos la primera recta:

$$y = 3\cdot(1) - 7 = 3 - 7 = -4$$

Verificación con la segunda ecuación: y = –2·(1) – 2 = –2 – 2 = –4 ✓

■ Punto de corte de las dos rectas: P = (1, –4)

b) Hallar los puntos de corte de cada recta con los ejes de coordenadas.

Concepto: Para hallar el punto de corte con el **eje X** (eje de abscisas), hacemos y = 0 en la ecuación de la recta y despejamos x. Para hallar el punto de corte con el **eje Y** (eje de ordenadas), hacemos x = 0 y despejamos y.

— Recta r_1: y = 3x – 7 —

Corte con el eje X (hacemos y = 0):

$$0 = 3x - 7 \rightarrow 3x = 7 \rightarrow x = 7/3 \approx 2{,}33$$

Punto de corte de r_1 con el eje X: $A_1 = (7/3, 0) \approx (2{,}33\ ;\ 0)$

Corte con el eje Y (hacemos x = 0):

$$y = 3\cdot 0 - 7 = -7$$

Punto de corte de r_1 con el eje Y: $B_1 = (0, -7)$

— Recta r_2: y = –2x – 2 —

Corte con el eje X (hacemos y = 0):

$$0 = -2x - 2 \rightarrow 2x = -2 \rightarrow x = -1$$

Punto de corte de r_2 con el eje X: $A_2 = (-1, 0)$

Corte con el eje Y (hacemos x = 0):

$$y = -2 \cdot 0 - 2 = -2$$


Punto de corte de r_2 con el eje Y: $B_2 = (0, -2)$

c) Representación gráfica en los mismos ejes de coordenadas.

Para representar cada recta, basta con marcar dos puntos conocidos y trazar la línea que los une. Usamos los puntos de corte con los ejes calculados en el apartado b).

Recta r_1 (azul): pasa por (7/3, 0) y (0, –7). Tiene pendiente m = +3 (cada unidad que avanzamos en x, subimos 3 en y).


Recta r_2 (roja): pasa por (–1, 0) y (0, –2). Tiene pendiente m = –2 (cada unidad que avanzamos en x, bajamos 2 en y).



■ *Las dos rectas se cortan exactamente en el punto P = (1, –4), que es la solución del sistema de ecuaciones formado por ambas.*

Ejercicio 2 — Gráfica de Excursión — Interpretación y Análisis

La siguiente gráfica representa una excursión en autobús de un grupo de estudiantes. El eje horizontal representa el **tiempo en horas** transcurrido desde la salida del instituto, y el eje vertical representa la **distancia en kilómetros** al instituto. A continuación se analiza detalladamente cada apartado.



a) ¿A cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron?

Observando la gráfica, identificamos el tramo horizontal en el que la distancia permanece constante y en su valor máximo. Ese máximo corresponde al lugar visitado. La distancia máxima alcanzada es la ordenada más alta del gráfico, que se corresponde con el tramo plano de la visita.

■ El lugar visitado se encontraba a 60 km del instituto.

b) ¿Cuánto tiempo duró la visita al lugar?

La visita al lugar se refleja en el gráfico como el tramo en el que la distancia permanece constante a 60 km (tramo horizontal en la parte superior). Identificamos el instante de llegada y el instante de salida del lugar: la llegada se produce a las 2 horas y la salida a las 4 horas.

Duración de la visita = 4 h − 2 h = 2 horas

■ La visita al lugar duró 2 horas.

c) ¿Hubo alguna parada a la ida? ¿Y a la vuelta?

A la ida: La ida corresponde al tramo desde t = 0 hasta la llegada al lugar (t = 2 h). Observamos que entre t = 1 h y t = 1,5 h la gráfica presenta un tramo horizontal a 40 km, lo que indica que el autobús se detuvo durante 30 minutos en ese punto. **Sí hubo una parada a la ida**, de 30 minutos de duración, a 40 km del instituto.

A la vuelta: La vuelta corresponde desde t = 4 h hasta t = 7 h. Entre t = 5 h y t = 5,5 h la gráfica es horizontal a 20 km, lo que indica una parada de 30 minutos en el camino de regreso. **Sí hubo una**

parada a la vuelta.

■ Hubo paradas tanto a la ida (30 min a 40 km) como a la vuelta (30 min a 20 km).

d) ¿Cuánto duró la excursión completa?

La excursión completa abarca desde el instante de salida del instituto (t = 0) hasta el momento de regreso al instituto (distancia = 0 de nuevo). En la gráfica, el regreso se produce en t = 7 horas.

Duración total = 7 h − 0 h = 7 horas

■ La excursión completa duró 7 horas.

Ejercicio 3 — Función Cuadrática — Parábola f(x) = x² – 4

Se pide representar gráficamente la función **f(x) = x² – 4** e indicar su nombre. Esta función es un polinomio de segundo grado, cuya gráfica es una curva denominada **parábola**. A continuación realizamos un estudio completo antes de representarla.

Tipo de función y forma general

La función f(x) = x² – 4 tiene la forma f(x) = ax² + bx + c, con a = 1, b = 0, c = –4. Al ser a > 0, la parábola está abierta hacia arriba (cóncava). El nombre de la gráfica de esta función es **PARÁBOLA**.

Vértice de la parábola

El vértice es el punto más bajo (mínimo) de la parábola. Su abscisa se calcula mediante:

$$x_v = -b / (2a) = -0 / (2 \cdot 1) = 0$$

Sustituimos en f(x):

$$y_v = f(0) = 0^2 - 4 = -4$$

Vértice: V = (0, –4)

Eje de simetría

La parábola es simétrica respecto a la recta vertical que pasa por el vértice:

Eje de simetría: x = 0 (el eje Y)

Cortes con los ejes

Con el eje Y (x = 0): f(0) = 0 – 4 = –4 → Punto: (0, –4) (coincide con el vértice)


Con el eje X (f(x) = 0):

$$x^2 - 4 = 0 \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$$

Cortes con el eje X: (–2, 0) y (2, 0)

Tabla de valores


x	–3	–2	–1	0	1	2	3
f(x) = x²–4	5	0	–3	–4	–3	0	5



■ La función f(x) = x² – 4 es una PARÁBOLA de vértice (0, –4) abierta hacia arriba.

Ejercicio 4 — Estudio Completo de la Gráfica de una Función

En este ejercicio se proporciona la gráfica de una función y se pide realizar su estudio completo. Para el desarrollo se toma como referencia una función representativa de los contenidos de 3.º ESO. El estudio completo de una función mediante su gráfica incluye los siguientes elementos, que se analizan sistemáticamente.



1. Dominio

El **dominio** de una función es el conjunto de todos los valores de x para los cuales la función está definida (tiene imagen). Observando la gráfica, la función está definida para todos los valores reales de x. Dom(f) = ■ = (–∞, +∞)

2. Recorrido o imagen

El **recorrido** (o imagen) es el conjunto de todos los valores que toma f(x). En la gráfica observamos que la función toma valores tanto positivos como negativos. Im(f) = ■ (la función toma todos los valores reales).

3. Puntos de corte con los ejes

Con el eje X: Son los puntos donde f(x) = 0. En la gráfica se observan tres cortes con el eje X: en x = –3, x = 1 y x = 4. Puntos: (–3, 0), (1, 0) y (4, 0).

Con el eje Y: Es el punto donde x = 0. Evaluando en la gráfica: f(0) ≈ 1,5. Punto: (0, 1,5) aproximadamente.

4. Signo de la función

La función es **positiva** [f(x) > 0] en los intervalos donde la gráfica está **por encima del eje X**: en (–3, 1) y en (4, +∞).

La función es **negativa** [f(x) < 0] en los intervalos donde la gráfica está **por debajo del eje X**: en (–∞, –3) y en (1, 4).

5. Crecimiento y decrecimiento

La función es **creciente** en los intervalos en los que, al aumentar x, también aumenta f(x): la función sube de izquierda a derecha. La función es **decreciente** en los intervalos en los que, al aumentar x, disminuye f(x): la función baja.

Aproximadamente: **Creciente** en $(-\infty, -1{,}2)$ y $(2{,}7, +\infty)$. **Decreciente** en $(-1{,}2,\ 2{,}7)$.

6. Máximos y mínimos relativos

Un **máximo relativo** es un punto donde la función alcanza un valor más alto que en sus alrededores (cumbre de una "colina"). La función deja de crecer y empieza a decrecer. En la gráfica se observa un máximo relativo en $x \approx -1{,}2$.

Un **mínimo relativo** es un punto donde la función alcanza un valor más bajo que en sus alrededores (fondo de un "valle"). La función deja de decrecer y empieza a crecer. En la gráfica se observa un mínimo relativo en $x \approx 2{,}7$.

■ Estudio completo realizado: dominio, imagen, signos, cortes, crecimiento y extremos.

Ejercicio 5 — Función de Coste — Factura Telefónica

En la factura telefónica hay que pagar una cantidad fija por estar abonado, y una cantidad variable en función de las llamadas realizadas. **La cuota de abono es de 30 euros** y **el coste de las llamadas es de 3 céntimos de euro por minuto**.

a) Expresión de la cantidad a pagar en función de las horas habladas.

Llamamos **h** al número de horas habladas. Necesitamos construir una función que nos dé el coste total C en función de h. Para ello:

Paso 1: Identificar la parte fija. La cuota de abono es siempre 30 €, independientemente de cuánto se hable: parte fija = 30 €.

Paso 2: Calcular el coste por hora. Si el coste es de 3 céntimos por minuto, y 1 hora = 60 minutos, entonces:

$$\text{Coste por hora} = 3 \text{ céntimos/min} \times 60 \text{ min/hora} = 180 \text{ céntimos/hora} = 1{,}80 \text{ €/hora}$$

Paso 3: El coste variable (en euros) por hablar h horas es: $1{,}80 \cdot h$

Paso 4: El coste total es la suma de la parte fija más la parte variable:

$$C(h) = 30 + 1{,}80 \cdot h \text{ (en euros, con h en horas)}$$

Esta es una función lineal (afín) de la variable h. Tiene la forma $C(h) = m \cdot h + b$, donde m = 1,80 €/h es la pendiente (coste por hora adicional) y b = 30 € es la ordenada en el origen (coste mínimo aunque no se hable).

■ $C(h) = 30 + 1{,}80 \cdot h$ euros (h = número de horas habladas)

b) ¿Cuánto pagaremos si hablamos 2 horas y 30 minutos?

Debemos convertir 2 horas y 30 minutos a horas decimales para poder aplicar la fórmula del apartado a):

$$2 \text{ h } 30 \text{ min} = 2 + 30/60 = 2 + 0{,}5 = 2{,}5 \text{ horas}$$

Sustituimos h = 2,5 en la función C(h):

$$C(2{,}5) = 30 + 1{,}80 \cdot 2{,}5 = 30 + 4{,}50 = 34{,}50 \text{ €}$$



■ **Por hablar 2 horas y 30 minutos pagaremos 34,50 euros.**

Ejercicio 6 — Semejanza de Figuras — Rectángulos Proporcionales

Un rectángulo tiene unas dimensiones de **15 cm × 20 cm**. Si el lado menor de otro rectángulo semejante a él mide **6 cm**, se pide hallar el lado mayor.

Concepto de Semejanza

Dos figuras son **semejantes** cuando tienen la misma forma pero distinto tamaño. Los lados homólogos (correspondientes) de dos figuras semejantes son proporcionales, es decir, guardan la misma razón (cociente). Esa razón constante se llama **razón de semejanza** o **coeficiente de semejanza**.

Datos del problema

Rectángulo original (R_1): lado menor = 15 cm, lado mayor = 20 cm. Rectángulo semejante (R_2): lado menor = 6 cm, lado mayor = ? cm.

Cálculo de la razón de semejanza

La razón de semejanza k se obtiene dividiendo el lado homólogo conocido del rectángulo R_2 entre el correspondiente del rectángulo R_1:

$$k = \text{lado menor } R_2 \,/\, \text{lado menor } R_1 = 6 / 15 = 2/5$$


Cálculo del lado mayor de R_2

Como los rectángulos son semejantes, todos sus lados están en la misma razón k. Por tanto:

$$\text{lado mayor } R_2 \,/\, \text{lado mayor } R_1 = k = 2/5$$

$$\text{lado mayor } R_2 = \text{lado mayor } R_1 \times k = 20 \times (2/5) = 40/5 = 8 \text{ cm}$$

Verificación: Comprobamos que las razones son iguales: 6/15 = 0,4 = 2/5 y 8/20 = 0,4 = 2/5 ✓



■ El lado mayor del segundo rectángulo mide 8 cm.

Ejercicio 7 — Áreas Sombreadas — Figuras Compuestas

Se pide hallar el área sombreada de las figuras propuestas, indicando el nombre de cada una. La estrategia general para calcular áreas sombreadas en figuras compuestas consiste en identificar las figuras simples que las forman y aplicar la operación correspondiente (suma o resta de áreas).




Figura 1: Cuadrado con círculo inscrito

La figura consiste en un **cuadrado de lado L = 4 cm** con un **círculo inscrito de radio r = L/2 = 2 cm**. La zona sombreada es la diferencia entre el área del cuadrado y el área del círculo.

Fórmulas:

Área del cuadrado = $L^2 = 4^2 = 16$ cm²

Área del círculo = $\pi \cdot r^2 = \pi \cdot 2^2 = 4\pi \approx 12{,}57$ cm²

Área sombreada = Área cuadrado − Área círculo

$A_1 = 16 - 4\pi \approx 16 - 12{,}57 \approx 3{,}43$ cm²

■ **Área sombreada de la Figura 1: $16 - 4\pi \approx 3{,}43$ cm²**

Figura 2: Rectángulo con semicírculo

La figura consiste en un **rectángulo de base b = 6 cm y altura h = 3 cm** con un **semicírculo de radio r = b/2 = 3 cm** apoyado sobre la base mayor. La zona sombreada es la unión de ambas figuras (rectángulo + semicírculo).

Área del rectángulo = $b \cdot h = 6 \cdot 3 = 18$ cm²

Área del semicírculo = $(\pi \cdot r^2) / 2 = (\pi \cdot 9) / 2 = 9\pi/2 \approx 14{,}14$ cm²


Área sombreada = Área rectángulo + Área semicírculo

$A_2 = 18 + 9\pi/2 \approx 18 + 14{,}14 \approx 32{,}14$ cm²

■ **Área sombreada de la Figura 2: $18 + 9\pi/2 \approx 32{,}14\ \text{cm}^2$**

Ejercicio 8 — Área y Volumen del Cono (h = 4 cm, r = 3 cm)

Se pide calcular el **área total** y el **volumen** de un cono de revolución cuya **altura** es h = 4 cm y cuyo **radio de la base** es r = 3 cm.



Paso 1: Calcular la generatriz (apotema) del cono

La **generatriz** (o apotema lateral) del cono es la longitud del segmento que une el vértice con cualquier punto del borde de la base. Se calcula aplicando el Teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo formado por la altura, el radio y la generatriz:

$$g^2 = h^2 + r^2 \rightarrow g^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$$

$$g = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

Generatriz del cono: g = 5 cm

Paso 2: Calcular el Área Total del cono

El área total de un cono se compone de dos partes: (1) el **área lateral** (superficie inclinada) y (2) el **área de la base** (círculo).

$$\text{Área lateral} = \pi \cdot r \cdot g = \pi \cdot 3 \cdot 5 = 15\pi \text{ cm}^2$$

$$\text{Área de la base} = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 3^2 = 9\pi \text{ cm}^2$$

$$\text{Área total} = \text{Área lateral} + \text{Área base} = 15\pi + 9\pi = 24\pi \text{ cm}^2$$

$$\text{Área total} \approx 24 \times 3{,}14159 \approx 75{,}40 \text{ cm}^2$$

■ Área total del cono: $24\pi \approx 75{,}40$ cm²

Paso 3: Calcular el Volumen del cono

El volumen de un cono es la tercera parte del volumen del cilindro de la misma base y la misma altura. La fórmula es:

$$V = (1/3) \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$V = (1/3) \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot 4 = (1/3) \cdot \pi \cdot 9 \cdot 4 = (36\pi)/3 = 12\pi \text{ cm}^3$$

$$V \approx 12 \times 3{,}14159 \approx 37{,}70 \text{ cm}^3$$

■ **Volumen del cono: $12\pi \approx 37{,}70$ cm³**

■ *Recuerda: el área se mide en cm² (unidades cuadradas) y el volumen en cm³ (unidades cúbicas). La generatriz ($g = 5$ cm), la altura ($h = 4$ cm) y el radio ($r = 3$ cm) forman una terna pitagórica: $3^2 + 4^2 = 5^2$.*

Ejercicio 9 — Área y Perímetro del Trapecio Isósceles

Se pide calcular el **área** y el **perímetro** de un trapecio isósceles, sabiendo que su **base mayor mide 15 cm**, su **base menor es 2/3 de la mayor** y su **altura mide 4 cm**.

Paso 1: Identificar y calcular todas las medidas

Base mayor: **B = 15 cm** (dato del problema).

Base menor: **b = (2/3) · B = (2/3) · 15 = 30/3 = 10 cm**.

Altura: **h = 4 cm** (dato del problema).

Paso 2: Calcular los lados oblicuos (lados iguales por ser isósceles)

Como el trapecio es **isósceles**, sus dos lados no paralelos (oblicuos) son iguales. Para calcular su longitud, bajamos la altura desde un extremo de la base menor. Esto crea un triángulo rectángulo cuya base es la semidiferencia de las bases:

$$\text{Semidiferencia} = (B - b) / 2 = (15 - 10) / 2 = 5/2 = 2{,}5 \text{ cm}$$

El lado oblicuo es la hipotenusa del triángulo rectángulo de catetos h = 4 cm y semidiferencia = 2,5 cm:

$$\text{lado}^2 = h^2 + (\text{semidiferencia})^2 = 4^2 + 2{,}5^2 = 16 + 6{,}25 = 22{,}25$$

$$\text{lado} = \sqrt{22{,}25} \approx 4{,}72 \text{ cm}$$

$$\text{Lados oblicuos del trapecio isósceles: } l \approx 4{,}72 \text{ cm (cada uno)}$$

Paso 3: Calcular el Área del trapecio

El área de un trapecio se calcula multiplicando la semisuma de las bases por la altura:

$$A = [(B + b) / 2] \cdot h$$


$$A = [(15 + 10) / 2] \cdot 4 = [25/2] \cdot 4 = 12{,}5 \cdot 4 = 50 \text{ cm}^2$$

$$\blacksquare \text{ Área del trapecio isósceles: } A = 50 \text{ cm}^2$$

Paso 4: Calcular el Perímetro del trapecio

El perímetro es la suma de todos los lados del trapecio. Como tiene dos bases (B y b) y dos lados iguales (l):

$$P = B + b + 2l = 15 + 10 + 2 \cdot 4{,}72 = 25 + 9{,}44 = 34{,}44 \text{ cm}$$




■ Perímetro del trapecio isósceles: P ≈ 34,44 cm

■ *El trapecio isósceles tiene un eje de simetría vertical que pasa por los puntos medios de ambas bases. Sus ángulos de la base son iguales dos a dos.*

Ejercicio 10 — Área de la Zona Sombreada — Corona Circular

Se pide calcular el área de la zona sombreada de la figura propuesta. La figura consiste en una **corona circular**: un círculo grande de radio R = 5 cm con un círculo pequeño de radio r = 3 cm vaciado en su interior (concéntrico). La zona sombreada es la diferencia entre ambas superficies circulares.



Identificación de la figura

La figura sombreada se llama **corona circular** (o anillo circular). Es la región comprendida entre dos circunferencias concéntricas (con el mismo centro).

Datos

Radio del círculo exterior (grande): **R = 5 cm**

Radio del círculo interior (pequeño): **r = 3 cm**

Cálculo del Área de la Corona Circular

El área de la corona circular es la diferencia entre el área del círculo grande y el área del círculo pequeño:

$$A = \pi \cdot R^2 - \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (R^2 - r^2)$$

$$A = \pi \cdot (5^2 - 3^2) = \pi \cdot (25 - 9) = \pi \cdot 16 = 16\pi \text{ cm}^2$$

$$A \approx 16 \times 3{,}14159 \approx 50{,}27 \text{ cm}^2$$

Detalle del cálculo: Aplicamos la identidad algebraica de diferencia de cuadrados: $R^2 - r^2 = (R + r)(R - r) = (5 + 3)(5 - 3) = 8 \cdot 2 = 16$. Por lo que $A = 16\pi$ cm².

■ Área de la zona sombreada (corona circular): $16\pi \approx 50{,}27$ cm²

■ ¡SUERTE, JÓVENES! ■


Recuerda: las matemáticas no son difíciles, solo requieren práctica y un método ordenado. Si sigues los pasos con cuidado, siempre llegarás al resultado correcto.

PRONTUARIO DE FÓRMULAS

Figura / Concepto	Fórmula	Significado
Recta	$y = mx + b$	m = pendiente, b = corte con eje Y
Sistema de rectas	Igualar $y_1 = y_2$	Encontrar la abscisa del punto de corte
Parábola (vértice)	$x_v = -b / (2a)$	Abscisa del vértice de $y = ax^2 + bx + c$
Función lineal (coste)	$C(x) = ax + b$	a = coste/unidad, b = cuota fija
Semejanza	$k = l_2 / l_1$	Razón de semejanza entre lados homólogos
Trapecio (área)	$A = (B + b) / 2 \cdot h$	B = base mayor, b = base menor, h = altura
Trapecio (perímetro)	$P = B + b + 2l$	l = lado oblicuo (igual en isósceles)
Lado oblicuo trapecio	$l = \sqrt{[\, h^2 + ((B-b)/2)^2 \,]}$	Pitágoras en el triángulo auxiliar
Cono (generatriz)	$g = \sqrt{(r^2 + h^2)}$	Teorema de Pitágoras
Cono (área lateral)	$A_l = \pi \cdot r \cdot g$	r = radio base, g = generatriz
Cono (área total)	$A_t = \pi \cdot r \cdot (r + g)$	Base circular + lateral
Cono (volumen)	$V = (1/3) \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$	Un tercio del volumen del cilindro
Corona circular	$A = \pi (R^2 - r^2)$	R = radio ext., r = radio int.
Número π	$\pi \approx 3{,}14159265\ldots$	Razón entre circunferencia y diámetro

Ejercicio nº 1.-

La siguiente gráfica muestra los beneficios obtenidos por una empresa desde que comenzó a funcionar:



a) ¿Cuál es el dominio de definición? ¿Cuántos años ha estado en funcionamiento la empresa?

b) ¿En qué tramos es creciente la función y en cuáles es decreciente?

c) ¿Al cabo de cuánto tiempo obtiene la empresa el beneficio máximo? ¿Cuál es ese beneficio?

d) ¿Pierde dinero la empresa en algún momento? Razona tu respuesta.

Ejercicio nº 2.-

Representa la siguiente función e indica su nombre


a) $y = x^2 - 3x + 2$

Ejercicio nº 3.-

Halla la altura de un cono, sabiendo que el radio de la base mide 11 cm y su generatriz, 61 cm.


Ejercicio nº 4.-

Calcula la altura h del triángulo aplicando el teorema de Pitágoras.



Ejercicio nº 5.-

Halla el área de la parte coloreada:




$\overline{AB}$ =10 cm
$\overline{CD}$ =16 cm
$\overline{AC}$ =$\overline{BD}$ =5 cm


Ejercicio nº 6.-

Halla la superficie total de cada una de estas figuras:

a)




b)




Ejercicio nº 7.-

Halla el volumen de cada una de las siguientes figuras:


a)



b)



Perímetro de la base = 12,56 cm



CUADERNO DE EJERCICIOS

Matemáticas

Ejercicios de Funciones, Geometría y Cuerpos

> *«Las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el Universo.»*
>
> — Galileo Galilei

EDUCACIÓN SECUNDARIA · GEOMETRÍA & ÁLGEBRA

Índice de Ejercicios

01 **Ejercicio 1 — Análisis de una Gráfica de Beneficios** 3
Dominio · Crecimiento · Máximo · Pérdidas

02 **Ejercicio 2 — Representación de una Función Cuadrática** 4
Parábola · Vértice · Raíces · $y = x^2 - 3x + 2$

03 **Ejercicio 3 — Altura de un Cono** 5
Teorema de Pitágoras · Radio = 11 cm · Generatriz = 61 cm

04 **Ejercicio 4 — Altura de un Triángulo con Pitágoras** 6
Teorema de Pitágoras · Altura h · Triángulo rectángulo

05 **Ejercicio 5 — Área de la Parte Coloreada** 7
Área circular · Área de figura compuesta · Resta de áreas

06 **Ejercicio 6 — Superficie Total de Figuras** 8
Cubo · Cilindro · Pirámide · Fórmulas de superficie

07 **Ejercicio 7 — Volumen de Figuras Geométricas** 9
Cilindro · Cono · Perímetro base = 12,56 cm

FUNCIONES Y GRÁFICAS

EJ. 01

Análisis de una Gráfica de Beneficios de una Empresa

Enunciado: La siguiente gráfica muestra los beneficios obtenidos por una empresa desde que comenzó a funcionar. Observa atentamente la gráfica y responde a cada uno de los siguientes apartados de forma razonada y detallada:




Figura 1.1 — Representación de los beneficios (en miles de €) de la empresa a lo largo del tiempo (en años desde su apertura)

a **¿Cuál es el dominio de definición? ¿Cuántos años ha estado en funcionamiento la empresa?**

Analiza en qué intervalo del eje horizontal (tiempo, en años) existe la función representada en la gráfica. El dominio de definición es el conjunto de todos los valores de la variable independiente (tiempo) para los cuales la función está definida. Expresa el dominio en notación de intervalo e indica el número total de años de funcionamiento de la empresa según la gráfica.

b **¿En qué tramos es creciente la función y en cuáles es decreciente?**

Una función es creciente en un intervalo si al aumentar el valor de x, el valor de f(x) también aumenta. Es decreciente si al aumentar x, f(x) disminuye. Indica con precisión los intervalos de tiempo en que los beneficios crecen y los intervalos en los que disminuyen, apoyándote en la lectura visual de la gráfica.

c **¿Al cabo de cuánto tiempo obtiene la empresa el beneficio máximo? ¿Cuál es ese beneficio?**

El máximo absoluto de una función corresponde al punto más alto de su gráfica. Localiza ese punto en la curva, lee el valor de la variable independiente (tiempo en años) y el valor de la variable dependiente (beneficio en miles de euros) en ese punto, y exprésalo claramente indicando tanto el instante como la cuantía del beneficio máximo.

d **¿Pierde dinero la empresa en algún momento? Razona tu respuesta.**

La empresa pierde dinero cuando el beneficio toma valores negativos, es decir, cuando la gráfica de la función queda por debajo del eje horizontal (eje de abscisas, beneficio = 0). Observa si existe algún tramo en el que esto ocurra, identifica esos intervalos de tiempo y razona matemáticamente tu respuesta indicando en qué períodos exactos la empresa trabaja con pérdidas.

💡 **Recuerda:** Para analizar una función gráficamente, es fundamental identificar los puntos de corte con los ejes, los máximos y mínimos locales y globales, así como los tramos de crecimiento y decrecimiento. La zona por debajo del eje x indica valores negativos (pérdidas en este contexto).

EJ. 02

FUNCIONES CUADRÁTICAS — PARÁBOLAS

Representación de $y = x^2 - 3x + 2$ e Identificación de su Nombre

Enunciado: Representa la siguiente función en el plano cartesiano e indica el nombre de la curva que describe:

$$y = x^2 - 3x + 2$$

Para realizar la representación correctamente deberás calcular el vértice de la parábola, las raíces (puntos de corte con el eje x), el punto de corte con el eje y, la dirección de apertura y elaborar una tabla de valores que permita trazar la curva con precisión.




Figura 2.1 — Representación gráfica de la parábola $y = x^2 - 3x + 2$, con vértice y raíces indicados

a **Nombre de la curva:**

La gráfica de toda función cuadrática de la forma $y = ax^2 + bx + c$ (con $a \neq 0$) es una curva denominada **parábola**. Cuando el coeficiente del término cuadrático (a) es positivo, la parábola tiene concavidad hacia arriba (en forma de U). En este caso, $a = 1 > 0$, por tanto la parábola está abierta hacia arriba.

b **Cálculo del vértice de la parábola:**

El vértice $V = (x_v, y_v)$ es el punto mínimo (o máximo) de la parábola. Se calcula con las fórmulas:

— Abscisa del vértice: $x_v = -b / (2a) = -(-3) / (2 \cdot 1) = 3/2 = 1{,}5$

— Ordenada del vértice: $y_v = f(x_v) = (1{,}5)^2 - 3 \cdot (1{,}5) + 2 = 2{,}25 - 4{,}5 + 2 = \mathbf{-0{,}25}$

Por tanto, el vértice es $V = (1{,}5\ ;\ -0{,}25)$, que es el punto más bajo de la parábola.

c **Raíces — puntos de corte con el eje x:**

Para encontrar las raíces igualamos $y = 0$: $x^2 - 3x + 2 = 0$. Aplicando la fórmula cuadrática o factorizando:

$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) = 0 \rightarrow x_1 = 1$ y $x_2 = 2$

Los puntos de corte con el eje x son: $A = (1, 0)$ y $B = (2, 0)$.

d **Punto de corte con el eje y:**

Para el corte con el eje y hacemos $x = 0$: $y = (0)^2 - 3 \cdot (0) + 2 = \mathbf{2}$.

El punto de corte con el eje y es $C = (0, 2)$.

💡 **Recuerda:** La **parábola** es la gráfica de toda función cuadrática. Para representarla correctamente utiliza siempre el vértice como punto clave, luego calcula 3-4 puntos adicionales de forma simétrica respecto al eje de simetría, que pasa por $x = x_v$.

EJ. 03

GEOMETRÍA — CUERPOS DE REVOLUCIÓN

Cálculo de la Altura de un Cono mediante el Teorema de Pitágoras

Enunciado: Halla la altura de un cono, sabiendo que el radio de la base mide **r = 11 cm** y su generatriz (el segmento que une el vértice con cualquier punto de la circunferencia de la base) mide **g = 61 cm**.

Para resolver este problema deberás identificar el triángulo rectángulo formado por la altura, el radio y la generatriz del cono, y aplicar el Teorema de Pitágoras para despejar la altura h.




Figura 3.1 — Cono recto: el radio (r), la altura (h) y la generatriz (g) forman un triángulo rectángulo con el ángulo recto en el centro de la base

1 **Identificación del triángulo rectángulo:**
En un cono recto, la altura h es perpendicular a la base en su centro. Por tanto, la altura (h), el radio (r) y la generatriz (g) forman un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto se encuentra entre la altura y el radio.
— Hipotenusa: la generatriz g = 61 cm
— Catetos: la altura h (desconocida) y el radio r = 11 cm

2 **Aplicación del Teorema de Pitágoras:**
Por el Teorema de Pitágoras: $g^2 = h^2 + r^2$
Despejando h: $h^2 = g^2 - r^2$
$h^2 = 61^2 - 11^2 = 3721 - 121 = 3600$
$h = \sqrt{3600} =$ **60 cm**

3 **Verificación del resultado:**
Comprobamos: ¿Se cumple $g^2 = h^2 + r^2$?
$61^2 = 3721$ y $60^2 + 11^2 = 3600 + 121 = 3721$ ✓
El resultado es correcto. La **altura del cono es h = 60 cm**.

$$g^2 = h^2 + r^2 \rightarrow h = \sqrt{(g^2 - r^2)} = \sqrt{(61^2 - 11^2)} = \sqrt{3600} = 60 \text{ cm}$$

💡 **Recuerda:** En un cono recto, la generatriz (g), la altura (h) y el radio (r) siempre forman un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras establece que el cuadrado de la hipotenusa (la generatriz) es igual a la suma de los cuadrados de los catetos (altura y radio).

EJ. 04

GEOMETRÍA PLANA — TRIÁNGULOS

Cálculo de la Altura h de un Triángulo con el Teorema de Pitágoras

Enunciado: Calcula la altura h del triángulo aplicando el Teorema de Pitágoras. La altura es el segmento perpendicular trazado desde un vértice hasta el lado opuesto (o su prolongación), formando un ángulo recto con dicho lado.

Para resolver este ejercicio deberás identificar correctamente el triángulo rectángulo que se forma al trazar la altura, localizar la hipotenusa y los catetos, y aplicar el Teorema de Pitágoras despejando la medida desconocida.




Figura 4.1 — Triángulo ABC con altura h trazada desde el vértice C perpendicular a la base AB. El pie de la altura divide AB en dos segmentos.

1. **Identificación de los elementos del triángulo rectángulo:**
Al trazar la altura h desde el vértice C hasta la base AB, se forma un triángulo rectángulo (o dos, si la altura cae en el interior). En ese triángulo rectángulo:
— El cateto perpendicular es la altura h (valor buscado).
— El otro cateto es la proyección del lado sobre la base (segmento desde el pie de la altura hasta el vértice adyacente).
— La hipotenusa es el lado del triángulo original (por ejemplo, el cateto AC o BC según el triángulo parcial considerado).

2. **Aplicación del Teorema de Pitágoras:**
Para calcular h se aplica el Teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo formado:
$\text{hipotenusa}^2 = \text{cateto}_1^2 + \text{cateto}_2^2$
Despejando la altura h (cateto desconocido):
$h^2 = \text{hipotenusa}^2 - \text{cateto_conocido}^2$
$h = \sqrt{(\text{hipotenusa}^2 - \text{cateto_conocido}^2)}$

3. **Sustitución y cálculo:**
Sustituye los valores numéricos dados en el enunciado original (los datos del triángulo concreto), opera, obtén h^2 y extrae la raíz cuadrada para obtener h en centímetros.
Comprueba el resultado sustituyendo en la ecuación de Pitágoras original.

$$h = \sqrt{(c^2 - d^2)} \quad \text{donde } c = \text{hipotenusa, } d = \text{segmento base conocido}$$

💡 **Recuerda:** El **Teorema de Pitágoras** afirma que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos: $c^2 = a^2 + b^2$. Para calcular la altura de un triángulo, siempre busca el triángulo rectángulo auxiliar que se forma al trazar dicha altura.

EJ. 05

GEOMETRÍA — ÁREAS DE FIGURAS COMPUESTAS

Cálculo del Área de la Parte Coloreada de una Figura

Enunciado: Halla el área de la parte coloreada de la figura. La figura está formada por una o varias formas geométricas superpuestas. La región coloreada corresponde a la diferencia (o suma) de las áreas de dichas formas.

Para resolverlo deberás identificar las figuras geométricas que componen el dibujo, calcular sus áreas por separado utilizando las fórmulas correspondientes, y operar (sumar o restar) para obtener el área de la zona coloreada.




Figura 5.1 — Representación de una figura compuesta: la zona coloreada es la diferencia entre el área del círculo exterior y la figura interior inscrita

1. **Identificación de las figuras geométricas:**
Observa detenidamente la figura del enunciado. Identifica cada forma geométrica presente: ¿hay un círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un semicírculo, etc.? Anota las medidas relevantes de cada figura (radio, lado, base, altura, etc.) que aparecen indicadas en el enunciado o en la figura.

2. **Cálculo de las áreas individuales:**
— Área del círculo: $A_{círculo} = \pi \cdot R^2$
— Área del cuadrado: $A_{cuadrado} = L^2$
— Área del rectángulo: $A_{rectángulo} = base \times altura$
— Área del semicírculo: $A_{semi} = (\pi \cdot R^2) / 2$
— Área del triángulo: $A_{triángulo} = (base \times altura) / 2$
Sustituye los valores numéricos del enunciado en cada fórmula y calcula cada área por separado.

3. **Obtención del área coloreada:**
El área de la parte coloreada se obtiene restando el área de la figura interior (la zona que no está coloreada) al área de la figura exterior (o sumando si la región coloreada es la unión de varias):
$A_{coloreada} = A_{figura_exterior} - A_{figura_interior}$
Realiza la operación con los valores calculados en el paso anterior y expresa el resultado en las unidades correspondientes (cm^2, m^2, etc.), con los decimales necesarios.

$$A_{coloreada} = A_{exterior} - A_{interior}$$

💡 **Recuerda:** Las figuras compuestas se resuelven siempre **descomponiéndolas en figuras simples**. Calcula cada área de forma independiente y luego combínalas (suma o resta) para obtener el área de la región de interés. Presta atención a las unidades del resultado.

EJ. 06

GEOMETRÍA — CUERPOS GEOMÉTRICOS

Cálculo de la Superficie Total de Figuras Tridimensionales

Enunciado: Halla la superficie total de cada una de estas figuras. La superficie total de un cuerpo geométrico es la suma de las áreas de todas sus caras (incluyendo las bases).

Para cada figura deberás identificar su tipo (cubo, prisma, cilindro, cono, pirámide, esfera…), recordar la fórmula de la superficie total, identificar las medidas necesarias y aplicar la fórmula correctamente con los datos del enunciado.




Figura 6.1 — Cubo y cilindro como ejemplos ilustrativos de cuerpos geométricos. La superficie total engloba todas las caras incluyendo las bases.

1 **Fórmulas de superficie total de cuerpos frecuentes:**

— **Cubo:** $S = 6 \cdot a^2$ (siendo a la longitud de la arista)

— **Prisma rectangular:** $S = 2(ab + ac + bc)$ (siendo a, b, c sus dimensiones)

— **Cilindro:** $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r(r + h)$ (siendo r el radio y h la altura)

— **Cono:** $S = \pi r^2 + \pi rg = \pi r(r + g)$ (siendo g la generatriz)

— **Esfera:** $S = 4\pi r^2$

— **Pirámide regular:** $S = A_{base} + (Perímetro_{base} \cdot apotema) / 2$

2 **Procedimiento para cada figura del enunciado:**

Para cada figura que aparece en el ejercicio original:

(a) Identifica qué tipo de cuerpo geométrico es.

(b) Escribe la fórmula correspondiente de la superficie total.

(c) Sustituye los datos del enunciado (medidas) en la fórmula.

(d) Realiza los cálculos paso a paso, operando con el valor $\pi \approx 3{,}14159$.

(e) Expresa el resultado con dos decimales y en las unidades correctas (cm^2, m^2, etc.).

3 **Comprobación y resultado:**

Revisa que la suma de las áreas de todas las caras sea coherente con las dimensiones de la figura. Si el resultado es una superficie total, sus unidades deben ser siempre cuadradas (cm^2, m^2). Anota el resultado final de forma clara para cada figura.

Cilindro: $S = 2\pi r(r + h)$ | Cubo: $S = 6a^2$ | Cono: $S = \pi r(r + g)$

💡 **Recuerda:** La **superficie total** incluye todas las caras del sólido, tanto las laterales como las bases. No confundas la superficie total con la superficie lateral (que sólo incluye las caras que no son la base).

EJ. 07

GEOMETRÍA — VOLÚMENES

Cálculo del Volumen de Figuras Geométricas Tridimensionales

Enunciado: Halla el volumen de cada una de las siguientes figuras. Se sabe que una de las figuras tiene un **perímetro de la base = 12,56 cm**, dato que deberás utilizar para obtener el radio antes de aplicar la fórmula del volumen.

El volumen mide el espacio tridimensional ocupado por un cuerpo geométrico. Para calcularlo, debes identificar el tipo de sólido, aplicar la fórmula correcta e introducir los datos del enunciado, resolviendo primero cualquier incógnita auxiliar (como el radio a partir del perímetro de la base).




Figura 7.1 — Cilindro y Cono. El volumen del cono es exactamente un tercio del volumen del cilindro de igual base y altura.

1 **Obtención del radio a partir del perímetro de la base:**

El perímetro de la circunferencia base es: P = 2πr

Si P = 12,56 cm, entonces:

r = P / (2π) = 12,56 / (2 × 3,14159) = 12,56 / 6,28318 ≈ **2 cm**

Por tanto, el radio de la base del sólido correspondiente es r = 2 cm.

2 **Fórmulas de volumen de los principales cuerpos:**

— **Cilindro:** $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

— **Cono:** $V = (1/3) \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$

— **Esfera:** $V = (4/3) \cdot \pi \cdot r^3$

— **Prisma / Cubo:** $V = A_{base} \cdot h$

— **Pirámide:** $V = (1/3) \cdot A_{base} \cdot h$

3 **Cálculo del volumen para cada figura:**

Para cada sólido del enunciado:

(a) Identifica el tipo de cuerpo geométrico.

(b) Anota la fórmula del volumen correspondiente.

(c) Identifica los datos: radio (obtenido si es necesario del perímetro), altura u otras medidas.

(d) Sustituye en la fórmula y opera paso a paso.

(e) Expresa el resultado en unidades cúbicas: cm^3, m^3, etc. (con 2 decimales).

4 **Ejemplo de cálculo — Cilindro con r = 2 cm:**

Si la altura del cilindro fuera h (dada en el enunciado), el volumen sería:

$V_{cilindro} = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot 2^2 \cdot h = 4\pi h \approx 12{,}566 \cdot h\ cm^3$

Sustituye la altura concreta del enunciado para obtener el valor numérico final.

$$r = P / (2\pi) = 12{,}56 / (2\pi) \approx 2\ cm \quad | \quad V_{cil} = \pi r^2 h \quad | \quad V_{cono} = \tfrac{1}{3}\pi r^2 h$$

💡 **Recuerda:** El volumen del **cono** es exactamente **un tercio** del volumen del **cilindro** de igual base y altura. Esta relación es fundamental en geometría de sólidos. Para extraer el radio a partir del perímetro de la base usa siempre: $r = P / (2\pi)$.

Junta de Castilla y León
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

EXAMEN 3º ESO GRUPO B
EXAMEN FINAL JUNIO 2017

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

Nº1.- Calcula:

$a)\ \sqrt{\frac{-5}{9}+1}\cdot\left(-2+\frac{5}{4}\right)-\left(\frac{1}{4}-1\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}$ $\quad b)\ 5\sqrt{125}+6\sqrt{45}-7\sqrt{20}+\frac{3}{2}\sqrt{80}$

Nº2.- En un instituto hay 120 alumnos en segundo de la ESO, de los que dos tercios practican algún deporte. De aquellos que practican algún deporte, dos quintos juegan al fútbol, un quinto al tenis y el resto a varios deportes.

a) ¿Cuántos alumnos practican algún deporte?
b) ¿Cuántos juegan al fútbol?
c) ¿Cuántos al tenis?
d) ¿Cuántos a varios deportes?

Nº3.- Un comerciante tiene dos clases de aceite, la primera de 6 € el litro y la segunda de 7,20 € el litro. ¿Cuántos litros de cada clase hay que poner para obtener 60 litros de mezcla a 7 euros el litro?

Nº4.- Resuelve las ecuaciones:

$$a)\ (5x-4)^2-(3x+5)\cdot(2x-1)=20\cdot x\cdot(x-2)+27$$

$$b)\ \frac{5}{2}\cdot\left(\frac{7+x}{3}\right)=\frac{1}{3}\cdot\left(5-\frac{5x}{2}\right)+\frac{3x}{2}$$

Nº5.- Resuelve el siguiente sistema:

$$\begin{cases}3-\dfrac{x-y}{4}=x\\ x-\dfrac{y-3}{2}=5\end{cases}$$

Nº6.- La suma de los infinitos términos de una progresión es 12 y su razón r=1/2. Halla el primer término.

Nº7.- Una tienda ha vendido 60 ordenadores, cuyo precio original era de 1.200 €, con un descuento del 20% a unos y un 25% a otros. Si se han recaudado 56.400 €, Calcula a cuántos ordenadores se les rebajó el 25%.

Nº8.- Escribe las ecuaciones de las siguientes rectas:


a) Que pasa por los puntos A(2,4) y B(1,8)
b) Que pasa por A(1,2) y es paralela a la recta r: 3x+2y=4
c) Que pasa por el origen y es paralela al eje X.

Nº9.- Hállese el área total y el volumen de un cono de 16 cm de generatriz y cuya longitud de la circunferencia de la base es 18,84 cm

Nº10.- Calcula el radio de un círculo sabiendo que si aumentamos el radio en 4 cm se cuadruplica su área.

SUERTE

JÓVENES



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

3.º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA · GRUPO B

Matemáticas

Examen Final de Junio

Curso 2016–2017 · **10 Ejercicios** · **Junio 2017**

> *"Cuando lees una buena obra matemática, el placer que produces es comparable al de la más bella poesía. La ciencia no puede existir sin las matemáticas."*
>
> — MAX PLANCK · FÍSICO Y MATEMÁTICO ALEMÁN (1858–1947)

α β γ δ θ λ μ σ φ

Índice de Ejercicios

Examen Final de Matemáticas · 3.º ESO · Junio 2017

BLOQUE I · ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA

N.º 1 Cálculo con Radicales y Fracciones 3

N.º 2 Fracciones de una Cantidad · Problema de Alumnos 5

N.º 3 Mezclas y Proporciones · Precio del Aceite 7

N.º 4 Resolución de Ecuaciones de Primer y Segundo Grado 9

N.º 5 Sistema de Ecuaciones con Dos Incógnitas 12

BLOQUE II · SUCESIONES Y ECONOMÍA

N.º 6 Progresión Geométrica Infinita · Suma de Términos 14


N.º 7 Descuentos y Porcentajes · Venta de Ordenadores 16


BLOQUE III · GEOMETRÍA ANALÍTICA Y SÓLIDOS

N.º 8 Ecuaciones de la Recta en el Plano 18

N.º 9 Área Total y Volumen de un Cono 21

N.º 10 Radio de un Círculo · Cuadruplicar el Área 24





01

ARITMÉTICA · RADICALES Y FRACCIONES

Cálculo con Radicales y Fracciones




Figura 1.1 · Simplificación de fracciones bajo el signo radical y suma de radicales semejantes

✦ ENUNCIADO

Calcula las siguientes expresiones:

Apartado a)

$$\frac{\sqrt{\frac{-5}{9}+1}\cdot\left(-2+\frac{5}{4}\right)}{\left(\frac{1}{4}-2\right)\cdot\left(-\frac{3}{2}-1\right)}$$

Apartado b)

$$5\sqrt{125}+6\sqrt{45}-7\sqrt{20}+\sqrt{80}$$

✦ SOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) — Expresión con fracción, radical y potencia negativa

PASO 1 · SIMPLIFICAR LA EXPRESIÓN BAJO EL RADICAL

$$\frac{-5}{9} + 1 = \frac{-5}{9} + \frac{9}{9} = \frac{4}{9}$$

$$\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \frac{2}{3}$$

PASO 2 · CALCULAR LA BASE DEL PARÉNTESIS CON EXPONENTE −2

$$-2 + \frac{5}{4} = \frac{-8}{4} + \frac{5}{4} = \frac{-3}{4}$$

Aplicamos la potencia negativa: $(\text{base})^{-n} = \frac{1}{(\text{base})^n}$

$$\left(\frac{-3}{4}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{-3}{4}\right)^2} = \frac{1}{\frac{9}{16}} = \frac{16}{9}$$

PASO 3 · CALCULAR EL SEGUNDO FACTOR DEL SEGUNDO TÉRMINO

$$\frac{1}{4} - 1 = \frac{1}{4} - \frac{4}{4} = \frac{-3}{4}$$

PASO 4 · CALCULAR EL SEGUNDO TÉRMINO COMPLETO

$$\left(\frac{-3}{4}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{(-3)\cdot(-3)}{4\cdot 2} = \frac{9}{8}$$

PASO 5 · CALCULAR EL PRIMER TÉRMINO COMPLETO

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{16}{9} = \frac{32}{27}$$

PASO 6 · RESTA FINAL CON MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO (MCM(27,8) = 216)

$$\frac{32}{27} - \frac{9}{8} = \frac{32 \cdot 8}{216} - \frac{9 \cdot 27}{216} = \frac{256}{216} - \frac{243}{216} = \frac{13}{216}$$

Resultado del apartado a):

$$\frac{13}{216}$$

Apartado b) — Suma de radicales semejantes

Para sumar radicales, debemos expresarlos todos en función de $\sqrt{5}$ (radical semejante):

PASO 1 · DESCOMPONER CADA RADICAL

$$\sqrt{125} = \sqrt{(25 \cdot 5)} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{5} = 5\sqrt{5}$$

$$\sqrt{45} = \sqrt{(9 \cdot 5)} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

$$\sqrt{20} = \sqrt{(4 \cdot 5)} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$$

$$\sqrt{80} = \sqrt{(16 \cdot 5)} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{5} = 4\sqrt{5}$$

PASO 2 · SUSTITUIR Y OPERAR

$$5(5\sqrt{5}) + 6(3\sqrt{5}) - 7(2\sqrt{5}) + 4\sqrt{5}$$

$$= 25\sqrt{5} + 18\sqrt{5} - 14\sqrt{5} + 4\sqrt{5}$$

$$= (25 + 18 - 14 + 4) \cdot \sqrt{5}$$

$$= 33\sqrt{5}$$

Resultado del apartado b): $33\sqrt{5} \approx 73{,}82$

02

ARITMÉTICA · FRACCIONES DE UNA CANTIDAD

Fracciones de una Cantidad · Problema de Alumnos




Figura 2.1 · Diagrama de árbol de la distribución de alumnos por deporte

✦ ENUNCIADO

En un instituto hay **120 alumnos** en segundo de la ESO, de los que **dos tercios** practican algún deporte. De aquellos que practican algún deporte, **dos quintos** juegan al fútbol, **un quinto** al tenis y el **resto** a varios deportes.

a) ¿Cuántos alumnos practican algún deporte?

b) ¿Cuántos juegan al fútbol?

c) ¿Cuántos al tenis?

d) ¿Cuántos a varios deportes?

✦ SOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) — Alumnos que practican deporte

Dos tercios de 120 alumnos practican algún deporte:

$$\frac{2}{3} \cdot 120 =$$

$$\frac{240}{3}$$

$$= 80 \text{ alumnos}$$

a) 80 alumnos practican algún deporte

Apartado b) — Alumnos que juegan al fútbol

Dos quintos de los 80 que practican deporte juegan al fútbol:

$$80 \cdot \frac{2}{5} = \frac{160}{5}$$

$$= 32 \text{ alumnos}$$

b) 32 alumnos juegan al fútbol

Apartado c) — Alumnos que juegan al tenis

Un quinto de los 80 que practican deporte juegan al tenis:

$$80 \cdot \frac{1}{5} = \frac{80}{5}$$

$$= 16 \text{ alumnos}$$

c) 16 alumnos juegan al tenis

Apartado d) — Alumnos que practican varios deportes

El resto practica varios deportes. Comprobamos las fracciones:

Fracción que juega al fútbol + fracción que juega al tenis =

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$

Fracción restante = $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$

$$80 \cdot \frac{2}{5} = 32 \text{ alumnos}$$

Comprobación: 32 + 16 + 32 = 80 ✓

d) 32 alumnos practican varios deportes

Deporte	Fracción de deportistas	Cálculo	N.º alumnos
Fútbol	2/5	80 × 2/5	**32**
Tenis	1/5	80 × 1/5	**16**
Varios deportes	2/5	80 × 2/5	**32**
Total deportistas	5/5 = 1	—	**80**

ARITMÉTICA · MEZCLAS Y REGLA DE TRES

03 Mezclas y Proporciones · Precio del Aceite




Figura 3.1 · Representación visual del problema de mezcla de aceites y el sistema de ecuaciones

✦ ENUNCIADO

Un comerciante tiene dos clases de aceite: la **primera de 6 € el litro** y la **segunda de 7,20 € el litro**.

¿Cuántos litros de cada clase hay que poner para obtener **60 litros de mezcla a 7 euros el litro**?

✦ SOLUCIÓN COMPLETA

PASO 1 · DEFINICIÓN DE VARIABLES

Sea x = litros de aceite de 6 €/litro (tipo 1)

Sea y = litros de aceite de 7,20 €/litro (tipo 2)

PASO 2 · PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DE ECUACIONES

Condición 1 — La suma de litros de ambos tipos debe ser 60:

$$x + y = 60 \qquad \text{(Ecuación I)}$$

Condición 2 — El precio total de la mezcla (60 litros × 7 €/L = 420 €):

$$6x + 7{,}20y = 420 \qquad \text{(Ecuación II)}$$

PASO 3 · RESOLUCIÓN POR SUSTITUCIÓN

De la Ecuación I despejamos x:

$$x = 60 - y \qquad \text{(III)}$$

Sustituimos (III) en la Ecuación II:

$$6(60 - y) + 7{,}20y = 420$$

$$360 - 6y + 7{,}20y = 420$$

$$360 + 1{,}20y = 420$$

$$1{,}20y = 420 - 360 = 60$$

$$y = \frac{60}{1{,}20}$$

$$= 50 \text{ litros}$$

PASO 4 · CALCULAR EL VALOR DE X

$$x = 60 - y = 60 - 50 = 10 \text{ litros}$$

PASO 5 · VERIFICACIÓN

Comprobamos que las dos ecuaciones se satisfacen:

$$x + y = 10 + 50 = 60 \checkmark$$

$$6(10) + 7{,}20(50) = 60 + 360 = 420 = 60 \times 7 \checkmark$$

Solución: Se necesitan 10 litros del aceite de 6 €/L y 50 litros del aceite de 7,20 €/L

04

ÁLGEBRA · ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO

Resolución de Ecuaciones




Figura 4.1 · La ecuación como balanza — ambos lados deben ser iguales. Fórmula cuadrática general

✦ ENUNCIADO

Resuelve las siguientes ecuaciones:

Apartado a)

$$(5x - 4)^2 - (3x + 5)(2x - 1) = 20x(x - 2) + 27$$

Apartado b)

$$\frac{5}{2} \cdot \frac{7 + x}{3} = \frac{1}{3} \cdot \left(5 - \frac{5x}{2} + \frac{3x}{2}\right)$$

✦ SOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) — Ecuación de segundo grado

PASO 1 · DESARROLLAR EL CUADRADO DEL BINOMIO $(5X-4)^2$

Aplicamos la identidad notable: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$$(5x-4)^2 = 25x^2 - 40x + 16$$

PASO 2 · DESARROLLAR EL PRODUCTO $(3X+5)(2X-1)$

Aplicamos la propiedad distributiva:

$$(3x+5)(2x-1) = 6x^2 - 3x + 10x - 5 = 6x^2 + 7x - 5$$

PASO 3 · DESARROLLAR EL LADO DERECHO $20X(X-2)+27$

$$20x(x-2) + 27 = 20x^2 - 40x + 27$$

PASO 4 · SUSTITUIR EN LA ECUACIÓN Y SIMPLIFICAR EL LADO IZQUIERDO

$$(25x^2 - 40x + 16) - (6x^2 + 7x - 5) = 20x^2 - 40x + 27$$

$$25x^2 - 40x + 16 - 6x^2 - 7x + 5 = 20x^2 - 40x + 27$$

$$19x^2 - 47x + 21 = 20x^2 - 40x + 27$$

PASO 5 · PASAR TODO AL LADO DERECHO E IGUALAR A CERO

$$0 = 20x^2 - 40x + 27 - 19x^2 + 47x - 21$$

$$0 = x^2 + 7x + 6$$

$$x^2 + 7x + 6 = 0$$

PASO 6 · FACTORIZAR O APLICAR LA FÓRMULA CUADRÁTICA

Buscamos dos números cuyo producto sea +6 y cuya suma sea +7: son **+1** y **+6**.

$$(x + 1)(x + 6) = 0$$

Por tanto:

$$x + 1 = 0 \quad \rightarrow \quad \mathbf{x_1 = -1}$$

$$x + 6 = 0 \quad \rightarrow \quad \mathbf{x_2 = -6}$$

Verificación para x = −1: (−5−4)² − (−3+5)(−2−1) = 81 − (2)(−3) = 81 + 6 = 87. Lado derecho: 20(−1)(−3) + 27 = 60 + 27 = 87 ✓

Solución apartado a): $x_1 = -1$ y $x_2 = -6$

Apartado b) — Ecuación con fracciones (primer grado)

PASO 1 · IDENTIFICAR EL MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO DE DENOMINADORES

Los denominadores son 2, 3 y 2. El **mcm(2, 3) = 6**. Multiplicamos toda la ecuación por 6:

$$6 \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{7+x}{3} = 6 \cdot \frac{1}{3} (5 - \frac{5x}{2}) + 6 \cdot \frac{3x}{2}$$

PASO 2 · SIMPLIFICAR TRAS MULTIPLICAR POR 6

$$5(7 + x) = 2(5 - \frac{5x}{2}) + 9x$$

$$35 + 5x = 10 - 5x + 9x$$

$$35 + 5x = 10 + 4x$$

PASO 3 · DESPEJAR LA INCÓGNITA X

$$5x - 4x = 10 - 35$$

$$x = -25$$


Verificación: Lado izq.: (5/2)·(7+(−25))/3 = (5/2)·(−18/3) = (5/2)·(−6) = −15. Lado der.: (1/3)·(5−(5·(−25)/2)) + (3·(−25)/2) = (1/3)·(5+62,5) − 37,5 = 22,5 − 37,5 = −15 ✓

Solución apartado b): x = −25

05

ÁLGEBRA · SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Sistema de Ecuaciones con Dos Incógnitas



Sistema:

$$\begin{cases} 3 - (x-y)/4 = x \\ x - (y-3)/2 = 5 \end{cases}$$

Figura 5.1 · Interpretación geométrica: la solución del sistema es la intersección de dos rectas en el plano

✦ ENUNCIADO

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3 - \dfrac{x-y}{4} = x \\ x - \dfrac{y-3}{2} = 5 \end{cases}$$

✦ SOLUCIÓN COMPLETA — MÉTODO DE SUSTITUCIÓN

PASO 1 · TRANSFORMAR LA PRIMERA ECUACIÓN (MULTIPLICAR POR 4)

$$4 \cdot 3 - 4 \cdot \frac{x-y}{4} = 4x$$

$$12 - (x - y) = 4x$$

$$12 - x + y = 4x$$

$$y = 4x + x - 12 = 5x - 12 \quad \rightarrow \quad y = 5x - 12 \quad (I)$$

PASO 2 · TRANSFORMAR LA SEGUNDA ECUACIÓN (MULTIPLICAR POR 2)

$$2x - 2 \cdot \frac{y-3}{2}$$

$$= 2 \cdot 5$$

$$2x - (y - 3) = 10$$

$$2x - y + 3 = 10$$

$$2x - y = 7 \quad \rightarrow \quad (II)$$

PASO 3 · SUSTITUIR (I) EN (II)

$$2x - (5x - 12) = 7$$

$$2x - 5x + 12 = 7$$

$$-3x = 7 - 12 = -5$$

$$x = \frac{5}{3}$$

PASO 4 · CALCULAR Y SUSTITUYENDO X EN (I)

$$y = 5 \cdot \frac{5}{3}$$

$$- 12 = \frac{25}{3}$$

$$-$$

$\frac{36}{3}$ = $\frac{-11}{3}$

PASO 5 · VERIFICACIÓN EN LAS ECUACIONES ORIGINALES

En la ec. I: $3 - (x-y)/4 = 3 - (5/3 - (-11/3))/4 = 3 - (16/3)/4 = 3 - 4/3 = 9/3 - 4/3 = 5/3 = x$ ✓


En la ec. II: $x - (y-3)/2 = 5/3 - ((-11/3)-3)/2 = 5/3 - (-20/3)/2 = 5/3 + 10/3 = 15/3 = 5$ ✓

Solución del sistema: $x = \frac{5}{3}$; $y = \frac{-11}{3}$

06

SUCESIONES · PROGRESIÓN GEOMÉTRICA

Progresión Geométrica Infinita · Suma de Términos



Fórmula de la suma infinita:

$S_\infty = a_1 / (1 - r)$

$12 = a_1 / (1 - 1/2)$

$\mathbf{a_1 = 12 \times 1/2 = 6}$

Figura 6.1 · Representación geométrica: cuadrados que se reducen con razón r = 1/2 y su suma infinita converge a un valor finito

✦ ENUNCIADO

La **suma de los infinitos términos** de una progresión geométrica es **12** y su razón es **r = 1/2**.

Halla el **primer término** de la progresión.

✦ SOLUCIÓN COMPLETA

PASO 1 · CONDICIÓN PARA QUE EXISTA SUMA INFINITA

Una progresión geométrica de razón *r* tiene suma infinita **sólo si |r| < 1**.

En nuestro caso r = 1/2, y |1/2| = 0,5 < 1, por lo que **la suma infinita existe**.

PASO 2 · FÓRMULA DE LA SUMA DE UNA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA INFINITA

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - r}$$

Donde a_1 es el primer término y *r* es la razón.

PASO 3 · SUSTITUIR LOS DATOS Y DESPEJAR A₁

$$12 = \frac{a_1}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$=$$

$$\frac{a_1}{\frac{1}{2}}$$

$$12 = a_1 \cdot 2$$

$$a_1 =$$

$$\frac{12}{2}$$

$$= 6$$

PASO 4 · VERIFICACIÓN — LOS PRIMEROS TÉRMINOS DE LA PROGRESIÓN

$$a_1 = 6, \quad a_2 = 6 \cdot$$

$$\frac{1}{2}$$

$$= 3, \quad a_3 =$$

$$\frac{3}{2}$$

,

$$a_4 =$$

$$\frac{3}{4}$$

,

$$\ldots$$

$$S_\infty = 6 + 3 +$$

$$\frac{3}{2}$$

$$+$$

$$\frac{3}{4}$$

$$+ \ldots =$$

$$\frac{6}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$=$$

$$\frac{6}{0{,}5}$$

$$= 12 \checkmark$$

El primer término de la progresión es: $a_1 = 6$

07

ARITMÉTICA · PORCENTAJES Y ECUACIONES

Descuentos y Porcentajes · Venta de Ordenadores




Figura 7.1 · Esquema de la venta de ordenadores con dos tipos de descuento diferentes

✦ ENUNCIADO

Una tienda ha vendido **60 ordenadores** cuyo precio original era de **1.200 €**, con un descuento del **20%** a unos y del **25%** a otros.

Si se han recaudado **56.400 €**, calcula a cuántos ordenadores se les rebajó el 25%.

✦ SOLUCIÓN COMPLETA

PASO 1 · CALCULAR LOS PRECIOS CON DESCUENTO

Precio con descuento del 20%:

$$1200 \cdot (1 - 0{,}20) = 1200 \cdot 0{,}80 = 960\,€$$

Precio con descuento del 25%:

$$1200 \cdot (1 - 0{,}25) = 1200 \cdot 0{,}75 = 900\,€$$

PASO 2 · DEFINICIÓN DE LA VARIABLE Y PLANTEAMIENTO

Sea x = número de ordenadores vendidos con el **25% de descuento**

Entonces: $(60 - x)$ = número de ordenadores vendidos con el **20% de descuento**

La recaudación total:

$$960 \cdot (60 - x) + 900 \cdot x = 56.400$$

PASO 3 · DESARROLLO Y RESOLUCIÓN

$$57.600 - 960x + 900x = 56.400$$

$$57.600 - 60x = 56.400$$

$$-60x = 56.400 - 57.600 = -1.200$$

$$x = \frac{-1.200}{-60}$$

$$= 20$$

PASO 4 · VERIFICACIÓN

$$960 \cdot (60 - 20) + 900 \cdot 20 = 960 \cdot 40 + 900 \cdot 20 = 38.400 + 18.000 = 56.400\,€ \checkmark$$

A 20 ordenadores se les aplicó el descuento del 25% (y a los 40 restantes el 20%)

08

GEOMETRÍA ANALÍTICA · RECTAS EN EL PLANO

Ecuaciones de la Recta en el Plano




Figura 8.1 · Las tres rectas representadas en el plano cartesiano — recta azul (a), roja (b) y verde (c)

✦ ENUNCIADO

Escribe las ecuaciones de las siguientes rectas:

a) Que pasa por los puntos A(2, 4) y B(1, 8)

b) Que pasa por A(1, 2) y es paralela a la recta r: 3x + 2y = 4

c) Que pasa por el origen y es paralela al eje X

✦ SOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) — Recta que pasa por A(2,4) y B(1,8)

PASO 1 · CALCULAR LA PENDIENTE

La pendiente de una recta que pasa por dos puntos se calcula como:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{8 - 4}{1 - 2} = \frac{4}{-1} = -4$$

PASO 2 · ECUACIÓN PUNTO-PENDIENTE USANDO EL PUNTO A(2,4)

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 4 = -4(x - 2)$$

$$y - 4 = -4x + 8$$

$$y = -4x + 12$$

a) $y = -4x + 12$ (o equivalentemente: $4x + y = 12$)

Apartado b) — Recta paralela a $3x + 2y = 4$ por A(1,2)

PASO 1 · HALLAR LA PENDIENTE DE LA RECTA DADA

Despejamos y de la ecuación $3x + 2y = 4$:

$$2y = -3x + 4 \quad \rightarrow \quad y = -\frac{3}{2}x + 2$$

La pendiente de la recta dada es $\mathbf{m = -3/2}$.

PASO 2 · LAS RECTAS PARALELAS TIENEN LA MISMA PENDIENTE

La recta buscada también tiene pendiente $\mathbf{m = -3/2}$.

$$y - 2 = -\frac{3}{2}(x - 1)$$

$$y - 2 = -\frac{3}{2}x + \frac{3}{2}$$

$$y = -\frac{3}{2}x + \frac{3}{2} + 2 = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}$$

También se puede expresar como: 3x + 2y = 7 (multiplicando por 2 y reordenando)

b) $y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}$

(o equivalentemente: $3x + 2y = 7$)

Apartado c) — Recta por el origen paralela al eje X

ANÁLISIS

Una recta paralela al eje X tiene **pendiente m = 0** (es horizontal).

Si además pasa por el origen (0, 0), su ordenada en el origen es **b = 0**.

$$y = m \cdot x + b = 0 \cdot x + 0 = 0$$

La recta y = 0 coincide exactamente con el eje de abscisas (eje X).

c) $y = 0$ (el eje X)

09

GEOMETRÍA · SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN · CONO

Área Total y Volumen de un Cono




Figura 9.1 · Cono recto con sus elementos: generatriz (l), radio (r), altura (h) y sección axial triangular

✦ ENUNCIADO

Hállese el **área total** y el **volumen** de un cono de **16 cm de generatriz** y cuya longitud de la circunferencia de la base es **18,84 cm**.

Nota: se usa el valor π ≈ 3,14

✦ SOLUCIÓN COMPLETA

PASO 1 · CALCULAR EL RADIO DE LA BASE A PARTIR DE LA CIRCUNFERENCIA

La longitud de la circunferencia es $C = 2\pi r$, luego:

$$r = \frac{C}{2\pi} = \frac{18{,}84}{2 \cdot 3{,}14} = \frac{18{,}84}{6{,}28} = 3 \text{ cm}$$

PASO 2 · CALCULAR LA ALTURA DEL CONO CON EL TEOREMA DE PITÁGORAS

En el triángulo rectángulo formado por la generatriz, el radio y la altura:

$$l^2 = r^2 + h^2 \quad \rightarrow \quad h^2 = l^2 - r^2 = 16^2 - 3^2 = 256 - 9 = 247$$

$$h = \sqrt{247} \approx 15{,}72 \text{ cm}$$

PASO 3 · CALCULAR EL ÁREA LATERAL DEL CONO

El área lateral de un cono recto es:

$$A_lateral = \pi \cdot r \cdot l = 3{,}14 \cdot 3 \cdot 16 = 3{,}14 \cdot 48 = 150{,}72 \text{ cm}^2$$

PASO 4 · CALCULAR EL ÁREA DE LA BASE

$$A_base = \pi \cdot r^2 = 3{,}14 \cdot 3^2 = 3{,}14 \cdot 9 = 28{,}26 \text{ cm}^2$$

PASO 5 · ÁREA TOTAL DEL CONO

$$A_total = A_lateral + A_base = 150{,}72 + 28{,}26 = 178{,}98 \text{ cm}^2$$

En términos exactos: $A_total = 48\pi + 9\pi = \mathbf{57\pi \text{ cm}^2}$

PASO 6 · CALCULAR EL VOLUMEN DEL CONO

La fórmula del volumen de un cono es $V = (1/3) \cdot A_base \cdot h$:

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 3{,}14 \cdot 9 \cdot 15{,}72 = \frac{1}{3} \cdot 444{,}56 \approx 148{,}15 \text{ cm}^3$$

Área total del cono: $57\pi \approx 178{,}98$ cm²

Volumen del cono: $\approx 148{,}15$ cm³

10 Radio de un Círculo · Cuadruplicar el Área

GEOMETRÍA · ÁREA DEL CÍRCULO · ECUACIÓN CUADRÁTICA




Figura 10.1 · Al aumentar el radio en 4 cm, el área se cuadruplica: el círculo azul tiene 4 veces el área del morado

✦ ENUNCIADO

Calcula el radio de un círculo sabiendo que si **aumentamos el radio en 4 cm**, su área se **cuadruplica**.

✦ SOLUCIÓN COMPLETA

PASO 1 · PLANTEAMIENTO DE LA ECUACIÓN

Sea r el radio original del círculo.

El área original es: $A = \pi r^2$

El área con radio aumentado $(r + 4)$ es: $A' = \pi(r + 4)^2$

La condición es que $A' = 4A$:

$$\pi(r + 4)^2 = 4 \cdot \pi r^2$$

PASO 2 · SIMPLIFICAR (DIVIDIR ENTRE Π)

$$(r + 4)^2 = 4r^2$$

PASO 3 · DESARROLLAR EL BINOMIO Y REORGANIZAR

$$r^2 + 8r + 16 = 4r^2$$

$$0 = 4r^2 - r^2 - 8r - 16$$

$$3r^2 - 8r - 16 = 0$$

PASO 4 · APLICAR LA FÓRMULA CUADRÁTICA (A=3, B=−8, C=−16)

$$r = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$$

$$= \frac{8 \pm \sqrt{(64 + 192)}}{6}$$

$$= \frac{8 \pm \sqrt{256}}{6}$$

$$= \frac{8 \pm 16}{6}$$

Las dos soluciones son:

$$r_1 = \frac{8 + 16}{6}$$

$$= \frac{24}{6}$$

$$= 4 \text{ cm}$$

$$r_2 = \frac{8 - 16}{6}$$

$$= \frac{-8}{6}$$

$$= -\frac{4}{3} \text{ cm}$$

PASO 5 · SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN VÁLIDA

El radio de un círculo no puede ser negativo, por lo que la solución $r_2 = -4/3$ se descarta.

La única solución válida es **r = 4 cm**.

PASO 6 · VERIFICACIÓN

Área original: $A = \pi \cdot 4^2 = 16\pi \text{ cm}^2$

Área nueva con r + 4 = 8 cm: $A' = \pi \cdot 8^2 = 64\pi \text{ cm}^2$

¿Se cuadruplica? $A' = 64\pi = 4 \cdot 16\pi = 4A$ ✓

El radio del círculo es: r = 4 cm

«Las matemáticas son el lenguaje en que Dios escribió el universo.»


— GALILEO GALILEI

Examen Final de Matemáticas · 3.º ESO · Grupo B · Junio 2017

✦ ✦ ✦

LIBRO DE EJERCICIOS Y SOLUCIONES

Matemáticas — 3º ESO



"La imaginación es más importante que el conocimiento."
— Albert Einstein

Departamento de Matemáticas
IES Tovar
Castilla y León

$1cm]$

Índice general

1. Enunciados del Examen Final **5**
1.1. Ejercicio 1: Operaciones con radicales y expresiones 6
1.2. Ejercicio 2: Problema de porcentajes y fracciones 7
1.3. Ejercicio 3: Mezcla de aceites 8
1.4. Ejercicio 4: Ecuaciones algebraicas 9
1.5. Ejercicio 5: Sistema de ecuaciones 10
1.6. Ejercicio 6: Progresión geométrica 11
1.7. Ejercicio 7: Problema de descuentos 12
1.8. Ejercicio 8: Rectas en el plano 13
1.9. Ejercicio 9: Cono — Área total y volumen 14
1.10. Ejercicio 10: Área de un círculo 15

2. Soluciones del Examen Final **17**
2.1. Solución del Ejercicio 1 18
2.2. Solución del Ejercicio 2 20
2.3. Solución del Ejercicio 3 21
2.4. Solución del Ejercicio 4 22
2.5. Solución del Ejercicio 5 23
2.6. Solución del Ejercicio 6 24
2.7. Solución del Ejercicio 7 25
2.8. Solución del Ejercicio 8 26
2.9. Solución del Ejercicio 9 27
2.10. Solución del Ejercicio 10 28

Capítulo 1

Enunciados del Examen Final

Introducción

Este capítulo contiene los enunciados completos del examen final de Matemáticas de 3º ESO, acompañados de ilustraciones artísticas realizadas con TikZ para facilitar la comprensión visual de cada problema.

1.1. Ejercicio 1: Operaciones con radicales y expresiones

Enunciado

Calcula:

a) $+1 \cdot (-2+4) - (1-1) \cdot (-2)$

b) $5\sqrt{125} + 6\sqrt{45} - \frac{7}{20} + \sqrt{80}$

Ilustración




Figura 1.1: Representación artística del ejercicio de radicales.

1.2. Ejercicio 2: Problema de porcentajes y fracciones

Enunciado

En un instituto hay 120 alumnos en segundo de la ESO, de los que dos tercios practican algún deporte. De aquellos que practican algún deporte:

- Dos quintos juegan al fútbol.
- Un quinto juega al tenis.
- El resto practica varios deportes.

Calcula:

a) ¿Cuántos alumnos practican algún deporte?

b) ¿Cuántos juegan al fútbol?

c) ¿Cuántos al tenis?

d) ¿Cuántos a varios deportes?

Ilustración




Figura 1.2: Diagrama artístico de distribución de alumnos por deporte.

1.3. Ejercicio 3: Mezcla de aceites

Enunciado

Un comerciante tiene dos clases de aceite:

- Primera clase: 6 € el litro.
- Segunda clase: 7,20 € el litro.

¿Cuántos litros de cada clase hay que mezclar para obtener 60 litros de mezcla a 7 €/litro?

Ilustración




Figura 1.3: Mezcla de aceites con diferentes precios.

1.4. Ejercicio 4: Ecuaciones algebraicas

Enunciado

Resuelve las ecuaciones:

a) $(5x-4)^2-(3x+5)(2x-1)=20x(x-2)+27$

b) Ecuación ilegible en el original. Se deja constancia del enunciado tal como aparece:

$$\cdot() = \cdot(5-\,)+2$$

Ilustración




Figura 1.4: Representación artística de ecuaciones algebraicas.

1.5. Ejercicio 5: Sistema de ecuaciones

Enunciado

Resuelve el siguiente sistema:

$$\begin{cases} \dfrac{xy-3}{3} = x \\ \dfrac{x-y}{4} = 5 \end{cases}$$

Ilustración




Figura 1.5: Representación artística de un sistema de ecuaciones.

1.6. Ejercicio 6: Progresión geométrica

Enunciado

La suma de los infinitos términos de una progresión geométrica es 12 y su razón es $r = \frac{1}{2}$. Halla el primer término.

Ilustración




Figura 1.6: Visualización de una progresión geométrica.

1.7. Ejercicio 7: Problema de descuentos

Enunciado

Una tienda ha vendido 60 ordenadores, cuyo precio original era de 1200 €. A algunos se les aplicó un descuento del 20 % y a otros del 25 %. Si se recaudaron 56 400 €, calcula cuántos ordenadores recibieron el descuento del 25 %.

Ilustración




Figura 1.7: Representación artística del problema de descuentos.

1.8. Ejercicio 8: Rectas en el plano

Enunciado

Escribe las ecuaciones de las siguientes rectas:

a) La recta que pasa por los puntos $A(2, 4)$ y $B(1, 8)$.

b) La recta que pasa por $A(1, 2)$ y es paralela a la recta $3x + 2y = 4$.

c) La recta que pasa por el origen y es paralela al eje X.

Ilustración




Figura 1.8: Representación artística de rectas en el plano.

1.9. Ejercicio 9: Cono — Área total y volumen

Enunciado

Hállese el área total y el volumen de un cono cuya generatriz mide 16 cm y cuya circunferencia de la base es 18.84 cm.

Ilustración





Figura 1.9: Cono con generatriz y base.

1.10. Ejercicio 10: Área de un círculo

Enunciado

Calcula el radio de un círculo sabiendo que, si aumentamos el radio en 4 cm, su área se cuadruplica.

Ilustración



El área se cuadruplica al aumentar el radio en 4 cm

Figura 1.10: Comparación de áreas de dos círculos.

Capítulo 2

Soluciones del Examen Final

Introducción

En este capítulo se desarrollan todas las soluciones de los ejercicios del examen final de Matemáticas de 3º ESO. Cada solución está explicada paso a paso, sin omitir razonamientos, y acompañada de ilustraciones cuando es útil para la comprensión.

2.1. Solución del Ejercicio 1

a) Operación combinada

$$+1 \cdot (-2+4) - (1-1) \cdot (-2)$$

Primero resolvemos los paréntesis:

$$-2+4=2$$

$$1-1=0$$

Sustituimos:

$$1 \cdot 2 - 0 \cdot (-2)$$

Calculamos:

$$1 \cdot 2 = 2$$

$$0 \cdot (-2) = 0$$

Resultado final:

$$\boxed{2}$$

b) Expresión con radicales

$$5\sqrt{125} + 6\sqrt{45} - \frac{7}{20} + \sqrt{80}$$

Simplificamos cada radical:

$$\sqrt{125} = \sqrt{25 \cdot 5} = 5\sqrt{5}$$

$$\sqrt{45} = \sqrt{9 \cdot 5} = 3\sqrt{5}$$

$$\sqrt{80} = \sqrt{16 \cdot 5} = 4\sqrt{5}$$

Sustituimos:

$$5(5\sqrt{5}) + 6(3\sqrt{5}) - \frac{7}{20} + 4\sqrt{5}$$

Multiplicamos:

$$25\sqrt{5} + 18\sqrt{5} + 4\sqrt{5} - \frac{7}{20}$$

Sumamos radicales:

$$(25 + 18 + 4)\sqrt{5} = 47\sqrt{5}$$

Resultado final:

$$\boxed{47\sqrt{5} - \frac{7}{20}}$$

2.2. Solución del Ejercicio 2

a) Alumnos que practican deporte

$$\frac{2}{3} \cdot 120 = 80$$

$$\boxed{80 \text{ alumnos practican deporte}}$$

b) Alumnos que juegan al fútbol

$$\frac{2}{5} \cdot 80 = 32$$

$$\boxed{32}$$

c) Alumnos que juegan al tenis

$$\frac{1}{5} \cdot 80 = 16$$

$$\boxed{16}$$

d) Alumnos que practican varios deportes

$$80 - 32 - 16 = 32$$

$$\boxed{32}$$

2.3. Solución del Ejercicio 3

Sea:

$$x = \text{litros de aceite de 6 €/L}$$

$$y = \text{litros de aceite de 7.20 €/L}$$

Sistema:

$$\begin{cases} x + y = 60 \\ 6x + 7{,}2y = 7 \cdot 60 \end{cases}$$

Segundo miembro:

$$7 \cdot 60 = 420$$

Sustituimos $x = 60 - y$:

$$6(60 - y) + 7{,}2y = 420$$

Desarrollamos:

$$360 - 6y + 7{,}2y = 420$$

$$360 + 1{,}2y = 420$$

$$1{,}2y = 60$$

$$y = 50$$

$$x = 10$$

$$\boxed{x = 10 \text{ L}, \quad y = 50 \text{ L}}$$

2.4. Solución del Ejercicio 4

a) Ecuación algebraica

$$(5x-4)^2-(3x+5)(2x-1)=20x(x-2)+27$$

Desarrollamos:

$$(25x^2-40x+16)-(6x^2+7x-5)=20x^2-40x+27$$

Quitamos paréntesis:

$$25x^2-40x+16-6x^2-7x+5=20x^2-40x+27$$

Simplificamos:

$$19x^2-47x+21=20x^2-40x+27$$

Pasamos todo a la derecha:

$$0=x^2+7x+6$$

Factorizamos:

$$x^2+7x+6=(x+1)(x+6)$$

Soluciones:

$$\boxed{x=-1,\quad x=-6}$$

b) Ecuación ilegible

No se puede resolver por falta de información en el enunciado original.

2.5. Solución del Ejercicio 5

Sistema:

$$\begin{cases} \dfrac{xy-3}{3} = x \\ \dfrac{x-y}{4} = 5 \end{cases}$$

Segunda ecuación:

$$x - y = 20$$

$$x = y + 20$$

Sustituimos en la primera:

$$\frac{(y+20)y - 3}{3} = y + 20$$

Multiplicamos por 3:

$$y^2 + 20y - 3 = 3y + 60$$

$$y^2 + 17y - 63 = 0$$

Factorizamos:

$$(y+21)(y-3) = 0$$

Soluciones:

$$y = -21, \quad y = 3$$

Para cada una:
1. Si $y = 3$:

$$x = 23$$

2. Si $y = -21$:

$$x = -1$$

Soluciones:

$$\boxed{(x, y) = (23, 3) \quad \text{o} \quad (-1, -21)}$$

2.6. Solución del Ejercicio 6

Suma infinita:

$$S = \frac{a}{1-r}$$

Dado:

$$S = 12, \quad r = \frac{1}{2}$$

Sustituimos:

$$12 = \frac{a}{1-\frac{1}{2}} = \frac{a}{\frac{1}{2}}$$

$$12 = 2a$$

$$\boxed{a = 6}$$

2.7. Solución del Ejercicio 7

Sea:

$$x = \text{ordenadores con } 20\,\% \text{ de descuento}$$

$$y = \text{ordenadores con } 25\,\% \text{ de descuento}$$

Sistema:

$$\begin{cases} x + y = 60 \\ 960x + 900y = 56\,400 \end{cases}$$

Sustituimos $x = 60 - y$:

$$960(60 - y) + 900y = 56\,400$$

$$57\,600 - 960y + 900y = 56\,400$$

$$-60y = -1\,200$$

$$y = 20$$

$$\boxed{20 \text{ ordenadores tuvieron el } 25\,\% \text{ de descuento}}$$

2.8. Solución del Ejercicio 8

a) Recta por A(2,4) y B(1,8)

Pendiente:

$$m = \frac{8-4}{1-2} = \frac{4}{-1} = -4$$

Ecuación:

$$y - 4 = -4(x - 2)$$

$$\boxed{y = -4x + 12}$$

b) Recta paralela a $3x + 2y = 4$

Pendiente de la recta dada:

$$2y = -3x + 4$$

$$m = -\frac{3}{2}$$

Pasa por A(1,2):

$$y - 2 = -\frac{3}{2}(x - 1)$$

$$\boxed{y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}}$$

c) Recta paralela al eje X

$$\boxed{y = 0}$$

2.9. Solución del Ejercicio 9

Circunferencia:

$$C = 18{,}84 = 2\pi r$$

$$r = \frac{18{,}84}{2\pi} = 3$$

Área total:

$$A = \pi r(r + g)$$

$$A = \pi \cdot 3(3 + 16) = 57\pi$$

Volumen:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

Altura:

$$h = \sqrt{g^2 - r^2} = \sqrt{16^2 - 3^2} = \sqrt{247}$$

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 9\sqrt{247}$$

$$\boxed{A = 57\pi \text{ cm}^2, \quad V = 3\pi\sqrt{247} \text{ cm}^3}$$

2.10. Solución del Ejercicio 10

Radio original: r
Nuevo radio:

$$r + 4$$

Área original:

$$A = \pi r^2$$

Área nueva:

$$A' = \pi(r + 4)^2$$

Condición:

$$\pi(r + 4)^2 = 4\pi r^2$$

Dividimos entre π:

$$(r + 4)^2 = 4r^2$$

Desarrollamos:

$$r^2 + 8r + 16 = 4r^2$$

$$3r^2 - 8r - 16 = 0$$

Resolución:

$$r = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 192}}{6}$$

$$r = \frac{8 \pm 16}{6}$$

Soluciones:

$$r = 4, \quad r = -\frac{4}{3}$$

El radio debe ser positivo:

$$\boxed{r = 4 \text{ cm}}$$

Cierre

Este libro ha sido elaborado con el objetivo de proporcionar a los estudiantes una herramienta clara, visual y completa para el estudio de los contenidos matemáticos de 3º de ESO. Incluye enunciados, ilustraciones y soluciones detalladas para facilitar la comprensión y el aprendizaje autónomo.

"La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles."

$0{,}2cm]^{-}RenDescartes$

Fin del libro

$\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a)$

$e^{i\pi} + 1 = 0$

EXÁMENES DE LÁDIS

2º BACHILLERATO

CURSO 2016–2017

"Toda ciencia, o bien es física, o bien es coleccionismo de sellos."

Ernest Rutherford

Departamento de Matemáticas

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

Junta de Castilla y León

EXAMEN MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIALES

2º BACH. 10/11/2016

Nº1.- Las pérdidas o ganancias de una empresa, en millones de euros, siguen una ley que viene dada por la siguiente función:

$$f(x) = \frac{2x-4}{x+2}$$

siendo *x* los años de vida de la empresa.

a) Determina el año en que la empresa deja de tener pérdidas

b) ¿Están sus beneficios limitados? Si lo están, ¿cuál es su límite?

(1 PUNTO)

Nº2.- Calcúlense los siguientes límites:

$$a)\ \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+3x}{3x-1}\right)^{3x} \qquad b)\ \lim_{x\to 2}\left(\frac{1}{x-2}-\frac{2x}{x^2-4}\right) \qquad c)\ \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{2x-1}\right)^{2x}$$

(1,5 PUNTOS)

Nº3.- Calcula las asíntotas de las siguientes funciones:

$$a)\ f(x)=\frac{x^2}{2x-1} \qquad b)\ f(x)=\frac{x}{2x-1} \qquad c)\ f(x)=\frac{1}{2x-1}$$

(1,5 PUNTOS)

Nº4.- Calcúlense los valores de los parámetros a y b para que la siguiente función sea derivable en x= 1.

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{b}{2-x} & si\ x\le 1\\ ax^2-3x+1 & si\ x>1\end{cases}$$

(2 PUNTOS)

Nº5.- Un fabricante puede producir juguetes a un coste de 20 euros cada uno. Se estima que si los juguetes se venden a x euros cada uno, los usuarios comprarán (120-x) de ellos al mes. Expresa el beneficio mensual del fabricante como una función del precio, dibuja esta función y utiliza el gráfico para estimar el precio óptimo de venta.

(2 PUNTOS)

Nº6.- El rendimiento de una máquina, a lo largo de las 7 horas que permanece en funcionamiento cada día, viene dado por la función $f(x) = x^3 - 10{,}5x^2 + 30\,x$ donde $x \in (0,7)$ indica el número de horas transcurridas desde que la máquina se pone en marcha.

a) Determina en qué momento se produce el máximo y el mínimo rendimiento.

b) Calcula el rendimiento de la máquina en esos dos momentos del día.

(2 PUNTOS)


SUERTE JÓVENES

MATEMÁTICAS · CIENCIAS SOCIALES

Cálculo de Límites y Derivadas

Resolución Completa de Ejercicios

2.º Bachillerato · Curso 2016–2017



> *«Un experto es alguien que ha cometido todos los errores posibles en un campo muy reducido.»*
>
> *— Niels Bohr, físico y matemático danés (1885–1962)*

Examen · 10 de noviembre de 2016 | Documento elaborado con resoluciones detalladas y completas

Índice de Contenidos

Resolución completa de todos los ejercicios del examen

EJERCICIOS DEL EXAMEN

Ejercicio 1 — Pérdidas y Ganancias de una Empresa 3

Ejercicio 2 — Cálculo de Límites 5

Ejercicio 3 — Cálculo de Asíntotas 8

Ejercicio 4 — Función Derivable en un Punto 12

Ejercicio 5 — Optimización: Fabricante de Juguetes 15

Ejercicio 6 — Máximos y Mínimos del Rendimiento 18

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS

Ejercicio	Tema	Puntos
1	Análisis de función racional — pérdidas/ganancias	1,0
2	Cálculo de tres límites (forma 1^{∞}, indeterminación, potencia)	1,5
3	Asíntotas de tres funciones racionales	1,5
4	Derivabilidad de función a trozos — parámetros a y b	2,0
5	Optimización económica — precio óptimo de venta	2,0
6	Máximos y mínimos de función de rendimiento	2,0
TOTAL		**10,0**

EJERCICIO N.º 1

Pérdidas y Ganancias de una Empresa

1 PUNTO

📋 **ENUNCIADO**

Las pérdidas o ganancias de una empresa, en millones de euros, siguen una ley dada por la función:

$$f(x) = \frac{2x - 4}{x + 2}$$

siendo x los años de vida de la empresa.

a) Determina el año en que la empresa deja de tener pérdidas.

b) ¿Están sus beneficios limitados? Si lo están, ¿cuál es su límite?




Figura 1.1 – Representación gráfica de f(x) = (2x−4)/(x+2). Se observan las asíntotas y el punto donde la función cruza el eje X (año en que cesan las pérdidas).

✏ RESOLUCIÓN COMPLETA

📐 CONCEPTO CLAVE

La función **f(x)** representa las pérdidas (valores negativos) y ganancias (valores positivos) de la empresa en función del año de vida **x**. La empresa *deja de tener pérdidas* cuando **f(x) = 0** (cruce con el eje X) o cuando **f(x) > 0** (la función se hace positiva).

Apartado a) — Año en que la empresa deja de tener pérdidas

La empresa deja de tener pérdidas cuando la función cambia de signo negativo a positivo, es decir, cuando **f(x) = 0**.

1. **Igualamos el numerador a cero** (ya que una fracción es cero cuando su numerador es cero y su denominador es distinto de cero):

$$f(x) = 0 \iff 2x - 4 = 0 \iff x = 2$$

2. **Verificamos el denominador** en x = 2: $x + 2 = 2 + 2 = 4 \neq 0$ ✓

3. **Verificamos el cambio de signo**: Para x < 2 (por ejemplo x = 0): $f(0) = (0-4)/(0+2) = -4/2 = -2 < 0$ (pérdidas). Para x > 2 (por ejemplo x = 4): $f(4) = (8-4)/(4+2) = 4/6 > 0$ (ganancias).

✅ **RESPUESTA APARTADO A)**

La empresa deja de tener pérdidas a partir del año x = 2

Apartado b) — ¿Están sus beneficios limitados?

Para determinar si los beneficios están limitados, calculamos el límite de la función cuando el tiempo tiende a infinito (es decir, a muy largo plazo).

1. **Calculamos el límite en +∞**. Dividimos numerador y denominador por x (la mayor potencia):

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2x - 4}{x + 2} = \lim_{x \to +\infty} \frac{2 - 4/x}{1 + 2/x} = \frac{2 - 0}{1 + 0} = \mathbf{2}$$

2 **Interpretación económica:** El límite es 2, lo que indica que la función tiene una **asíntota horizontal** en $y = 2$. Esto significa que, por muy grande que sea la vida de la empresa, sus ganancias *nunca superarán* los 2 millones de euros, aunque se aproximarán indefinidamente a ese valor.

> ⚠ **Nota importante:** La función también tiene una asíntota vertical en $x = -2$ (cuando el denominador se anula), pero como estamos hablando de años de vida ($x \geq 0$), esta asíntota no es relevante para el contexto del problema.

✅ RESPUESTA APARTADO B)

Sí, los beneficios están limitados. El límite es 2 millones de euros (asíntota horizontal $y = 2$).

EJERCICIO N.º 2

Cálculo de Límites

1,5 PUNTOS

📋 ENUNCIADO

Calcúlense los siguientes límites:

$$\text{a) } \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+3x}{3x-1}\right)^{3x} \qquad \text{b) } \lim_{x\to 2}\left(\frac{2x}{x-2}-\frac{x}{x^2-4}\right) \qquad \text{c) } \lim_{x\to\infty}\left(x+\frac{1}{2x-1}\right)^{2x}$$




Figura 2.1 – Comportamiento de las tres funciones al aproximarse al límite. Izquierda: convergencia a e^2. Centro: divergencia a $\pm\infty$. Derecha: convergencia a 0.

✏ RESOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) — $\lim_{x\to\infty}\left[(1+3x)/(3x-1)\right]^{3x}$

1 **Identificamos la indeterminación:** Cuando $x \to \infty$, la base $(1+3x)/(3x-1) \to 1$, y el exponente $3x \to \infty$. Se trata de la indeterminación del tipo $\mathbf{1^{\infty}}$.

2 **Reescribimos la base** para aislar el «exceso» respecto a 1:

$$\frac{1+3x}{3x-1} = 1 + \frac{(1+3x)-(3x-1)}{3x-1} = 1 + \frac{2}{3x-1}$$

3 **Aplicamos la fórmula estándar** para límites del tipo $(1 + \alpha/n)^n \to e^{\alpha}$:

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{2}{3x-1}\right)^{3x}$$

Hacemos el cambio $u = 3x - 1$, de modo que cuando $x \to \infty$, también $u \to \infty$, y $3x = u + 1$. El límite se transforma en:

$$\lim_{u\to\infty} \left(1 + \frac{2}{u}\right)^{u+1} = \lim_{u\to\infty} \left[\left(1 + \frac{2}{u}\right)^{u} \cdot \left(1 + \frac{2}{u}\right)^{1}\right]$$

4 **Resolvemos cada factor:**

$$\lim_{u\to\infty} \left(1 + \frac{2}{u}\right)^{u} = e^{2} \quad \text{(definición del número e)}$$

$$\lim_{u\to\infty} \left(1 + \frac{2}{u}\right)^{1} = (1 + 0)^{1} = 1$$

✅ RESULTADO A)

$$\lim_{x\to\infty} [(1+3x)/(3x-1)]^{3x} = e^{2} \approx 7{,}389$$

Apartado b) — $\lim_{x\to 2} [2x/(x-2) - x/(x^2-4)]$

1 **Identificamos la indeterminación:** Si sustituimos x = 2 directamente, obtenemos denominadores nulos ($\infty - \infty$). Debemos operar algebraicamente.

2 **Factorizamos el denominador** del segundo sumando:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

3 **Reducimos a denominador común** $(x-2)(x+2)$:

$$\frac{2x}{x-2} - \frac{x}{(x-2)(x+2)} = \frac{2x(x+2) - x}{(x-2)(x+2)}$$

4 **Desarrollamos el numerador:**

$$2x(x+2) - x = 2x^2 + 4x - x = 2x^2 + 3x = x(2x + 3)$$

5 **El límite queda como:**

$$\lim_{x\to 2} \frac{x(2x + 3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{2\cdot(4+3)}{0\cdot 4} = \frac{14}{0}$$

Como el numerador tiende a $14 \neq 0$ y el denominador tiende a 0, el límite es infinito. Analizando los signos por la derecha y por la izquierda:

$$\lim_{x\to 2^+} = \frac{14}{0^+\cdot 4} = +\infty \qquad \lim_{x\to 2^-} = \frac{14}{0^-\cdot 4} = -\infty$$

✅ RESULTADO B)

El límite no existe (tiende a $\pm\infty$). La función tiene una asíntota vertical en $x = 2$.

Apartado c) — $\lim_{x\to\infty} [(x+1)/(2x-1)]^{2x}$

1 **Calculamos el límite de la base:**

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x+1}{2x-1} = \lim_{x\to\infty} \frac{1 + 1/x}{2 - 1/x} = \frac{1}{2}$$

Como la base tiende a $1/2 < 1$ y el exponente tiende a $+\infty$, tenemos $\mathbf{(1/2)^{\infty} \to 0}$.

2 **Confirmamos con logaritmos** (método exponencial riguroso). Sea $L = lim\ [(x+1)/(2x-1)]^{2x}$. Tomando logaritmo:

$$\ln L = \lim_{x\to\infty} 2x \cdot \ln\frac{(x+1)}{(2x-1)}$$

Para x grande: $ln[(x+1)/(2x-1)] = ln(1/2) + ln(1 + 3/(2x-1)) \approx ln(1/2) + 3/(2x)$

$$\ln L = \lim_{x\to\infty} 2x \cdot [\ln(1/2) + \frac{3}{2x}] = \lim_{x\to\infty} [2x\cdot\ln(1/2) + 3] = -\infty + 3 = -\infty$$

3 Por tanto: $\ln L = -\infty \Longrightarrow L = e^{-\infty} = 0$

✅ RESULTADO C)

$$\lim_{x\to\infty} [(x+1)/(2x-1)]^{2x} = 0$$

EJERCICIO N.º 3

Cálculo de Asíntotas de Funciones

1,5 PUNTOS

📋 ENUNCIADO

Calcula las asíntotas de las siguientes funciones:

$$\text{a) } f(x) = x^2/(2x-1) \quad \text{b) } f(x) = x/(2x-1) \quad \text{c) } f(x) = 1/(2x-1)$$




Figura 3.1 – Representación de las tres funciones con sus asíntotas. En rojo discontinuo las asíntotas horizontales/oblicuas, en naranja discontinuo las asíntotas verticales.

✏ RESOLUCIÓN COMPLETA

📐 TIPOS DE ASÍNTOTAS

Vertical (AV): $x = a$ cuando el denominador se anula y el numerador no.

Horizontal (AH): $y = L$ si $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = L$ (finito).

Oblicua (AO): $y = mx + n$ si $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)/x = m \neq 0$ y $\lim[f(x)-mx] = n$ (se produce cuando el grado del numerador supera en 1 al del denominador).

Apartado a) — $f(x) = x^2 / (2x - 1)$

Asíntota Vertical (AV):

1. Igualamos el denominador a cero: $2x - 1 = 0 \Longrightarrow x = 1/2$

   Verificamos: el numerador en $x = 1/2$ es $(1/2)^2 = 1/4 \neq 0$ ✓

$$\text{AV: } \mathbf{x = 1/2}$$

Asíntota Horizontal (AH):

2. El grado del numerador (2) es mayor que el del denominador (1), por lo que $\lim f(x) = \infty$. **No hay asíntota horizontal.**

Asíntota Oblicua (AO):

3. Como el grado del numerador supera en 1 al del denominador, existen asíntotas oblicuas. Calculamos la pendiente:

$$m = \lim_{x\to\infty} {}^{f(x)}\!/_{x} = \lim_{x\to\infty} {}^{x^2}\!/_{x(2x-1)} = \lim_{x\to\infty} {}^{x}\!/_{2x-1} = {}^{1}\!/_{2}$$

4. Calculamos el término independiente n. Realizamos la división polinómica de x^2 entre $(2x-1)$:

$$x^2 \div (2x-1) = {}^{x}\!/_{2} + {}^{1}\!/_{4} + {}^{1/4}\!/_{(2x-1)}$$

Verificación: $f(x) - (x/2 + 1/4) = 1/(4(2x-1)) \to 0$ cuando $x \to \infty$ ✓

$$n = \lim_{x\to\infty} [f(x) - {}^{x}\!/_{2}] = \lim_{x\to\infty} [{}^{x^2}\!/_{2x-1} - {}^{x}\!/_{2}] = \lim_{x\to\infty} {}^{2x^2 - x(2x-1)}\!/_{2(2x-1)}$$
$$= \lim_{x\to\infty} {}^{x}\!/_{2(2x-1)} = {}^{1}\!/_{4}$$

✅ ASÍNTOTAS DE $f(x) = x^2/(2x-1)$

AV: $x = 1/2$ | No hay AH | AO: $y = x/2 + 1/4$

Apartado b) — $f(x) = x / (2x - 1)$

Asíntota Vertical:

$$2x - 1 = 0 \Longrightarrow \mathbf{x = 1/2} \quad \text{(numerador en x=1/2: } 1/2 \neq 0 \text{ ✓)}$$

Asíntota Horizontal:

1. El grado del numerador (1) es igual al del denominador (1), así que existe asíntota horizontal:

$$\lim_{x\to\infty} {}^{x}\!/_{2x-1} = \lim_{x\to\infty} {}^{1}\!/_{2 - 1/x} = {}^{1}\!/_{2}$$

El mismo límite existe para $x \to -\infty$ (mismo resultado).

Asíntota Oblicua: Como existe asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua (no pueden coexistir en $\pm\infty$).

✅ ASÍNTOTAS DE F(X) = X/(2X−1)

AV: x = 1/2 | AH: y = 1/2 | No hay AO

Apartado c) — f(x) = 1 / (2x − 1)

Asíntota Vertical:

$$2x - 1 = 0 \Longrightarrow \mathbf{x = 1/2} \quad \text{(numerador: } 1 \neq 0 \text{ ✓)}$$

Asíntota Horizontal:

1. El grado del numerador (0) es menor que el del denominador (1):

$$\lim_{x\to\pm\infty} {}^{1}\!/_{2x-1} = 0$$

La función tiende a cero tanto por $+\infty$ como por $-\infty$. El eje X es la asíntota horizontal.

Asíntota Oblicua: No existe (el cociente $f(x)/x \to 0$ cuando $x \to \infty$).

✅ ASÍNTOTAS DE F(X) = 1/(2X−1)

AV: x = 1/2 | AH: y = 0 | No hay AO

Resumen comparativo de las tres funciones:

Función	A. Vertical	A. Horizontal	A. Oblicua
$x^2/(2x-1)$	x = 1/2	No existe	y = x/2 + 1/4
$x/(2x-1)$	x = 1/2	y = 1/2	No existe

$1/(2x-1)$	$x = 1/2$	$y = 0$	No existe

EJERCICIO N.º 4

Valores de a y b para que f sea Derivable en x = 1

2 PUNTOS

📋 ENUNCIADO

Calcúlense los valores de los parámetros **a** y **b** para que la siguiente función sea derivable en x = 1:

$$f(x) = \begin{cases} b/(2-x) & \text{si } x \leq 1 \\ ax^2 - 3x + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$




Figura 4.1 – Función a trozos con a = 1 y b = −1. Las dos ramas se unen en el punto (1, −1) de forma suave, sin «pico» ni discontinuidad, garantizando la derivabilidad.

✏ RESOLUCIÓN COMPLETA

📐 **CONDICIONES DE DERIVABILIDAD**

Para que una función definida a trozos sea derivable en un punto de empalme **x = c**, deben cumplirse *necesariamente* dos condiciones:

1) Continuidad: $\lim_{x\to c^-} f(x) = \lim_{x\to c^+} f(x) = f(c)$

2) Igualdad de derivadas laterales: $f'(c^-) = f'(c^+)$

La derivabilidad implica continuidad, pero no al revés.

Condición 1 — Continuidad en x = 1

1 **Límite por la izquierda** (usando la primera rama, válida para $x \leq 1$):

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} {}^{b}\!/_{2-x} = {}^{b}\!/_{2-1} = {}^{b}\!/_{1} = \mathbf{b}$$

También: *f(1) = b/(2−1) = b* (por ser x = 1 incluido en $x \leq 1$).

2 **Límite por la derecha** (usando la segunda rama, válida para $x > 1$):

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (ax^2 - 3x + 1) = a(1)^2 - 3(1) + 1 = a - 2$$

3 **Igualamos** para garantizar continuidad:

$$b = a - 2 \quad \Longrightarrow \quad \textbf{Ecuación (I)}$$

Condición 2 — Igualdad de Derivadas Laterales en x = 1

4 **Derivada de la primera rama** (para $x \leq 1$):

$$f(x) = {}^{b}\!/_{2-x} = b \cdot (2-x)^{-1}$$

$$f'(x) = b \cdot (-1) \cdot (2-x)^{-2} \cdot (-1) = {}^{b}\!/_{(2-x)^2}$$

Evaluamos en x = 1 (derivada por la izquierda):

$$f'(1^-) = {}^{b}\!/_{(2-1)^2} = {}^{b}\!/_{1} = \mathbf{b}$$

5 **Derivada de la segunda rama** (para $x > 1$):

$$f'(x) = 2ax - 3$$

Evaluamos en $x = 1$ (derivada por la derecha):

$$f'(1^+) = 2a(1) - 3 = \mathbf{2a - 3}$$

6 **Igualamos** las derivadas laterales:

$$b = 2a - 3 \implies \textbf{Ecuación (II)}$$

Resolución del Sistema de Ecuaciones

7 Tenemos el sistema:

$$\text{(I)} \quad b = a - 2$$
$$\text{(II)} \quad b = 2a - 3$$

Igualamos las expresiones de b:

$$a - 2 = 2a - 3 \implies -2 + 3 = 2a - a \implies 1 = a \implies \mathbf{a = 1}$$

Sustituimos en la ecuación (I):

$$b = 1 - 2 = \mathbf{-1}$$

8 **Verificación completa:** Con $a = 1$ y $b = -1$, la función es:

$$f(x) = \begin{cases} -1/(2-x) & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - 3x + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Continuidad: $f(1^-) = -1/(2-1) = -1 \;=\; f(1^+) = 1 - 3 + 1 = -1$ ✓

Derivabilidad: $f'(1^-) = b = -1 \;=\; f'(1^+) = 2(1) - 3 = -1$ ✓

✅ **RESULTADO FINAL**

$$\mathbf{a = 1 \quad b = -1}$$

EJERCICIO N.º 5

Optimización del Precio de Venta de Juguetes

2 PUNTOS

📋 ENUNCIADO

Un fabricante puede producir juguetes a un coste de **20 euros** cada uno. Se estima que si los juguetes se venden a **x euros** cada uno, los usuarios comprarán **(120 − x)** de ellos al mes.

Expresa el **beneficio mensual del fabricante** como función del precio, dibuja esta función y utiliza el gráfico para estimar el **precio óptimo de venta**.




Figura 5.1 – Función de beneficio mensual B(x) = (x−20)(120−x). La curva alcanza su máximo en x = 70 €, con un beneficio de 2.500 €.

✏ RESOLUCIÓN COMPLETA

📐 VARIABLES DEL PROBLEMA

x = precio de venta de cada juguete (en euros); es la variable independiente.

Demanda = número de juguetes vendidos al mes = (120 − x)

Coste de fabricación = 20 € por unidad

B(x) = beneficio mensual total = ingresos − costes

Paso 1 — Plantear la función de beneficio

1 **Ingresos totales** = precio × unidades vendidas:

$$\text{Ingresos} = x \cdot (120 - x)$$

2 **Costes totales** = coste unitario × unidades vendidas:

$$\text{Costes} = 20 \cdot (120 - x)$$

3 **Beneficio** = Ingresos − Costes:

$$B(x) = x(120-x) - 20(120-x) = (120-x)(x-20)$$

Desarrollando:

$$B(x) = 120x - x^2 - 2400 + 20x = \mathbf{-x^2 + 140x - 2400}$$

🔍 **Dominio natural:** Para que tenga sentido el problema, se necesita que:

• El precio supere el coste: $x > 20$ (si $x \leq 20$ no hay beneficio posible o se vende a pérdida).

• La demanda sea positiva: $120 - x > 0 \Longrightarrow x < 120$.

Por tanto, el **dominio válido** es **$20 < x < 120$**.

Paso 2 — Encontrar el precio óptimo (máximo de B)

4 **Derivamos** la función de beneficio:

$$B'(x) = -2x + 140$$

5 **Igualamos a cero** para hallar el punto crítico:

$$B'(x) = 0 \Longrightarrow -2x + 140 = 0 \Longrightarrow x = {}^{140}\!/_{2} = \mathbf{70}$$

6 **Verificamos que es máximo** con la segunda derivada:

$$B''(x) = -2 < 0 \quad \forall x \quad \checkmark \text{ (cóncava hacia abajo} \rightarrow \text{es un máximo)}$$

7 **Calculamos el beneficio máximo** en $x = 70$:

$$B(70) = (70 - 20)(120 - 70) = 50 \times 50 = \mathbf{2.500 \text{ euros/mes}}$$

Alternativamente: $B(70) = -(70)^2 + 140(70) - 2400 = -4900 + 9800 - 2400 = 2500$ ✓

8 **Número de juguetes vendidos** al precio óptimo:

$$120 - 70 = 50 \text{ juguetes/mes}$$

✅ RESULTADO FINAL

$B(x) = -x^2 + 140x - 2400$

Precio óptimo: $x^* = 70$ €

Beneficio máximo: $B(70) = 2.500$ €/mes

Unidades vendidas: 50 juguetes/mes

EJERCICIO N.º 6

Máximos y Mínimos del Rendimiento de una Máquina

2 PUNTOS

📋 **ENUNCIADO**

El rendimiento de una máquina, a lo largo de las 7 horas que permanece en funcionamiento cada día, viene dado por la función:

$$f(x) = x^3 - 10{,}5x^2 + 30x \quad \text{con } x \in (0, 7)$$

donde **x** indica el número de horas transcurridas desde que la máquina se pone en marcha.

a) Determina en qué momento se produce el máximo y el mínimo rendimiento.

b) Calcula el rendimiento de la máquina en esos dos momentos del día.




Figura 6.1 – Rendimiento de la máquina a lo largo del día. El máximo se alcanza a las 2 horas (rendimiento = 26) y el mínimo a las 5 horas (rendimiento = 12,5).

✏ RESOLUCIÓN COMPLETA

📐 MÉTODO PARA ENCONTRAR EXTREMOS RELATIVOS

1. Calcular $f'(x)$ y resolver $f'(x) = 0$ para obtener los puntos críticos.

2. Calcular $f''(x)$ y evaluar en los puntos críticos.

- Si $f''(c) < 0 \rightarrow$ **máximo relativo** en $x = c$.
- Si $f''(c) > 0 \rightarrow$ **mínimo relativo** en $x = c$.

3. Verificar que los puntos críticos pertenecen al dominio $(0, 7)$.

Apartado a) — Cálculo de máximo y mínimo

1 **Calculamos la primera derivada:**

$$f'(x) = 3x^2 - 21x + 30$$

2 **Igualamos a cero** para encontrar los puntos críticos:

$$3x^2 - 21x + 30 = 0$$

Dividimos todo entre 3 para simplificar:

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

Factorizamos (buscamos dos números que sumen 7 y multipliquen 10: son 2 y 5):

$$(x - 2)(x - 5) = 0 \Longrightarrow x_1 = 2 \quad x_2 = 5$$

Ambos valores pertenecen al intervalo $(0, 7)$ ✓

3 **Calculamos la segunda derivada:**

$$f''(x) = 6x - 21$$

4 **Evaluamos f′ en cada punto crítico:**

$$f'(2) = 6(2) - 21 = 12 - 21 = \mathbf{-9 < 0} \rightarrow \textbf{Máximo relativo} \text{ en } x = 2$$

$$f'(5) = 6(5) - 21 = 30 - 21 = \mathbf{+9 > 0} \rightarrow \textbf{Mínimo relativo} \text{ en } x = 5$$

✅ RESULTADO APARTADO A)

Máximo rendimiento: a las x = 2 horas de funcionamiento.

Mínimo rendimiento: a las x = 5 horas de funcionamiento.

Apartado b) — Cálculo del rendimiento en esos momentos

5 **Rendimiento máximo** (evaluamos f en x = 2):

$$f(2) = (2)^3 - 10{,}5 \cdot (2)^2 + 30 \cdot (2)$$

$$f(2) = 8 - 10{,}5 \cdot 4 + 60$$

$$f(2) = 8 - 42 + 60$$

$$f(2) = \mathbf{26}$$

6 **Rendimiento mínimo** (evaluamos f en x = 5):

$$f(5) = (5)^3 - 10{,}5 \cdot (5)^2 + 30 \cdot (5)$$

$$f(5) = 125 - 10{,}5 \cdot 25 + 150$$

$$f(5) = 125 - 262{,}5 + 150$$

$$f(5) = \mathbf{12{,}5}$$

7 **Tabla resumen de la variación del rendimiento:**

x (horas)	f'(x)	f(x)	Comportamiento
$0 \rightarrow 2$	$f'(x) > 0$	Creciente	↗ El rendimiento aumenta
$x = 2$	$f'(2) = 0$	$f(2) = 26$	▲ MÁXIMO
$2 \rightarrow 5$	$f'(x) < 0$	Decreciente	↘ El rendimiento baja
$x = 5$	$f'(5) = 0$	$f(5) = 12{,}5$	▼ MÍNIMO
$5 \rightarrow 7$	$f'(x) > 0$	Creciente	↗ El rendimiento sube de nuevo

✅ RESULTADO APARTADO B)

Rendimiento máximo: $f(2) = 26$ unidades (a las 2 horas de funcionamiento).

Rendimiento mínimo: $f(5) = 12{,}5$ unidades (a las 5 horas de funcionamiento).

📝 **Interpretación física:** La máquina arranca con bajo rendimiento, alcanza su pico máximo de eficiencia a las 2 horas, luego desciende hasta su mínimo a las 5 horas (posiblemente por fatiga mecánica o calentamiento), y posteriormente el rendimiento vuelve a subir hasta el final de la jornada.

$$\Sigma \int \infty$$

¡Resolución Completada!

«Las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo.»

— Galileo Galilei

2.º BACHILLERATO · MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIALES · 2016–2017

Junta de Castilla y León

EXAMEN MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIALES

2º BACH. 1/12/2016

Nº1.- Una empresa dedicada a montajes en cadena, ha determinado que el número de montajes, M(t), realizados por un trabajador sin experiencia depende de los días de entrenamiento, t, de acuerdo con la función: $M(t) = \frac{30\,t}{t+4}$

(a) ¿Cuántos montajes realizará el primer día de entrenamiento? ¿Y el sexto?
(b) ¿Existe un número de días de entrenamiento para los que el número de montajes es máximo? Razona la respuesta.
(c) ¿Qué ocurriría, con el número de montajes, si nunca acabara el entrenamiento? Justifícalo.

(1 PUNTO)

Nº2.- Calcúlense los siguientes límites:

$$a)\ \lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+3}{2x-1}\right)^{4x} \qquad b)\ \lim_{x\to\infty}\left(x-\sqrt{x^2+5x}\right) \qquad c)\ \lim_{x\to 2}\left(\frac{x^2-4}{x-2}\right)$$

(1,5 PUNTOS)

Nº3.- Dada la función $y=\frac{x^2}{x^2-4}$ Estudia:

a) Dominio
b) Simetría
c) Asíntotas
d) Crecimiento
e) Máximos y mínimos
f) Representación gráfica.

(1 PUNTO)

Nº4.- a) Calcúlense el valor del parámetro a para que la siguiente función sea continua en $x=1$

$$f(x)=\begin{cases} x+1 & si\ x\le 1 \\ x^2+ax+5 & si\ x>1 \end{cases}$$

b) Para ese valor de a ¿Es derivable la función en $x=1$?

(1 PUNTOS)

Nº5.- Una compañía de autobuses alquila un autobús de 50 plazas a grupos de 36 o más personas. Si un grupo contiene exactamente 36 personas, cada persona paga 60 euros. En grupos mayores, la tarifa de todos se reduce en un euro por cada persona que sobrepasa las 36.

(a) Halla la función que nos proporciona los ingresos de la compañía.

(b) Determina el tamaño del grupo para el cual los ingresos de la compañía sean máximos.

(2 PUNTOS)

Nº6.- El porcentaje de personas que sintonizan un programa de radio que se emite entre las 6 y las 12 horas viene dado, según la hora t, mediante la función:

$$S(t) = 660 - 231t + 27t^2 - t^3$$

i) ¿Qué porcentaje de personas sintonizan el programa al comenzar la emisión? ¿Y al cierre?

ii) ¿A qué hora tiene máxima y mínima audiencia? ¿Qué porcentaje de personas sintonizan el programa a dichas horas?

(2 PUNTOS)

Nº7.- a) Calcúlense las siguientes integrales indefinidas:

$$a) \int \frac{(x-1)}{3x^2 - 6x + 7}\, dx \qquad b) \int \ln(x)\, dx$$

b) Calcúlese el área del recinto limitado por la función $f(x) = \ln(x)$ entre $x = 1$ y $x = e$

(1,5 PUNTOS)

SUERTE JÓVENES



CIENCIAS SOCIALES · 2.º BACHILLERATO

Matemáticas Aplicadas

Ejercicios Resueltos con Rigor

EXAMEN · 1 DE DICIEMBRE DE 2016

"Nada es demasiado maravilloso para ser verdad si está de acuerdo con las leyes de la naturaleza."

— MICHAEL FARADAY

✦ ∞ ∫ ∂ Σ ✦

7 Ejercicios · Límites · Funciones · Continuidad · Optimización · Integrales

Curso Académico 2016 – 2017

Índice de Contenidos

NAVEGACIÓN POR EJERCICIOS RESUELTOS

EJERCICIOS DEL EXAMEN

Ej. 1 Función de Montajes en Cadena — Análisis de $M(t) = 30t/(t+4)$ 3

Ej. 2 Cálculo de Límites — Tres Indeterminaciones 5

Ej. 3 Estudio Completo de la Función $y = x/(x^2-4)$ 7

Ej. 4 Continuidad y Derivabilidad de una Función a Trozos 10

Ej. 5 Optimización de Ingresos — Compañía de Autobuses 12

Ej. 6 Audiencia de Radio — Máximos y Mínimos de $S(t)$ 14

Ej. 7 Integrales Indefinidas y Área entre Curvas 17

✦ ✦ ✦

Cada ejercicio incluye enunciado completo, desarrollo paso a paso e ilustración explicativa.

EJERCICIO 1 · 1 PUNTO

Función de Montajes en Cadena

Análisis de funciones racionales · Asíntotas · Interpretación aplicada

📋 ENUNCIADO

Una empresa dedicada a montajes en cadena ha determinado que el número de montajes *M(t)*, realizados por un trabajador sin experiencia, depende de los días de entrenamiento *t*, de acuerdo con la función:

$$M(t) = 30t / (t + 4)$$

(a) ¿Cuántos montajes realizará el primer día de entrenamiento? ¿Y el sexto?

(b) ¿Existe un número de días de entrenamiento para los que el número de montajes es máximo? Razona la respuesta.

(c) ¿Qué ocurriría con el número de montajes si nunca acabara el entrenamiento? Justifícalo.




Fig. 1 — Línea de montaje industrial. La función M(t) modela el aprendizaje de un trabajador.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Apartado (a) — Cálculo de M(1) y M(6)

Para calcular el número de montajes en el primer día de entrenamiento ($t = 1$), sustituimos directamente en la función:

$$M(1) = 30 \cdot 1 / (1 + 4) = 30 / 5 = 6 \text{ montajes}$$

El trabajador realiza únicamente **6 montajes** en su primer día. Es un valor reducido, coherente con su falta de experiencia.

Para el sexto día de entrenamiento ($t = 6$):

$$M(6) = 30 \cdot 6 / (6 + 4) = 180 / 10 = 18 \text{ montajes}$$

√ M(1) = 6 montajes; M(6) = 18 montajes

Podemos observar que en 6 días el trabajador triplica su producción inicial, lo que refleja una mejora significativa pero con ritmo de crecimiento decreciente.

Día (t)	Montajes M(t)
1	6,00
3	12,00
6	18,00
10	21,43
20	24,00
100	28,97

Apartado (b) — ¿Existe un número máximo de montajes?

Para determinar si existe un máximo, calculamos la derivada de $M(t)$ y analizamos su signo. Aplicando la regla del cociente, con numerador $u = 30t$ y denominador $v = t + 4$:

$$M'(t) = [30\cdot(t+4) - 30t\cdot1] / (t+4)^2 = [30t + 120 - 30t] / (t+4)^2$$

$$M'(t) = 120 / (t+4)^2$$

Analizamos el signo de $M'(t)$:

- El numerador es **120 > 0** siempre.
- El denominador **$(t+4)^2 > 0$** siempre (es un cuadrado).
- Por tanto, **$M'(t) > 0$** para todo t en el dominio de la función ($t > 0$).

⚠ Como la derivada es siempre positiva, la función es **estrictamente creciente** en todo su dominio. No existe ningún punto donde M'(t) = 0, por lo que **no existe máximo** en el sentido de extremo relativo.

✓ **No existe un número de días con máximo de montajes en sentido estricto. La función crece continuamente a medida que aumentan los días de entrenamiento.**

Apartado (c) — Comportamiento cuando t → +∞

Si el entrenamiento nunca acabara, debemos calcular el límite de M(t) cuando t tiende a infinito positivo:

$$\lim_{t\to+\infty} M(t) = \lim_{t\to+\infty} 30t / (t + 4)$$

Dividimos numerador y denominador entre *t* (la mayor potencia que aparece):

$$= \lim_{t\to+\infty} [30t/t] / [(t + 4)/t] = \lim_{t\to+\infty} 30 / (1 + 4/t)$$

Cuando t → +∞, el término 4/t → 0, luego:

$$= 30 / (1 + 0) = 30$$

✓ **lím M(t) = 30 cuando t → +∞**

La recta *y = 30* es una **asíntota horizontal** de la función. Esto significa que, por muy entrenado que esté el trabajador, **jamás podrá superar los 30 montajes por día**. Este valor representa la capacidad máxima teórica del sistema de producción.

📝 Nota: En términos de análisis matemático, M(t) = 30 − 120/(t+4), lo que muestra claramente que la diferencia respecto al límite 30 disminuye con el tiempo pero nunca llega a cero.

EJERCICIO 2 · 1,5 PUNTOS

Cálculo de Límites

Límites al infinito · Indeterminación 1^∞ · Forma $\infty-\infty$ · Forma 0/0

📋 ENUNCIADO

Calcúlense los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to\infty} [(2x+3)/(2x-1)]^{4x}$

b) $\lim_{x\to\infty} (x - \sqrt{(x^2 + 5x)})$

c) $\lim_{x\to 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$




Fig. 2 — Representación visual del concepto de límite: curvas que se aproximan a valores concretos.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) — Indeterminación 1^∞

Analizamos el tipo de indeterminación. Cuando $x \to \infty$:

- La base: $(2x+3)/(2x-1) \to 1$
- El exponente: $4x \to \infty$

Se trata de una indeterminación del tipo $\mathbf{1^\infty}$. Para resolverla, utilizamos la técnica del logaritmo neperiano. Sea:

$$L = \lim_{x\to\infty} [(2x+3)/(2x-1)]^{4x}$$

Tomamos logaritmo neperiano en ambos miembros:

$$\ln L = \lim_{x\to\infty} 4x \cdot \ln[(2x+3)/(2x-1)]$$

Reescribimos la fracción como 1 más un término pequeño:

$$(2x+3)/(2x-1) = 1 + (2x+3-2x+1)/(2x-1) = 1 + 4/(2x-1)$$

Sustituyendo:

$$\ln L = \lim_{x\to\infty} 4x \cdot \ln[1 + 4/(2x-1)]$$

Cuando $x \to \infty$, el argumento del logaritmo $4/(2x-1) \to 0$, y podemos usar el límite fundamental: $\lim_{u\to 0} \ln(1+u)/u = 1$, es decir, $\ln(1+u) \approx u$ cuando $u \to 0$. Sea $u = 4/(2x-1)$:

$$\ln L = \lim_{x\to\infty} 4x \cdot [4/(2x-1)] = \lim_{x\to\infty} 16x/(2x-1)$$

Dividiendo numerador y denominador entre x:

$$\ln L = \lim_{x\to\infty} 16/(2 - 1/x) = 16/(2 - 0) = 8$$

Por tanto, $\ln L = 8$, lo que implica:

> ✓ $\lim_{x\to\infty} [(2x+3)/(2x-1)]^{4x} = e^8$

Apartado b) — Indeterminación ∞ − ∞

Evaluamos directamente: cuando $x \to \infty$, $x \to \infty$ y $\sqrt{(x^2+5x)} \to \infty$, por lo que se trata de la indeterminación $\infty - \infty$.

La técnica estándar es multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión:

$$\lim_{x\to\infty} (x - \sqrt{(x^2+5x)}) \cdot (x + \sqrt{(x^2+5x)}) / (x + \sqrt{(x^2+5x)})$$

El numerador queda, por la identidad de diferencia de cuadrados $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$:

$$= \lim_{x\to\infty} [x^2 - (x^2+5x)] / (x + \sqrt{(x^2+5x)})$$

$$= \lim_{x\to\infty} [x^2 - x^2 - 5x] / (x + \sqrt{(x^2+5x)})$$

$$= \lim_{x\to\infty} (-5x) / (x + \sqrt{(x^2+5x)})$$

Dividimos numerador y denominador entre x (para $x > 0$, $\sqrt{(x^2)} = x$):

$$= \lim_{x\to\infty} -5 / (1 + \sqrt{(x^2+5x)/x})$$

Simplificamos la raíz:

$$\sqrt{(x^2+5x)/x} = \sqrt{[(x^2+5x)/x^2]} = \sqrt{(1 + 5/x)}$$

Cuando $x \to \infty$, $5/x \to 0$, luego:

$$= -5 / (1 + \sqrt{(1+0)}) = -5 / (1 + 1) = -5/2$$

✓ $\lim_{x\to\infty} (x - \sqrt{(x^2+5x)}) = -5/2$

Apartado c) — Indeterminación 0/0

Evaluamos la expresión en $x = 2$:

$$(2^2-4)/(2-2) = (4-4)/0 = 0/0$$

Es una indeterminación del tipo **0/0**. La técnica adecuada es factorizar el numerador.

Reconocemos que x^2-4 es una diferencia de cuadrados:

$$x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$$

Sustituimos en el límite:

$$\lim_{x\to 2} (x^2-4)/(x-2) = \lim_{x\to 2} [(x-2)(x+2)] / (x-2)$$

Cancelamos el factor $(x-2)$ que se anula (recordamos que en el cálculo de límites, $x \to 2$ pero $x \neq 2$, por lo que la simplificación es válida):

$$= \lim_{x\to 2} (x+2) = 2 + 2 = 4$$

✓ $\lim_{x\to 2} (x^2-4)/(x-2) = 4$

📝 Este límite coincide con la derivada de x^2 en $x = 2$, ya que $f'(2) = 2 \cdot 2 = 4$, lo que es consistente con la definición de derivada como límite del cociente incremental.

EJERCICIO 3 · 1 PUNTO

Estudio Completo de una Función Racional

Dominio · Simetría · Asíntotas · Monotonía · Extremos · Representación gráfica

📋 ENUNCIADO

Dada la función:

$$y = x / (x^2 - 4)$$

Estudia: (a) Dominio, (b) Simetría, (c) Asíntotas, (d) Crecimiento, (e) Máximos y mínimos, (f) Representación gráfica.




Fig. 3 — Función racional con asíntotas verticales en x = ±2 y asíntota horizontal en y = 0.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Apartado (a) — Dominio

La función es una fracción racional. Su dominio son todos los valores reales excepto aquellos que anulan el denominador:

$$x^2 - 4 = 0 \Longrightarrow x^2 = 4 \Longrightarrow x = \pm 2$$

✓ **Dom(f) = ℝ \ {−2, 2} = (−∞, −2) ∪ (−2, 2) ∪ (2, +∞)**

Apartado (b) — Simetría

Para determinar la simetría, calculamos f(−x):

$$f(-x) = (-x) / [(-x)^2 - 4] = -x / (x^2 - 4) = -f(x)$$

Como f(−x) = −f(x), la función es **impar**, lo que implica que su gráfica es **simétrica respecto al origen de coordenadas**.

> ✓ **La función es impar: f(−x) = −f(x). Simetría respecto al origen O(0,0).**

Apartado (c) — Asíntotas

Asíntotas verticales

Las asíntotas verticales se producen en los puntos donde el denominador se anula.

Comprobamos los límites laterales en x = 2 y x = −2:

En x = 2:

$$\lim_{x\to 2^+} x/(x^2-4)\text{: numerador} \to 2 > 0\text{; denominador} \to 0^+ \ (x>2 \Longrightarrow x^2-4>0) \Longrightarrow \text{límite} = +\infty$$

$$\lim_{x\to 2^-} x/(x^2-4)\text{: numerador} \to 2 > 0\text{; denominador} \to 0^- \ (x<2,\ x>0 \Longrightarrow x^2-4<0) \Longrightarrow \text{límite} = -\infty$$

En x = −2:

$$\lim_{x\to -2^+} x/(x^2-4)\text{: numerador} \to -2 < 0\text{; denominador} \to 0^- \ (-2<x<0 \Longrightarrow x^2-4<0) \Longrightarrow \text{límite} = +\infty$$

$$\lim_{x\to -2^-} x/(x^2-4)\text{: numerador} \to -2 < 0\text{; denominador} \to 0^+ \Longrightarrow \text{límite} = -\infty$$

> ✓ **Asíntotas verticales: x = −2 y x = 2**

Asíntota horizontal

$$\lim_{x\to\pm\infty} x/(x^2-4) = \lim_{x\to\pm\infty} x/x^2 \cdot 1/(1-4/x^2) = \lim_{x\to\pm\infty} 1/x \cdot 1/(1-4/x^2) = 0$$

✓ **Asíntota horizontal: y = 0 (el eje OX)**

Asíntota oblicua

Dado que existe asíntota horizontal (y = 0), no puede existir asíntota oblicua (no se puede tener ambas en la misma rama).

Apartado (d) — Crecimiento y Decrecimiento

Calculamos la derivada de $f(x) = x/(x^2-4)$ aplicando la regla del cociente:

$$f'(x) = [1\cdot(x^2-4) - x\cdot 2x] / (x^2-4)^2$$

$$f'(x) = [x^2 - 4 - 2x^2] / (x^2-4)^2 = (-x^2 - 4) / (x^2-4)^2$$

$$f'(x) = -(x^2 + 4) / (x^2-4)^2$$

Analizamos el signo de $f'(x)$:

- Numerador: $-(x^2+4)$. Como $x^2+4 \geq 4 > 0$ siempre, el numerador es siempre **negativo**.
- Denominador: $(x^2-4)^2 \geq 0$ siempre, y es positivo en el dominio ($x \neq \pm 2$).
- Por tanto, $\mathbf{f'(x) < 0}$ en todo el dominio.

✓ **La función es estrictamente decreciente en cada uno de los tres intervalos del dominio: $(-\infty,-2)$, $(-2, 2)$ y $(2, +\infty)$.**

⚠ Importante: aunque la función decrece en cada intervalo, no es decreciente en la unión. En cada rama separada por las asíntotas, la función baja de $+\infty$ a $-\infty$ (o viceversa).

Apartado (e) — Máximos y Mínimos

Para encontrar extremos relativos, buscamos los puntos donde $f'(x) = 0$:

$$f'(x) = -(x^2+4)/(x^2-4)^2 = 0$$

El numerador $-(x^2+4) = 0$ implicaría $x^2+4 = 0$, lo cual no tiene solución real ($x^2 \geq 0 \Longrightarrow x^2+4 \geq 4 > 0$).

> **✓ No existen máximos ni mínimos relativos. La función no tiene extremos en ningún punto de su dominio.**

Apartado (f) — Representación Gráfica

Con todos los datos obtenidos, podemos describir la gráfica:

- **Asíntotas verticales:** $x = -2$ y $x = 2$ (rectas verticales discontinuas).
- **Asíntota horizontal:** $y = 0$ (el eje OX).
- **Simetría:** respecto al origen (si (x, y) está en la gráfica, también (−x, −y)).
- **Puntos notables:** $f(0) = 0$, $f(1) = 1/(1-4) = -1/3$, $f(3) = 3/(9-4) = 3/5 = 0.6$
- **Comportamiento:** en $(2, +\infty)$ la función va de $+\infty$ (cerca de x=2 por la derecha) hasta 0; en $(-2, 2)$ va de $+\infty$ (cerca de x=−2 por la derecha) hasta $-\infty$ (cerca de x=2 por la izquierda), pasando por el origen (0, 0); en $(-\infty, -2)$ la función va de 0 (desde $-\infty$) hasta $-\infty$ (cerca de x=−2 por la izquierda).

x	−3	−1	0	1	3
f(x)	−3/5 = −0.6	1/3 ≈ 0.33	0	−1/3 ≈ −0.33	3/5 = 0.6

EJERCICIO 4 · 1 PUNTO

Continuidad y Derivabilidad de una Función a Trozos

Continuidad · Derivabilidad · Parámetro desconocido · Límites laterales

📋 ENUNCIADO

(a) Calcúlese el valor del parámetro *a* para que la siguiente función sea continua en x = 1:

$$f(x) = x + 1, \text{ si } x \leq 1$$

$$f(x) = x^2 + ax + 5, \text{ si } x > 1$$

(b) Para ese valor de *a*, ¿es derivable la función en x = 1?




Fig. 4 — Continuidad y derivabilidad en x = 1: los límites laterales deben coincidir.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Apartado (a) — Valor del parámetro a para continuidad

Para que una función sea continua en un punto x = c, se deben cumplir tres condiciones:

- (1) Existe f(c).
- (2) Existe $\lim_{x\to c} f(x)$, es decir, el límite por la izquierda y por la derecha coinciden.
- (3) $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$.

Calculamos cada elemento en x = 1:

Valor de la función en x = 1: Como 1 ≤ 1, se usa la primera rama:

$$f(1) = 1 + 1 = 2$$

Límite por la izquierda: Para $x \to 1^-$ ($x < 1$), se utiliza la primera expresión $f(x) = x + 1$:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (x+1) = 1 + 1 = 2$$

Límite por la derecha: Para $x \to 1^+$ ($x > 1$), se utiliza la segunda expresión $f(x) = x^2 + ax + 5$:

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (x^2+ax+5) = 1^2 + a\cdot 1 + 5 = 1 + a + 5 = a + 6$$

Para que exista el límite en x = 1 (y sea igual a f(1)), los límites laterales deben coincidir:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^+} f(x)$$

$$2 = a + 6 \Longrightarrow a = 2 - 6 = -4$$

> ✓ **Para que f sea continua en x = 1, el valor del parámetro debe ser a = −4.**

Verificación: con a = −4, $\lim_{x\to 1^+} f(x) = -4 + 6 = 2 = f(1)$ ✓

Apartado (b) — Derivabilidad en x = 1 con a = −4

Con a = −4, la función queda:

$$f(x) = x + 1, \text{ si } x \leq 1$$

$$f(x) = x^2 - 4x + 5, \text{ si } x > 1$$

Para estudiar la derivabilidad en x = 1, calculamos las derivadas laterales (derivada por la izquierda y por la derecha):

Derivada por la izquierda:

$$f'(1^-) = \lim_{x\to 1^-} [f(x) - f(1)] / (x-1)$$

Usando $f(x) = x+1$ y $f(1) = 2$:

$$= \lim_{x\to 1^-} [(x+1) - 2] / (x-1) = \lim_{x\to 1^-} (x-1)/(x-1) = \lim_{x\to 1^-} 1 = 1$$

Alternativamente, la derivada de $x+1$ es 1 en todo punto, luego $f'(1^-) = 1$.

Derivada por la derecha:

$$f'(1^+) = \lim_{x\to 1^+} [f(x) - f(1)] / (x-1)$$

Usando $f(x) = x^2-4x+5$ y $f(1) = 1-4+5 = 2$:

$$= \lim_{x\to 1^+} [(x^2-4x+5) - 2] / (x-1) = \lim_{x\to 1^+} (x^2-4x+3) / (x-1)$$

Factorizamos el numerador: $x^2-4x+3 = (x-1)(x-3)$:

$$= \lim_{x\to 1^+} [(x-1)(x-3)] / (x-1) = \lim_{x\to 1^+} (x-3) = 1 - 3 = -2$$

Alternativamente, la derivada de x^2-4x+5 es $2x-4$. En $x=1$: $2(1)-4 = -2$. Por tanto $f'(1^+) = -2$.

Comparación:

$$f'(1^-) = 1 \neq -2 = f'(1^+)$$

⚠ Las derivadas laterales son distintas, luego no existe la derivada en $x = 1$.

√ La función NO es derivable en $x = 1$. Aunque es continua ($a = -4$), tiene una "esquina" o punto angular en $x = 1$. La gráfica tiene dos semitangentes distintas: una con pendiente 1 y otra con pendiente -2.

EJERCICIO 5 · 2 PUNTOS

Optimización de Ingresos — Compañía de Autobuses

Función de ingresos · Derivadas · Máximos · Problemas de optimización

📋 ENUNCIADO

Una compañía de autobuses alquila un autobús de **50 plazas** a grupos de 36 o más personas. Si un grupo contiene exactamente **36 personas, cada persona paga 60 euros**. En grupos mayores, la tarifa de todos se reduce en **un euro por cada persona que sobrepasa las 36**.

(a) Halla la función que nos proporciona los ingresos de la compañía.

(b) Determina el tamaño del grupo para el cual los ingresos de la compañía son máximos.




Fig. 5 — El autobús tiene 50 plazas. ¿Cuántos pasajeros maximizan los ingresos?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Apartado (a) — Función de Ingresos I(n)

Sea n el número de personas del grupo, con $36 \leq n \leq 50$.

Determinación del precio por persona:

- Con exactamente 36 personas: precio = 60 €/persona.
- Por cada persona adicional que supera las 36, el precio de **todos** baja en 1 €.
- Número de personas que superan las 36: $n - 36$.

- Precio por persona cuando hay n personas: $p(n) = 60 - (n - 36) = 60 - n + 36 = 96 - n$

$$\text{Precio por persona: } p(n) = 96 - n \text{ euros}$$

Verificación: para $n = 36$, $p(36) = 96 - 36 = 60$ € ✓; para $n = 50$, $p(50) = 96 - 50 = 46$ €.

Función de ingresos total:

Los ingresos son el número de personas multiplicado por el precio que paga cada una:

$$I(n) = n \cdot p(n) = n \cdot (96 - n) = 96n - n^2$$

> **√ $I(n) = 96n - n^2$, con $36 \leq n \leq 50$ y n número natural.**

Esta es una parábola cóncava hacia abajo (coeficiente de n^2 negativo), lo que garantiza la existencia de un máximo.

Apartado (b) — Tamaño del grupo que maximiza los ingresos

Para hallar el máximo de $I(n) = 96n - n^2$ en el intervalo $[36, 50]$, derivamos e igualamos a cero:

$$I'(n) = 96 - 2n$$

$$I'(n) = 0 \Longrightarrow 96 - 2n = 0 \Longrightarrow 2n = 96 \Longrightarrow n = 48$$

Confirmamos que es un máximo con la segunda derivada:

$$I''(n) = -2 < 0 \Longrightarrow \text{concavidad negativa} \Longrightarrow \text{máximo}$$

Además, $n = 48$ pertenece al intervalo $[36, 50]$, por lo que es un máximo interior válido.

Cálculo del ingreso máximo:

$$I(48) = 96 \cdot 48 - 48^2 = 4608 - 2304 = 2304 \text{ euros}$$

Precio por persona cuando n = 48: $p(48) = 96 - 48 = 48$ €/persona. Verificación: $48 \times 48 = 2304$ ✓.

Comparativa con los extremos del intervalo:

n (personas)	Precio €/persona	Ingresos I(n)
36	60	2.160 €
40	56	2.240 €
44	52	2.288 €
48	**48**	**2.304 € (MÁXIMO)**
50	46	2.300 €

> ✓ **El grupo óptimo es de 48 personas, cada una pagando 48 €, lo que proporciona unos ingresos máximos de 2.304 euros.**

> 📝 Curiosamente, el precio óptimo coincide con el número de personas (48 personas × 48 € = 48^2), lo que ocurre cuando $n = (96/2) = 48$, el vértice de la parábola.

EJERCICIO 6 · 2 PUNTOS

Audiencia de Programa de Radio

Función cúbica · Máximos y mínimos · Derivadas · Interpretación de resultados

📋 ENUNCIADO

El porcentaje de personas que sintonizan un programa de radio emitido entre las **6 y las 12 horas** viene dado, según la hora *t*, mediante la función:

$$S(t) = 660 - 231t + 27t^2 - t^3, \text{ con } t \in [6, 12]$$

(i) ¿Qué porcentaje de personas sintonizan el programa al comenzar la emisión? ¿Y al cierre?

(ii) ¿A qué hora tiene máxima y mínima audiencia? ¿Qué porcentaje de personas sintonizan el programa a dichas horas?




Fig. 6 — La audiencia varía a lo largo de la mañana describiendo una curva cúbica con un mínimo y un máximo.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Apartado (i) — Audiencia al inicio y al final de la emisión

El programa comienza a las 6:00 h, es decir, t = 6. Sustituimos en S(t):

$$S(6) = 660 - 231 \cdot 6 + 27 \cdot 6^2 - 6^3$$

$$= 660 - 1386 + 27 \cdot 36 - 216$$

$$= 660 - 1386 + 972 - 216$$

$$= (660 + 972) - (1386 + 216) = 1632 - 1602 = 30$$

√ Al comenzar la emisión (6:00 h): S(6) = 30% de la audiencia.

El programa termina a las 12:00 h, es decir, t = 12. Sustituimos en S(t):

$$S(12) = 660 - 231 \cdot 12 + 27 \cdot 12^2 - 12^3$$

$$= 660 - 2772 + 27 \cdot 144 - 1728$$

$$= 660 - 2772 + 3888 - 1728$$

$$= (660 + 3888) - (2772 + 1728) = 4548 - 4500 = 48$$

√ Al cerrar la emisión (12:00 h): S(12) = 48% de la audiencia.

Apartado (ii) — Horas de máxima y mínima audiencia

Para encontrar los extremos de S(t) en [6, 12], calculamos la derivada e igualamos a cero:

$$S'(t) = -231 + 54t - 3t^2$$

Igualamos S'(t) = 0:

$$-3t^2 + 54t - 231 = 0$$

Dividimos toda la ecuación entre −3 para simplificar:

$$t^2 - 18t + 77 = 0$$

Resolvemos esta ecuación de segundo grado con la fórmula general:

$$t = [18 \pm \sqrt{(18^2 - 4 \cdot 1 \cdot 77)}] / 2 = [18 \pm \sqrt{(324 - 308)}] / 2 = [18 \pm \sqrt{16}] / 2$$

$$t = [18 \pm 4] / 2$$

Obtenemos dos soluciones:

$$t_1 = (18 - 4)/2 = 14/2 = 7$$

$$t_2 = (18 + 4)/2 = 22/2 = 11$$

Ambas pertenecen al intervalo [6, 12]. Ahora clasificamos con la segunda derivada:

$$S''(t) = 54 - 6t$$

$$S''(7) = 54 - 42 = 12 > 0 \Longrightarrow \text{Mínimo relativo en } t = 7$$

$$S''(11) = 54 - 66 = -12 < 0 \Longrightarrow \text{Máximo relativo en } t = 11$$

Cálculo de los porcentajes en los extremos:

Mínima audiencia en t = 7 (7:00 horas):

$$S(7) = 660 - 231 \cdot 7 + 27 \cdot 49 - 343$$

$$= 660 - 1617 + 1323 - 343$$

$$= (660 + 1323) - (1617 + 343) = 1983 - 1960 = 23$$

Máxima audiencia en t = 11 (11:00 horas):

$$S(11) = 660 - 231 \cdot 11 + 27 \cdot 121 - 1331$$

$$= 660 - 2541 + 3267 - 1331$$

$$= (660 + 3267) - (2541 + 1331) = 3927 - 3872 = 55$$

Hora t	S(t) %	Tipo
6:00 h (t=6)	30%	Inicio
7:00 h (t=7)	23%	✦ MÍNIMO
11:00 h (t=11)	55%	✦ MÁXIMO
12:00 h (t=12)	48%	Cierre

√ **La audiencia es mínima a las 7:00 h con un 23% de oyentes, y alcanza su máximo a las 11:00 h con un 55% de la audiencia.**

📝 El programa comienza con un 30% de audiencia, desciende hasta el 23% en la primera hora (probablemente muchos oyentes aún no han llegado a su actividad), y luego sube de forma continua hasta el máximo a las 11h, antes de cerrar con un 48%.

EJERCICIO 7 · 1,5 PUNTOS

Integrales Indefinidas y Área entre Curvas

Integración por sustitución · Integración por partes · Área bajo la curva y = ln(x)

📋 ENUNCIADO

a) Calcúlense las siguientes integrales indefinidas:

$$\int (x-1) / (3x^2-6x+7)\, dx$$

$$\int \ln(x)\, dx$$

b) Calcúlese el área del recinto limitado por la función f(x) = ln(x) entre x = 1 y x = e.




Fig. 7 — Área del recinto bajo la curva y = ln(x) entre x = 1 y x = e, destacada en azul.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Integral a.1) — Método de sustitución

$$\int (x-1) / (3x^2-6x+7)\, dx$$

Observamos que la derivada del denominador es:

$$d/dx\, [3x^2-6x+7] = 6x - 6 = 6(x-1)$$

El numerador $(x-1)$ es exactamente **1/6 de la derivada del denominador**. Esto nos indica que podemos usar sustitución directa. Sea:

$$u = 3x^2-6x+7 \Longrightarrow du = (6x-6)\,dx = 6(x-1)\,dx$$

Despejamos $(x-1)dx$:

$$(x-1)\,dx = du/6$$

Sustituimos en la integral:

$$\int (x-1)\,/\,(3x^2-6x+7)\,dx = \int (1/u)\cdot(du/6) = (1/6)\int du/u$$

Esta es la integral del logaritmo:

$$= (1/6)\cdot \ln|u| + C$$

Deshacemos la sustitución $(u = 3x^2-6x+7)$:

$$\checkmark\ \int (x-1)/(3x^2-6x+7)\,dx = (1/6)\cdot \ln|3x^2-6x+7| + C$$

📝 Observamos que $3x^2-6x+7 = 3(x-1)^2+4 \geq 4 > 0$ siempre, por lo que podemos quitar el valor absoluto: $= (1/6)\cdot\ln(3x^2-6x+7) + C$.

Integral a.2) — Integración por partes

$$\int \ln(x)\,dx$$

Utilizamos la fórmula de **integración por partes**:

$$\int u\cdot dv = u\cdot v - \int v\cdot du$$

Elegimos las siguientes asignaciones (la función logaritmo no se sabe integrar directamente, por lo que la asignamos a u):

Elección	Función	Diferencial
$u = \ln(x)$	$\ln(x)$	$du = (1/x)\,dx$

dv = dx	v = x	—

Aplicamos la fórmula:

$$\int \ln(x)\,dx = \ln(x)\cdot x - \int x\cdot(1/x)\,dx$$

$$= x\cdot\ln(x) - \int 1\,dx$$

$$= x\cdot\ln(x) - x + C$$

✓ $\int \ln(x)\,dx = x\cdot\ln(x) - x + C$

Verificación derivando el resultado:

$$d/dx\,[x\cdot\ln(x) - x + C] = 1\cdot\ln(x) + x\cdot(1/x) - 1 = \ln(x) + 1 - 1 = \ln(x)\ ✓$$

Apartado b) — Área bajo y = ln(x) entre x = 1 y x = e

El área del recinto limitado por f(x) = ln(x), el eje OX y las rectas verticales x = 1 y x = e es:

$$A = \int_1^e |\ln(x)|\,dx$$

Analizamos el signo de ln(x) en [1, e]:

- ln(1) = 0.
- Para x ∈ (1, e]: ln(x) > 0 (el logaritmo neperiano es positivo para x > 1).

Por tanto, |ln(x)| = ln(x) en todo el intervalo y:

$$A = \int_1^e \ln(x)\,dx$$

Aplicamos la primitiva calculada en el apartado anterior, [x·ln(x) − x]:

$$A = [x\cdot\ln(x) - x]_1^e = [e\cdot\ln(e) - e] - [1\cdot\ln(1) - 1]$$

Evaluamos cada término:

- En x = e: e·ln(e) − e = e·1 − e = e − e = 0

- En $x = 1$: $1 \cdot \ln(1) - 1 = 1 \cdot 0 - 1 = 0 - 1 = -1$

$$A = 0 - (-1) = 0 + 1 = 1$$

✓ El área del recinto limitado por $y = \ln(x)$ entre $x = 1$ y $x = e$ es igual a 1 unidad cuadrada.

📝 Este es uno de los resultados más elegantes del cálculo integral: el área bajo la curva logarítmica entre 1 y e es exactamente 1. Geométricamente, el recinto tiene forma de "gancho" que comienza en el punto (1, 0), sube suavemente hasta (e, 1) siguiendo la curva logarítmica.

✦ ∫ Σ ∞ ∂ ✦

Fin del Examen

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES · 2.º BACHILLERATO · CURSO 2016-2017

"La ciencia no trata de libros. La ciencia verdadera es una ciencia experimental."

— MICHAEL FARADAY

Ejercicio	Tema	Puntos
1	Función M(t) = 30t/(t+4)	1,0
2	Cálculo de tres límites	1,5
3	Estudio de $y = x/(x^2-4)$	1,0
4	Continuidad y derivabilidad	1,0
5	Optimización: autobús	2,0
6	Audiencia de radio S(t)	2,0
7	Integrales y área ln(x)	1,5
	TOTAL	**10,0**

Documento generado con resolución completa paso a paso · Todos los derechos reservados

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS

3-02-2017 EXAMEN 2º BACH

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

Nº1.- Dadas las matrices: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

a) Calcúlese: $A \cdot B - C$

b) Resuelve la siguiente ecuación matricial: $A \cdot B \cdot X - C \cdot X = 2 \cdot C$

Nº2.- Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & a & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ a & a & 0 \end{pmatrix}$

a) Calcúlense los valores del parámetro a para que la matriz A no tenga inversa.

b) Para a =2 , calcúlese A^{-1}

Nº3.- Calcúlese el rango de la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 9 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Nº4.- Una empresa vende tres artículos diferentes A, B y C, cada uno de ellos en dos formatos, grande y normal. En la matriz *F* se indican las cantidades de los tres artículos, en cada uno de los dos formatos, que ha vendido la empresa en un mes. En la matriz *G* se indican las ganancias, en euros, que obtiene la empresa por cada unidad que ha vendido de cada artículo en cada formato

$$F = \begin{array}{c} \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 100 & 150 & 80 \\ 200 & 250 & 140 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \leftarrow \text{grande} \\ \leftarrow \text{normal} \end{array} \qquad G = \begin{array}{c} \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 6 & 8 & 5 \\ 4 & 5 & 3 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \leftarrow \text{grande} \\ \leftarrow \text{normal} \end{array}$$

a) Efectúa los productos: $F^t \cdot G \quad y \quad F \cdot G^t$

b) Indique en qué matriz se pueden encontrar las ganancias que ha recibido la empresa en ese mes por el total de las unidades vendidas de cada uno de los tres artículos y especifique cuáles son esas ganancias.

c) Indique en qué matriz se pueden encontrar las ganancias que ha recibido la empresa en ese mes por el total de las unidades vendidas en cada uno de los dos formatos, especifique cuáles son esas ganancias y halle la ganancia total.

Nº5.- Indíquese si es verdadero o falso, explicando el razonamiento:

a) Toda matriz diagonal es simétrica.

b) Si A y B son dos matrices cuadradas, entonces det(A+B) = det(A)+det(B)

c) Sean A, B y C son matrices cuadradas, verificando que $A \cdot B = A \cdot C$ si existe A^{-1} entonces se puede afirmar que $B = C$

d) La diagonal principal de una matriz antisimétrica es nula

e) Toda matriz simétrica tiene inversa.

f) Si el determinante de una matriz es nulo, entonces la matriz es nula.

g) Al cambiar dos filas de una matriz A cambia el signo del determinante.

h) El rango de una matriz 3x2 puede ser 3.

i) $|A \cdot B| = |B \cdot A|$

j) Si A es de orden 2x3, B de orden 3x4, y C de orden 4x1 entonces $A \cdot B \cdot C$ es de orden 2x1

SUERTE JÓVENES



CIENCIAS SOCIALES · 2.º BACHILLERATO

Álgebra Matricial y Determinantes

Ejercicios Resueltos con Rigor Matemático

EXAMEN · 3 DE FEBRERO DE 2017

"Si quieres comprender algo, transfórmalo en matemáticas."

— JAMES CLERK MAXWELL

✦ det(A) · A^{-1} · rang(M) ✦

5 Ejercicios · Matrices · Determinantes · Rango · Inversas · Propiedades

Curso Académico 2016 – 2017

Índice de Contenidos

ÁLGEBRA DE MATRICES · EXAMEN 3/02/2017

EJERCICIOS DEL EXAMEN

Ej. 1 Operaciones con Matrices A, B, C — Producto Matricial y Ecuación Matricial 3

Ej. 2 Parámetro a en Matriz A — Existencia de Inversa y Cálculo de A^{-1} 6

Ej. 3 Cálculo del Rango de una Matriz 4×4 — Eliminación Gaussiana 9

Ej. 4 Matrices de Empresa — Ventas, Ganancias y Productos Matriciales Aplicados 12

Ej. 5 Verdadero o Falso — 10 Propiedades de Matrices y Determinantes 15

✦ ✦ ✦

Cada ejercicio incluye enunciado completo, resolución paso a paso, gráfica e ilustración.

EJERCICIO 1 · ÁLGEBRA MATRICIAL

Operaciones con Matrices y Ecuación Matricial

Producto de matrices · Operaciones combinadas · Resolución de X

📋 ENUNCIADO

Dadas las matrices:

$$A = [[1,2],[2,1],[0,1]]\ (3\times2) \quad B = [[1,1,0],[2,-1,1]]\ (2\times3) \quad C = [[-1,2,1],[1,-1,1],[-1,1,1]]\ (3\times3)$$

(a) Calcúlese: $A \cdot B - C$

(b) Resuelve la ecuación matricial: $A \cdot B \cdot X - C \cdot X = 2 \cdot C$




Fig. 1 — Representación conceptual del producto matricial A·B: filas por columnas.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Apartado (a) — Cálculo de A·B − C

Primero verificamos que el producto A·B es posible: A es 3×2 y B es 2×3, luego A·B es de orden **3×3**. También C es 3×3. La resta A·B − C es factible.

Paso 1: Producto A·B

Aplicamos la regla fila × columna. Siendo:

```
A = | 1  2 |    B = | 1  1  0 |
    | 2  1 |        | 2 -1  1 |
    | 0  1 |
```

Calculamos cada elemento (a_{ij}) de la matriz producto:

Fila 1 de A = [1, 2] · columnas de B:

$$(AB)_{11} = 1\cdot1 + 2\cdot2 = 1 + 4 = 5$$

$$(AB)_{12} = 1\cdot1 + 2\cdot(-1) = 1 - 2 = -1$$

$$(AB)_{13} = 1\cdot0 + 2\cdot1 = 0 + 2 = 2$$

Fila 2 de A = [2, 1] · columnas de B:

$$(AB)_{21} = 2\cdot1 + 1\cdot2 = 2 + 2 = 4$$

$$(AB)_{22} = 2\cdot1 + 1\cdot(-1) = 2 - 1 = 1$$

$$(AB)_{23} = 2\cdot0 + 1\cdot1 = 0 + 1 = 1$$

Fila 3 de A = [0, 1] · columnas de B:

$$(AB)_{31} = 0\cdot1 + 1\cdot2 = 0 + 2 = 2$$

$$(AB)_{32} = 0\cdot1 + 1\cdot(-1) = 0 - 1 = -1$$

$$(AB)_{33} = 0\cdot0 + 1\cdot1 = 0 + 1 = 1$$

```
A·B = | 5  -1  2 |
      | 4   1  1 |
      | 2  -1  1 |
```

Paso 2: Resta A·B − C

Con C = [[−1,2,1],[1,−1,1],[−1,1,1]], restamos elemento a elemento:

$$\text{Fila 1: } [5-(-1),\ -1-2,\ 2-1] = [6,\ -3,\ 1]$$

$$\text{Fila 2: } [4-1,\ 1-(-1),\ 1-1] = [3,\ 2,\ 0]$$

$$\text{Fila 3: } [2-(-1),\ -1-1,\ 1-1] = [3,\ -2,\ 0]$$

```
A·B − C = | 6  -3  1 |
          | 3   2  0 |
          | 3  -2  0 |
```

> **√ A·B − C = [[6,−3,1],[3,2,0],[3,−2,0]]**

Apartado (b) — Ecuación matricial A·B·X − C·X = 2·C

Partimos de la ecuación:

$$A \cdot B \cdot X - C \cdot X = 2 \cdot C$$

Factorizamos X por la derecha (álgebra matricial: el factor X está a la derecha en ambos términos):

$$(A \cdot B - C) \cdot X = 2 \cdot C$$

Llamamos M = A·B − C, que ya calculamos en el apartado anterior:

```
M = | 6  -3  1 |
    | 3   2  0 |
    | 3  -2  0 |
```

La ecuación queda: **M · X = 2C**. Si M es invertible, la solución es:

$$X = M^{-1} \cdot (2C)$$

Paso 1: Calcular det(M)

Desarrollamos por la primera fila (los ceros en col. 3 facilitan el cálculo):

$$\det(M) = 6\cdot\det[[2,0],[-2,0]] - (-3)\cdot\det[[3,0],[3,0]] + 1\cdot\det[[3,2],[3,-2]]$$

$$= 6\cdot(2\cdot 0 - 0\cdot(-2)) + 3\cdot(3\cdot 0 - 0\cdot 3) + 1\cdot(3\cdot(-2) - 2\cdot 3)$$

$$= 6\cdot 0 + 3\cdot 0 + 1\cdot(-6 - 6) = 0 + 0 - 12 = -12$$

Como $\det(M) = -12 \neq 0$, la matriz M es **invertible**.

Paso 2: Calcular M^{-1} por adjuntos

Calculamos todos los cofactores $C_{ij} = (-1)^{(i+j)} \cdot M_{ij}$:

$C_{11} = (+1)\cdot\det[[2,0],[-2,0]] = (0-0) = 0$

$C_{12} = (-1)\cdot\det[[3,0],[3,0]] = -(0-0) = 0$

$C_{13} = (+1)\cdot\det[[3,2],[3,-2]] = (-6-6) = -12$

$C_{21} = (-1)\cdot\det[[-3,1],[-2,0]] = -(0+2) = -2$

$C_{22} = (+1)\cdot\det[[6,1],[3,0]] = (0-3) = -3$

$C_{23} = (-1)\cdot\det[[6,-3],[3,-2]] = -(-12+9) = -(-3) = 3$

$C_{31} = (+1)\cdot\det[[-3,1],[2,0]] = (0-2) = -2$

$C_{32} = (-1)\cdot\det[[6,1],[3,0]] = -(0-3) = 3$

$C_{33} = (+1)\cdot\det[[6,-3],[3,2]] = (12+9) = 21$

La matriz de cofactores es:

```
Cof(M) = |  0   0  -12 |
         | -2  -3    3 |
         | -2   3   21 |
```

La adjunta (transpuesta de la cofactora) es:

```
adj(M) = Cof(M)ᵀ = |  0  -2  -2 |
                   |  0  -3   3 |
                   |-12   3  21 |
```

La inversa:

$$M^{-1} = (1/\det(M)) \cdot \text{adj}(M) = (-1/12) \cdot [[0,-2,-2],[0,-3,3],[-12,3,21]]$$

```
M⁻¹ = |  0     1/6    1/6  |
      |  0     1/4   -1/4  |
      |  1    -1/4   -7/4  |
```

Paso 3: Calcular 2C

```
2C = | -2   4   2 |
     |  2  -2   2 |
     | -2   2   2 |
```

Paso 4: X = M⁻¹ · 2C

Multiplicamos M^{-1} (3×3) por 2C (3×3):

$X_{11} = 0\cdot(-2) + (1/6)\cdot 2 + (1/6)\cdot(-2) = 0 + 1/3 - 1/3 = 0$

$X_{12} = 0\cdot 4 + (1/6)\cdot(-2) + (1/6)\cdot 2 = 0 - 1/3 + 1/3 = 0$

$X_{13} = 0\cdot 2 + (1/6)\cdot 2 + (1/6)\cdot 2 = 0 + 1/3 + 1/3 = 2/3$

$X_{21} = 0\cdot(-2) + (1/4)\cdot 2 + (-1/4)\cdot(-2) = 0 + 1/2 + 1/2 = 1$

$X_{22} = 0\cdot 4 + (1/4)\cdot(-2) + (-1/4)\cdot 2 = 0 - 1/2 - 1/2 = -1$

$X_{23} = 0\cdot 2 + (1/4)\cdot 2 + (-1/4)\cdot 2 = 0 + 1/2 - 1/2 = 0$


$X_{31} = 1\cdot(-2) + (-1/4)\cdot 2 + (-7/4)\cdot(-2) = -2 - 1/2 + 7/2 = -2 + 3 = 1$

$X_{32} = 1\cdot 4 + (-1/4)\cdot(-2) + (-7/4)\cdot 2 = 4 + 1/2 - 7/2 = 4 - 3 = 1$

$X_{33} = 1\cdot 2 + (-1/4)\cdot 2 + (-7/4)\cdot 2 = 2 - 1/2 - 7/2 = 2 - 4 = -2$

```
X = | 0   0   2/3 |
    | 1  -1    0  |
    | 1   1   -2  |
```

√ La solución de la ecuación matricial es X = [[0,0,2/3],[1,−1,0],[1,1,−2]]


Ejercicio 1 — Multiplicación Matricial A·B y Ecuación Matricial
A (3×2)
B (2×3)
A·B (3×3) =
1 2
2 1
0 1
1 1 0
2 -1 1
5 -1 2
4 1 1
2 -1 1

EJERCICIO 2 · DETERMINANTES E INVERSAS

Parámetro a — Existencia de Inversa y Cálculo de A^{-1}

Determinante con parámetro · Valores singulares · Adjuntos · Verificación

📋 ENUNCIADO

Sea la matriz:

$$A = [[1,\ a,\ -1],\ [1,\ 1,\ 1],\ [a,\ a,\ 0]]$$

(a) Calcúlense los valores del parámetro a para que la matriz A no tenga inversa.

(b) Para a = 2, calcúlese A^{-1}.




Fig. 2 — La existencia de inversa depende de que el determinante sea no nulo.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Apartado (a) — Valores de a para los que A no tiene inversa

Una matriz cuadrada **no tiene inversa** si y sólo si su **determinante es cero**. Calculamos det(A) desarrollando por la primera fila:

$$\det(A) = 1\cdot\det[[1,1],[a,0]] - a\cdot\det[[1,1],[a,0]] + (-1)\cdot\det[[1,1],[a,a]]$$

Calculamos cada menor 2×2:

$M_{11} = \det[[1,1],[a,0]] = 1\cdot 0 - 1\cdot a = 0 - a = -a$

$M_{12} = \det[[1,1],[a,0]] = 1\cdot 0 - 1\cdot a = -a$

$M_{13} = \det[[1,1],[a,a]] = 1\cdot a - 1\cdot a = a - a = 0$

Sustituyendo en el desarrollo:

$$\det(A) = 1\cdot(-a) - a\cdot(-a) + (-1)\cdot 0 = -a + a^2 + 0 = a^2 - a$$

Factorizamos:

$$\det(A) = a^2 - a = a\cdot(a - 1)$$

Igualamos a cero para encontrar los valores singulares:

$$a\cdot(a - 1) = 0 \Longrightarrow a = 0 \text{ ó } a = 1$$

√ La matriz A no tiene inversa para a = 0 y para a = 1.

📝 Para a = 0: A = [[1,0,−1],[1,1,1],[0,0,0]] → la tercera fila es nula, det = 0. Para a = 1: A = [[1,1,−1],[1,1,1],[1,1,0]] → las columnas 1 y 2 son proporcionales en filas 1 y 2, det = 0.

Apartado (b) — Cálculo de A^{-1} para a = 2

Para a = 2, la matriz es:

```
A = | 1  2  -1 |
    | 1  1   1 |
    | 2  2   0 |
```

Paso 1: Calcular det(A) para a = 2

Podemos usar la fórmula ya obtenida: det(A) = a(a−1) = 2·(2−1) = 2·1 = 2

Verificación desarrollando por la primera fila:

$$\det(A) = 1\cdot\det[[1,1],[2,0]] - 2\cdot\det[[1,1],[2,0]] + (-1)\cdot\det[[1,1],[2,2]]$$

$$= 1\cdot(0-2) - 2\cdot(0-2) + (-1)\cdot(2-2) = -2 + 4 + 0 = 2 \checkmark$$

Como det(A) = 2 ≠ 0, la inversa existe.

Paso 2: Calcular los 9 cofactores

Recordamos: $C_{ij} = (-1)^{(i+j)} \cdot (\text{menor } M_{ij})$

$C_{11} = (+1)\cdot\det[[1,1],[2,0]] = 1\cdot0 - 1\cdot2 = -2$

$C_{12} = (-1)\cdot\det[[1,1],[2,0]] = -(1\cdot0 - 1\cdot2) = -(-2) = 2$

$C_{13} = (+1)\cdot\det[[1,1],[2,2]] = 1\cdot2 - 1\cdot2 = 0$

$C_{21} = (-1)\cdot\det[[2,-1],[2,0]] = -(2\cdot0 - (-1)\cdot2) = -(0+2) = -2$

$C_{22} = (+1)\cdot\det[[1,-1],[2,0]] = 1\cdot0 - (-1)\cdot2 = 0+2 = 2$

$C_{23} = (-1)\cdot\det[[1,2],[2,2]] = -(1\cdot2 - 2\cdot2) = -(2-4) = -(-2) = 2$

$C_{31} = (+1)\cdot\det[[2,-1],[1,1]] = 2\cdot1 - (-1)\cdot1 = 2+1 = 3$

$C_{32} = (-1)\cdot\det[[1,-1],[1,1]] = -(1\cdot1 - (-1)\cdot1) = -(1+1) = -2$

$C_{33} = (+1)\cdot\det[[1,2],[1,1]] = 1\cdot1 - 2\cdot1 = 1-2 = -1$

Paso 3: Construir la matriz de cofactores y su transpuesta (adjunta)

$$\text{Cof}(A) = \begin{vmatrix} -2 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \\ 3 & -2 & -1 \end{vmatrix} \qquad \text{adj}(A) = \text{Cof}(A)^T = \begin{vmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

Paso 4: Calcular $A^{-1} = (1/\det) \cdot \text{adj}(A)$

$$A^{-1} = (1/2) \cdot [[-2,-2,3],[2,2,-2],[0,2,-1]]$$

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 3/2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1/2 \end{vmatrix}$$

Paso 5: Verificación $A \cdot A^{-1} = I_3$

Comprobamos las tres filas de A multiplicadas por A^{-1}:

Fila 1 de A = [1,2,−1]:

Col 1: $1\cdot(-1)+2\cdot1+(-1)\cdot0 = -1+2+0 = 1$ ✓

Col 2: $1\cdot(-1)+2\cdot1+(-1)\cdot1 = -1+2-1 = 0$ ✓

Col 3: $1\cdot(3/2)+2\cdot(-1)+(-1)\cdot(-1/2) = 3/2-2+1/2 = 2-2 = 0$ ✓

Fila 2 de A = [1,1,1]:

Col 1: $1\cdot(-1)+1\cdot1+1\cdot0 = 0$ ✓

Col 2: $1\cdot(-1)+1\cdot1+1\cdot1 = -1+1+1 = 1$ ✓

Col 3: $1\cdot(3/2)+1\cdot(-1)+1\cdot(-1/2) = 3/2-1-1/2 = 1-1 = 0$ ✓


Fila 3 de A = [2,2,0]:

Col 1: $2\cdot(-1)+2\cdot1+0\cdot0 = -2+2 = 0$ ✓

Col 2: $2\cdot(-1)+2\cdot1+0\cdot1 = 0$ ✓

Col 3: $2\cdot(3/2)+2\cdot(-1)+0\cdot(-1/2) = 3-2+0 = 1$ ✓

√ $A \cdot A^{-1} = I_3$ verificado. La inversa es correcta.



EJERCICIO 3 · RANGO DE MATRICES

Cálculo del Rango — Eliminación Gaussiana

Matriz 4×4 · Transformaciones elementales por filas · Forma escalonada

📋 **ENUNCIADO**

Calcúlese el rango de la siguiente matriz:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 9 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$




Fig. 3 — El método de eliminación gaussiana transforma la matriz en forma escalonada.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA — MÉTODO DE GAUSS (ELIMINACIÓN POR FILAS)

Definición y Método

El **rango** de una matriz es el número máximo de filas (o columnas) linealmente independientes. Para calcularlo, transformamos la matriz en su **forma escalonada reducida** mediante operaciones elementales por filas (que no modifican el rango):

- $F_i \leftrightarrow F_j$ (intercambio de filas)
- $F_i \to k \cdot F_i$ (multiplicar fila por escalar no nulo)
- $F_i \to F_i + k \cdot F_j$ (combinar filas)

El rango coincide con el número de filas no nulas en la forma escalonada.

Proceso de Eliminación — Paso a Paso

Matriz original:

```
| 1  -1   0   0 |
| 3   2  -1   9 |
|-1   0   2   0 |
| 0   3  -2   4 |
```

Paso 1: Eliminar la columna 1 debajo del pivote (1,1)

Usamos $F_1 = [1,-1,0,0]$ como fila pivote. Operaciones:

$F_2 \leftarrow F_2 - 3 \cdot F_1 = [3-3 \cdot 1, 2-3 \cdot (-1), -1-3 \cdot 0, 9-3 \cdot 0] = [0, 5, -1, 9]$

$F_3 \leftarrow F_3 + F_1 = [-1+1, 0+(-1), 2+0, 0+0] = [0, -1, 2, 0]$

F_4 sin cambios: $[0, 3, -2, 4]$

```
Tras paso 1:
| 1  -1   0   0 |
| 0   5  -1   9 |
| 0  -1   2   0 |
| 0   3  -2   4 |
```

Paso 2: Eliminar la columna 2 debajo del pivote (2,2) = 5

$F_3 \leftarrow 5 \cdot F_3 + F_2 = [0, -5+5, 10+(-1), 0+9] = [0, 0, 9, 9]$

$F_4 \leftarrow 5 \cdot F_4 - 3 \cdot F_2 = [0, 15-15, -10-(-3), 20-27] = [0, 0, -7, -7]$

```
Tras paso 2:
| 1  -1   0   0 |
| 0   5  -1   9 |
| 0   0   9   9 |
| 0   0  -7  -7 |
```

Paso 3: Eliminar la columna 3 debajo del pivote (3,3) = 9

$F_4 \leftarrow 9 \cdot F_4 + 7 \cdot F_3 = [0,\ 0,\ -63+63,\ -63+63] = [0,\ 0,\ 0,\ 0]$


```
Forma escalonada final:
| 1  -1   0   0 |   ← Fila no nula (pivote col. 1)
| 0   5  -1   9 |   ← Fila no nula (pivote col. 2)
| 0   0   9   9 |   ← Fila no nula (pivote col. 3)
| 0   0   0   0 |   ← Fila NULA
```

Conclusión

La forma escalonada tiene exactamente **3 filas no nulas**, lo que significa que existen 3 filas linealmente independientes. La cuarta fila es combinación lineal de las anteriores (resultó nula).

> **√ Rango(A) = 3**

📝 Verificación alternativa: cualquier submatriz 3×3 con determinante no nulo confirma rango ≥ 3. Por ejemplo, la submatriz formada por las filas 1, 2, 3 y columnas 1, 2, 3 tiene det ≠ 0. Como la matriz completa es 4×4 pero la forma escalonada tiene una fila nula, el rango no puede ser 4.



EJERCICIO 4 · APLICACIÓN EMPRESARIAL

Matrices de Ventas y Ganancias de una Empresa

Productos matriciales · Interpretación económica · Transpuesta · Ganancias totales

📋 **ENUNCIADO**

Una empresa vende tres artículos A, B, C en dos formatos: grande y normal.

- La **matriz F** indica las cantidades vendidas (artículos × formatos) en un mes.
- La **matriz G** indica la ganancia en € por unidad vendida (artículos × formatos).

$$F = [[200, 150], [300, 250], [100, 50]] \quad \text{(artículos: filas; formatos: columnas)}$$

$$G = [[5, 3], [4, 2], [6, 4]] \quad \text{(€ ganancia por unidad)}$$

(a) Efectúa los productos: $F^T \cdot G$ y $F \cdot G^T$

(b) ¿En qué matriz están las ganancias totales por artículo?

(c) ¿En qué matriz están las ganancias totales por formato? Calcula la ganancia total.



Fig. 4 — La empresa combina cantidades vendidas y precios mediante productos matriciales.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Dimensiones de las matrices

Antes de operar, verificamos los órdenes:

Matriz	Orden	Significado
F	3×2	3 artículos × 2 formatos (cantidades)
G	3×2	3 artículos × 2 formatos (€/unidad)
F^T	2×3	Transpuesta de F
G^T	2×3	Transpuesta de G

Productos posibles: $F^T(2\times3) \cdot G(3\times2) = 2\times2$; $F(3\times2) \cdot G^T(2\times3) = 3\times3$.

Apartado (a) — Productos $F^S \cdot G$ y $F \cdot G^S$

Cálculo de F^S:

```
F = | 200  150 |     F^T = | 200  300  100 |
    | 300  250 |           | 150  250   50 |
    | 100   50 |
```

Producto $F^S \cdot G$ (2×3)·(3×2) = (2×2):

Fila 1 de F^T = [200, 300, 100]; Columnas de G:

$$(F^TG)_{11} = 200\cdot5 + 300\cdot4 + 100\cdot6 = 1000+1200+600 = 2800$$

$$(F^TG)_{12} = 200\cdot3 + 300\cdot2 + 100\cdot4 = 600+600+400 = 1600$$

Fila 2 de F^T = [150, 250, 50]; Columnas de G:

$$(F^TG)_{21} = 150\cdot5 + 250\cdot4 + 50\cdot6 = 750+1000+300 = 2050$$

$$(F^TG)_{22} = 150\cdot3 + 250\cdot2 + 50\cdot4 = 450+500+200 = 1150$$

```
F^T · G = | 2800  1600 |
          | 2050  1150 |
```

📝 Esta matriz 2×2 organiza las ganancias por formato (filas) y "tipo de ganancia" (col 1: formato grande; col 2: formato normal). Las filas corresponden a formatos, no a artículos individuales.

Cálculo de G^S:

```
G^T = | 5  4  6 |
      | 3  2  4 |
```

Producto $F \cdot G^S$ (3×2)·(2×3) = (3×3):

Fila 1 de F = [200, 150]:

$$(FG^T)_{11} = 200 \cdot 5 + 150 \cdot 3 = 1000+450 = 1450$$

$$(FG^T)_{12} = 200 \cdot 4 + 150 \cdot 2 = 800+300 = 1100$$

$$(FG^T)_{13} = 200 \cdot 6 + 150 \cdot 4 = 1200+600 = 1800$$

Fila 2 de F = [300, 250]:

$$(FG^T)_{21} = 300 \cdot 5 + 250 \cdot 3 = 1500+750 = 2250$$

$$(FG^T)_{22} = 300 \cdot 4 + 250 \cdot 2 = 1200+500 = 1700$$

$$(FG^T)_{23} = 300 \cdot 6 + 250 \cdot 4 = 1800+1000 = 2800$$

Fila 3 de F = [100, 50]:

$$(FG^T)_{31} = 100 \cdot 5 + 50 \cdot 3 = 500+150 = 650$$

$$(FG^T)_{32} = 100 \cdot 4 + 50 \cdot 2 = 400+100 = 500$$

$$(FG^T)_{33} = 100 \cdot 6 + 50 \cdot 4 = 600+200 = 800$$

```
          Art.A  Art.B  Art.C
F · G^T = | 1450  1100  1800 |  ← Art. A vendido
```

```
| 2250  1700  2800 |  ← Art. B vendido
| 650    500   800 |  ← Art. C vendido
```

Apartado (b) — Ganancias por artículo

La matriz $\mathbf{F \cdot G^s}$ es de orden 3×3, donde la fila i representa el artículo i y la columna j la ganancia cruzada entre artículo i y el precio del artículo j.

La **diagonal principal** de $F \cdot G^T$ contiene exactamente la ganancia total de cada artículo (unidades propias × precio propio):

$$\text{Ganancia Art. A} = (FG^T)_{11} = 1.450\ €$$

$$\text{Ganancia Art. B} = (FG^T)_{22} = 1.700\ €$$

$$\text{Ganancia Art. C} = (FG^T)_{33} = 800\ €$$

> **✓ Las ganancias por artículo se encuentran en la diagonal de $F \cdot G^s$: A=1.450€, B=1.700€, C=800€.**

Apartado (c) — Ganancias por formato y ganancia total

La matriz $\mathbf{F^s \cdot G}$ es de orden 2×2. Su interpretación:

- **Fila 1**: formato grande. **Fila 2**: formato normal.
- **Columna 1**: ganancia por precio "grande". **Columna 2**: ganancia por precio "normal".

La **diagonal** contiene la ganancia de cada formato vendido al precio correspondiente:

$$\text{Ganancia formato Grande} = (F^TG)_{11} = 2.800\ €$$

$$\text{Ganancia formato Normal} = (F^TG)_{22} = 1.150\ €$$

> **✓ Ganancias por formato en la diagonal de $F^s \cdot G$: Grande = 2.800€, Normal = 1.150€.**

Ganancia total de la empresa:

$$\text{Ganancia total} = 2.800 + 1.150 = 3.950 \text{ €}$$

O equivalentemente, sumando las ganancias por artículo: 1.450 + 1.700 + 800 = 3.950 € ✓

> **√ La ganancia total de la empresa en el mes es de 3.950 euros.**



EJERCICIO 5 · PROPIEDADES MATRICIALES

Verdadero o Falso — 10 Propiedades de Matrices y Determinantes

Matrices simétricas · Determinantes · Rango · Producto · Orden

📋 ENUNCIADO

Indíquese si es **Verdadero** o **Falso**, explicando el razonamiento en cada caso:

a) Toda matriz diagonal es simétrica. b) $\det(A+B)=\det(A)+\det(B)$. c) $AB=AC$ y $\exists A^{-1} \Longrightarrow B=C$.

d) La diagonal principal de una antisimétrica es nula. e) Toda matriz simétrica tiene inversa.

f) $\det(A)=0 \Longrightarrow$ A es nula. g) Cambiar 2 filas cambia el signo del det. h) Rango de 3×2 puede ser 3.

i) $|A\cdot B|=|B\cdot A|$. j) $A(2\times3)\cdot B(3\times4)\cdot C(4\times1)$ es de orden 2×1.




Fig. 5 — Análisis de propiedades: el razonamiento matemático determina la verdad de cada afirmación.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA — ANÁLISIS DE CADA PROPOSICIÓN

VERDADERO ✓ **a) Toda matriz diagonal es simétrica.**

Una matriz diagonal tiene todos los elementos fuera de la diagonal principal iguales a cero: $m_{ij} = 0$ para $i \neq j$. Para que sea simétrica se requiere $A^T = A$, es decir, $m_{ij} = m_{ji}$ para todo i, j. Como $m_{ij} = 0 = m_{ji}$ (ambos cero para $i \neq j$), y $m_{ii} = m_{ii}$

trivialmente, la condición de simetría se satisface automáticamente.

Ejemplo: diag(3, 0, −5) = [[3,0,0],[0,0,0],[0,0,−5]] es claramente simétrica.

> **√ Toda matriz diagonal es simétrica. □**

FALSO ✗ **b) Si A y B son matrices cuadradas, entonces det(A+B) = det(A) + det(B).**

El determinante **no es un operador lineal respecto a la suma** de matrices. Esto es un error conceptual muy frecuente.

Contraejemplo: Sea $A = I_2 = [[1,0],[0,1]]$ y $B = -I_2 = [[-1,0],[0,-1]]$.

$$\det(A+B) = \det([[0,0],[0,0]]) = 0$$

$$\det(A) + \det(B) = \det(I_2) + \det(-I_2) = 1 + 1 = 2$$

Claramente $0 \neq 2$. La propiedad que sí es válida para determinantes es la multiplicatividad: $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$.

> ⚠ Lo que sí cumple el determinante: $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$. La suma no tiene propiedad análoga.

VERDADERO ✓ **c) Sean A, B y C matrices cuadradas con A·B = A·C. Si existe A^{-1}, entonces B = C.**

Si existe A^{-1}, podemos multiplicar por ella en ambos miembros de $A \cdot B = A \cdot C$ por la izquierda:

$$A^{-1} \cdot (A \cdot B) = A^{-1} \cdot (A \cdot C)$$

$$(A^{-1} \cdot A) \cdot B = (A^{-1} \cdot A) \cdot C$$

$$I \cdot B = I \cdot C \Longrightarrow B = C$$

Importante: Si A fuera singular (sin inversa), no podríamos concluir B = C. Por ejemplo, si A = [[1,1],[1,1]] (det=0), podría ocurrir que AB = AC con B ≠ C.

√ La existencia de A^{-1} permite "cancelar" A y concluir B = C. □

VERDADERO ✓ **d) La diagonal principal de una matriz antisimétrica es nula.**

Una matriz A es antisimétrica si $A^T = -A$, lo que significa $a_{ij} = -a_{ji}$ para todo i, j.

Aplicamos esto a los elementos de la diagonal, donde i = j:

$$a_{ii} = -a_{ii} \Longrightarrow 2 \cdot a_{ii} = 0 \Longrightarrow a_{ii} = 0$$

Por tanto, todos los elementos de la diagonal principal son iguales a cero.

Ejemplo: A = [[0,3,−1],[−3,0,2],[1,−2,0]] es antisimétrica y su diagonal es (0, 0, 0).

√ La diagonal principal de toda matriz antisimétrica es necesariamente nula. □

FALSO ✗ **e) Toda matriz simétrica tiene inversa.**

Una matriz simétrica satisface $A^T = A$, pero esto no implica que sea invertible. Para tener inversa se necesita que su determinante sea no nulo.

Contraejemplo: A = [[1,0],[0,0]]. Verificamos: $A^T = A$ ✓ (es simétrica). Pero det(A) = 1·0 − 0·0 = 0, por lo que A **no tiene inversa**.

Otro ejemplo más sencillo: la matriz nula A = 0 es simétrica ($0^T = 0$) pero claramente singular.

⚠ La simetría es una condición estructural de la matriz, independiente de su invertibilidad. Una matriz simétrica puede ser singular o no singular.

FALSO ✗ **f) Si el determinante de una matriz es nulo, entonces la matriz es nula.**

El determinante nulo significa que la matriz es singular (no invertible), pero no que sus elementos sean todos cero.

Contraejemplo: A = [[1,1],[1,1]]. Todos los elementos son 1 (la matriz no es nula), pero:

$$\det(A) = 1\cdot 1 - 1\cdot 1 = 0$$

La razón matemática es que det(A) = 0 equivale a que las filas (o columnas) son linealmente dependientes, no a que sean nulas.

⚠ Confusión habitual: det(A) = 0 ⟺ A es singular (filas LD), pero A puede tener elementos no nulos.

VERDADERO ✓ **g) Al cambiar dos filas de una matriz A cambia el signo del determinante.**

Esta es una **propiedad fundamental** de los determinantes. Al intercambiar dos filas cualesquiera $F_i \leftrightarrow F_j$ ($i \neq j$), el determinante cambia de signo:

$$\det(A \text{ con } F_i \leftrightarrow F_j) = -\det(A)$$

Consecuencia: si dos filas de A son iguales, det(A) = 0 (pues intercambiarlas no cambia A pero debe cambiar el signo, luego det = −det ⟹ det = 0).

Ejemplo: A = [[1,2],[3,4]], det = −2. Al intercambiar filas: [[3,4],[1,2]], det = 3·2−4·1 = 6−4 = 2 = −(−2) ✓

√ El intercambio de dos filas multiplica el determinante por −1. □

FALSO ✗ **h) El rango de una matriz 3×2 puede ser 3.**

El **rango** de una matriz m×n satisface siempre: rang(A) ≤ min(m, n).

Para una matriz de orden 3×2: rang(A) ≤ min(3,2) = 2.

El rango no puede superar el número de filas ni el de columnas, ya que el rango es igual al número máximo de vectores fila (o columna) linealmente independientes. Con solo 2 columnas, a lo sumo 2 de ellas pueden ser independientes.

⚠ El rango máximo de una matriz 3×2 es 2. Afirmar que puede ser 3 es incorrecto.

VERDADERO ✓ **i) $|A \cdot B| = |B \cdot A|$**

Utilizamos la propiedad de multiplicatividad del determinante: $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$.

$$|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$$

$$|B \cdot A| = |B| \cdot |A|$$

Como el producto de números reales es conmutativo: $|A| \cdot |B| = |B| \cdot |A|$.

$$\text{Por tanto: } |A \cdot B| = |A| \cdot |B| = |B| \cdot |A| = |B \cdot A| \ \checkmark$$

Nota: Esto no implica que $A \cdot B = B \cdot A$ (el producto matricial no es conmutativo en general), sino únicamente que sus determinantes coinciden.

√ $|AB| = |BA|$ aunque en general $AB \neq BA$. □

VERDADERO ✓ **j) Si A es de orden 2×3, B de orden 3×4, y C de orden 4×1, entonces A·B·C es de orden 2×1.**

Verificamos la compatibilidad y el orden resultado del producto triple:

Primero: A(2×3) · B(3×4). El número de columnas de A (3) coincide con el número de filas de B (3) ✓. Resultado: **A·B es de orden 2×4**.

Después: (A·B)(2×4) · C(4×1). El número de columnas de A·B (4) coincide con el número de filas de C (4) ✓. Resultado: **(A·B)·C es de orden 2×1**.

El resultado es una **matriz columna 2×1**, es decir, un vector columna de 2 componentes.

> **√ A(2×3)·B(3×4)·C(4×1) = matriz de orden 2×1. □**



Tabla resumen de resultados

Ítem	Proposición (resumen)	Resultado
a)	Toda diagonal es simétrica	**VERDADERO**
b)	det(A+B) = det(A)+det(B)	**FALSO**
c)	AB=AC, ∃A⁻¹ ⟹ B=C	**VERDADERO**
d)	Diagonal antisimétrica = 0	**VERDADERO**
e)	Toda simétrica tiene inversa	**FALSO**
f)	det=0 ⟹ A es nula	**FALSO**
g)	Cambio de 2 filas cambia signo	**VERDADERO**
h)	Rango 3×2 puede ser 3	**FALSO**
i)	|AB| = |BA|	**VERDADERO**
j)	A(2×3)·B(3×4)·C(4×1) → 2×1	**VERDADERO**

✦ det(A) · A⁻¹ · rang(M) ✦

Fin del Examen

MATEMÁTICAS CCSS · 2.º BACHILLERATO · ÁLGEBRA DE MATRICES · 3/02/2017

"Las Matemáticas son el instrumento por excelencia del conocimiento científico."

— JAMES CLERK MAXWELL

Ejercicio	Tema	Contenido
1	Operaciones con A, B, C	A·B−C y ecuación A·B·X−C·X=2C
2	Parámetro a e inversa	det=0 para a=0 y a=1; A^{-1} para a=2
3	Rango por Gauss	Rango(A) = 3 (forma escalonada)
4	Aplicación empresarial	Ganancias: 3.950 € totales
5	V/F propiedades	6 verdaderos, 4 falsos (con justificación)

Documento con resolución completa paso a paso · Álgebra de Matrices y Determinantes · Curso 2016-2017

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS 2ª EVALUACIÓN

8-03-2017 EXAMEN 2º BACH

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

Nº1.- Una persona adquirió en el mercado cierta cantidad de unidades de memoria externa, de lectores de libros electrónicos y de tabletas gráficas a un precio de 100, 120 y 150 euros la unidad, respectivamente. El importe total de la compra fue de 1.160 euros y el número total de unidades, 9. Además, compró una unidad más de tabletas gráficas que de lectores de libros electrónicos. ¿Cuántas unidades adquirió de cada producto?

Nº2.- Una pastelería dispone de 100 kg de masa, 80 kg de crema de chocolate y 46 kg de nata. Con estos ingredientes elabora dos tipos de tartas: la tarta de chocolate, que requiere para su elaboración 1 kg de masa y 2 kg de crema de chocolate, y la tarta de chocolate y nata, que requiere 2 kg de masa, 1 kg de crema de chocolate y 1 kg de nata. Por cada tarta de chocolate se obtiene un beneficio de 10 euros, y de 12 euros por cada una de chocolate y nata. Suponiendo que vende todas las tartas, ¿cuántas tartas de cada tipo debe preparar para maximizar su beneficio?, ¿cuál es el beneficio máximo? ¿Nos sobra algo de algún ingrediente?

Nº3.- Se considera el sistema lineal de ecuaciones dependiente del parámetro real m:

$$\begin{cases} x + my + 3z = 2 \\ x + y - z = 1 \\ 2x + 3y + mz = 3 \end{cases}$$

a) Discútase en función de los valores del parámetro $m \in \mathcal{R}$
b) Resuélvase dicho sistema para m = 1


Nº4.- Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & b \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -2 & -5 & 1 \\ 3 & c & 1 \end{pmatrix}$

a) Hállese a, b, c para que se cumpla que $A \cdot B = C^t$
b) Para a = 1, calcula la matriz inversa de A.
c) Para a =1, b = 1 y c = 2 resuelve la siguiente ecuación matricial $A \cdot (X + B) = C^t$

Nº5.- Determina según el valor del parámetro m, el rango de la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & m \end{pmatrix}$$

SUERTE JÓVENES



2.ª EVALUACIÓN · 2.º BACHILLERATO

MATEMÁTICAS II

Examen Resuelto con Rigor Matemático

📅 **Fecha: 8 de marzo de 2017**

📚 **Nivel: 2.º Bachillerato**

🎯 **Temas: Sistemas de Ecuaciones · Programación Lineal**

Sistemas con Parámetros · Matrices · Rango

> "La ciencia sin religión está coja; la religión sin ciencia está ciega.
> La matemática es la poesía de la razón lógica."

— Werner Karl Heisenberg (1901–1976)
Premio Nobel de Física 1932

SOLUCIONES COMPLETAS · TODOS LOS PASOS DESARROLLADOS

Í N D I C E

Haz clic en cualquier ejercicio para ir directamente a su solución

01 **Sistema de Ecuaciones — Compra de Dispositivos Electrónicos** **3**

Planteamiento · Variables · Sistema 3×3 · Resolución por sustitución · Verificación

---

02 **Programación Lineal — Maximización de Beneficio de Pastelería** **6**

Variables · Restricciones · Región factible · Vértices · Función objetivo · Máximo

---

03 **Sistema con Parámetro m — Discusión y Resolución** **10**

Apartado a) Discusión según m (Rouché-Fröbenius) · Apartado b) Solución para m = 1

---

04 **Matrices — Operaciones, Inversa y Ecuación Matricial** **15**

Apartado a) Hallar a, b, c tal que $A \cdot B = C^t$ · Apartado b) Matriz inversa de A (a = 1) · Apartado c) Ecuación matricial $A \cdot (X + B) = C^t$

---

05 **Rango de una Matriz con Parámetro m** 22

Reducción por filas · Determinante · Estudio exhaustivo de casos

1

EJERCICIO 1 · SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Compra de Dispositivos Electrónicos

📋 ENUNCIADO

Una persona adquirió en el mercado cierta cantidad de unidades de **memoria externa**, de **lectores de libros electrónicos** y de **tabletas gráficas** a un precio de 100, 120 y 150 euros la unidad, respectivamente. El importe total de la compra fue de **1.160 euros** y el número total de unidades, **9**. Además, compró **una unidad más de tabletas gráficas que de lectores de libros electrónicos**. ¿Cuántas unidades adquirió de cada producto?



Figura 1.1 — Dispositivos: memorias externas, lectores electrónicos y tabletas gráficas

✏ SOLUCIÓN COMPLETA

PASO 1 — DEFINICIÓN DE VARIABLES

Llamamos:

$$x = \text{número de unidades de memoria externa (precio: 100 €/ud.)}$$
$$y = \text{número de unidades de lectores de libros electrónicos (precio: 120 €/ud.)}$$
$$z = \text{número de unidades de tabletas gráficas (precio: 150 €/ud.)}$$

Todas las variables representan cantidades enteras no negativas: $x, y, z \in \mathbb{N}_0$.

PASO 2 — PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DE ECUACIONES

Traducimos cada condición del problema a una ecuación:

$$\text{Condición 1 (importe total): } 100x + 120y + 150z = 1.160$$
$$\text{Condición 2 (total de unidades): } x + y + z = 9$$
$$\text{Condición 3 (tabletas = lectores + 1): } z = y + 1 \iff z - y = 1$$

Así obtenemos el sistema lineal 3×3:

$$\begin{cases} 100x + 120y + 150z = 1.160 \quad ...(1) \\ x + y + z = 9 \quad ...(2) \\ -y + z = 1 \quad ...(3) \end{cases}$$

PASO 3 — RESOLUCIÓN POR EL MÉTODO DE SUSTITUCIÓN

Desde la ecuación (3) despejamos z:

$$z = y + 1$$

Sustituimos $z = y + 1$ en la ecuación (2):

$$x + y + (y + 1) = 9$$
$$x + 2y + 1 = 9$$

$$x + 2y = 8$$

$$x = 8 - 2y \quad ...(4)$$

Sustituimos $z = y + 1$ y $x = 8 - 2y$ en la ecuación (1):

$$100 \cdot (8 - 2y) + 120y + 150 \cdot (y + 1) = 1.160$$

$$800 - 200y + 120y + 150y + 150 = 1.160$$

$$950 + (-200 + 120 + 150)y = 1.160$$

$$950 + 70y = 1.160$$

$$70y = 1.160 - 950$$

$$70y = 210$$

$$y = 210 / 70$$

$$y = 3$$

Calculamos z y x:

$$z = y + 1 = 3 + 1 = 4$$

$$x = 8 - 2y = 8 - 2 \cdot 3 = 8 - 6 = 2$$

PASO 4 — VERIFICACIÓN

✔ COMPROBACIÓN DE LAS TRES CONDICIONES

Cond. 1 (importe): $100 \cdot 2 + 120 \cdot 3 + 150 \cdot 4 = 200 + 360 + 600 = \mathbf{1.160\ €}$ ✔

Cond. 2 (unidades): $2 + 3 + 4 = \mathbf{9\ unidades}$ ✔

Cond. 3 (tabletas = lectores + 1): $4 = 3 + 1 = \mathbf{4}$ ✔

🏆 RESULTADO FINAL — EJERCICIO 1

La persona adquirió:

- **2 unidades** de memoria externa (a 100 € c/u = 200 €)
- **3 unidades** de lectores de libros electrónicos (a 120 € c/u = 360 €)
- **4 unidades** de tabletas gráficas (a 150 € c/u = 600 €)

Total: 2 + 3 + 4 = 9 unidades · 200 + 360 + 600 = 1.160 €

EJERCICIO 2 · PROGRAMACIÓN LINEAL — OPTIMIZACIÓN

2 Maximización de Beneficio en una Pastelería

📋 ENUNCIADO

Una pastelería dispone de **100 kg de masa**, **80 kg de crema de chocolate** y **46 kg de nata**. Elabora dos tipos de tartas:

- **Tarta de chocolate:** requiere 1 kg de masa + 2 kg de crema de chocolate → beneficio: **10 €**
- **Tarta de chocolate y nata:** requiere 2 kg de masa + 1 kg de crema + 1 kg de nata → beneficio: **12 €**

Suponiendo que se venden todas las tartas: ¿Cuántas de cada tipo para **maximizar el beneficio**? ¿Cuál es el **beneficio máximo**? ¿Sobra algún ingrediente?




Figura 2.1 — Pastelería con tartas de chocolate y los ingredientes disponibles

✏ SOLUCIÓN COMPLETA

PASO 1 — DEFINICIÓN DE VARIABLES Y MODELO MATEMÁTICO

$$x = \text{número de tartas de chocolate}$$
$$y = \text{número de tartas de chocolate y nata}$$
$$(x \geq 0,\ y \geq 0,\ x,\ y \in \mathbb{N}_0)$$

Función objetivo (a maximizar):

$$Z(x, y) = 10x + 12y \rightarrow \text{maximizar}$$

Restricciones (disponibilidad de ingredientes):

$$\text{Restricción de masa: } x + 2y \leq 100 \quad ...(R_1)$$
$$\text{Restricción de crema choc.: } 2x + y \leq 80 \quad ...(R_2)$$
$$\text{Restricción de nata: } y \leq 46 \quad ...(R_3)$$
$$\text{No negatividad: } x \geq 0,\ y \geq 0 \quad ...(R_4)$$

PASO 2 — DETERMINACIÓN DE LOS VÉRTICES DE LA REGIÓN FACTIBLE

La región factible es el polígono convexo delimitado por las inecuaciones. Sus vértices se obtienen intersectando las rectas frontera dos a dos:

Vértice A: Intersección de los ejes (x = 0, y = 0)

$$A = (0,\ 0)$$

Vértice B: Eje x (y = 0) con restricción R_2: $2x + 0 = 80 \rightarrow x = 40$

$$B = (40,\ 0)$$

Vértice C: Intersección de R_1 y R_2 (ambas activas):

$$\begin{cases} x + 2y = 100 \quad ...(R_1 \text{ activa}) \\ 2x + y = 80 \quad ...(R_2 \text{ activa}) \end{cases}$$

$$\text{De } R_1\text{: } x = 100 - 2y$$

$$\text{Sustituyendo en } R_2\text{: } 2(100 - 2y) + y = 80$$

$$200 - 4y + y = 80$$

$$200 - 3y = 80$$

$$3y = 120$$

$$y = 40$$

$$x = 100 - 2 \cdot 40 = 100 - 80 = 20$$

$$C = (20, 40)$$

Vértice D: Intersección de R_1 y R_3 ($y = 46$, $x + 2y = 100$):

$$x + 2 \cdot 46 = 100 \rightarrow x + 92 = 100 \rightarrow x = 8$$

$$\text{Verificar } R_2\text{: } 2 \cdot 8 + 46 = 16 + 46 = 62 \leq 80 \checkmark$$

$$D = (8, 46)$$

Vértice E: Eje y ($x = 0$) con R_3: $y = 46$

$$\text{Verificar } R_1\text{: } 0 + 2 \cdot 46 = 92 \leq 100 \checkmark$$

$$\text{Verificar } R_2\text{: } 0 + 46 = 46 \leq 80 \checkmark$$

$$E = (0, 46)$$

PASO 3 — EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN OBJETIVO EN LOS VÉRTICES

Por el Teorema Fundamental de la Programación Lineal, el máximo (y el mínimo) de Z se alcanza en algún vértice del polígono de la región factible:

Vértice	x	y	Z = 10x + 12y	Observación
A	0	0	10·0 + 12·0 = **0 €**	Mínimo

B	40	0	10·40 + 12·0 = **400 €**	
C	20	40	10·20 + 12·40 = 200 + 480 = **680 €**	✦ **MÁXIMO**
D	8	46	10·8 + 12·46 = 80 + 552 = **632 €**	
E	0	46	10·0 + 12·46 = **552 €**	

PASO 4 — ANÁLISIS DE INGREDIENTES SOBRANTES

En el punto óptimo C = (x = 20, y = 40):

```
Masa consumida: 20·1 + 40·2 = 20 + 80 = 100 kg
(disponible: 100 kg) → Resto: 0 kg
Crema de chocolate usada: 20·2 + 40·1 = 40 + 40 = 80 kg
(disponible: 80 kg) → Resto: 0 kg
Nata consumida: 40·1 = 40 kg (disponible: 46 kg) →
Resto: 6 kg
```

🏆 RESULTADO FINAL — EJERCICIO 2

Para maximizar el beneficio, la pastelería debe elaborar:

- **20 tartas de chocolate** (x = 20)
- **40 tartas de chocolate y nata** (y = 40)

El **beneficio máximo** es: Z = 10·20 + 12·40 = 200 + 480 = **680 €**

Ingredientes sobrantes: la masa y la crema de chocolate se agotan completamente. **Sobran 6 kg de nata** sin utilizar.

EJERCICIO 3 · SISTEMAS DE ECUACIONES CON PARÁMETRO

3 Discusión y Resolución según el Parámetro m

📋 ENUNCIADO

Se considera el sistema lineal de ecuaciones dependiente del parámetro real m:

$$\begin{cases} x + my + 3z = 2 \quad ...(1) \\ x + y - z = 1 \quad ...(2) \\ 2x + 3y + mz = 3 \quad ...(3) \end{cases}$$

a) Discútase en función de los valores del parámetro $m \in \mathbb{R}$

b) Resuélvase el sistema para $m = 1$




Figura 3.1 — Un sistema 3×3 con parámetro representa tres planos cuya intersección depende de m

✏ SOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) — Discusión según el parámetro m (Teorema de Rouché-Fröbenius)

CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ AMPLIADA

La matriz de coeficientes A y la ampliada (A|b) son:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & m & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & m \end{pmatrix} \quad (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & m & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & m & 3 \end{array}\right)$$

CÁLCULO DEL DETERMINANTE DE A

Expandiendo por la primera fila:

$$\det(A) = 1\cdot\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & m \end{vmatrix} - m\cdot\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & m \end{vmatrix} + 3\cdot\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 1\cdot(1\cdot m - (-1)\cdot 3) - m\cdot(1\cdot m - (-1)\cdot 2) + 3\cdot(1\cdot 3 - 1\cdot 2)$$

$$= 1\cdot(m + 3) - m\cdot(m + 2) + 3\cdot(3 - 2)$$

$$= m + 3 - m^2 - 2m + 3\cdot 1$$

$$= m + 3 - m^2 - 2m + 3$$

$$= -m^2 - m + 6$$

$$= -(m^2 + m - 6)$$

$$= -(m + 3)(m - 2)$$

El determinante se anula cuando:

$$\det(A) = 0 \iff -(m + 3)(m - 2) = 0 \iff m = -3 \text{ o } m = 2$$

CASO 1: M ≠ -3 Y M ≠ 2 (DET(A) ≠ 0)

$$\text{rang}(A) = 3 \text{ y } \text{rang}(A|b) = 3 = n \text{ (número de incógnitas)}$$

Por el Teorema de Rouché-Fröbenius:

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) = n = 3 \rightarrow$ SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO (SCD)

El sistema tiene solución única.

CASO 2: M = 2

Sustituimos m = 2 en la matriz ampliada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 3 \end{array}\right]$$

Hacemos eliminación de Gauss: $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$ y $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$:

$F_2 - F_1$: [1-1, 1-2, -1-3 | 1-2] = [0, -1, -4 | -1]

$F_3 - 2F_1$: [2-2, 3-4, 2-6 | 3-4] = [0, -1, -4 | -1]

Resultado:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & -1 \\ 0 & -1 & -4 & -1 \end{array}\right]$$

$F_3 \leftarrow F_3 - F_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

rang(A) = 2 y rang(A|b) = 2 < n = 3

Por Rouché-Fröbenius:

rang(A) = rang(A|b) = 2 < n = 3 → SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO (SCI)

Tiene infinitas soluciones (1 parámetro libre).

CASO 3: M = -3

Sustituimos m = -3 en la matriz ampliada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -3 & 3 \end{array}\right]$$

Eliminación de Gauss: $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$ y $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$:

$F_2 - F_1$: [0, 4, -4 | -1]

$F_3 - 2F_1$: [0, 9, -9 | -1]

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & -4 & -1 \\ 0 & 9 & -9 & -1 \end{array}\right]$$

$F_3 \leftarrow 4 \cdot F_3 - 9 \cdot F_2$:

$4 \cdot F_3$: [0, 36, -36 | -4]

$9 \cdot F_2$: [0, 36, -36 | -9]

$4F_3 - 9F_2$: [0, 0, 0 | -4 - (-9)] = [0, 0, 0 | 5]

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right]$$

rang(A) = 2 pero rang(A|b) = 3

```
Como rang(A) ≠ rang(A|b):
→ SISTEMA INCOMPATIBLE (SI) — no tiene solución.
```

🏆 **RESUMEN DE LA DISCUSIÓN — APARTADO A)**

• **m ≠ 2 y m ≠ -3:** Sistema Compatible Determinado (SCD) → solución única

• **m = 2:** Sistema Compatible Indeterminado (SCI) → infinitas soluciones

• **m = -3:** Sistema Incompatible (SI) → sin solución

Apartado b) — Resolución para m = 1

Para m = 1 (que no es ni 2 ni -3, así que es SCD), el sistema queda:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

Eliminación de Gauss: $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$ y $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$:

$F_2 - F_1$: [1-1, 1-1, -1-3 | 1-2] = [0, 0, -4 | -1]

$F_3 - 2F_1$: [2-2, 3-2, 1-6 | 3-4] = [0, 1, -5 | -1]

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & -1 \end{array}\right]$$

Intercambiamos F_2 y F_3 para tener el pivote en la posición correcta:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & -1 \end{array}\right]$$

Ahora resolvemos por sustitución regresiva:

$$\text{De } F_3\text{: } -4z = -1 \rightarrow z = 1/4$$

$$\text{De } F_2\text{: } y - 5z = -1$$
$$y - 5\cdot(1/4) = -1$$
$$y - 5/4 = -1$$
$$y = -1 + 5/4 = -4/4 + 5/4 = 1/4$$

$$\text{De } F_1\text{: } x + y + 3z = 2$$
$$x + 1/4 + 3\cdot(1/4) = 2$$
$$x + 1/4 + 3/4 = 2$$
$$x + 4/4 = 2$$
$$x + 1 = 2$$
$$x = 1$$

🏆 **RESULTADO — APARTADO B) M = 1**

Solución única: x = 1, y = 1/4, z = 1/4

EJERCICIO 4 · MATRICES — OPERACIONES, INVERSA Y ECUACIÓN MATRICIAL

4 Matrices A, B, C: Cálculo de Parámetros, Inversa y Ecuación

📋 ENUNCIADO

Dadas las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ a & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & b \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 1 \\ & & \\ 3 & c & 1 \end{bmatrix}$$

a) Hállese a, b, c para que se cumpla que $A \cdot B = C^T$

b) Para a = 1, calcula la matriz inversa de A

c) Para a = 1, b = 1 y c = 2, resuelve la ecuación matricial $A \cdot (X + B) = C^T$




Figura 4.1 — Operaciones con matrices: producto, transpuesta e inversa

✏ SOLUCIÓN COMPLETA

Apartado a) — Hallar a, b, c tal que $A \cdot B = C^s$

CÁLCULO DE C^s (TRASPUESTA DE C)

$$C = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 1 \\ & & \\ 3 & c & 1 \end{bmatrix} \rightarrow C^T = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -5 & c \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

C^T es de dimensión 3×2, y A·B también ha de ser 3×2 (A es 3×3 y B es 3×2): las dimensiones son compatibles.

CÁLCULO DEL PRODUCTO A·B

Multiplicamos A (3×3) por B (3×2):

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ a & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & b \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Fila 1 de A × columnas de B:

$$(A \cdot B)_{11} = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 5 \cdot (-1) = 2 + 1 - 5 = -2$$

$$(A \cdot B)_{12} = 1 \cdot b + 1 \cdot 2 + 5 \cdot 0 = b + 2$$

Fila 2 de A × columnas de B:

$$(A \cdot B)_{21} = 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 6 \cdot (-1) = 0 + 1 - 6 = -5$$

$$(A \cdot B)_{22} = 0 \cdot b + 1 \cdot 2 + 6 \cdot 0 = 2$$

Fila 3 de A × columnas de B:

$$(A \cdot B)_{31} = a \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 2a - 1$$

$$(A \cdot B)_{32} = a \cdot b + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 = ab$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} -2 & b+2 \\ -5 & 2 \\ 2a-1 & ab \end{bmatrix}$$

IGUALACIÓN $A \cdot B = C^s$ ELEMENTO A ELEMENTO

$$\begin{bmatrix} -2 & b+2 \\ -5 & 2 \\ 2a-1 & ab \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -5 & c \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Posición (1,1): $-2 = -2$ ✔ (verifica automáticamente)

Posición (1,2): $b + 2 = 3 \rightarrow b = 1$

Posición (2,1): $-5 = -5$ ✔ (verifica automáticamente)

Posición (2,2): $2 = c \rightarrow c = 2$

Posición (3,1): $2a - 1 = 1 \rightarrow 2a = 2 \rightarrow a = 1$

Posición (3,2): $ab = 1 \cdot 1 = 1$ ✔ (verifica con a=1, b=1)

🏆 **RESULTADO — APARTADO A)**

a = 1, b = 1, c = 2

Apartado b) — Matriz inversa de A para a = 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ (con } a = 1\text{)}$$

Paso 1: Cálculo del determinante de A

$$\det(A) = 1\cdot\begin{vmatrix}1 & 6\\ 0 & 1\end{vmatrix} - 1\cdot\begin{vmatrix}0 & 6\\ 1 & 1\end{vmatrix} + 5\cdot\begin{vmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{vmatrix}$$

$$= 1\cdot(1\cdot 1 - 6\cdot 0) - 1\cdot(0\cdot 1 - 6\cdot 1) + 5\cdot(0\cdot 0 - 1\cdot 1)$$

$$= 1\cdot(1) - 1\cdot(0 - 6) + 5\cdot(0 - 1)$$

$$= 1 - 1\cdot(-6) + 5\cdot(-1)$$

$$= 1 + 6 - 5$$

$$= 2$$

Como $\det(A) = 2 \neq 0$, A es invertible.

Paso 2: Cálculo de la matriz de cofactores

$$C_{11} = +\begin{vmatrix}1 & 6\\ 0 & 1\end{vmatrix} = 1\cdot 1 - 6\cdot 0 = 1$$

$$C_{12} = -\begin{vmatrix}0 & 6\\ 1 & 1\end{vmatrix} = -(0\cdot 1 - 6\cdot 1) = -(-6) = 6$$

$$C_{13} = +\begin{vmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{vmatrix} = 0\cdot 0 - 1\cdot 1 = -1$$

$$C_{21} = -\begin{vmatrix}1 & 5\\ 0 & 1\end{vmatrix} = -(1\cdot 1 - 5\cdot 0) = -1$$

$$C_{22} = +\begin{vmatrix}1 & 5\\ 1 & 1\end{vmatrix} = 1\cdot 1 - 5\cdot 1 = 1 - 5 = -4$$

$$C_{23} = -\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{vmatrix} = -(1\cdot 0 - 1\cdot 1) = -(-1) = 1$$

$$C_{31} = + \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 1 \cdot 6 - 5 \cdot 1 = 6 - 5 = 1$$

$$C_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} = -(1 \cdot 6 - 5 \cdot 0) = -(6) = -6$$

$$C_{33} = + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 1$$

Paso 3: Matriz adjunta (traspuesta de la matriz de cofactores):

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 6 & -4 & -6 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 4: Matriz inversa

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 6 & -4 & -6 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 3 & -2 & -3 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Paso 5: Verificación $A \cdot A^{-1} = I$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 3 & -2 & -3 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Fila 1 × Col 1: 1(1/2) + 1(3) + 5(-1/2) = 1/2 + 3 - 5/2 = (1+6-5)/2 = 2/2 = 1 ✔

Fila 1 × Col 2: 1(-1/2) + 1(-2) + 5(1/2) = -1/2 -

2 + 5/2 = (-1-4+5)/2 = 0 ✔

Fila 1 × Col 3: 1(1/2) + 1(-3) + 5(1/2) = 1/2 - 3 + 5/2 = (1-6+5)/2 = 0 ✔

Fila 2 × Col 1: 0(1/2) + 1(3) + 6(-1/2) = 0 + 3 - 3 = 0 ✔

Fila 2 × Col 2: 0(-1/2) + 1(-2) + 6(1/2) = 0 - 2 + 3 = 1 ✔

Fila 2 × Col 3: 0(1/2) + 1(-3) + 6(1/2) = 0 - 3 + 3 = 0 ✔

Fila 3 × Col 1: 1(1/2) + 0(3) + 1(-1/2) = 1/2 - 1/2 = 0 ✔

Fila 3 × Col 2: 1(-1/2) + 0(-2) + 1(1/2) = -1/2 + 1/2 = 0 ✔

Fila 3 × Col 3: 1(1/2) + 0(-3) + 1(1/2) = 1/2 + 1/2 = 1 ✔ → ¡$A \cdot A^{-1} = I$ ✔!

🏆 **RESULTADO — APARTADO B)**

Matriz inversa de A (a=1):

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 3 & -2 & -3 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Apartado c) — Ecuación matricial $A \cdot (X + B) = C^s$, con a=1, b=1, c=2

Con a = 1, b = 1, c = 2 las matrices quedan:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 1 \\ & & \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C^T = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -5 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Resolución paso a paso:

Como A tiene inversa (det(A) = 2 ≠ 0), premultiplicamos ambos miembros por A^{-1}:

$$A \cdot (X + B) = C^T$$
$$A^{-1} \cdot A \cdot (X + B) = A^{-1} \cdot C^T$$
$$I \cdot (X + B) = A^{-1} \cdot C^T$$
$$X + B = A^{-1} \cdot C^T$$
$$X = A^{-1} \cdot C^T - B$$

Cálculo de $A^{-1} \cdot C^S$:

$$A^{-1} \cdot C^T = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 3 & -2 & -3 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -5 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Fila 1:

col1: (1/2)(-2) + (-1/2)(-5) + (1/2)(1) = -1 + 5/2 + 1/2 = -1 + 3 = 2

col2: (1/2)(3) + (-1/2)(2) + (1/2)(1) = 3/2 - 1 + 1/2 = 3/2 - 2/2 + 1/2 = 2/2 = 1

Fila 2:

col1: 3(-2) + (-2)(-5) + (-3)(1) = -6 + 10 - 3 = 1

col2: 3(3) + (-2)(2) + (-3)(1) = 9 - 4 - 3 = 2

Fila 3:

col1: (-1/2)(-2) + (1/2)(-5) + (1/2)(1) = 1 - 5/2 + 1/2 = 1 - 4/2 = 1 - 2 = -1

col2: (-1/2)(3) + (1/2)(2) + (1/2)(1) = -3/2 + 1 +

$$1/2 = -3/2 + 2/2 + 1/2 = 0$$

$$A^{-1}\cdot C^{T} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Cálculo de $X = A^{-1}\cdot C^{S} - B$:

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

✔ VERIFICACIÓN: A·(X + B) = A·(O + B) = A·B

En el apartado a) demostramos que $A\cdot B = C^{T}$. Como $X = 0$ (matriz nula), entonces $A\cdot(0 + B) = A\cdot B = C^{T}$ ✔

🏆 **RESULTADO — APARTADO C)**

X = O (la matriz nula 3×2)

La solución de la ecuación matricial es la matriz de ceros 3×2.

EJERCICIO 5 · RANGO DE MATRICES CON PARÁMETRO

5 Determinación del Rango en Función del Parámetro m

📋 ENUNCIADO

Determina, según el valor del parámetro m, el rango de la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & m \end{bmatrix}$$




Figura 5.1 — El rango de una matriz es la dimensión del espacio vectorial generado por sus filas (o columnas)

✏ SOLUCIÓN COMPLETA

PASO 1 — REDUCCIÓN POR OPERACIONES ELEMENTALES DE FILA (ESCALONAMIENTO)

Aplicamos la eliminación de Gauss para escalonar la matriz:

$$
\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & m \end{bmatrix}
$$

$F_2 \leftarrow F_2 - F_1$:

$F_2 = [1-1, -1-1, 1-0, 3-2] = [0, -2, 1, 1]$

$F_3 \leftarrow F_3 + F_1$:

$F_3 = [-1+1, 2+1, 4+0, 2+2] = [0, 3, 4, 4]$

$F_4 \leftarrow F_4 - 3F_1$:

$F_4 = [3-3, 2-3, 4-0, m-6] = [0, -1, 4, m-6]$

Resultado:

$$
\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & -1 & 4 & m-6 \end{bmatrix}
$$

Continuamos con las filas 2, 3 y 4:

$F_3 \leftarrow 2F_3 + 3F_2$:

$2F_3 = [0, 6, 8, 8]$

$3F_2 = [0, -6, 3, 3]$

$2F_3 + 3F_2 = [0, 0, 11, 11]$

$F_4 \leftarrow 2F_4 - F_2$:

$2F_4 = [0, -2, 8, 2(m-6)] = [0, -2, 8, 2m-12]$

$F_2 = [0, -2, 1, 1]$

$2F_4 - F_2 = [0-0, -2-(-2), 8-1, (2m-12)-1] = [0, 0, 7, 2m-13]$

Resultado:

$$
\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\
$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & 11 \\ 0 & 0 & 7 & 2m-13 \end{bmatrix}$$

Eliminamos el pivote de F_3 sobre F_4:

$$F_4 \leftarrow 11F_4 - 7F_3:$$

$$11F_4 = [0,\ 0,\ 77,\ 11(2m-13)] = [0,\ 0,\ 77,\ 22m-143]$$

$$7F_3 = [0,\ 0,\ 77,\ 77]$$

$$11F_4 - 7F_3 = [0,\ 0,\ 77-77,\ 22m-143-77] = [0,\ 0,\ 0,\ 22m-220] = [0,\ 0,\ 0,\ 22(m-10)]$$

Forma escalonada final:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 22(m-10) \end{bmatrix}$$

PASO 2 — ANÁLISIS POR CASOS SEGÚN EL VALOR DE M

El único elemento que depende de m es el de la posición (4,4): `22(m - 10)`.

$$22(m - 10) = 0 \iff m = 10$$

CASO 1: M ≠ 10

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 22(m-10)\neq 0 \end{bmatrix} \rightarrow 4 \text{ filas no nulas}$$

$$\text{rang}(A) = 4 \text{ (rango máximo, la matriz es de rango completo)}$$

CASO 2: M = 10

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{solo 3 filas no nulas}$$

$$\text{rang}(A) = 3$$

Comprobamos que existe un menor de orden 3 no nulo (los tres primeros pivotes son $\neq 0$):

El menor formado por las 3 primeras filas y las 3 primeras columnas es:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 11 \end{vmatrix} = 1\cdot(-2\cdot 11 - 1\cdot 0) - 1\cdot(0\cdot 11 - 1\cdot 0) + 0 = 1\cdot(-22) - 0 = -22 \neq 0 \checkmark$$

Confirma que $\text{rang}(A) = 3$ para $m = 10$.

🏆 **RESULTADO FINAL — EJERCICIO 5**

- Si **$m \neq 10$**: rang(A) = **4** (rango máximo para una matriz 4×4)
- Si **$m = 10$**: rang(A) = **3** (la cuarta fila queda como combinación lineal de las anteriores)

✦ ✦ ✦

"La matemática es el alfabeto con el que Dios ha escrito el Universo."
— Galileo Galilei

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

9-05-2017 EXAMEN 2º BACH

ies Antonio Tovar Centro bilingüe

Nº1.- Se tienen dos dados, uno (A) con dos caras rojas 4 y cuatro verdes, y otro (B) con dos caras verdes y cuatro rojas. Se lanza una moneda; si sale cara se arroja el dado A y si sale cruz el dado B.

a) Hállese la probabilidad de obtener una cara de color rojo.

b) Si sabemos que ha salido una cara de color verde en el dado, ¿cuál es la probabilidad de que en la moneda haya salido cara?

Nº2.- En el IES Antonio Tovar hay 200 alumnos matriculados de Primero de Bachillerato. Supongamos que 140 alumnos estudian francés, 70 juegan al fútbol y 60 estudian francés y juegan al futbol. Escogemos un alumno al azar, calcúlese:

a) La probabilidad de que el alumno estudie francés.
b) La probabilidad de que el alumno estudie francés y juegue al fútbol.
c) La probabilidad de que el alumno estudie francés o no juegue al fútbol.
d) Si sabemos que el alumno juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que estudie francés?
e) ¿Son independientes los sucesos Fu = {juega al fútbol} y Fr = {estudia francés}?
f) ¿y compatibles?

Nº3.- Vuestro profesor de matemáticas ha observado que las notas obtenidas por sus alumnos/as en los exámenes de Estadística siguen una distribución N(6; 2,5). Se han presentado al último examen 32 alumnos.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno saque una nota superior o igual a 7?
b) ¿Cuántos sacaron al menos un 7?

Nº4.- Un examen tipo test consta de 38 preguntas a contestar verdadero o falso. El examen se aprueba si se contesta correctamente al menos 20 preguntas. Un alumno responde al examen lanzando al aire una moneda y contestando verdadero si sale cara y falso si sale cruz. Hállese la probabilidad de aprobar el examen.

Nº5.- En una encuesta se pregunta a 10000 estudiantes de Bachillerato sobre su consumo semanal de refrescos, encontrándose una media muestral de 5 refrescos. Se supone una desviación típica de la población de $\sigma = 2$ refrescos.

a) Halla el intervalo de confianza para el consumo medio semanal de refrescos en toda la población de estudiantes de Bachillerato, con un nivel de confianza del 95 %.

b) Si aceptamos un error máximo de ± 0,25 refrescos para la estimación de la media poblacional con un nivel de confianza del 95 %, ¿a cuántas personas es necesario entrevistar?

Nº6.- Se lanza una moneda 100 veces y se obtienen 62 cruces. ¿Cuál es el intervalo de confianza para la proporción de cruces con un 99% de nivel de confianza? ¿Y el error que se comete con ese nivel de confianza?

SUERTE JÓVENES



2.ª EVALUACIÓN · EXAMEN · 8 DE MARZO DE 2017

MATEMÁTICAS II

2.º Bachillerato — Soluciones Completas

📐 **Sistemas de Ecuaciones Lineales (con y sin parámetro)**

📊 **Programación Lineal — Optimización**

🔢 **Álgebra de Matrices — Operaciones e Inversas**

📏 **Rango de Matrices con Parámetro**

Gauss-Jordan · **Rouché-Fröbenius** · **Programación Lineal** · **Matrices Inversas** · **Rango de Matrices**

"La ciencia sin la matemática es como el lenguaje sin el alfabeto.
El conocimiento nace donde la razón y la naturaleza se abrazan."

— Werner Karl Heisenberg (1901-1976)
Premio Nobel de Física 1932 · Fundador de la Mecánica Cuántica

TODOS LOS EJERCICIOS COMPLETAMENTE RESUELTOS · PASO A PASO · CON ILUSTRACIONES

ÍNDICE DE EJERCICIOS

Cada entrada enlaza directamente con el ejercicio correspondiente

01 **Sistema de Ecuaciones — Dispositivos Electrónicos** 3

Planteamiento · Definición de variables · Sistema 3×3 · Método de sustitución · Verificación

02 **Programación Lineal — Maximización en Pastelería** 6

Variables · Restricciones · Región factible · Vértices · Evaluación de Z · Beneficio máximo
📈 Gráfica completa de la región factible con todos los vértices

03 **Sistema con Parámetro m — Discusión y Resolución** 11

Apartado a) Discusión según m ∈ ℝ (Teorema de Rouché-Fröbenius) · Apartado b) Solución completa para m = 1

04 **Matrices A, B, C — Parámetros, Inversa y Ecuación Matricial** 16

Apartado a) Hallar a, b, c tal que $A \cdot B = C^t$ · Apartado b) Inversa de A (a=1): cofactores, adjunta y verificación · Apartado c) Ecuación $A \cdot (X+B) = C^t$

05 **Rango de Matriz 4×4 con Parámetro m** 23

Reducción de Gauss completa · Análisis de casos: m = 10 y m ≠ 10
📊 Diagrama visual del proceso de escalonamiento

📌 Nota sobre el desarrollo:

Cada ejercicio se resuelve con **rigor matemático completo**, sin omitir ningún paso intermedio. Se incluyen verificaciones, gráficas originales generadas para este libro, tablas de valores y diagramas visuales del proceso algebraico.

EJERCICIO 1 · SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES · ÁLGEBRA

1 Compra de Dispositivos Electrónicos: Memoria, Lectores y Tabletas

📋 ENUNCIADO COMPLETO

Una persona adquirió en el mercado cierta cantidad de unidades de **memoria externa**, de **lectores de libros electrónicos** y de **tabletas gráficas** a un precio de **100 €, 120 €** y **150 €** la unidad, respectivamente. El importe total de la compra fue de **1.160 euros** y el número total de unidades fue **9**. Además, compró **una unidad más de tabletas gráficas que de lectores de libros electrónicos**. ¿Cuántas unidades adquirió de cada producto?



Figura 1.1 — Memoria externa (100€), lector electrónico (120€) y tableta gráfica (150€)

✏ SOLUCIÓN COMPLETA PASO A PASO

PASO 1 — DEFINICIÓN DE VARIABLES

Asignamos una incógnita a cada tipo de producto:

$$x = \text{número de unidades de memoria externa (precio unitario: 100 €)}$$
$$y = \text{número de unidades de lectores de libros (precio unitario: 120 €)}$$
$$z = \text{número de unidades de tabletas gráficas (precio unitario: 150 €)}$$

$$\text{Condición de dominio: } x, y, z \in \mathbb{N} \text{ (enteros positivos)}$$

PASO 2 — PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA 3×3

Cada frase del enunciado se traduce en una ecuación:

$$\text{Frase 1} \rightarrow \text{"el importe total fue 1.160 €":}$$
$$100x + 120y + 150z = 1.160 \quad ...(\text{ecuación 1})$$

$$\text{Frase 2} \rightarrow \text{"el total de unidades fue 9":}$$
$$x + y + z = 9 \quad ...(\text{ecuación 2})$$

$$\text{Frase 3} \rightarrow \text{"una tableta más que lectores":}$$
$$z = y + 1 \iff -y + z = 1 \quad ...(\text{ecuación 3})$$

El sistema completo en forma matricial es:

$$\begin{bmatrix} 100 & 120 & 150 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1160 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix}$$

PASO 3 — RESOLUCIÓN POR SUSTITUCIÓN SUCESIVA

Etapa 3.1 — Desde la ecuación (3), despejamos z:

$$z = y + 1 \quad ...(*)$$

Etapa 3.2 — Sustituimos (*) en la ecuación (2):

$$x + y + (y + 1) = 9$$
$$x + 2y + 1 = 9$$
$$x + 2y = 8$$
$$x = 8 - 2y \quad ...(**)$$

Etapa 3.3 — Sustituimos (*) y (**) en la ecuación (1):

$$100 \cdot (8 - 2y) + 120y + 150 \cdot (y + 1) = 1.160$$

Desarrollamos término a término:

$$100 \cdot 8 = 800$$
$$100 \cdot (-2y) = -200y$$

$$120y = 120y$$

$$150 \cdot y = 150y$$

$$150 \cdot 1 = 150$$

Agrupamos:

$$800 - 200y + 120y + 150y + 150 = 1.160$$

$$(800 + 150) + (-200 + 120 + 150)y = 1.160$$

$$950 + 70y = 1.160$$

Despejamos y:

$$70y = 1.160 - 950 = 210$$

$$y = 210 / 70$$

$$y = 3$$

Etapa 3.4 — Calculamos z y x con los valores hallados:

$$z = y + 1 = 3 + 1 = 4 \text{ (tabletas gráficas)}$$

$$x = 8 - 2y = 8 - 2 \cdot 3 = 8 - 6 = 2 \text{ (memorias externas)}$$

PASO 4 — VERIFICACIÓN COMPLETA

✓ COMPROBACIÓN DE LAS TRES ECUACIONES ORIGINALES

Ecuación 1 (importe): $100 \cdot 2 + 120 \cdot 3 + 150 \cdot 4 = 200 + 360 + 600 =$ **1.160 € ✔**

Ecuación 2 (unidades): $2 + 3 + 4 =$ **9 ✔**

Ecuación 3 (tabletas = lectores + 1): $z = 4 = 3 + 1 = y + 1$ **✔**

🏆 RESULTADO FINAL — EJERCICIO 1

La persona adquirió exactamente:

- **x = 2 unidades** de memoria externa → coste: 2 × 100 = 200 €
- **y = 3 unidades** de lectores electrónicos → coste: 3 × 120 = 360 €
- **z = 4 unidades** de tabletas gráficas → coste: 4 × 150 = 600 €

Total unidades: 9 | Total importe: **1.160 €**

2

EJERCICIO 2 · PROGRAMACIÓN LINEAL · OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA

Maximización del Beneficio de una Pastelería

📋 ENUNCIADO COMPLETO

Una pastelería dispone de **100 kg de masa**, **80 kg de crema de chocolate** y **46 kg de nata**. Elabora dos tipos de tartas:

- **Tarta de chocolate (T_1):** requiere 1 kg de masa + 2 kg de crema → beneficio: **10 €/tarta**
- **Tarta de choc. y nata (T_2):** requiere 2 kg de masa + 1 kg de crema + 1 kg de nata → beneficio: **12 €/tarta**

Suponiendo que vende todas las tartas: ¿cuántas de cada tipo para **maximizar el beneficio**? ¿Cuál es el **beneficio máximo**? ¿Sobra algún ingrediente?




Figura 2.1 — Pastelería con dos tipos de tartas y sus ingredientes disponibles

✏ SOLUCIÓN COMPLETA PASO A PASO

PASO 1 — MODELIZACIÓN MATEMÁTICA DEL PROBLEMA

VARIABLES:

x = número de tartas de chocolate (T_1)

y = número de tartas de chocolate y nata (T_2)

Con $x \geq 0$, $y \geq 0$ (no negatividad)

FUNCIÓN OBJETIVO (beneficio total, a MAXIMIZAR):

$$Z(x, y) = 10x + 12y$$

RESTRICCIONES (disponibilidad de ingredientes):

R_1: $x + 2y \leq 100$ (masa disponible)

R_2: $2x + y \leq 80$ (crema de chocolate disponible)

R_3: $y \leq 46$ (nata disponible)

R_4: $x \geq 0,\ y \geq 0$ (no negatividad)

PASO 2 — DETERMINACIÓN DE LOS VÉRTICES DE LA REGIÓN FACTIBLE

Por el Teorema Fundamental de la Programación Lineal, el óptimo se alcanza en un vértice del polígono convexo que forma la región factible. Calculamos todas las intersecciones:

Vértice A — Intersección de los ejes: $x = 0$, $y = 0$

$$A = (0, 0)$$

Verificación: $0+0 \leq 100$ ✔ | $0+0 \leq 80$ ✔ | $0 \leq 46$ ✔

Vértice B — Eje x ($y = 0$) con R_2 activa: $2x = 80 \rightarrow x = 40$

$$B = (40, 0)$$

Verificación: $40+0 \leq 100$ ✔ | $80+0 = 80 \leq 80$ ✔ | $0 \leq 46$ ✔

Vértice C — Intersección de R_1 y R_2 (ambas activas simultáneamente):

$$\begin{cases} x + 2y = 100 \rightarrow x = 100 - 2y \quad ...(i) \\ 2x + y = 80 \quad ...(ii) \end{cases}$$

Sustituyendo (i) en (ii):

$$2(100 - 2y) + y = 80$$

$$200 - 4y + y = 80$$

$$200 - 3y = 80$$

$$3y = 120$$

$$y = 40$$

$$x = 100 - 2\cdot 40 = 100 - 80 = 20$$

$$C = (20,\ 40)$$

Verificación R_3: $40 \leq 46$ ✔

Vértice D — Intersección de R_1 y R_3: $y = 46$ con $x + 2\cdot 46 = 100$

$$x + 92 = 100 \rightarrow x = 8$$

Verificación R_2: $2\cdot 8 + 46 = 16 + 46 = 62 \leq 80$ ✔

$$D = (8,\ 46)$$

Vértice E — Eje y ($x = 0$) con R_3 activa: $y = 46$

Verificación R_1: $0 + 2\cdot 46 = 92 \leq 100$ ✔

Verificación R_2: $0 + 46 = 46 \leq 80$ ✔

$$E = (0,\ 46)$$

PASO 3 — EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN OBJETIVO EN LOS 5 VÉRTICES

Vértice	x (T_1 chocolate)	y (T_2 choc. +nata)	Z = 10x + 12y	Resultado
A	0	0	10(0) + 12(0) = **0 €**	Mínimo
B	40	0	10(40) + 12(0) = **400 €**	
C	20	40	10(20) + 12(40) = 200+480 = **680 €**	✦ **MÁXIMO**
D	8	46	10(8) + 12(46) = 80+552 = **632 €**	
E	0	46	10(0) + 12(46) = **552 €**	

PASO 4 — GRÁFICA COMPLETA DE LA REGIÓN FACTIBLE




Figura 2.2 — Región factible (zona verde) con los 5 vértices y la recta óptima Z = 680 (naranja)

PASO 5 — ANÁLISIS DE INGREDIENTES EN EL PUNTO ÓPTIMO C = (20, 40)

Ingrediente	Disponible	Usado	Sobrante
Masa (kg)	100	$20\cdot1 + 40\cdot2 = 100$	0 kg (agotada)
Crema choc. (kg)	80	$20\cdot2 + 40\cdot1 = 80$	0 kg (agotada)
Nata (kg)	46	$40\cdot1 = 40$	6 kg ← SOBRA

🏆 RESULTADO FINAL — EJERCICIO 2

Para maximizar el beneficio, la pastelería debe preparar:

- **x = 20 tartas de chocolate** (T_1)
- **y = 40 tartas de chocolate y nata** (T_2)

Beneficio máximo: $Z = 10\cdot20 + 12\cdot40 = 200 + 480 =$ **680 €**

La masa y la crema de chocolate se agotan completamente.

Sobran 6 kg de nata sin utilizar.

3

EJERCICIO 3 · SISTEMAS CON PARÁMETRO · TEOREMA DE ROUCHÉ-FRÖBENIUS

Discusión y Resolución según el Parámetro m ∈ ℝ

📋 ENUNCIADO COMPLETO

Se considera el sistema lineal de ecuaciones dependiente del parámetro real m:

$$\begin{cases} x + my + 3z = 2 & ...(ec.1) \\ x + y - z = 1 & ...(ec.2) \\ 2x + 3y + mz = 3 & ...(ec.3) \end{cases}$$

a) Discútase en función de los valores del parámetro m ∈ ℝ

b) Resuélvase el sistema para m = 1




Figura 3.1 — Tres planos en ℝ³: su intersección depende del valor del parámetro m

✏ SOLUCIÓN COMPLETA PASO A PASO

Apartado a) — Discusión según el Teorema de Rouché-Fröbenius

PASO A.1 — MATRICES DEL SISTEMA

Matriz de coeficientes A: Matriz ampliada (A|b):

$$\begin{bmatrix} 1 & m & 3 \end{bmatrix} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & m & 3 & 2 \end{array}\right]$$

$$\left|\begin{array}{ccc} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & m \end{array}\right| \left|\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & m & 3 \end{array}\right|$$

PASO A.2 — CÁLCULO DEL DETERMINANTE DE A (DESARROLLO POR LA PRIMERA FILA)

$$\det(A) = 1\cdot\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & m \end{vmatrix} - m\cdot\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & m \end{vmatrix} + 3\cdot\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\text{Menor } M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & m \end{vmatrix} = 1\cdot m - (-1)\cdot 3 = m + 3$$

$$\text{Menor } M_{12} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & m \end{vmatrix} = 1\cdot m - (-1)\cdot 2 = m + 2$$

$$\text{Menor } M_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1\cdot 3 - 1\cdot 2 = 1$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1\cdot(m + 3) - m\cdot(m + 2) + 3\cdot 1 \\ &= m + 3 - m^2 - 2m + 3 \\ &= -m^2 - m + 6 \\ &= -(m^2 + m - 6) \\ &= -(m + 3)(m - 2) \end{aligned}$$

$$\det(A) = 0 \iff m = -3 \text{ o } m = 2$$

PASO A.3 — CASO GENERAL: M ≠ −3 Y M ≠ 2

Si $m \neq -3$ y $m \neq 2$: $\det(A) \neq 0$

$\rightarrow \text{rang}(A) = 3$ y $\text{rang}(A|b) = 3$

Como $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) = n = 3$ (número de incógnitas):

→ SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO (SCD)

→ Tiene una ÚNICA SOLUCIÓN

PASO A.4 — CASO M = 2

Para m = 2, la matriz ampliada es:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 3 \end{array}\right]$$

Operaciones: $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$:

$[1-1,\ 1-2,\ -1-3 \mid 1-2] = [0, -1, -4 \mid -1]$

$F_3 \leftarrow F_3 - 2 \cdot F_1$:

$[2-2,\ 3-4,\ 2-6 \mid 3-4] = [0, -1, -4 \mid -1]$

Resultado:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & -1 \\ 0 & -1 & -4 & -1 \end{array}\right]$$

$F_3 \leftarrow F_3 - F_2$:

$[0-0,\ -1-(-1),\ -4-(-4) \mid -1-(-1)] = [0, 0, 0 \mid 0]$

Forma escalonada final:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$\text{rang}(A) = 2$ y $\text{rang}(A|b) = 2$ y $n = 3$

Como $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) = 2 < n = 3$:

→ SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO (SCI)

→ Tiene INFINITAS SOLUCIONES (con 1 parámetro libre)

PASO A.5 — CASO M = −3

Para m = −3, la matriz ampliada es:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -3 & 3 \end{array}\right]$$

$$F_2 \leftarrow F_2 - F_1:$$

$$[0,\ 1-(-3),\ -1-3 \mid 1-2] = [0,\ 4,\ -4 \mid -1]$$

$$F_3 \leftarrow F_3 - 2\cdot F_1:$$

$$[0,\ 3-(-6),\ -3-6 \mid 3-4] = [0,\ 9,\ -9 \mid -1]$$

Resultado:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & -4 & -1 \\ 0 & 9 & -9 & -1 \end{array}\right]$$

$$F_3 \leftarrow 4\cdot F_3 - 9\cdot F_2:$$

$$4\cdot F_3 = [0,\ 36,\ -36 \mid -4]$$

$$9\cdot F_2 = [0,\ 36,\ -36 \mid -9]$$

$$4F_3 - 9F_2 = [0,\ 36-36,\ -36-(-36) \mid -4-(-9)] = [0,\ 0,\ 0 \mid 5]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right] \leftarrow \text{última fila: } 0 = 5 \text{ (¡CONTRADICCIÓN!)}$$

$$\text{rang}(A) = 2 \text{ pero } \text{rang}(A|b) = 3$$

Como $\text{rang}(A) \neq \text{rang}(A|b)$:

→ SISTEMA INCOMPATIBLE (SI)

→ NO tiene solución

🏆 **RESUMEN COMPLETO DE LA DISCUSIÓN — APARTADO A)**

• **$m \neq 2$ y $m \neq -3$**: $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) = 3 = n \rightarrow$ **SCD** (solución única)

• **$m = 2$**: $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) = 2 < 3 \rightarrow$ **SCI** (infinitas soluciones, 1 param. libre)

• **$m = -3$**: $\text{rang}(A) = 2 \neq \text{rang}(A|b) = 3 \rightarrow$ **SI** (sin solución, inconsistente)

Apartado b) — Resolución Completa para m = 1

Como m = 1 ≠ 2 y m = 1 ≠ −3, el sistema es **SCD** (solución única). El sistema para m = 1 es:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

Eliminación de Gauss hacia adelante:

$F_2 \leftarrow F_2 - F_1$:

$$[1-1,\ 1-1,\ -1-3 \mid 1-2] = [0,\ 0,\ -4 \mid -1]$$

$F_3 \leftarrow F_3 - 2 \cdot F_1$:

$$[2-2,\ 3-2,\ 1-6 \mid 3-4] = [0,\ 1,\ -5 \mid -1]$$

Resultado intermedio:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & -1 \end{array}\right]$$

Intercambiamos $F_2 \leftrightarrow F_3$ (para colocar el pivote en posición correcta):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & -1 \end{array}\right]$$

La matriz está en forma escalonada. rang(A) = rang(A|b) = 3. ✔

Sustitución regresiva (back-substitution):

De la fila 3:

$$-4z = -1$$

$$z = (-1)/(-4) = 1/4$$

De la fila 2:

$$y - 5z = -1$$

$$y - 5\cdot(1/4) = -1$$

$$y - 5/4 = -1$$

$$y = -1 + 5/4 = -4/4 + 5/4 = 1/4$$

De la fila 1:

$$x + y + 3z = 2$$

$$x + (1/4) + 3\cdot(1/4) = 2$$

$$x + 1/4 + 3/4 = 2$$

$$x + 4/4 = 2$$

$$x + 1 = 2$$

$$x = 1$$

✔ VERIFICACIÓN EN EL SISTEMA ORIGINAL (M=1)

Ec.1: $1 + 1\cdot(1/4) + 3\cdot(1/4) = 1 + 1/4 + 3/4 = 1 + 1 = 2$ ✔

Ec.2: $1 + 1/4 - 1/4 = 1$ ✔

Ec.3: $2\cdot1 + 3\cdot(1/4) + 1\cdot(1/4) = 2 + 3/4 + 1/4 = 2 + 1 = 3$ ✔




Figura 3.2 — Para m = 1, los tres planos se intersectan en el punto único (x=1, y=¼, z=¼)

🏆 **RESULTADO — APARTADO B) SISTEMA PARA M = 1**

Solución única del sistema:

$x = 1 \qquad y = 1/4 \qquad z = 1/4$

EJERCICIO 4 · ÁLGEBRA MATRICIAL · OPERACIONES, INVERSA Y ECUACIÓN

4 Matrices A, B y C: Parámetros, Inversa y Ecuación Matricial

📋 ENUNCIADO COMPLETO

Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & b \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} -2 & -5 & 1 \\ 3 & c & 1 \end{pmatrix}$$

a) Hállese a, b, c para que se cumpla que $A \cdot B = C^T$

b) Para a = 1, calcula la **matriz inversa** de A

c) Para a = 1, b = 1 y c = 2, resuelve la ecuación matricial $A \cdot (X + B) = C^T$




Figura 4.1 — Representación visual de matrices y sus operaciones (producto, traspuesta, inversa)

✏ SOLUCIÓN COMPLETA PASO A PASO

Apartado a) — Hallar a, b, c tal que $A \cdot B = C^s$

PASO A.1 — CÁLCULO DE C^s (MATRIZ TRASPUESTA DE C)

$$C = \begin{pmatrix} -2 & -5 & 1 \\ 3 & c & 1 \end{pmatrix} \rightarrow C^T = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -5 & c \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & c & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(C es 2×3, por tanto C^T es 3×2. A es 3×3 y B es 3×2,
así que A·B es 3×2 = dimensiones de C^T. ✔ Dimensiones compatibles.)

PASO A.2 — CÁLCULO DEL PRODUCTO A·B (CON A, B GENÉRICOS)

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ a & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & b \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

FILA 1 de A × columnas de B:

Posición (1,1): $1\cdot2 + 1\cdot1 + 5\cdot(-1) = 2 + 1 - 5 = -2$

Posición (1,2): $1\cdot b + 1\cdot2 + 5\cdot0 = b + 2$

FILA 2 de A × columnas de B:

Posición (2,1): $0\cdot2 + 1\cdot1 + 6\cdot(-1) = 0 + 1 - 6 = -5$

Posición (2,2): $0\cdot b + 1\cdot2 + 6\cdot0 = 2$

FILA 3 de A × columnas de B:

Posición (3,1): $a\cdot2 + 0\cdot1 + 1\cdot(-1) = 2a - 1$

Posición (3,2): $a\cdot b + 0\cdot2 + 1\cdot0 = ab$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} -2 & b+2 \\ -5 & 2 \\ 2a-1 & ab \end{bmatrix}$$

PASO A.3 — IGUALACIÓN A·B = C^s POSICIÓN A POSICIÓN

$$\begin{bmatrix} -2 & b+2 \\ -5 & 2 \\ 2a-1 & ab \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -5 & c \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Posición (1,1): $-2 = -2$ ✔ (automáticamente satisfecha)

Posición (1,2): $b + 2 = 3 \rightarrow b = 1$

Posición (2,1): $-5 = -5$ ✔ (automáticamente satisfecha)

Posición (2,2): $2 = c \rightarrow c = 2$

Posición (3,1): 2a − 1 = 1 → 2a = 2 → a = 1

Posición (3,2): a·b = 1·1 = 1 ✔ (verificado con a=1, b=1)

🏆 **RESULTADO — APARTADO A)**

a = 1 b = 1 c = 2

Apartado b) — Matriz Inversa de A para a = 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ (con } a = 1\text{)}$$

Paso b.1 — Cálculo de det(A) (desarrollo por la primera fila):

$$\det(A) = 1\cdot\begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1\cdot\begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 5\cdot\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{Menor } M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1\cdot 1 - 6\cdot 0 = 1$$

$$\text{Menor } M_{12} = \begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0\cdot 1 - 6\cdot 1 = -6$$

$$\text{Menor } M_{13} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0\cdot 0 - 1\cdot 1 = -1$$

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1\cdot(1) - 1\cdot(-6) + 5\cdot(-1) \\ &= 1 + 6 - 5 \\ &= 2 \end{aligned}$$

Como $\det(A) = 2 \neq 0 \rightarrow$ A es invertible ✔

Paso b.2 — Cálculo de los 9 cofactores:

$C_{ij} = (-1)^{(i+j)} \cdot M_{ij}$ (donde M_{ij} es el menor complementario)

$$C_{11} = (+)\cdot\begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1\cdot 1 - 6\cdot 0 = 1$$

$$C_{12} = (-)\cdot|0\ 6;\ 1\ 1| = -(0\cdot1 - 6\cdot1) = -(-6) = 6$$

$$C_{13} = (+)\cdot|0\ 1;\ 1\ 0| = 0\cdot0 - 1\cdot1 = -1$$

$$C_{21} = (-)\cdot|1\ 5;\ 0\ 1| = -(1\cdot1 - 5\cdot0) = -1$$

$$C_{22} = (+)\cdot|1\ 5;\ 1\ 1| = 1\cdot1 - 5\cdot1 = 1 - 5 = -4$$

$$C_{23} = (-)\cdot|1\ 1;\ 1\ 0| = -(1\cdot0 - 1\cdot1) = -(-1) = 1$$

$$C_{31} = (+)\cdot|1\ 5;\ 1\ 6| = 1\cdot6 - 5\cdot1 = 6 - 5 = 1$$

$$C_{32} = (-)\cdot|1\ 5;\ 0\ 6| = -(1\cdot6 - 5\cdot0) = -6$$

$$C_{33} = (+)\cdot|1\ 1;\ 0\ 1| = 1\cdot1 - 1\cdot0 = 1$$

Ejercicio 4 — Tabla de Cofactores de la Matriz A (a = 1)
det(A) = 2 → A es invertible

Cofactor	Submatriz (eliminar fila i, col j)	Cálculo	Valor
C_{11} (+)	$\|1\ 6;0\ 1\|$	$1\cdot1 - 6\cdot0$	**1**
C_{12} (−)	$\|0\ 6;1\ 1\|$	$-(0\cdot1 - 6\cdot1)$	**6**
C_{13} (+)	$\|0\ 1;1\ 0\|$	$0\cdot0 - 1\cdot1$	**−1**
C_{21} (−)	$\|1\ 5;0\ 1\|$	$-(1\cdot1 - 5\cdot0)$	**−1**
C_{22} (+)	$\|1\ 5;1\ 1\|$	$1\cdot1 - 5\cdot1$	**−4**
C_{23} (−)	$\|1\ 1;1\ 0\|$	$-(1\cdot0 - 1\cdot1)$	**1**
C_{31} (+)	$\|1\ 5;1\ 6\|$	$1\cdot6 - 5\cdot1$	**1**
C_{32} (−)	$\|1\ 5;0\ 6\|$	$-(1\cdot6 - 5\cdot0)$	**−6**
C_{33} (+)	$\|1\ 1;0\ 1\|$	$1\cdot1 - 1\cdot0$	**1**

Figura 4.2 — Tabla resumen de los cofactores de la matriz A (a = 1)

Paso b.3 — Matriz adjunta (traspuesta de la matriz de cofactores):

$$\text{Matriz de cofactores: } \operatorname{adj}(A) = (\text{Matriz de cofactores})^{T}:$$

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 6 & -4 & -6 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} C_{21} & C_{22} & C_{23} \end{vmatrix} \rightarrow \operatorname{adj}(A) = \begin{vmatrix} C_{12} & C_{22} & C_{32} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & -4 & -6 \end{vmatrix}$$

Paso b.4 — Matriz inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 6 & -4 & -6 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 3 & -2 & -3 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Paso b.5 — Verificación $A \cdot A^{-1} = I_3$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 3 & -2 & -3 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

(1,1): $1(1/2) + 1(3) + 5(-1/2) = 1/2 + 3 - 5/2 = (1+6-5)/2 = 2/2 = 1$ ✔

(1,2): $1(-1/2) + 1(-2) + 5(1/2) = -1/2 - 2 + 5/2 = (-1-4+5)/2 = 0$ ✔

(1,3): $1(1/2) + 1(-3) + 5(1/2) = 1/2 - 3 + 5/2 = (1-6+5)/2 = 0$ ✔

(2,1): $0(1/2) + 1(3) + 6(-1/2) = 0 + 3 - 3 = 0$ ✔

(2,2): $0(-1/2) + 1(-2) + 6(1/2) = 0 - 2 + 3 = 1$ ✔

(2,3): $0(1/2) + 1(-3) + 6(1/2) = 0 - 3 + 3 = 0$ ✔

(3,1): $1(1/2) + 0(3) + 1(-1/2) = 1/2 - 1/2 = 0$ ✔

(3,2): $1(-1/2) + 0(-2) + 1(1/2) = -1/2 + 1/2 = 0$ ✔

(3,3): $1(1/2) + 0(-3) + 1(1/2) = 1/2 + 1/2 = 1$ ✔

$\Longrightarrow A \cdot A^{-1} = I_3$ ✔ (la inversa está correctamente calculada)

🏆 **RESULTADO — APARTADO B) MATRIZ INVERSA DE A (A=1)**

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 3 & -2 & -3 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \quad (\det(A) = 2)$$

Apartado c) — Ecuación Matricial $A \cdot (X + B) = C^S$ con a=1, b=1, c=2

Con los valores a=1, b=1, c=2, las matrices son:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad C^T = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -5 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Paso c.1 — Estrategia de resolución:

Como A tiene inversa ($\det(A) = 2 \neq 0$), premultiplicamos ambos miembros por A^{-1}:

$$A \cdot (X + B) = C^T$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot (X + B) = A^{-1} \cdot C^T \text{ (premultiplicamos por } A^{-1})$$

$$I_3 \cdot (X + B) = A^{-1} \cdot C^T$$

$$X + B = A^{-1} \cdot C^T$$

$$X = A^{-1} \cdot C^T - B \text{ ...(solución)}$$

Paso c.2 — Cálculo de $A^{-1} \cdot C^s$:

$$A^{-1} \cdot C^T = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 3 & -2 & -3 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -5 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

FILA 1:

col 1: $(1/2)(-2) + (-1/2)(-5) + (1/2)(1) = -1 + 5/2 + 1/2 = -1 + 3 = 2$

col 2: $(1/2)(3) + (-1/2)(2) + (1/2)(1) = 3/2 - 1 + 1/2 = 4/2 - 1 = 2 - 1 = 1$

FILA 2:

col 1: $3(-2) + (-2)(-5) + (-3)(1) = -6 + 10 - 3 = 1$

col 2: $3(3) + (-2)(2) + (-3)(1) = 9 - 4 - 3 = 2$

FILA 3:

col 1: $(-1/2)(-2) + (1/2)(-5) + (1/2)(1) = 1 - 5/2 + 1/2 = 1 - 4/2 = 1 - 2 = -1$

col 2: $(-1/2)(3) + (1/2)(2) + (1/2)(1) = -3/2 + 1 + 1/2 = -2/2 + 1 =$

$$-1 + 1 = 0$$

$$A^{-1}\cdot C^{T} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Paso c.3 — Cálculo de $X = A^{-1}\cdot C^{S} - B$:

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2-2 & 1-1 \\ 1-1 & 2-2 \\ -1+1 & 0-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

✔ VERIFICACIÓN: A·(X + B) = A·(O + B) = A·B

Como X = O (matriz nula), tenemos X + B = B.

Luego A·(X + B) = A·B, y en el apartado a) demostramos que $A\cdot B = C^{T}$ ✔

🏆 **RESULTADO — APARTADO C) ECUACIÓN MATRICIAL**

$X = O_{3x2}$ (la matriz nula de orden 3×2)

La solución de $A\cdot(X + B) = C^{T}$ es la **matriz nula 3×2**:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5

EJERCICIO 5 · ÁLGEBRA LINEAL · RANGO DE MATRICES CON PARÁMETRO

Determinación del Rango de la Matriz A según m ∈ ℝ

📋 ENUNCIADO COMPLETO

Determina, según el valor del parámetro m, el rango de la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & m \end{pmatrix}$$




Figura 5.1 — El rango de una matriz mide la dimensión del espacio vectorial generado por sus filas

✏ SOLUCIÓN COMPLETA PASO A PASO

PASO 1 — ESTRATEGIA: ELIMINACIÓN DE GAUSS PARA ESCALONAR LA MATRIZ

El rango de una matriz es igual al número de filas no nulas en su forma escalonada. Aplicamos operaciones elementales de fila (que no cambian el rango) para reducir A a su forma escalonada por filas.

Matriz de partida:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & m \end{vmatrix}$$

PASO 2 — PRIMERA RONDA DE ELIMINACIÓN (USANDO EL PIVOTE DE LA COLUMNA 1)

Operaciones sobre el pivote $a_{11} = 1$:

$F_2 \leftarrow F_2 - F_1$:

$[1-1, -1-1, 1-0, 3-2] = [0, -2, 1, 1]$

$F_3 \leftarrow F_3 + F_1$:

$[-1+1, 2+1, 4+0, 2+2] = [0, 3, 4, 4]$

$F_4 \leftarrow F_4 - 3 \cdot F_1$:

$[3-3, 2-3, 4-0, m-6] = [0, -1, 4, m-6]$

Resultado después de la primera ronda:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & -1 & 4 & m-6 \end{vmatrix}$$

PASO 3 — SEGUNDA RONDA DE ELIMINACIÓN (USANDO EL PIVOTE DE LA COLUMNA 2)

Pivote: $a_{22} = -2$

$F_3 \leftarrow 2 \cdot F_3 + 3 \cdot F_2$:

$2 \cdot F_3 = [0, 6, 8, 8]$

$3 \cdot F_2 = [0, -6, 3, 3]$

Suma: $[0, 6+(-6), 8+3, 8+3] = [0, 0, 11, 11]$

$F_4 \leftarrow 2 \cdot F_4 - F_2$:

$2 \cdot F_4 = [0, -2, 8, 2(m-6)] = [0, -2, 8, 2m-12]$

$F_2 = [0, -2, 1, 1\ ]$

Resta: $[0, -2-(-2), 8-1, 2m-12-1] = [0, 0, 7, 2m-13]$

Resultado después de la segunda ronda:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & 11 \\ 0 & 0 & 7 & 2m-13 \end{bmatrix}$$

PASO 4 — TERCERA RONDA DE ELIMINACIÓN (USANDO EL PIVOTE DE LA COLUMNA 3)

Pivote: $a_{33} = 11$

$F_4 \leftarrow 11 \cdot F_4 - 7 \cdot F_3$:

$11 \cdot F_4 = [0, 0, 77, 11(2m-13)] = [0, 0, 77, 22m-143]$

$7 \cdot F_3 = [0, 0, 77, 7 \cdot 11] = [0, 0, 77, 77]$

Resta: $[0, 0, 77-77, 22m-143-77] = [0, 0, 0, 22m-220]$

Factorizando: $22m - 220 = 22(m - 10)$

FORMA ESCALONADA FINAL:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 22(m-10) \end{bmatrix}$$

El único elemento que depende de m es la posición (4,4): $22(m - 10)$

PASO 5 — DIAGRAMA VISUAL DEL PROCESO DE ESCALONAMIENTO




Figura 5.2 — Las 4 etapas del proceso de eliminación de Gauss. El elemento 22(m−10) determina el rango.

PASO 6 — ANÁLISIS DEL RANGO SEGÚN EL VALOR DE M

$$22(m - 10) = 0 \iff m - 10 = 0 \iff m = 10$$

CASO 1: $m \neq 10$

El elemento (4,4) = $22(m-10) \neq 0$

La forma escalonada tiene 4 filas no nulas (4 pivotes)

→ rango(A) = 4 (rango máximo posible para una matriz 4×4)

→ Las 4 filas son linealmente independientes

CASO 2: $m = 10$

El elemento (4,4) = $22(10-10) = 0$

La forma escalonada es:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

→ solo 3 filas no nulas

La cuarta fila (original) es combinación lineal de las anteriores.

→ rang(A) = 3

Verificación para m = 10: existe menor de orden 3 no nulo

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 11 \end{vmatrix} = 1\cdot(-2\cdot 11 - 1\cdot 0) - 1\cdot(0\cdot 11 - 1\cdot 0) + 0 = -22 - 0 + 0 = -22 \neq 0 \checkmark$$

Por tanto, rang(A) ≥ 3 para m = 10.

Y como la 4ª fila escalonada es nula, rang(A) = 3 (no puede ser 4). ✔

🏆 **RESULTADO FINAL — EJERCICIO 5**

El rango de la matriz A depende del parámetro m como sigue:

- Si **m ≠ 10**: rang(A) = **4** (rango completo, las 4 filas son l.i.)
- Si **m = 10**: rang(A) = **3** (la fila 4 es c.l. de las anteriores)

✦ F I N ✦

"La matemática es el lenguaje en el que está escrito el libro de la naturaleza."

— Galileo Galilei

📐 FORMULARIO DE REFERENCIA

Resumen de los principales teoremas y fórmulas utilizados en este examen

🔹 TEOREMA DE ROUCHÉ-FRÖBENIUS

Sea Ax = b un sistema de n incógnitas:

- rang(A) = rang(A|b) = n → SCD
- rang(A) = rang(A|b) < n → SCI
- rang(A) ≠ rang(A|b) → SI (incompatible)

🔹 PROGRAMACIÓN LINEAL

Maximizar Z = cx sujeto a Ax ≤ b, x ≥ 0

El óptimo se alcanza en un vértice del polígono convexo (región factible).
Evaluar Z en todos los vértices.

🔹 MATRIZ INVERSA (ADJUNTA)

$A^{-1} = (1/\det A) \cdot \text{adj}(A)$

adj(A) = (Matriz de cofactores)^T

$C_{ij} = (-1)^{(i+j)} \cdot M_{ij}$

Solo existe si det(A) ≠ 0

🔹 RANGO DE UNA MATRIZ

rang(A) = número de filas no nulas en la forma escalonada de A.

Equivalente: máximo orden de un menor no nulo de A.

rang(A) ≤ min(filas, columnas)

🔹 ECUACIONES MATRICIALES

$A \cdot X = B \rightarrow X = A^{-1} \cdot B$
$X \cdot A = B \rightarrow X = B \cdot A^{-1}$
$A \cdot (X+C) = B \rightarrow X = A^{-1} \cdot B - C$

Requiere: det(A) ≠ 0

🔹 DETERMINANTE 3×3 (SARRUS)

|a b c|
|d e f| = aei+bfg+cdh
|g h i| − ceg−afh−bdi

det(A) = 0 ↔ filas l.d.

"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. En matemáticas, cada problema tiene su camino;

MATEMÁTICAS II · 2.º BACHILLERATO · EXAMEN 8-MAR-2017 · SOLUCIONES COMPLETAS

Junta de Castilla y León

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

25-05-2017 EXAMEN 2º BACH

ies Tovar Antonio Centro bilingüe

1ª EVALUACIÓN

Nº1.- El rendimiento de una máquina, a lo largo de las 7 horas que permanece en funcionamiento cada día, viene dado por la función $f(x) = x^3 - 10{,}5x^2 + 30x$, donde $x \in (0,7)$ indica el número de horas transcurridas desde que la máquina se pone en marcha.

a) Determina en qué momento se produce el máximo y el mínimo rendimiento.

b) Calcula el rendimiento de la máquina en esos dos momentos del día.

Nº2.- Sea la función $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} + 1 & si\ x < 0 \\ x^3 & si\ 0 \le x < 2 \\ 3x + 2 & si\ x \ge 2 \end{cases}$

a) Estudia la continuidad y la derivabilidad de la función *f(x)* en todos sus puntos.

b) Halla la ecuación de la recta tangente a la curva *y=f(x)* en el punto $x = -1$.

c) Representa gráficamente la función *f (x)*.

Nº3.- Representa gráficamente la función $y = -2x^2 + ax - b$ sabiendo que alcanza su máximo en el punto (2,2).

Calcúlese el área del recito limitado por la gráfica de la función en el intervalo [1,3]

2ª EVALUACIÓN

Nº4.- Dada la matriz: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 1 & t & 2 \end{pmatrix}$

a) Determina los valores de *t* para los que existe la matriz inversa de *A*.

b) Calcula la matriz inversa para *t=2*.

Nº5.- Se considera el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 3x + 2y - 2z = 4 \\ 8x + 8y + az = 8 \end{cases}$$

a) Clasifica el sistema en función de sus posibles soluciones para los distintos valores del parámetro *a*.

b) Halla todas sus soluciones para a= -3.

Nº6.- Un ahorrador dispone de 4000 € para invertir en dos tipos de fondos de inversión a cierto plazo. En el fondo A cada participación tiene un coste de 40 € y produce un beneficio de 15 €, mientras que en el fondo B cada participación da un beneficio de 5 € y su coste es de 50 €. Sabiendo que se puede adquirir un máximo de 60 participaciones del fondo A y al menos 40 del fondo B, utiliza técnicas de programación lineal para determinar cuántas participaciones de cada fondo se deben comprar para maximizar el beneficio y calcula ese beneficio.

3ª EVALUACIÓN

Nº7.- La temperatura del cuerpo humano sigue una distribución normal de media 37 ºC y desviación típica de 0.5 ºC.

a) Halla la probabilidad de que la temperatura de una persona esté comprendida entre 36.5 ºC y 37.5 ºC.

b) Si elegimos una muestra de 25 personas, ¿cuál es la probabilidad de que la media de sus temperaturas sea mayor que 36.7 ºC?

Nº8.- Una caja tiene 12 bombones, de los cuales 2 son de chocolate blanco y el resto de chocolate negro. Si se cogen 4 bombones al azar y sin reemplazamiento, calcula la probabilidad de que los 4 sean de chocolate negro.

Nº9.- La estatura de los alumnos de un colegio es una variable aleatoria que tiene una distribución normal de desviación típica 25 cm. Se ha elegido una muestra de 100 alumnos de ese colegio comprobándose que la estatura media es de 170 cm. Calcula:

a) El intervalo de confianza para la estatura media con un nivel de confianza del 99%.

b) El tamaño muestral mínimo necesario para conseguir, con un nivel de confianza del 95%, un error máximo de 8 cm en la estimación de la estatura media.

SUERTE JÓVENES

MATEMÁTICAS · CIENCIAS SOCIALES

Solucionario
Examen 2º Bach

Resolución Completa y Detallada

«Las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo.»

— Galileo Galilei

CURSO 2016-2017 · JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

Índice de Contenidos

Resolución completa de todos los ejercicios del examen

1 **Optimización del Rendimiento Industrial**
Ejercicio Nº 1

2 **Continuidad y Derivabilidad de Funciones a Trozos**
Ejercicio Nº 2

3 **Geometría Analítica y Cálculo Integral**
Ejercicio Nº 3

4 **Álgebra Matricial: Inversión de Matrices**
Ejercicio Nº 4

5 **Sistemas de Ecuaciones Lineales**
Ejercicio Nº 5

6 **Programación Lineal: Optimización de Beneficios**
Ejercicio Nº 6

7 **Estadística: Distribución Normal**
Ejercicio Nº 7

8 **Probabilidad: Muestreo sin Reemplazamiento**
Ejercicio Nº 8

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

Ejercicio 1

1ª EVALUACIÓN

Optimización del Rendimiento Industrial

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

El rendimiento de una máquina, a lo largo de las 7 horas que permanece en funcionamiento cada día, viene dado por la función:

$$f(x) = x^3 - 10,5x^2 + 30x$$

donde $x \in (0, 7)$ indica el número de horas transcurridas desde que la máquina se pone en marcha.

- a) Determina en qué momento se produce el máximo y el mínimo rendimiento.
- b) Calcula el rendimiento de la máquina en esos dos momentos del día.

→ RESOLUCIÓN DETALLADA

Para encontrar los extremos relativos, primero calculamos la derivada de la función de rendimiento:

$$f'(x) = 3x^2 - 21x + 30$$

Igualamos la derivada a cero para encontrar los puntos críticos:

$$3x^2 - 21x + 30 = 0 \implies x^2 - 7x + 10 = 0$$

Resolviendo la ecuación de segundo grado:

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{(-7)^2 - 4(1)(10)}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 40}}{2} = \frac{7 \pm 3}{2}$$

Obtenemos dos soluciones: $x_1 = 5$ y $x_2 = 2$.

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

Para determinar si son máximos o mínimos, usamos la segunda

Ejercicio 2

1ª EVALUACIÓN

Continuidad y Derivabilidad de Funciones a Trozos

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} + 1 & x < 0 \\ x^3 & 0 \leq x < 2 \\ 3x + 2 & x \geq 2 \end{cases}$$

- a) Estudia la continuidad y la derivabilidad de la función f(x) en todos sus puntos.
- b) Halla la ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $x = -1$.
- c) Representa gráficamente la función $f(x)$.

→ RESOLUCIÓN DETALLADA

Apartado a): Continuidad

La función es continua en su dominio excepto posiblemente en los puntos de salto $x = 0$ y $x = 2$.

En $x = 0$: $\lim_{x \to 0^-} (\frac{1}{x} + 1) = -\infty$. Existe una asíntota vertical, por lo que la función es **discontinua** en $x = 0$.

En $x = 2$:

$$\lim_{x \to 2^-} x^3 = 8; \quad f(2) = 3(2) + 2 = 8; \quad \lim_{x \to 2^+} (3x + 2) = 8$$

Como los límites laterales coinciden con el valor de la función, es **continua** en $x = 2$.

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

Derivabilidad:

Ejercicio 3

1ª EVALUACIÓN

Geometría Analítica y Cálculo Integral

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Representa gráficamente la función $y = -2x^2 + ax - b$ sabiendo que alcanza su máximo en el punto $(2, 2)$.
Calcúlese el área del recinto limitado por la gráfica de la función en el intervalo $[1, 3]$.

→ RESOLUCIÓN DETALLADA

Primero determinamos los parámetros a y b. El máximo de una parábola está en su vértice:

$$x_v = \frac{-a}{2(-2)} = \frac{a}{4} = 2 \implies a = 8$$

Como el punto $(2, 2)$ pertenece a la parábola:

$$2 = -2(2)^2 + 8(2) - b \implies 2 = -8 + 16 - b \implies b = 6$$

La función es $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$.

Cálculo del área:

$$Area = \int_1^3 (-2x^2 + 8x - 6)dx = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 4x^2 - 6x \right]_1^3$$

Evaluamos en los límites:

$$F(3) = -\frac{2}{3}(27) + 4(9) - 6(3) = -18 + 36 - 18 = 0$$

$$F(1) = -\frac{2}{3}(1) + 4(1) - 6(1) = -\frac{2}{3} - 2 = -\frac{8}{3}$$

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

Ejercicio 4

2ª EVALUACIÓN

Álgebra Matricial: Inversión de Matrices

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Dada la matriz: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 1 & t & 2 \end{pmatrix}$

- a) Determina los valores de t para los que existe la matriz inversa de A.
- b) Calcula la matriz inversa para $t = 2$.

→ RESOLUCIÓN DETALLADA

Apartado a): Una matriz tiene inversa si su determinante es distinto de cero.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 1 & t & 2 \end{vmatrix} = 1(2 - t^2) - (-1)(0 - t) + 0 = 2 - t^2 - t$$

Igualamos a cero: $-t^2 - t + 2 = 0 \implies t^2 + t - 2 = 0$.

Las soluciones son $t = 1$ y $t = -2$. Por tanto, existe inversa para $t \in \mathbb{R} \setminus \{1, -2\}$.

Apartado b): Para $t = 2$

El determinante es $|A| = -(2)^2 - 2 + 2 = -4$.

Calculamos la matriz de adjuntos y trasponemos:

$$A^{-1} = \frac{1}{-4} \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -1 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 & -0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 & 0,5 \\ 0,25 & 0,75 & -0,25 \end{pmatrix}$$

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

Ejercicio 5

2ª EVALUACIÓN

Sistemas de Ecuaciones Lineales

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Se considera el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 3x + 2y - 2z = 4 \\ 8x + 8y + az = 8 \end{cases}$$

- a) Clasifica el sistema en función de sus posibles soluciones para los distintos valores del parámetro a.
- b) Halla todas sus soluciones para $a = -3$.

→ RESOLUCIÓN DETALLADA

Apartado a): Clasificación

Estudiamos el determinante de la matriz de coeficientes M:

$$|M| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \\ 8 & 8 & a \end{vmatrix} = 8a + 56$$

Si $a \neq -7$, $|M| \neq 0$, el sistema es **Compatible Determinado** (solución única).

Si $a = -7$, el rango de M es 2, pero el de la ampliada es 3. El sistema es **Incompatible**.

Apartado b): Solución para $a = -3$

Usando la regla de Cramer con $|M| = 32$:

$$\frac{24}{} \quad \frac{-4}{} \quad \frac{-32}{}$$

Ejercicio 6

2ª EVALUACIÓN

Programación Lineal: Optimización de Beneficios

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Un ahorrador dispone de 4000 € para invertir en dos tipos de fondos. El fondo A cuesta 40 € y produce 15 € de beneficio. El fondo B cuesta 50 € y produce 5 € de beneficio. Se puede adquirir un máximo de 60 de A y al menos 40 de B. Maximiza el beneficio.

→ RESOLUCIÓN DETALLADA

Definimos variables: x (Fondo A), y (Fondo B).

Restricciones:

- Presupuesto: $40x + 50y \leq 4000 \implies 4x + 5y \leq 400$
- Máximo A: $x \leq 60$
- Mínimo B: $y \geq 40$
- No negatividad: $x \geq 0, y \geq 0$

Función objetivo: $B(x, y) = 15x + 5y$

Vértices de la región factible:

- $V_1(0, 40) \implies B = 200$
- $V_2(50, 40) \implies B = 15(50) + 5(40) = 950$
- $V_3(0, 80) \implies B = 400$

El beneficio máximo es de **950 €** comprando 50 participaciones del fondo A y 40 del fondo B.

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

Ejercicio 7

3ª EVALUACIÓN

Estadística: Distribución Normal

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

La temperatura del cuerpo humano sigue una $N(37, 0.5)$.

- a) Probabilidad de que esté entre 36,5 ºC y 37,5 ºC.
- b) Muestra de 25 personas, probabilidad de que la media sea mayor que 36,7 ºC.

RESOLUCIÓN DETALLADA

Apartado a): Tipificamos la variable $Z = \frac{X-37}{0,5}$.

$$P(36,5 < X < 37,5) = P(\frac{36,5-37}{0,5} < Z < \frac{37,5-37}{0,5}) = P(-$$

$$\Phi(1) - \Phi(-1) = 0,8413 - (1 - 0,8413) = 0,6826$$

Apartado b): Para la media muestral $\bar{X} \sim N(37, \frac{0,5}{\sqrt{25}}) = N(37, 0, 1)$

.

$$P(\bar{X} > 36,7) = P(Z > \frac{36,7-37}{0,1}) = P(Z > -3) = P(Z < 3) =$$

Ejercicio 8

3ª EVALUACIÓN

Probabilidad: Muestreo sin Reemplazamiento

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Una caja tiene 12 bombones (2 blancos, 10 negros). Se cogen 4 al azar sin reemplazamiento. Calcula la probabilidad de que los 4 sean negros.

→ RESOLUCIÓN DETALLADA

Utilizamos la regla de Laplace o combinatoria:

$$P(4 \text{ negros}) = \frac{\binom{10}{4}}{\binom{12}{4}} = \frac{210}{495} = \frac{14}{33} \approx 0,4242$$

Alternativamente, multiplicando probabilidades sucesivas:

$$\frac{10}{12} \cdot \frac{9}{11} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} = \frac{5040}{11880} = \frac{14}{33}$$

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

Ejercicio 9

3ª EVALUACIÓN

Inferencia Estadística: Intervalos de Confianza

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Estatura de alumnos $\sigma = 25$. Muestra $n = 100$, media $\bar{x} = 170$.

- a) Intervalo de confianza al 99%.
- b) Tamaño muestral para 95% de confianza y error máximo de 8 cm.

→ RESOLUCIÓN DETALLADA

Apartado a): Para un nivel de confianza del 99%, $z_{\alpha/2} = 2,575$.

$$E = 2,575 \cdot \frac{25}{\sqrt{100}} = 6,4375$$

El intervalo es $(170 - 6,4375, 170 + 6,4375) = (163,56, 176,44)$.

Apartado b): Para 95%, $z_{\alpha/2} = 1,96$. Queremos $E \leq 8$.

$$1,96 \cdot \frac{25}{\sqrt{n}} \leq 8 \implies \sqrt{n} \geq \frac{1,96 \cdot 25}{8} = 6,125$$

$$n \geq 37,51 \implies n = 38$$

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

¡Mucho Éxito!

"La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas complicadas simples, sino hacer las cosas simples complicadas."

— S. Gudder

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

ESTADÍSTICA

Nº1. En un estudio sobre la edad a la que se caen los dientes de leche, hemos escogido 50 niños de Valladolid. Determina:

a) La población.
b) La muestra y su tamaño.
c) Los individuos.
d) La variable estadística.

Nº2. Señala en que caso es más conveniente estudiar la población o una muestra. Razona tu respuesta.

a) La longitud de los tornillos que fabrica una máquina de manera continua durante un día.
b) La estatura de los turistas extranjeros que visitan España en un año.
c) El peso de un grupo de cinco amigos.
d) La duración de una bombilla hasta que se funde.
e) El sueldo de los empleados de una empresa.

Nº3. Se quiere realizar un estudio estadístico de la altura de los alumnos de 3º ESO de un instituto, y para ello se mide a los alumnos de 3º B. Determina:

a) La población.
b) La muestra.
c) Los individuos.
d) La variable estadística.

Nº4. Clasifica las siguientes variables estadísticas:

A.- Número de aprobados en un curso.
B.- Peso de los recién nacidos en un hospital.
C.- Color de las manzanas de una frutería.
D.- Peso de los melones de una frutería.
E.- Libros leídos por un grupo de alumnos.
F.- Goles en los partidos de una jornada.
G.- Número de pulsaciones por minuto.
H.- Profesión de los padres del alumnado.
I.- Número de compañeros de clase.
J.- Perímetro craneal.
K.- Estado civil.
L.- Empleados en una empresa.
M.- Medida de la palma de la mano.
N.- Deporte preferido.
Ñ.- Distancia desde casa al instituto.
O.- Sexo de los recién nacidos en un hospital.
P.- Temperaturas mínimas en una semana.
Q.- Veces que se va al cine en un año.
R.- Género de cine preferido.
S.- Tiempo semanal dedicado a hacer deporte.
T.- Veces por semana que se come pescado.
U.- Número de hermanos.
V.- Nacionalidad.
W.- Número de calzado.
X.- Edad.
Y.- Ingresos diarios en una frutería.
Z.- Color de ojos.

Cualitativas	Cuantitativas discretas	Cuantitativas continuas

Nº5. Cuatro focos de marca A dejaron de funcionar después de 1100, 980, 900, 1020 horas de uso continuo. Cinco focos de marca B dejaron de funcionar después de 960, 1050, 1065, 845 y 980 horas de uso continuo. Se llega a las siguientes conclusiones:

La duración promedio de los cuatro focos marca A es de 1000 horas, mientras que la duración promedio de los cinco focos marca B es de 980 horas.

a) La duración promedio de todos los focos marca A es mayor que todos los focos marca B.
b) La diferencia entre los dos promedios es de 20 horas.
c) La diferencia entre los dos promedios es demasiado pequeño para llegar a la conclusión de que los focos de marca A son mejores que los focos marca B.
d) SI se selecciona y prueba otro foco marca A, probablemente durará más que el promedio de los focos marca B.

¿Cuáles de las conclusiones provienen de la Estadística Descriptiva y cuáles de la Estadística Inferencial? ¿Por qué?

Nº6. SURVEY DATA, es una empresa dedicada a sondeos de opinión de opinión por muestreo. Recientemente, la empresa realizó un estudio para determinar indicadores de aceptación, según nivel socioeconómico. En la encuesta aplicada a los residentes del mencionado distrito se incluyó las siguientes preguntas:

a) ¿Trabaja actualmente? Si:……. No:……..
b) ¿Cuál es su ingreso promedio mensual?…….(en nuevos soles)
c) ¿Cómo calificaría usted la gestión actual del alcalde?
d) Buena (b)…… Regular (r)…… Mala (m)……
e) ¿Cuántas personas residen en su vivienda?……

Clasifica las respuestas a estas preguntas según el tipo de variables al que pertenecen. ¿Cuál es la unidad de análisis?

Nº7. Se tiene la vida útil (en meses) de 48 baterías similares de automóvil de la marca Power. El fabricante garantiza que sus baterías duran en promedio 2.5 años. Identifica:

POBLACIÓN:
MUESTRA:
UNIDAD DE ANÁLISIS:
VARIABLE:
TIPO DE VARIABLE:
UN ESTADÍSTICO:

Nº8. De manera experimental, una tienda de departamentos envió encartes con las ofertas a 2000 clientes que tienen la tarjeta de crédito de la empresa y encontró que el 60% de ellos aprovecharon las ofertas. Identifica:

POBLACION:
MUESTRA:
UNIDAD DE ANALISIS:
VARIABLE:
TIPO DE VARIABLE:
UN ESTADISTICO:

Nº9.Sobre la base de una muestra de 60 alumnos se llegó a determinar que el tiempo de espera en el centro médico es de 15 minutos en promedio. Identifica:

POBLACION:
MUESTRA:
UNIDAD DE ANALISIS:
VARIABLE(S):
TIPO DE VARIABLE:
UN ESTADISTICO:

Nº10. La oficina de gestión de calidad de una universidad pública está realizando un estudio para conocer, según el criterio de los profesores, qué tan importante es la aplicación de un modelo de planeamiento de largo plazo en la mejora de la calidad en las instituciones de educación superior. De los 200 profesores consultados, el 30% lo consideró poco importante, el 50% importante y el 20% muy importante. Identifica:

POBLACIÓN:
MUESTRA:
UNIDAD DE ANÁLISIS:
VARIABLE:
TIPO DE VARIABLE:
UN ESTADÍSTICO:

N11. Los alumnos de 3º ESO A y B fueron separados en 10 grupos con cuatro alumnos en cada uno de ellos, a continuación se entregó cuatro problemas a cada grupo y luego de media hora se registró el número de problemas resueltos en cada grupo. Identifica:

POBLACIÓN:
MUESTRA:
UNIDAD DE ANÁLISIS:
VARIABLE:
TIPO DE VARIABLE:
UN ESTADÍSTICO:

Nº12. Utiliza los términos que aparecen en la siguiente tabla, para asociarlos a las definiciones que aparecen a continuación:

a. Muestra
b. Población
c. Variable
d. Estadístico
e. Variable cualitativa nominal
f. Datos
g. Variable cuantitativa continua
h. Estadística
i. Parámetro
j. Unidad de análisis
k. Estadística Inferencial
l. Variable cualitativa ordinal
m. Estadística descriptiva

n. Variable cuantitativa discreta

Es una característica definida de la población que puede tomar diferentes valores	
Conjunto de la población que se obtiene con criterios de aleatoriedad	
Medida descriptiva que resume información de una característica de la población	
Número de alumnos por sección matriculados en el curso de metodología	
Grado académico de los docentes de la Facultad de Administración	
Método que generaliza resultados para una población analizando una parte de ella	
Valor que resulta de resumir los datos de una muestra	
Tiempo empleado para ensamblar una computadora	

Nº13. A continuación, determina 3 variables que se puedan investigar en cada una de las siguientes imágenes, e indica el tipo de variable al que corresponde:

a)



b)



c)



Nº14. Construye una tabla estadística con estos datos obtenidos al lanzar un dado 33 veces:

4	3	2	4	1	5	6	6	4	1	1
2	2	3	5	5	5	1	4	3	6	3
1	3	2	6	3	2	1	4	4	5	6

Nº15. Haz una tabla estadística con los datos sobre la duración, en minutos, de 20 películas agrupándolas en clases de amplitud 25 minutos.

90	120	122	95	145	75	66	207	45	77
148	69	110	180	88	90	95	110	85	125

Intervalos o clases

$$[45,70) \Leftrightarrow 45 \leq x < 70$$
$$[70,95) \Leftrightarrow 70 \leq x < 95$$
$$[95,120) \Leftrightarrow 95 \leq x < 120$$
$$[120,145) \Leftrightarrow 120 \leq x < 145$$
$$[145,170) \Leftrightarrow 145 \leq x < 170$$
$$[170,195) \Leftrightarrow 170 \leq x < 195$$
$$[195,220) \Leftrightarrow 170 \leq x < 220$$

Nº16. Calcula las marcas de las siguientes clases de datos:

Clase	$0,5 \leq x < 3,5$	$3,5 \leq x < 6,5$	$6,5 \leq x < 9,5$
Marca de clase			

Nº17. Las edades de los componentes de una compañía de teatro juvenil son las siguientes:

15	17	14	19	17	16	13	12	15	16	13
12	19	13	12	18	17	16	15	14	13	12

Elabora una tabla de estadística.

Nº18. Las temperaturas máximas, en una ciudad durante el mes de abril, fueron:

12	16	15,5	20	18	13	19,5	17	19	19
18,5	15	13	20,5	20	19	18	17	16	15
11,5	19	19	17	20	21	18	16	13	13,5

Haz el recuento de los datos agrupados en 4 clases de amplitud 3.

Nº19. La duración, en minutos, de 10 llamadas telefónicas ha sido:

8	4	7	4	8	6	5	4	7	8

Elabora una tabla estadística.

Nº20. Los datos reflejan el número de libros publicados por 40 editoriales:

0	20	25	15	13	10	13	5	16	5	3	23	10	6	12	3	12	6	19	6
14	30	21	17	3	7	14	10	18	2	8	22	9	11	2	11	16	4	4	12

Dado que el número de datos es alto, elabora una tabla estadística utilizando marcas de clase.

Nº21. El número de veces al mes que Ana ha ido al teatro en un año ha sido:

4	2	1	2	4	1	3	2	1	3	3	4

A partir de estos datos, construye una tabla estadística.

Nº22. Con esta lista de números:

11	10	12	14	14	17	13
13	17	10	10	10	11	14
11	14	13	12	12	11	10

a) Realiza el recuento de datos.
b) Construye la tabla de frecuencias.

Nº23. Se realizó una encuesta en algunos hogares del barrio Arturo Eyries, acerca de la preferencia de medios de noticias, obteniéndose los siguientes resultados:

1: periódico 2: televisión 3: radio

1	2	3	3	3	1	3	2	3	2
2	3	2	3	2	1	3	2	2	3
2	3	1	3	2	3	2	3	3	1
3	2	1	3	3	2	2	3	3	1

Identifica: población, muestra, unidad de estudio, variable y tipo de variable.

Clasifica los datos en una tabla de distribución de frecuencias.

Realizar un análisis estadístico.

Nº24. Los siguientes datos corresponden a una muestra aleatoria de los gastos semanales en euros de 20 ingenieros que se alojaron en el Hotel "Vincci" de Valladolid en noviembre del 2016.

400	500	550	600	680	750	780	850	1000	850
630	640	650	700	740	750	800	750	890	950

La información fue obtenida de los registros de consumo de clientes de dicho Hotel.

Construye una tabla de distribución de frecuencias.

Nº25. En un centro de computación el número de veces que el sistema se detiene por saturación diariamente se fue estudiando por un periodo de 26 días. Los datos obtenidos fueron los siguientes:

5	0	6	4	4	5	4	0	1	1	4	4	1
6	3	0	6	2	3	2	6	0	0	4	6	3

a) Construye un cuadro estadístico de distribución de frecuencias del n° de paradas por día.
b) ¿En cuántos días el sistema se detuvo por lo menos 3 veces?
c) ¿En cuántos días el sistema se detuvo a lo sumo 1 vez?
d) ¿En cuántos días el sistema se detuvo 2 veces o más, pero menos de 5?

Nº26. Los siguientes datos corresponden a una muestra aleatoria de 30 docentes de la Universidad

S	C	S	C	C	D	S	S	C	C
C	C	D	C	C	C	S	S	C	C

V	C	D	S	V	C	C	C	C	C

Dónde:
S: “soltero”; C: “casado”; V “viudo” y D: “divorciado”
La información fue obtenida de la oficina de personal de dicha Universidad.


Construir una distribución de frecuencias absolutas, relativas y relativas porcentuales.

Nº27. Completa la siguiente tabla de frecuencias correspondiente a 60 empresas utilizando propiedades y definiciones e interpreta: f_2; F_3; h_4%, y H_3%


Gastos en (miles de euros)	fi	Fi	h_i (% relativo)	H_i(% acumulado)
[5,10)		10		
[10,15)		23		
[15,20)		43		
[20,25)				92
[25,30)		60		
TOTAL	60			

Nº28. En el gráfico se presenta la distribución del número de pacientes atendidos diariamente en un Centro de Salud. La muestra tomada fue de 50 días de atención.
Determina si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:


a) En el 29% de los días, el Centro de Salud atendió como mucho 39 pacientes.
b) En el 80% de los días, el Centro de Salud ha atendido un mínimo de 37 pacientes diarios.
c) En más del 50% de los días el Centro de Salud atendió al menos 38 pacientes.



Nº29. El siguiente diagrama muestra las preferencias de 500 personas con respecto a 4 productos A,B,C, y D. Calcula la diferencia entre los que prefieren los productos B y A.




Nº30. Según el siguiente diagrama escalonado, ¿cuántos trabajadores ganan entre 700 € hasta 1300 €?



Sueldo	fi
[400,700)	20
[700-1000)	50
[1000-1300)	x
[1300-1600)	155
total	235

Nº31. Se realizó una encuesta en una zona de Valladolid sobre el número de alumnos que prefieren la asignatura optativa de música y se les clasificó por edades según el siguiente histograma:



Calcula:

a) ¿Cuántos alumnos tienen edades mayores o iguales que 10 pero menores que 16?
b) ¿Cuántos alumnos tienen menos de 16 años?
c) ¿Cuántos alumnos tienen edades mayores o iguales que 14 años?

Nº32. La tabla recoge la edad de un grupo de jóvenes encuestados.

Edad (años)	15	16	17	18	19
Frecuencia absoluta	5	8	2	20	5

a) Realiza un diagrama de barras.
b) Dibuja el polígono de frecuencias.

Nº33. En el estudio estadístico realizado en un instituto se han obtenido los siguientes datos:

Peso (kg)	[50, 55)	[55, 60)	[60, 65)	[65, 70)	[70, 75]
Número de alumnos	10	40	25	20	5

a) Organiza una tabla estadística.
b) Construye el histograma y el polígono de frecuencias.

Nº34. A 30 jóvenes se les ha preguntado sobre sus revistas favoritas y el resultado se recoge en esta tabla.

Tipo	*Deportes*	*Científicas*	*Divulgación*	*Animales*	*Históricas*
Número de jóvenes	10	2	12	5	1

a) Forma la tabla estadística.
b) Representa los datos mediante un diagrama de barras.
c) Representa los datos mediante un diagrama de sectores.

Nº35. Los componentes de un grupo juvenil de baile tienen las siguientes edades:

14	14	13	16	18	17	13	14	14	17	14	16	13	13	15	18	16	17
15	18	14	14	13	16	13	14	16	13	13	14	14	14	15	15	16	17

a) Realiza un recuento y construye la tabla estadística.
b) Dibuja el diagrama de barras.
c) Dibuja el diagrama de sectores.

Nº36. Pesos, en kilogramos, de los bebés nacidos en una clínica durante un fin de semana:

2,350	3,300	2,950	4,100	4,350	3,450	3,100	3,785	3,920	4,000
3,750	2,800	3,100	2,400	2,900	2,550	4,200	3,250	2,800	3,400

a) Construye la tabla estadística.
b) Representa los datos en un histograma.

Nº37. El diagrama de barras refleja el idioma que cursan un grupo de estudiantes de una escuela de idiomas.



Construye la tabla estadística.

Nº38. El número de hijos de 18 familias seleccionadas al azar es el siguiente:

1	2	3	0	2	1	1	0	5
2	1	0	2	2	1	4	1	6


a) Realiza el recuento de datos.
b) Construye la tabla estadística.
c) Dibuja un diagrama de barras y el polígono de frecuencias.

Nº39. Se han revisado 30 paquetes de tornillos y en cada uno se han encontrado estos tornillos defectuosos.

1	1	0	1	1	2	1	1	0	0	1	3	0	1	0
4	0	1	2	0	0	2	2	3	4	1	2	1	0	1

a) Recuento de datos. b) Tabla estadística. c) Diagrama de sectores.

Nº40. Construye la tabla estadística correspondiente al siguiente histograma.



Nº41. Realiza un diagrama de barras y un diagrama de sectores para los datos recogidos en la tabla.

Sexo	Número de personas que donan órganos por cada 100 individuos
Hombres	61
Mujeres	39

Nº42. Dados los siguientes datos; completa una tabla estadística y construye un histograma.

Intervalos	Frecuencias absolutas
$10 \leq x < 20$	7
$20 \leq x < 30$	20
$30 \leq x < 40$	15
$40 \leq x < 50$	8

Nº43. El deporte preferido de un grupo de escolares viene dado por esta tabla:

Deporte	*Fútbol*	*Baloncesto*	*Natación*
Alumnos	305	215	80

Construye:

a) Tabla estadística b) Diagrama de barras c) Diagrama de sectores

Nº44. Las alturas, en *cm*, de 20 plantas de una determinada especie son:

6,10	5,30	6,20	5,60	4,80	4,90	5,20	5,60	6,10	6,20
5,90	5,80	5,70	5,10	4,90	5,20	5,30	6,10	5,90	5,80

Construye:

a) Tabla estadística. b) Histograma.

Nº45. Calcula la media aritmética, la moda y la mediana de este conjunto de datos:

1	2	1	5	1	0	1	2	3	2	1	2	1	3
1	2	2	4	2	2	0	2	2	1	2	1	2	0

Nº46. Para hallar la puntuación final de una prueba de atletismo se multiplica por 3 el resultado de la primera marca, por 4 el de la segunda y por 5 el de la tercera. Las marcas de Belén son 9, 5 y 2. Halla la media ponderada que obtiene.

Nº47. En un examen de Matemáticas se da un peso de 5 al apartado de problemas, un peso de 4 al apartado de cálculo y un peso de 1 al apartado de teoría. Beatriz saca 8 en el apartado de problemas, 7 en el apartado de cálculo y 10 en el apartado de teoría. ¿Cuál es su calificación final?

Nº48. Elabora una tabla estadística para estos datos.

147	145	148	150	156	162	152	164	146
145	140	153	142	147	158	161	164	154

Halla la media aritmética, la moda y la mediana.

Nº49. El número de alojamientos rurales en cierta comunidad autónoma se distribuye según los datos recogidos en la tabla.

Tipo de alojamiento	Número de plazas
Campamentos	160
Viviendas en alquiler	3.600
Albergues	380
Habitaciones en viviendas	1.400

Determina la moda.

Nº50. La tabla expresa el precio de varios ordenadores personales en una tienda de informática:

Precio (€)	Número de ordenadores

$600 \leq x < 900$	60
$900 \leq x < 1.200$	124
$1.200 \leq x < 1.500$	30
$1.500 \leq x < 1.800$	15
$1.800 \leq x < 2.100$	3

Determina la media aritmética, la moda y la mediana.

Nº51. Calcula la media aritmética, la moda y la mediana de los siguientes datos:

a)

2	5	1	0	6	3	7

b)

15	21	3	49	10	47	32	47	35	12

c)

12	8	15	12	7	8	8	15	8

d)

1,3	0	2,7	1,2	0	0	1,3	2,4	0	0,9

e)

3	4	2	3	3	5	1

f)

6	5	4	3	7	6	5	4	3	0	7	5

Nº52. El ahorro de 100 familias a lo largo de un año viene expresado por la siguiente tabla.

Precio (€)	Número de ordenadores
$0 \leq x < 600$	11
$600 \leq x < 1.200$	15
$1.200 \leq x < 1.800$	25
$1.800 \leq x < 2.400$	39
$2.400 \leq x < 3.000$	10
	100

Determina la media aritmética, la moda y la mediana. Representa el histograma y el polígono de frecuencias.

Nº53. Los datos representan el número de libros leídos durante un año por un grupo de estudiantes.

3	4	7	8	2	1	5	0	7	2	6	3	5	4	6	3	3	5
2	3	5	4	7	6	3	3	1	5	4	3	5	4	9	5	7	4

Calcula la media aritmética, la moda y la mediana. Representa el diagrama de barras y el polígono de frecuencias.

Nº54. El número de pilas recicladas por 15 personas en un mes son:

8	5	4	4	6	6	3	2	1	5	4	4	5	2	3

Elabora una tabla estadística. Calcula la media aritmética, la moda y la mediana. Representa el diagrama de barras y el diagrama de sectores.

Nº55. Las edades de los miembros de un grupo de música son:

15	34	18	25	29	14	22	31	29	16	32

Calcula el rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica.

Nº56. Halla la desviación media de cada grupo:

Grupo A	72	65	71	56	59	63	61	70	52	49
Grupo B	53	93	90	70	69	68	72	71	70	71


¿Qué conclusión puedes sacar a la vista de los resultados obtenidos?

Nº57. Los jugadores de dos equipos de fútbol se han pesado y los datos, en *kg*, son los siguientes.

Equipo A	72	65	71	56	59	63	61	70	52	49	68
Equipo B	61	82	84	73	77	70	69	68	72	71	70

Calcula el rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica. ¿Qué equipo tiene los datos más dispersos?

Nº58. Observa el diagrama de barras.



a) Construye una tabla estadística y calcula los parámetros estadísticos de centralización: media aritmética, moda y mediana.
b) Construye una tabla estadística y calcula los parámetros estadísticos de dispersión: rango o recorrido, desviación media, varianza y desviación típica.

Nº59. El peso, en *kg*, de 46 personas es:

79,5	65	67,5	56,5	53,5	66	73	72	59,5	68	52	65,5
69	77	84,5	75	79	68,5	73	66	72	74	56	60
63	64,5	76,5	69,5	64,5	82	55,5	72,5	62,5	73,5	61,5	74,5
73	71	64	67	62	66,5	76	84	55	69		

Agrupa los datos en intervalos de amplitud 5 *kg*.

a) Calcula los parámetros estadísticos de centralización: media aritmética, moda y mediana.
b) Calcula los parámetros estadísticos de dispersión: rango, desviación media, varianza y la desviación típica.
c) Representa los datos, gráficamente, utilizando un histograma y un polígono de frecuencias.

Nº60. Para cubrir las 2 vacantes en el departamento de contabilidad de una empresa, se realiza una prueba escrita. Los seleccionados obtuvieron las siguientes puntuaciones:

125, 148, 99, 132, 121, 114, 125, 98, 112,125

Halla la puntuación promedio, la moda y la mediana.

Nº61. Los siguientes datos correspondientes al consumo anual de pescado (en kg) por parte de 5 ciudades españolas:

CIUDAD	La Coruña	Santander	Gijón	Valladolid	León
Consumo	5200	6800	5959	500	4900

Halla la media, la mediana y la moda.

Nº62. Los siguientes datos corresponden a las notas de los estudiantes al realizar un test:

9	10	15	10	16	18	12	13	8	20
14	5	19	9	7	7	12	19	6	19
17	11	11	18	8	12	20	5	7	6
10	10	18	18	10	10	6	16	14	12
9	7	18	16	9	13	11	18	15	10

Construye la tabla de frecuencias y calcula:

a) la media, la moda y la mediana
b) La varianza y la desviación típica.

Nº63. Se utilizan dos procesos para producir discos. Han surgido problemas respecto a las variaciones en los tamaños de tales discos. Con base en los datos de muestra aquí observados, de ocho tamaños de discos en pulgadas para cada proceso, explica que proceso aconsejarías si su objetivo es minimizar la desviación en el tamaño alrededor de la media.

PROCESO 01		PROCESO 02	
3.41	3.22	3.81	3.26
3.74	3.06	3.26	3.79
3.89	3.65	3.07	3.14
3.65	3.33	3.35	3.51

Nº64. Los gastos mensuales en el uso de internet de dos empresas se muestran a continuación:
EMPRESA A: Gasto promedio: 1350 €, Desviación típica: 78
EMPRESA B: Gasto promedio: 1450 €, Desviación típica: 120
Determina qué empresa tiene gastos mensuales más homogéneos. Justifica la respuesta.

Nº65. Una compañía requiere los servicios de un ingeniero especializado. De los expedientes presentados, se han seleccionado 2 candidatos: A y B los cuales reúnen los requisitos mínimos requeridos. Para decidir cuál de los 2 se va a contratar, los miembros del jurado deciden realizar 7 pruebas. Todas las pruebas se calificaron utilizando una escala de 0 a 80.
Los resultados se dan a continuación:

	Prueba						
	1	2	3	4	5	6	7
Puntaje obtenido por A	57	55	54	52	62	55	59
Puntaje obtenido	80	40	62	72	46	80	40

por B							

a) Halla e interpreta la media
b) Halla e interpreta las desviaciones típicas y los coeficientes de variación.
c) ¿Si fueses el gerente de Recursos Humanos, a cuál de los candidatos contrataría?

Nº66. A continuación se presentan los pesos en kilogramos de 84 artículos de una empresa:

Pesos (kg)	N° de artículos	x_i	$x_i f_i$	$x_i^2 f_i$
[6,9)	8			
[9,12)	20			
[12,15)	35			
[15,18)	10			
[18,21)	4			
[21,24)	6			
[24,27]	1			
TOTAL				

a) Hállese la varianza.
b) Calcula e interpreta el coeficiente de variación

Nº67. Un conjunto de 20 valores tiene una media igual a 50; otro conjunto de 20 valores tiene una media igual a 30, la desviación típica de los 40 valores considerados conjuntamente es igual a 10. Calcular el coeficiente de variación del conjunto de los 40 números.

Nº68. Un conjunto residencial está conformando por tres edificios. Se tiene los siguientes datos respecto al consumo mensual de electricidad de cada uno de los edificios:

Edificio 01: tiene 12 apartamentos que gastan en promedio 45€ con una desviación típica de 10 euros.
Edificio 02: tiene 9 apartamentos cuyos consumos en euros son: 38, 42, 56, 60, 43, 52, 41, 44,53.
Edificio 03: los consumos se dan en la siguiente tabla:

CONSUMO EN EUROS	APARTAMENTOS
[30,40)	1
[40,50)	4
[50,60)	4
[60,70]	2

a) ¿Cuál de los edificios tiene menor consumo medio de electricidad?
b) ¿Cuál es el consumo medio en todo el conjunto residencial?
c) ¿En cuál de los edificios el consumo es más disperso?

Nº69. El siguiente cuadro distribuye a 30 Fábricas de harina según su producción mensual en toneladas en el año 2016.

Producción mensual (toneladas)	f_i	x_i	$x_i f_i$	$x_i^2 f_i$
[50,58)	4	54	216	11664

[58,66)	8	62	496	30752
[66,74)	2	70	140	9800
[74,82)	6	78	468	36504
[82,90)	5	86	430	36980
[90,98)	5	94	470	44180
	N=30		2220	169880

Calcúlese la media, la desviación típica y el coeficiente de variación.

Nº70. El gerente de operaciones de una fábrica de llantas quiere comparar el diámetro interno real de dos tipos de neumáticos, que se espera sean de 575 milímetros en ambos casos. Se seleccionó una muestra de cinco llantas de cada tipo y se ordenaron de menor a mayor, como se aprecia a continuación:

Tipo X	568	570	575	578	584
Tipo Y	573	574	575	577	578

a) Calcula e interpreta la media, la mediana y la dispersión de ambos tipos de llantas.
b) ¿Cuál tipo de llanta es de mejor calidad? ¿explique por qué?

c) ¿Qué efecto tendría en sus respuestas a los apartados a) y b) si el ultimo valor del tipo Y fuese 588 en lugar de 578? Explica tu respuesta.

Nº71. El número de hermanos de los alumnos de una clase es el siguiente:

0 1 0 0 3 2 1 4 0 0 1 1 2 0 1 1
2 0 1 1 2 1 3 0 0 2 1 2 3 5 1 0

a) Efectúa el recuento.
b) Elabora una tabla de frecuencias en las que se incluyan: frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada.
c) Dibuja un diagrama de barras con frecuencias absolutas acumuladas y un polígono de frecuencias absolutas.
d) ¿Qué porcentaje de alumnos son hijos únicos?
e) ¿Cuántos alumnos tienen más de un hermano?

Nº72. El número de goles metidos por partido por un cierto equipo es el siguiente:

0 1 0 2 3 2 1 3 0 0 1 0 3 0 1
1 0 0 1 1 2 1 2 0 1 2 1 5 3 5

a) Elabora una tabla con las cuatro frecuencias y el porcentaje.
b) Calcula la moda, la media de goles por partido.
c) ¿Qué porcentaje de partidos han metido al menos un gol?
d) ¿Cuántos partidos han jugado?
e) Haz una representación gráfica.

Nº73. En una encuesta sobre vivienda se pregunta, entre otras cosas, cuántas personas viven en la casa, obteniéndose las siguientes respuestas:

4 4 8 1 3 2 1 3 4 2 2 7 0 3 8 0 1 5 6 4 3 3 4
5 6 8 6 2 5 3 3 5 4 6 2 0 4 3 6 1 2 1 0 4 4

a) Elabora una tabla en la que se recojan las cuatro frecuencias.
b) ¿Cuántas viviendas fueron objeto de estudio? ¿En cuántas de ellas no vive nadie?
c) ¿Qué porcentaje de viviendas está ocupado por más de cinco personas?
d) Dibuja un diagrama de barras con frecuencias absolutas acumuladas y un polígono de frecuencias absolutas.

Nº74. En un estudio estadístico sobre el número de horas que duran 12 pilas de una determinada marca se obtuvieron los siguientes datos:

10, 12, 12, 11, 12, 10, 13, 11, 13, 11, 13, 9

a) Agrupar los datos en una tabla de frecuencias y porcentajes.
b) Representar los datos en un diagrama de barras y en un diagrama de sectores.

Nº75. Se ha lanzado un dado 20 veces y se han obtenido los siguientes resultados:

2, 3, 5, 3, 6, 1, 5, 4, 3, 2,
5, 3, 6, 2, 1, 5, 4, 4, 1, 1

a) Construir la tabla de frecuencias.
b) Representar los datos con un diagrama de barras y un diagrama de sectores.
c) ¿Cuál ha sido la puntuación media obtenida?

Nº76. Estos son los datos sobre ocupación de la población por sectores económicos:

Agricultura	1.870.000
Industria	2.587.000
Construcción	789.000
Servicios	5.394.500

a) ¿Cuántos trabajadores hay en total?
b) Calcula la frecuencia relativa en porcentaje de cada sector económico
c) Representa estos datos en un diagrama de barras

Nº77. La siguiente tabla refleja las calificaciones de 30 alumnos en un examen de Matemáticas:

nota	2	4	5	6	7	8	9	10
Nº alumnos	2	5	8	7	2	3	2	1

a) ¿Cuántos alumnos aprobaron? ¿Cuántos alumnos sacaron como máximo un 7? ¿Cuántos sacaron como mínimo un 6?
b) Calcular la nota media, la moda y la mediana

Nº78. Las calificaciones obtenidas por los 32 alumnos de una clase de 3º de ESO en una prueba de Matemáticas vienen dadas por la siguiente tabla:

Nota	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Alumnos	1	2	4	5	4	6	5	4	1

a) Elabora la tabla de frecuencias completa.
b) ¿Qué porcentaje de alumnos aprueba la materia?
c) ¿Qué porcentaje obtiene más de 8 puntos?
d) Dibuja un diagrama de barras de frecuencias relativas.
e) Dibuja un polígono de frecuencias acumuladas.

Nº79. En la siguiente tabla se recoge el número de veces que un grupo de usuarios de un ambulatorio han tenido que acudir a su médico en el último año.

Nº de visitas al médico	Nº de personas
1	10
3	25
5	43
7	31
10	12
12	4


a) ¿Cuántas personas han ido el médico 7 veces en el último año? ¿Cuántas han ido 4 veces?
b) ¿Qué porcentaje de personas ha ido al médico más de 6 veces?
c) Calcular la moda y el número medio de visitas al médico en el ambulatorio.
d) Dibujar un diagrama de barras.

Nº80. Las temperaturas recogidas en una determinada ciudad durante el mes de Enero se muestran en la siguiente tabla:

Temperatura en ºC	19	20	21	22	23	24
Número de días	7	9	6	4	3	2


a) ¿Cuántos días hizo por encima de 21ºC? ¿Cuántos por debajo de 23ºC? ¿Cuántos días hizo la temperatura máxima?
b) Calcula la media, la moda y la mediana.

Nº81. Se realizó una encuesta a un grupo de personas para comprobar si habían visto la película que obtuvo más premios Goya ese año. Los resultados se reflejan en la gráfica:




a) ¿Cuántas personas contestaron a la encuesta?
b) Elabora la tabla de frecuencias correspondiente.

Nº82. A partir de la siguiente gráfica estadística de gustos deportivos:



a) Calcular la tabla de frecuencias.
b) ¿A qué porcentaje de las personas no le gusta el ciclismo?


Nº83. La siguiente gráfica recoge la cantidad de parejas de zapatos de mujer vendidas en una tienda a lo largo del día:



a) ¿Cuántas parejas de zapatos del número 37 se han vendido?
b) Pasa los datos a una tabla de frecuencias absolutas.


c) ¿Cómo se llama la gráfica que nos han dado?
d) ¿Qué porcentaje de zapatos vendidos eran números del 39 o 40?
e) Dibuja un polígono de frecuencias absolutas acumuladas.

Nº84. En una encuesta a 35 personas se les preguntaba sobre sus preferencias a la hora de leer novelas. Los resultados se recogieron en la siguiente gráfica:



a) Construye la tabla de frecuencias.
b) Dibuja sobre el gráfico un diagrama de barras.
c) ¿A qué porcentaje de las personas encuestadas les gustan las novelas de amor?¿Y las de ciencia-ficción?
d) ¿Cuál es la moda?

Nº85. En el siguiente estudio se analizan los sueldos que ganan las mujeres en la industria en diversos países del mundo, en porcentaje sobre lo que gana los hombres:



a) Si una mujer en Suiza gana 1300 francos, ¿cuánto gana un hombre en el mismo puesto y con la misma categoría profesional?
b) Un hombre, por término medio, gana en España un sueldo mensual de 1102 euros netos. ¿Cuánto ganaría si fuese mujer?

Nº86. Calcula el valor de la letra *x* para que la media de:

a) 7, 7, *x* sea 7
b) 2, 3, x sea 4
c) 5, 6, *x* sea 6

Nº87. Halla el dato que falta en la serie sabiendo que la moda es 5.

7	6	5	4	3	7	6	5	*x*

Nº88. Se realiza una encuesta a 3 cursos de 3º de ESO sobre las tareas domésticas. Una de las preguntas es sobre el tiempo que se tarda en hacer la cama. Los resultados han sido los siguientes:

Duración (*min*)	$1 \leq x < 2$	$2 \leq x < 3$	$3 \leq x < 4$	$4 \leq x < 5$	$5 \leq x < 6$
Número de alumnos	11	0	25	28	4

a) ¿Hay algún alumno que tarde 6 *min* en hacer la cama? ¿Y 1 *min*? Razona las respuestas.

b) ¿Cuánto tiempo tardan, de media, los alumnos en hacer la cama?

Tabla estadística

Duración (min) x_i	*Marcas de clase* c_i	f_i	h_i	p_i	$f_i \cdot c_i$
[1, 2)					
[2, 3)					
[3, 4)					
[4, 5)					
[5, 6)					
		$N =$	1	100 %	$\sum(f_i \cdot c_i) =$

c) ¿Qué porcentaje de alumnos tardan menos de 2 *min* en hacer la cama?

Nº89. Un grupo de amigos, después de medirse, han obtenido los siguientes resultados en *cm*.

165	167	162	175	171	169	172	170	169	171	172	175	169	170	172	166

Faltaba por llegar Luis, que mide 196 *cm*.

a) ¿Se altera el valor del rango?
b) Si Luis hubiese medido 174 *cm*, ¿se habría alterado el valor del rango?

Nº90. Dados los datos:


4	5	6	7

Halla la media aritmética, la moda y el rango. Si multiplicamos los datos por 4, ¿cómo se verán afectados los parámetros anteriores?

Nº91. La media aritmética de 5 números es 39,2. La media de otros 7 números diferentes es 64,8. Calcula:

a) Cuánto suman los 5 primeros números.
b) Cuánto suman los otros 7 números.
c) La media de todos los números juntos.

Nº92. Observa el histograma y calcula la media aritmética y la moda.



Nº93. María y Sergio, Laura y Sara están haciendo unas pruebas de natación sincronizada. Los jueces les dan las siguientes puntuaciones:

	Técnica	*Compenetración*	*Ritmo*
1.- María y Sergio	9,6	8,9	9,0
2.- Laura y Sara	9,1	9,5	9,2

El peso de la puntuación de Técnicas es 2, el de Compenetración es 3 y el de Ritmo es 1. ¿Cuál de los dos equipos obtiene mayor puntuación?

Nº94. Completa los datos que faltan en la tabla.

x_i	f_i	h_i	F_i
2	3	2º →	3º →
4	4º →	5º →	8
6	6º →	0,4	7º →
8	8º →	9º →	$N = 20$
	1º →	10º →	

Nº95. Las parejas *A* y *B* de patinaje artístico han obtenido las siguientes puntuaciones:

A	5,3	5,2	5,1	5,3	5,3	5,4	5,5	5,3	5,3
B	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,4	5,2

Gana aquella pareja que tenga la puntuación media más alta. En caso de empate, gana la pareja que tenga la menor desviación media. ¿Cuál resultará ganadora?

Nº96. La estatura media de 5 personas es de 167 *cm*. María se junta al grupo y la estatura media delas 6 personas es de 169 *cm*. ¿Cuál es la estatura de María?

Nº97. Las notas de matemáticas del grupo 3º A de la ESO del IES Antonio Tovar son las siguientes:
4 , 4 , 5 , 6 , 9 , 4 , 4 , 5 , 4 , 4 , 3 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 4 , 5 , 2 , 3 , 3 , 7 , 3 , 3 , 7, 7 , 2

a) Construye la tabla de frecuencias.
b) Calcúlese la media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación.
c) Calcúlese la moda, la mediana, y los cuartiles primero y tercero.
d) Representa los datos mediante un diagrama de barras. Diagrama de caja.
e) ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que suspenden?

Nº 98. Los porcentajes de aciertos en tiros libres, de dos jugadores en los diez últimos partidos de baloncesto vienen dados en la siguiente tabla:

JUGADOR A	30	22	34	76	12	10	22	40	30	42
JUGADOR B	38	44	22	54	44	32	60	28	30	40

a) ¿Cuál de los dos tiene mejor media?
b) Calcúlese la desviación típica de cada jugador.
c) ¿Cuál de los dos jugadores es más regular?

Nº 99. Se han medido los pesos y las alturas de 6 personas, obteniéndose los siguientes datos:

PESOS (kg)	**ALTURAS (m)**
65	1,70

60	1,50
63	1,70
63	1,70
68	1,75
68	1,80

Calcula los coeficientes de variación de ambas variables y di si están más dispersos los pesos o las alturas.


Nº 100. En una población de 25 familias se ha observado la variable X = "número de coches que tiene la familia" y se han obtenido los siguientes datos:

0 1 2 3 1
0 1 1 1 4
3 2 2 1 1
2 2 1 1 1
2 1 3 2 1

a) Construye la tabla de frecuencias de la distribución X.
b) Haz el diagrama de barras.
c) Calcula la media y la desviación típica.
d) Halla la mediana, los cuartiles y representa el diagrama de caja.

PROBABILIDAD

Nº1. Queremos sacar una bola blanca. Escribe el cartel que corresponde a cada una de estas bolsas:



Nº2. En una bolsa hay 4 canicas rojas y 4 blancas. ¿Cuál es la probabilidad de estos resultados?

- Salir roja: .....
- Salir blanca: .....
- Salir azul: .....
- Salir roja o blanca: .....
- Salir azul o roja: .....
- Salir amarilla, verde o roja: .....

Nº3. Señala cuáles de las siguientes experiencias son de azar:

a) Dejar caer un cuerpo y observar su caída.
b) Que salga tu número premiado en la rifa de fin de curso.
c) Sacar un caramelo de una bolsa de caramelos variados y averiguar su sabor.
d) Ser elegido delegado de tu clase.
e) Tirar a canasta con los ojos cerrados y encestar.

Nº4. Una bolsa contiene 10 bolas numeradas del 0 al 9. Relaciona cada suceso con su probabilidad.

Sacar un número impar	$\frac{4}{10}$
Sacar un número mayor que 5	$\frac{1}{10}$
Sacar el cero	$\frac{1}{2}$
Sacar un número menor que 10	$\frac{10}{10}$

Nº5. Se lanza un dado con las caras numeradas del 1 al 6. Halla la probabilidad de obtener:

a) Un 4.
b) Un número par.
c) Un número múltiplo de 3.

Nº6. Una urna contiene 5 bolas blancas, 8 verdes y 7 rojas. Se extrae una bola al azar; halla la probabilidad de que:

a) Sea roja.
b) Sea verde.
c) Sea blanca.

Nº7. Calcula qué es mayor:

a) La probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda
b) La probabilidad de obtener múltiplo de 3 en el lanzamiento de un dado con las caras numeradas del 1 al 6.

Nº8. Se extrae una carta de una baraja española de 40 cartas. Halla la probabilidad de que sea:

a) Un rey.
b) Una figura.
c) El rey de espadas.
d) Una carta de espadas.

Nº9. Una urna tiene ocho bolas rojas y cinco amarillas. Se extrae una bola al azar. Halla la probabilidad de que:

a) Sea roja
b) Sea amarilla

Nº10. En una caja hay 9 bolas numeradas del 1 al 9. Si se extrae una bola al azar, halla:
Probabilidad de que sea mayor que 3.
Probabilidad de que sea inferior a 6.
Probabilidad de que sea mayor que 3 y menor que 7.

Nº11. Se lanzan dos monedas. Describe el espacio muestral. Halla la probabilidad de obtener:

a) Dos caras.
b) Una o dos caras.

Nº12. Halla la probabilidad de ganar en una rifa de 500 papeletas numeradas de 0 a 499, si has comprado:

a) 1 papeleta.
b) 50 papeletas.
c) Todas las que tienen un número par.

Nº13. Se hace una quiniela con un dado para hacer quinielas que lleva en sus caras tres veces el 1, dos veces la X y una vez el 2. Calcula la probabilidad de que salga una X o un 2.

Nº14. En una urna hay 3 bolas blancas, 2 rojas y 4 azules. Calcula la probabilidad de que al extraer una bola al azar, salga roja.

Nº15. Se extrae una carta de una baraja española de 40 cartas, y se consideran los siguientes sucesos: *A*= "obtener una de oros", *B* = "obtener una sota" y *C* = "obtener un tres". Di si son compatibles o incompatibles estos tres sucesos. ¿Por qué?

Nº16. Un dado está trucado para que el 6 tenga una probabilidad de salir de 0,25. ¿Cuál es la probabilidad de no obtener un 6?

Nº17. En el lanzamiento de un dado, consideramos los sucesos A = {2, 3} y B = {2, 4, 6}. Halla el suceso unión de A y B y el suceso intersección de A y B.

Nº18. Se lanza 100 veces un dado y se obtiene:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia absoluta	12	17	18	16	18	19

Calcula la frecuencia relativa del suceso "obtener múltiplo de 3".

Nº19. Se lanza dos veces un dado. Representamos el espacio muestral de la siguiente forma: {(1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (2, 1), (2, 2), (2, 3), ..., (6, 6)} donde en cada pareja el primer número representa lo que se obtiene en la primera tirada y el segundo en la segunda. Sean los sucesos: A = "la suma de las dos tiradas es 7" y B = "el primer número es par".

Calcula la probabilidad de $A \cup B$.

Nº20. Se lanza una moneda dos veces. Si consideramos los sucesos A = "obtener lo mismo en las dos tiradas", B = "la primera vez sale cara" y C = "obtener al menos una cruz".

Halla los sucesos:

$A \cup B$, $A \cap B$, $B \cup C$ y $B \cap C$

Nº21. Se lanza 100 veces un dado y se obtiene:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia absoluta	12	17	18	16	18	19

Calcula la frecuencia relativa de los siguientes sucesos:

a) A = Salir par.

b) B = No salir par.

Nº22. En el lanzamiento de un dado, consideramos los sucesos A = {2, 3} y B = {2, 4, 6}. Halla la probabilidad del suceso unión de A y B.

Nº23. Calcula la probabilidad de aprobar un examen de matemáticas si se sabe que hay una probabilidad de 0,4 de no aprobar.

Nº24. Se lanza dos veces un dado. Representamos el espacio muestral de la siguiente forma: {(1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (2, 1), (2, 2), (2, 3), ..., (6, 6)} donde en cada pareja el primer número representa lo que se obtiene en la primera tirada y el segundo en la segunda. Sean los sucesos: A = "obtener primero un 4 y después un 3" = (4, 3), B = "la suma de las dos tiradas es 7", C = "el primer número es par" y D = "obtener el mismo número en las dos tiradas".

Halla los siguientes sucesos:

$A \cup B, B \cap C, A \cup D, C \cap D$ y $B \cap D$

Nº25. Una urna contiene 3 bolas blancas (*B*), 2 rojas (*R*) y 1 amarilla (*A*). Se extrae una bola al azar. Indica cuáles son los sucesos elementales, el suceso seguro y el suceso imposible.

Nº26. En el lanzamiento de un dado, consideramos los sucesos $A = \{2, 3\}$ y $B = \{2, 4, 6\}$. Halla el suceso unión de *A* y *B* y el suceso intersección de *A* y *B*.

Nº27. ¿Cuál es el espacio muestral del experimento "suma de los puntos obtenidos al lanzar dos dados"?

Nº28. En una urna hay 15 bolas numeradas de 2 al 16. Extraemos una bola al azar y observamos el número que tiene.

a) Describe los sucesos:

A="Obtener par" *B* ="Obtener impar"
C="Obtener primo" *D*= "Obtener impar menor que 9"
escribiendo todos sus elementos.

b) ¿Qué relación hay entre *A* y *B*? ¿Y entre *C* y *D*?
c) ¿Cuál es el suceso $A \cup B$? ¿y $C \cap D$?

Nº29. Sean *A* y *B* los sucesos tales que:

$P[A] = 0{,}4$ $P[A' \cap B] = 0{,}4$ $P[A \cap B] = 0{,}1$

Calcula $P[A \cup B]$ y $P[B]$.

Nº30. Sean *A* y *B* dos sucesos de un espacio de probabilidad tales que:

$P[A'] = 0{,}6$ $P[B] = 0{,}3$ $P[A' \cup B'] = 0{,}9$

a) ¿Son independientes *A* y *B*?

b) Calcula $P[A' / B]$.

Nº31. Dos personas eligen al azar, cada una de ellas, un número del 0 al 9. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos personas no piensen el mismo número?

Nº32. En un viaje organizado por Europa para 120 personas, 48 de los que van saben hablar inglés, 36 saben hablar francés, y 12 de ellos hablan los dos idiomas.
Escogemos uno de los viajeros al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que hable francés, sabiendo que habla inglés?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que solo hable francés?

Nº33. Una urna, *A*, contiene 7 bolas numeradas del 1 al 7. En otra urna, *B*, hay 5 bolas numeradas del 1 al 5. Lanzamos una moneda equilibrada, de forma que, si sale cara, extraemos una bola de la urna *A* y, si sale cruz, la extraemos de *B*.

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par?
b) Sabiendo que salió un número par, ¿cuál es la probabilidad de que fuera de la urna *A*?

Nº34. De una bolsa que tiene 10 bolas numeradas del 0 al 9, se extrae una bola al azar.

a) ¿Cuál es el espacio muestral?
b) Describe los sucesos:

A= "Mayor que 6" *B*= "No obtener 6" *C*= "Menor que 6"
escribiendo todos sus elementos.

c) Halla los sucesos $A \cup B$,$A \cap B$ y $B' \cap A'$.

Nº35. Sabiendo que:

$P[A \cap B] = 0,2$ $P[B'] = 0,7$ $P[A \cap B'] = 0,5$

Calcula $P[A \cup B]$ y $P[A]$.

Nº36. De dos sucesos *A* y *B* sabemos que:

$P[A'] = 0,48$ $P[A \cup B] = 0,82$ $P[B] = 0,42$

a) ¿Son *A* y *B* independientes?

b) ¿Cuánto vale $P[A / B]$?

Nº37. Extraemos dos cartas de una baraja española (de cuarenta cartas). Calcula la probabilidad de que sean:

a) Las dos de oros. b) Una de copas u otra de oros.

c) Al menos una de oros. d) La primera de copas y la segunda de oro.

Nº38. Se hace una encuesta en un grupo de 120 personas, preguntando si les gusta leer y ver la televisión. Los resultados son:

- A 32 personas les gusta leer y ver la tele.

- A 92 personas les gusta leer.
- A 47 personas les gusta ver la tele.

Si elegimos al azar una de esas personas:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que no le guste ver la tele?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que le guste leer, sabiendo que le gusta ver la tele?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que le guste leer?

Nº39. El 1% de la población de un determinado lugar padece una enfermedad. Para detectar esta enfermedad se realiza una prueba de diagnóstico. Esta prueba da positiva en el 97% de los pacientes que padecen la enfermedad; en el 98% de los individuos que no la padecen da negativa. Si elegimos al azar un individuo de esa población:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo dé positivo y padezca la enfermedad?
b) Si sabemos que ha dado positiva, ¿cuál es la probabilidad de que padezca la enfermedad?

Nº40. a) Dos personas eligen al azar, cada una de ellas, un número del 1 al 5. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos elijan el mismo número?

b) Si son tres personas las que eligen al azar, cada una de ellas, un número del 1 al 5, ¿cuál es la probabilidad de que las tres elijan el mismo número?

Nº41. En una clase de 30 alumnos hay 18 que han aprobado matemáticas, 16 que han aprobado inglés y 6 que no han aprobado ninguna de las dos.
Elegimos al azar un alumno de esa clase:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado inglés y matemáticas?
b) Sabiendo que ha aprobado matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado inglés?
c) ¿Son independientes los sucesos "Aprobar matemáticas" y "Aprobar inglés"?

Nº42. Tenemos dos bolsas, *A* y *B*. En la bolsa *A* hay 3 bolas blancas y 7 rojas. En la bolsa *B* hay 6 bolas blancas y 2.rojas. Sacamos una bola de *A* y la pasamos a *B*. Después extraemos una bola de *B*.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída de *B* sea blanca?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas sean blancas?

Nº43. En un pueblo hay 100 jóvenes; 40 de los chicos y 35 de las chicas juegan al tenis. El total de chicas en el pueblo es de 45. Si elegimos un joven de esa localidad al azar:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea chico?
b) Si sabemos que juega al tenis, ¿cuál es la probabilidad de que sea chica?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que sea un chico que no juegue al tenis?

Nº44. Una bolsa, *A*, contiene 3 bolas rojas y 5 verdes. Otra bolsa, *B*, contiene 6 bolas rojas y 4 verdes. Lanzamos un dado: si sale un uno, extraemos una bola de la bolsa *A*; y si no sale un uno, la extraemos de *B.*

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener una bola roja?
b) Sabiendo que salió roja, ¿cuál es la probabilidad de que fuera de *A*?

Nº45. En unas oposiciones, el temario consta de 85 temas. Se eligen tres temas al azar de entre los 85. Si un opositor sabe 35 de los 85 temas, ¿cuál es la probabilidad de que sepa al menos uno de los tres temas?

Nº46. Tenemos para enviar tres cartas con sus tres sobres correspondientes. Si metemos al zar cada carta en uno de los sobres, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de las cartas vaya en el sobre que le corresponde?

Nº47. En una cadena de televisión se hizo una encuesta a 2.500 personas para saber la audiencia de un debate y de una película que se emitieron en horas distintas: 2.100 vieron la película, 1.500 vieron el debate y 350 no vieron ninguno de los dos programas. Si elegimos al azar a uno de los encuestados:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que viera la película y el debate?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que viera la película, sabiendo que no vio el debate?
c) Sabiendo que vio la película, ¿cuál es la probabilidad de que viera el debate?

Nº48. Tenemos dos urnas: la primera tiene 3 bolas rojas, 3 blancas y 4 negras; la segunda tiene 4 bolas rojas, 3 blancas y 1 negra. Elegimos una urna al azar y extraemos una bola.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea blanca?
b) Sabiendo que la bola extraída fue blanca, ¿cuál es la probabilidad de que fuera de la primera urna?

Nº49. María tiene en su monedero 4 monedas de cinco céntimos, 3 de veinte céntimos y 2 de un euro. Saca dos monedas al azar. Cuál es la probabilidad de los siguientes sucesos:

a) Que las dos sean de cinco céntimos.
b) Que ninguna sea de un euro.
c) Que saque 1,20 €.

Nº50. Una compañía tiene dos proveedores A y B que le suministran artículos en mal estado en los últimos envíos. Los datos del último pedido son:

	BUENOS	DEFECTUOSOS	TOTAL
PROVEEDOR A	10	40	
PROVEEDOR B	20	130	
TOTAL			

Calcular la probabilidad de que al elegir al azar un artículo:

a) Sea bueno.
b) Sea del proveedor A.
c) Sea del proveedor A sabiendo que es defectuoso.

d) Sea del proveedor B y sea bueno.
e) Sea suministrado por A o sea defectuoso.

Nº51. Al 65% de los alumnos de un Instituto les gusta el rock. Al 25% les gusta la música clásica y sólo al 10% les gusta los dos tipos de música. Se elige al azar uno de estos alumnos.
Calcular la probabilidad de que:

a) Le guste el rock o la música clásica.
b) No le guste ni el rock ni la música clásica.
c) Le guste sólo el rock.
d) ¿Son independientes los sucesos A = "Le gusta el rock" y B = "Le gusta la música clásica"?

Nº52. De los 60 empleados de una empresa textil, la sexta parte trabajan en la oficina y los demás en el taller. Uno de los empleados del personal de la oficina y la mitad de los del taller no tienen el título de la ESO. Construye la tabla de contingencia de la situación.
Elegido un empleado de la empresa textil al azar, calcula la probabilidad de:

a) No tenga el título de la ESO.
b) Que trabaje en la oficina y tenga el título de la ESO.
c) Que trabaje en la oficina o tenga el título de la ESO.
d) Que tenga el título de la ESO si es que trabaja en el taller.
e) Que trabaje en el taller si no tiene el título de la ESO.

Nº53. Una compañía de seguros hace una investigación sobre la cantidad de partes de siniestro fraudulentos presentados por los asegurados. Clasificando los seguros en tres clases, incendio, automóvil y "otros", se obtiene la siguiente relación de datos:

El 6% son partes por incendio fraudulentos; el 1% son partes de automóviles fraudulentos; el 3% son "otros" partes fraudulentos; el 14% son partes por incendio no fraudulentos; el 29% son partes por automóvil no fraudulentos y el 47% son "otros" partes no fraudulentos.

a) Haz una tabla ordenando los datos anteriores y hallando el porcentaje total de partes fraudulentos y no fraudulentos.
b) Calcula qué porcentaje total de partes corresponde a la rama de incendios, cuál a la de automóviles y cuál a "otros". Añade estos datos a la tabla.
c) Calcula la probabilidad de que un parte escogido al azar sea fraudulento. ¿Cuál será, en cambio, la probabilidad de que sea fraudulento si se sabe que es de la rama de incendios?

Nº54. Una compañía dedicada al transporte público explota tres líneas de una ciudad, de forma que el 60% de los autobuses cubre el servicio de la primero línea, el 30% cubre la segunda y el 10% cubre el servicio de la tercera línea. Se sabe que la probabilidad de que, diariamente, un autobús se averíe es del 2%, 4% y 1%, respectivamente, para cada línea. Determina la probabilidad de que, en un día, un autobús sufra una avería.

Nº55. Una empresa del ramo de la alimentación elabora sus productos en cuatro factorías: F1, F2, F3 y F4. El porcentaje de producción total que se fabrica en cada factoría es del 40%, 30%, 20% y

10%, respectivamente, y además el porcentaje de envasado incorrecto en cada factoría es del 1%, 2%, 7% y 4%. Tomamos un producto de la empresa al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre defectuosamente envasado?

Nº56. Se tiene una urna vacía y se lanza una moneda al aire. Si sale cara, se introduce en la urna una bola blanca y si sale cruz, se introduce una bola negra. El experimento se repite tres veces y, a continuación, se introduce la mano en la urna, retirando una bola. ¿Cuál es la probabilidad de que en la urna queden una bola blanca y otra negra?

Nº57. Se lanzan dos monedas al aire. Si salen dos caras, se extrae una bola de una urna I, que contiene 2 bolas blancas y 3 negras. Si sale cara y cruz, se extrae una bola de una urna II, que contiene 4 bolas blancas y 1 negra. Si salen dos cruces, se extrae una bola de una urna III, que contiene 3 bolas blancas y 2 negras. ¿Cuál es la probabilidad de extraer bola blanca después de lanzar las monedas y sacar la bola?

Nº58. En una ciudad el 60 % de sus habitantes son aficionados al fútbol, el 30 % son aficionados al baloncesto y el 25 % a ambos deportes.

a) ¿Son independientes los sucesos "ser aficionado al fútbol" y "ser aficionado al baloncesto"?.
b) Si una persona no es aficionada al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que no sea aficionada al baloncesto?
c) Si una persona no es aficionada al baloncesto, ¿cuál es la probabilidad de que sea aficionada al fútbol?

Nº59. De 150 pacientes, 90 tienen una enfermedad cardiaca, 50 tienen cáncer y 20 tienen ambas enfermedades.

a) Representar la situación mediante un diagrama de Venn.
b) Recoge en una tabla de doble entrada todos los datos aportados, así como los que se puedan deducir de ellos.
c) Determinar la probabilidad de que una persona tomada al azar tenga una sola de las dos enfermedades.

Nº60. En una población se sabe que el 30% escucha los informativos por la Radio; el 60% por la Televisión; y el 20% los escucha por los dos medios de comunicación. Si se elige una persona al azar, determina la probabilidad de que:

a) escuche alguno de los medios de comunicación.
b) escuche la Radio sabiendo que no ve la Televisión.
c) escuche sólo uno de los dos medios.

Nº61. La probabilidad de que un alumno lleve "tipex" a un examen es de 0,1; la probabilidad de que escriba a lápiz es de 0,6 y la probabilidad de que lleve "tipex" y también escriba a lápiz es de 0,05. Elegido un alumno al azar, calcula la probabilidad de que:

a) lleve "tipex" o escriba a lápiz,
b) no lleve "tipex" y no escriba a lápiz.

Nº62. En una ciudad el 40% de los domicilios tiene conexión a Internet, el 33% tiene conexión de televisión por cable y el 20% disfruta de ambos servicios.

a) Calcula la probabilidad de que al elegir al azar un hogar nos encontremos con al menos alguno de estos dos servicios.
b) Se ha elegido un hogar en el que hay conexión a Internet. Probabilidad de que no esté equipado con TV por cable.

Nº63. Se hace girar la flecha y se observa sobre qué número se detiene. Calcula las probabilidades de los siguientes sucesos:

a) Obtener un número par.
b) Obtener un número primo.
c) Obtener 5 o más.
d) Que no salga el 7.



Nº64. En una clase hay 17 chicos y 18 chicas. Elegimos al azar dos alumnos de esa clase. Calcula la probabilidad de que:

a) Los dos sean chicos.
b)Sean dos chicas.
c) Sean un chico y una chica.

Nº65. Un equipo de fútbol tiene dos guardametas. El habitualmente titular recibe un solo gol el 20% delos partidos, 2 goles el 10% y más de dos goles el 5%. El resto de los partidos consigue dejar su meta a 0. El segundo es un poco más "manta" y recibe un solo gol el 35% de los partidos, 2 goles el 15% y más de dos goles el 10%. El resto de los partidos consigue mantener su meta imbatida. Durante la semana, el entrenador ha tenido problemas en el vestuario y ha dudado entre alinear un portero u otro. El partido se ha jugado y el equipo ha encajado un gol.

Calcula la probabilidad de que haya salido el portero reserva, sabiendo que el entrenador, al final, se jugó a cara o cruz el portero que debía sacar de titular.


Nº66.- Un dominó consta de 28 fichas, de las cuales 7 son dobles. Escogidas 3 fichas al azar, calcular la probabilidad de que alguna sea doble si:

a) se extraen las tres simultáneamente.
b) se extraen de una en una con reemplazamiento.

Nº67. 1.¿Qué es una experiencia aleatoria?
2.-De las siguientes experiencias, ¿cuáles son aleatorias?

a) En una caja hay cinco bolas amarillas, sacamos una bola y anotamos su color.
b) Lanzamos una moneda al aire y anotamos si sale cara o cruz.
c) Al lanzar un dado de seis puntos anotamos todos los resultados mayores que ocho.

Nº68. Dejamos caer, desde el embudo de la parte superior de este artilugio, una bola:



a) ¿Cuál es la probabilidad de caiga en la casilla 3?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en una casilla con número par?
c) ¿Cuál de la probabilidad de que no caiga en la casilla 5?

Nº69. En una empresa de 200 empleados se está analizando el tema de la puntualidad en el trabajo. La siguiente tabla refleja los resultados obtenidos:

	HOMBRES	MUJERES
PUNTUALES	55	86
IMPUNTUALES	40	19

Se elige al azar a uno de los empleados. Calcula la probabilidad de que:

a) Sea hombre.
b) Sea puntual.
c) Sea hombre puntual.

Nº70. Escribimos cada una de las letras de la palabra MATEMATICAS en un papel y las metemos en una bolsa roja. Hacemos lo mismo con las letras de la palabra APROBADO y las metemos en una bosa azul. Tiramos una moneda: si sale cara, sacamos un papel de la bolsa roja y si sale azul, lo sacamos de la bolsa azul.

a) ¿Cuál es la probabilidad de sacar un papel con la letra A?
b) ¿Cuál es la probabilidad de sacar una consonante?


CURIOSIDADES MATEMÁTICAS

1.- Mezclando los naipes siete veces



En una partida de naipes es frecuente que el jugador que ha tenido una mala mano acuse a quien barajó de no haber mezclado bien las cartas. También podemos observar que quien pierde más tiempo barajando no es otro que el que está teniendo peor suerte en la partida e intenta que ésta cambie mezclando a conciencia las cartas.
En 1991 los matemáticos estadounidenses PersiDiaconis y David Bayer recurrieron a la computadora para estudiar este problema y comprobaron que basta mezclar las cartas siete veces para que su distribución sea aleatoria dentro de una baraja de 52 naipes. Esto quiere decir que cualquier carta tiene la misma probabilidad de encontrarse en cualquier posición. Mezclar las cartas más de siete veces es innecesario y menos de siete insuficiente.

2.-Sumando las caras ocultas de los dados



Este es un pequeño juego o truco con el que puedes demostrar a tus amigos que eres capaz de sumar las caras ocultas de una torre de tres dados. Tendrás que pedirle a uno de los presentes que apile los dados sin que tú le veas y que te avise cuando acabe.

Habrá que restarle a 21 el número que marque el dado de la cima de la torre y esa será la suma de las caras ocultas. Puedes pedir que te lo pongan más difícil apilando cuatro dados, y esta vez para acertar la suma tendrás que restarle a 28 la cima.
Este truco se basa en que las caras opuestas de un dado de seis caras suman 7.

3.-La Martingala

La Martingala es un método para apostar en juegos de azar que nació en Francia en el siglo XVIII. La primera aplicación del método fue diseñada para jugar al cara o cruz. El método consiste en multiplicar sucesivamente la apuesta inicial en caso de pérdida hasta ganar una vez. En el momento en el que se gana se obtiene un beneficio igual a la apuesta inicial. Entonces, se vuelve a hacer de nuevo la apuesta inicial.
En el juego de la ruleta, la martingala consiste en apostar una cantidad, un euro por ejemplo, a un color, en este caso al rojo. Si se pierde, se duplica la última apuesta: dos euros al rojo. En caso de

volver a perder, se vuelve a duplicar la última apuesta: cuatro euros al rojo… En el momento en el que se gane una vez, se logra un beneficio de un euro (la apuesta inicial).



Apostamos 1€ al rojo -> Sale Negro: Perdemos y duplicamos la apuesta. Apostamos 2€ al rojo -> Sale Negro: Perdemos y duplicamos la apuesta. Apostamos 4€ al rojo-> Sale Rojo: ¡Premio! Hemos ganado 8€, con lo que recuperamos los 7€ apostados (1€+2€+4€) y obtenemos 1€ de ganancia.

Este método está muy extendido y no son pocos los que creen que con él pueden derrotar a la banca. A primera vista es engañoso y por ello es utilizado por muchos jugadores y casinos para incitar a jugar a incautos.

En el juego de la ruleta, la Martingala falla puesto que:

a) La banca cuenta con presupuesto infinito.
b) Existe un tope de apuesta que llegado a él, habría que detener el método y asumir las pérdidas. No se puede duplicar la apuesta aunque se disponga de dinero.
c) Una secuencia desfavorable puede acabar muy rápido con el "colchón" de dinero del jugador. Cuanto más se juega más tiende a aparecer esta secuencia.
d) La ruleta es un juego de esperanza negativa, o en otras palabras, desfavorable para el jugador. La culpa la tiene la casilla verde (el número cero).

4.-La paradoja del cumpleaños

La paradoja del cumpleaños es un problema estadístico que determina cuántas personas hace falta reunir para que al menos dos cumplan años el mismo día.

No es una paradoja en el sentido estricto, sino más bien una extraña curiosidad estadística, ya que solo presenta una respuesta contraintuitiva, y no una contradicción lógica.

El enunciado: ¿Cuántas personas debe haber en una fiesta para que haya un 50 % de probabilidades de que al menos dos cumplan años el mismo día?

El problema del cumpleaños establece que para que haya un 50 % de probabilidades de que dos personas cumplan el mismo día debe haber AL MENOS 23 personas.

Pero lo verdaderamente interesante y curioso de todo esto es que la posibilidad supera el 99 % cuando en la fiesta hay 57 personas o más.

La «paradoja» no es más que la contraintuición. ¿Cómo es posible que tan solo entre 23 personas, que pueden cumplir en 365 días diferentes, haya un 50 % de probabilidades de que dos cumplan el mismo día?

La clave para entender la solución de este problema es intentar razonarlo a la inversa, calculando primero cuál es la probabilidad de que NINGUNA persona de la fiesta cumpla años el mismo día que otra.

Una vez calculada esa probabilidad de no coincidir, para resolver el problema del cumpleaños nada más hace falta hallar su complementario.

5.-Paradoja de los dos sobres

Una persona participa en un concurso donde le ofrecen elegir entre dos cajas. Ambas contienen dinero y se sabe que una tiene el doble de dinero que la otra. La paradoja que se plantea es la siguiente: supongamos que una de las cajas contiene una cantidad x. Entonces la otra caja puede tener o bien 2x o bien x/2.

Como una cosa es igual de probable que la otra, la esperanza matemática de la cantidad que contiene la otra caja es 0,5*2x + 0,5*x/2 = 1,25x Esto es más que x, luego al concursante le vendría bien elegir la otra caja. ¡Pero el razonamiento puede hacerse exactamente igual con la otra caja! ¿Dónde está el fallo? Esta es una de esas paradojas sobre las que es difícil que la gente se ponga de acuerdo y existen numerosas teorías sobre su explicación.

6.-Sorteo en programa de televisión

El siguiente dilema es bastante popular pero no por ello menos enigmático: Dos programas de televisión sortean un gran premio. En el primero de los programas, hay 3 puertas cerradas. Detrás de una de ellas está el premio; detrás de las otras dos no hay nada. Tenemos la opción de elegir una puerta. Si aparece el premio, es nuestro. Si detrás de la puerta elegida no hay nada no ganamos nada. Así, la probabilidad de ganar es, claro está, 1/3. El otro programa tiene un mecanismo diferente. Nuevamente hay 3 puertas y sólo una es la que contiene el premio. Elegimos una de las puertas y enseguida el presentador del programa elige una de las 2 restantes. Nos dan entonces la siguiente opción: podemos quedarnos con la elección original o bien cambiar la decisión y pasar a la puerta que el presentador dejó libre. Hecha esta 2ª elección, ya no tenemos más oportunidades; abrimos la puerta elegida y sabremos si hemos ganado o perdido. Lo que sí sabemos es que el presentador adopta el siguiente criterio: Si en 1ª instancia elegimos la puerta correcta, entonces el presentador elige al azar entre alguna de las otras 2. Si en primera instancia elegimos una puerta incorrecta, entonces se para delante de la otra y nos deja libre la puerta ganadora. Desde luego esta decisión la toma el presentador sin que sepamos si nosotros elegimos (en primera instancia) la puerta correcta o no.
Evidentemente, el dilema a resolver es: ¿En qué programa conviene participar? ¿Es indistinto? Si uno participa en el segundo programa, ¿qué estrategia conviene adoptar? ¿Conviene conservar la decisión original o conviene cambiarla? ¿Es indistinto? La respuesta a este dilema es que conviene participar en el 2º programa y siempre optar por escoger la puerta que dejó libre el presentador. En este caso tendrá el doble de opciones de ganar que en el 1er programa.

Veámoslo: Como ya se ha comentado, la probabilidad de escoger la puerta correcta en el primer intento es igual a 1/3. Por lo tanto la probabilidad de que la puerta correcta sea una de las restantes es igual a 2/3; que es igual a la probabilidad de que el presentador le deje libre la puerta ganadora. O sea, que si siempre se cambia de puerta la probabilidad de éxito es de 2/3 (el doble que en el primer programa)

7.-Miedo a viajar en los aviones,

Un hombre que viajaba mucho estaba preocupado por la posibilidad de que hubiese una bomba en su avión. Calculó la probabilidad de que así fuese y, aunque ésta era baja, no era lo suficiente para dejarlo tranquilo. Desde entonces lleva una bomba en su maleta. Según él, la probabilidad de que haya dos bombas a bordo es infinitesimal.

8.-Probabilidades de las distintas loterías nacionales.

 La Primitiva y la Bono Loto :1 entre 13.983.816 **0,0000072%**

 El Gordo de la Primitiva :1 entre 31.625.100 **0,0000032%**

 Euromillones :1 entre 76.275.360 **,0000013%**

 Lotería Nacional : 1 entre 600.000(Jueves) **0,0001667%.** 1 entre 85.000(Navidad) **0,0011765%**

 La Quiniela y el Quinigol : 1 entre 4.782.969 **0,0000209%**

 Hípica nacional : 1 entre 8.835.372 (Lototurf) **0,0000113%**. 1 entre 60.080.000 (Quíntuple Plus) **0,0000017%**

 Cupón Once : 1 entre 15 millones **0,0000067%**


 El Combo de la Once :1 entre 15 millones **0,0000067%**

Esperanza matemática de las Loterías:

Las probabilidades de las loterías por si mismas son irrelevantes. Lo que realmente importa es: la esperanza matemática del juego. Casi siempre, cualquier juego real de apuestas tiene esperanza menor que 1: lo más probable es perder dinero y es por eso que dicen que las loterías son un impuesto del gobierno al desconocimiento de las matemáticas.

Juego de Azar	Probabilidad de 1 entre	Probabilidad (%)
Décimo Lotería Navidad	**85.000**	0,0011765%
Décimo Lotería Nacional	**600.000**	0,0001667%
Quieniela /Quinigol	**4.782.969**	0,0000209%
Lototurf	**8.835.372**	0,0000113%
Primitiva/Bono Loto	**13.983.816**	0,0000072%
ONCE	**15.000.000**	0,0000067%
Combo de la Once	**15.000.000**	0,0000067%
El Gordo de la Primitiva	**31.625.100**	0,0000032%
Quintuple Plus	**60.080.000**	0,0000017%
Euromillones	**76.275.360**	0,0000013%

¿Qué lotería es más probable que toque?



El 63,8% de la población mayor de edad de España juega a algún tipo de juego de azar



PROBABILIDAD

Lotería Navidad
0,0011765%

Lotería Nacional
0,0001667%

Quiniela
0,0000209%

Lototurf
0,0000113%

Primitiva
0,0000072%

ONCE
0,0000067%

Quintuple Plus
0,0000017%

Euromillones
0,0000013%



Existe un 20% de probabilidades de morir de un ataque al corazon



Existe un 0,02033% de probabilidades de morir de un accidente de bicicleta




Existe un 0,00125% de probabilidades de morir ahogado en una piscina



Existe un 0,00125% de probabilidades de morir alcanzado por un rayo

Todas tienen una probabilidad mayor que los juegos de azar



Estadística y Probabilidad

Libro de Ejercicios Resueltos

> "El día que dejes de aprender matemáticas será el día en que el universo deje de hablarte."

"Now I am become Death, the destroyer of worlds"
— citando el Bhagavad Gita tras el primer ensayo nuclear



J. Robert Oppenheimer (1904–1967)

Matemáticas · Educación Secundaria y Bachillerato

Soluciones paso a paso · Ilustraciones · Tablas

📋 ÍNDICE DE EJERCICIOS

CAPÍTULO I — ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

1 Población, Muestra y Variable

2 Estudio por Muestra vs Estudio Total

3 Clasificación de Variables

4 Tabla de frecuencias – calificaciones

5 Tabla estadística – número de hijos

6 Tabla estadística – notas de clase

7 Frecuencia acumulada e interpretación

8 Datos agrupados – Estaturas

9 Media Aritmética – datos sin agrupar

10 Media, Moda y Mediana

11 Media con frecuencias

12 Mediana con tabla de frecuencias

13 Moda, Media y Mediana completas

14 Media ponderada

15 Rango y Recorrido

16 Desviación media

17 Varianza y Desviación Típica

18 Coeficiente de Variación

19 Cuartiles

20 Media de datos agrupados

21 Varianza de datos agrupados

22 Diagrama de caja (Boxplot)

23 Percentiles

24 Media Moda Mediana – Nº45

25 Puntuación ponderada – atletismo

26 Desviación típica con tabla

27 Interpretación de la desviación típica
28 Media de datos agrupados – notas
29 Mediana de datos agrupados
30 Moda de datos agrupados
31 Histograma y polígono de frecuencias
32 Ojiva o curva acumulada
33 Tipificación – Puntuación Z
34 Diagrama de tallo y hojas
35 Asimetría e interpretación
36 Temperatura media mensual
37 Nota media del grupo
38 Comparación de dos grupos
39 Estadísticos con tabla de frecuencias
40 Datos temperatura – tabla completa
41 Velocidades – tabla e histograma
42 Desviación típica de velocidades
43 Mediana de velocidades
44 Tabla estadística datos continuos
45 Media Moda Mediana Nº45
46 Puntuación ponderada atletismo
47 Recorrido intercuartílico y outliers
48 Correlación lineal Pearson
49 Recta de regresión
50 Resumen estadístico completo

CAPÍTULO II — PROBABILIDAD

P1 Espacio muestral – moneda
P2 Probabilidad clásica – dados
P3 Suceso complementario
P4 Unión de sucesos
P5 Sucesos incompatibles
P6 Probabilidad condicionada
P7 Sucesos independientes

P8 Regla del producto – dep.

P9 Diagrama de árbol

P10 Prob. total

P11 Teorema de Bayes

P12 Permutaciones

P13 Permutaciones con repetición

P14 Variaciones sin repetición

P15 Combinaciones

P16 Prob. con combinaciones

P17 Distribución Binomial

P18 Binomial – varios valores

P19 Media y varianza binomial

P20 Distribución de Poisson

P21 Normal – tablas Z

P22 Normal – P(X>a)

P23 Normal – percentil inverso

P24 Probabilidad – baraja

P25 Espacio muestral – 2 dados

P26 Combinatoria – comités

P27 Variable aleatoria discreta

P28 Esperanza matemática

P29 Probabilidad frecuencial

P30 Probabilidad geométrica

P31 Ley de los Grandes Números

P32 Tabla de contingencia


P33 Binomial acumulada

P34 Paradoja del cumpleaños

P35 Normal – aplicación práctica

📊 Capítulo I — Estadística Descriptiva

Organización, representación y análisis de datos estadísticos: tablas de frecuencias, medidas de centralización (media, moda, mediana), medidas de dispersión (varianza, desviación típica), gráficos estadísticos y datos agrupados.



Nº1 Población, Muestra y Variable

En un estudio sobre la edad a la que se caen los dientes de leche se escogieron 50 niños de Valladolid.
Determina: a) La población. b) La muestra y su tamaño. c) Los individuos. d) La variable estadística.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

a) Población

La **población** es el conjunto total de todos los elementos sobre los que se quiere obtener información. En este caso: todos los niños de Valladolid.

b) Muestra y tamaño

La **muestra** es el subconjunto de la población realmente estudiado: los 50 niños seleccionados. El **tamaño muestral** es n = 50.

c) Individuos

Cada uno de los 50 niños que forman parte del estudio.

d) Variable estadística

La **variable estadística** es el dato que se mide en cada individuo: la edad (en meses o años) a la que se cae cada diente de leche. Es una variable **cuantitativa continua**.

✓ Población: todos los niños de Valladolid | Muestra: 50 niños | Variable: edad de caída del diente




Diagrama de Sectores

Nº2 Estudio por Muestra vs Estudio Total

Señala en qué caso es más conveniente estudiar la población completa y en cuál la muestra:
a) El número de páginas de los libros de la biblioteca del instituto.
b) La resistencia de los ladrillos de una carga.
c) El número de hermanos de los alumnos del instituto.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

a) Libros de la biblioteca

Es conveniente estudiar la **población completa**, pues todos los libros están disponibles, es fácil contabilizarlos y no se destruyen en la medición.

b) Resistencia de ladrillos

Aquí se debe usar una **muestra**: el ensayo de resistencia implica romper el ladrillo (es destructivo), por lo que sería imposible comercializar el producto si se analizaran todos.

c) Número de hermanos

Se puede estudiar la **población completa** ya que el conjunto de alumnos del instituto es finito, accesible y la recogida de datos no es destructiva.

✓ a) Población completa | b) Muestra (ensayo destructivo) | c) Población completa

Nº3 Clasificación de Variables

Señala si las siguientes variables son cualitativas, cuantitativas discretas o cuantitativas continuas:
a) Número de hermanos. b) Color de ojos. c) Temperatura. d) Talla de zapato.
e) Calificación escolar (Suspenso, Aprobado, Notable, Sobresaliente). f) Longitud de un río.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Definiciones previas

Cualitativa: no numérica (categorías). **Cuantitativa discreta**: numérica, valores aislados (contables). **Cuantitativa continua**: numérica, puede tomar cualquier valor en un intervalo.

a) Número de hermanos

Es un recuento entero → **Cuantitativa discreta**.

b) Color de ojos

No es numérica, son categorías (azul, marrón…) → **Cualitativa**.

c) Temperatura

Puede tomar cualquier valor decimal → **Cuantitativa continua**.

d) Talla de zapato

Aunque parece discreta, en España los valores son números enteros o medios estándar. Se considera **cuantitativa discreta**.

e) Calificación escolar

Son categorías ordenadas pero no numéricas → **Cualitativa ordinal**.

f) Longitud de un río

Medida continua → **Cuantitativa continua**.

✓ a) Q.Discreta | b) Cualitativa | c) Q.Continua | d) Q.Discreta | e) Cualitativa | f) Q.Continua

Nº4 Tabla de frecuencias – calificaciones

Las calificaciones obtenidas por un grupo de alumnos en un examen de Matemáticas han sido:
5 3 7 6 4 8 5 6 7 5 4 3 6 7 8 5 6 4 5 7
Construye la tabla estadística con: xi, fi, hi, Fi, Hi

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Paso 1: Ordenar y contar

Identificamos los valores distintos (xi) y contamos cuántas veces aparece cada uno (fi).

```
xi = 3 → aparece 2 veces
xi = 4 → aparece 3 veces
xi = 5 → aparece 5 veces
xi = 6 → aparece 4 veces
xi = 7 → aparece 4 veces
xi = 8 → aparece 2 veces
TOTAL n = 20
```

Paso 2: Frecuencia relativa

hi = fi / n


```
h(3) = 2/20 = 0,10    h(4) = 3/20 = 0,15    h(5) = 5/20 = 0,25
h(6) = 4/20 = 0,20    h(7) = 4/20 = 0,20    h(8) = 2/20 = 0,10
```

Paso 3: Frecuencias acumuladas

Fi = suma de fi hasta xi | Hi = suma de hi hasta xi

xi	fi	hi	Fi	Hi
3	2	0,10	2	0,10
4	3	0,15	5	0,25
5	5	0,25	10	0,50
6	4	0,20	14	0,70
7	4	0,20	18	0,90
8	2	0,10	20	1,00
Σ	20	1,00	—	—

✓ Tabla completada: n=20, 6 valores distintos



Nº5 Tabla estadística – número de hijos

En una encuesta realizada a 30 familias de un barrio, el número de hijos fue:
2 1 0 3 2 1 2 0 1 2 3 2 1 2 1 0 2 3 1 2 2 1 3 2 1 2 0 1 2 1
Construye la tabla estadística completa.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Paso 1: Recuento de valores

```
xi=0 → 4 veces  |  xi=1 → 10 veces  |  xi=2 → 12 veces  |  xi=3 → 4 veces
TOTAL n = 30
```

Paso 2: Cálculo de todas las frecuencias

hi=fi/30, Fi=acumulada absoluta, Hi=acumulada relativa

xi	fi	hi	hi (%)	Fi	Hi
0	4	4/30 ≈ 0,133	13,3%	4	0,133
1	10	10/30 ≈ 0,333	33,3%	14	0,467
2	12	12/30 = 0,400	40,0%	26	0,867
3	4	4/30 ≈ 0,133	13,3%	30	1,000
Σ	30	1,000	100%	—	—

✓ **Moda = 2 hijos (mayor frecuencia fi=12)**

Nº6 Tabla estadística – notas de clase

Se tienen las notas de 25 alumnos:
6 7 5 8 6 7 9 5 6 7 8 6 5 7 6 8 7 5 6 9 7 6 5 8 7
Construye la tabla estadística.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Recuento

```
xi=5 → 5 veces  |  xi=6 → 7 veces  |  xi=7 → 7 veces
xi=8 → 4 veces  |  xi=9 → 2 veces    |  n=25
```

xi	fi	hi	Fi	Hi
5	5	0,20	5	0,20
6	7	0,28	12	0,48
7	7	0,28	19	0,76
8	4	0,16	23	0,92
9	2	0,08	25	1,00
Σ	25	1,00	—	—

✓ **Moda = 6 y 7 (distribución bimodal)**

Nº7 Frecuencia acumulada e interpretación

Dada la tabla de frecuencias de una variable X:
xi: 1, 2, 3, 4, 5 | fi: 3, 7, 12, 5, 3 (n=30)

a) Completa la tabla con hi, Fi, Hi.

b) ¿Cuántos datos son menores o iguales que 3?

c) ¿Qué porcentaje de datos es mayor que 3?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

a) Completar tabla

xi	fi	hi	Fi	Hi
1	3	0,10	3	0,10
2	7	0,233	10	0,333
3	12	0,400	22	0,733
4	5	0,167	27	0,900
5	3	0,100	30	1,000
Σ	30	1,000	—	—

b) Datos ≤ 3

F(3) = 22 datos son menores o iguales que 3.

c) Datos > 3

P(X>3) = 1 − H(3) = 1 − 0,733 = 0,267 → 26,7% de los datos son mayores que 3.

✓ F(3)=22 datos | 26,7% son mayores que 3

Nº8 Datos agrupados – Estaturas

Las estaturas (en cm) de 40 alumnos son:

[150-155): 3 [155-160): 8 [160-165): 14 [165-170): 10 [170-175): 5

Construye: a) Tabla estadística completa. b) Histograma.


✎ SOLUCIÓN COMPLETA

a) Tabla completa con marca de clase xi = (Li+Ls)/2

Intervalo	xi	fi	hi	Fi	Hi
[150,155)	152,5	3	0,075	3	0,075
[155,160)	157,5	8	0,200	11	0,275
[160,165)	162,5	14	0,350	25	0,625
[165,170)	167,5	10	0,250	35	0,875
[170,175)	172,5	5	0,125	40	1,000
Σ	—	40	1,000	—	—

b) Histograma

Cada intervalo forma una barra de anchura 5 cm y altura proporcional a fi o hi. La barra más alta corresponde al intervalo [160,165) con fi=14.



✓ Clase modal: [160-165) con fi=14

Nº9 Media Aritmética – datos sin agrupar

Calcula la media aritmética del conjunto: 4, 7, 3, 9, 5, 6, 8, 3, 7, 8

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Fórmula

La media aritmética es: $\bar{x} = (\Sigma xi) / n$


Suma de todos los valores

$\bar{x} = (4+7+3+9+5+6+8+3+7+8) / 10$

```
Suma = 4+7 = 11
11+3 = 14
14+9 = 23
23+5 = 28
28+6 = 34
34+8 = 42
42+3 = 45
45+7 = 52
52+8 = 60

x̄ = 60 / 10 = 6
```

✓ $\bar{x} = 6$



Nº10 Media, Moda y Mediana

Para los datos: 3, 5, 7, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 14

Calcula: a) Media aritmética. b) Moda. c) Mediana.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

a) Media aritmética

$\bar{x} = \Sigma xi / n$

```
Suma = 3+5+7+7+8+9+11+12+12+14 = 88
x̄ = 88/10 = 8,8
```

b) Moda

El valor que más se repite. Los valores 7 y 12 aparecen 2 veces cada uno.

```
Mo = 7 y 12 (distribución bimodal)
```

c) Mediana (n=10, par)

Ordenamos los datos (ya ordenados). La mediana está entre el dato 5º y 6º:

```
Dato 5º = 8,   Dato 6º = 9
Me = (8 + 9) / 2 = 17/2 = 8,5
```

✓ x̄ = 8,8 | Mo = 7 y 12 | Me = 8,5

Nº11 Media con frecuencias

Dada la tabla: xi: 1,2,3,4,5 | fi: 4,7,9,6,4 (n=30)
Calcula la media aritmética.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Fórmula con frecuencias

$\bar{x} = \Sigma(x_i \cdot f_i) / n$

Productos xi·fi

```
1·4 = 4
2·7 = 14
3·9 = 27
4·6 = 24
```

```
5·4 = 20
Σ(xi·fi) = 4+14+27+24+20 = 89
```

```
x̄ = 89 / 30 = 2,967 ≈ 2,97
```

✓ $\bar{x} \approx 2{,}97$

Nº12 Mediana con tabla de frecuencias

Dada la tabla del ejercicio anterior (xi: 1,2,3,4,5 | fi: 4,7,9,6,4 | n=30):
Calcula la mediana.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Regla para encontrar la mediana

La mediana es el valor xi tal que Fi ≥ n/2 por primera vez. n/2 = 30/2 = 15.

Frecuencias acumuladas

```
F(1) = 4      < 15
F(2) = 4+7 = 11  < 15
F(3) = 11+9 = 20 ≥ 15 ← primer valor que supera 15
```

Conclusión

El dato central está en xi = 3.

✓ Mediana = 3

Nº13 Moda, Media y Mediana completas

Los datos son: 2, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9
Calcula: a) Moda. b) Media. c) Mediana.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

a) Moda

El valor que más se repite es 6 (aparece 3 veces).

```
Mo = 6
```

b) Media

```
Suma = 2+4+4+5+6+6+6+7+8+9 = 57
x̄ = 57/10 = 5,7
```

c) Mediana (n=10, par)

Datos ya ordenados. Entre el 5º (=6) y 6º (=6):

```
Me = (6+6)/2 = 6
```

✓ Mo=6 | x̄=5,7 | Me=6

Nº14 Media ponderada

Para hallar la nota final se pondera: Examen parcial (peso 2), Examen final (peso 3), Trabajos (peso 1).
Un alumno sacó: Parcial=6, Final=7, Trabajos=8. ¿Cuál es su nota final?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Fórmula de la media ponderada

$\bar{x}_p = \Sigma(x_i \cdot w_i) / \Sigma w_i$

```
Σ(xi·wi) = 6·2 + 7·3 + 8·1 = 12 + 21 + 8 = 41
Σwi = 2+3+1 = 6
x̄_p = 41/6 ≈ 6,833
```

✓ **Nota final ≈ 6,83**

Nº15 Rango y Recorrido

Para los datos: 12, 7, 25, 18, 3, 30, 22, 15
Calcula el recorrido (rango).

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Definición

El **recorrido o rango** es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la distribución.

```
Valor máximo = 30
Valor mínimo = 3
Recorrido = 30 − 3 = 27
```

✓ **Recorrido = 27**

Nº16 Desviación media o desviación absoluta media

Para los datos: 2, 4, 6, 8, 10. Calcula la desviación media.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Paso 1: Calcular la media

$\bar{x} = (2+4+6+8+10)/5 = 30/5 = 6$

Paso 2: Calcular desviaciones absolutas $|x_i - \bar{x}|$

$|2-6| = 4$
$|4-6| = 2$
$|6-6| = 0$
$|8-6| = 2$
$|10-6| = 4$

Paso 3: Desviación media

$DM = \Sigma|x_i-\bar{x}| / n$

$DM = (4+2+0+2+4)/5 = 12/5 = 2,4$

✓ **Desviación media = 2,4**

Nº17 Varianza y Desviación Típica

Calcula la varianza y la desviación típica de: 3, 5, 7, 9, 11

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Paso 1: Media

$\bar{x} = (3+5+7+9+11)/5 = 35/5 = 7$

Paso 2: Desviaciones al cuadrado $(x_i-\bar{x})^2$

$(3-7)^2 = (-4)^2 = 16$
$(5-7)^2 = (-2)^2 = 4$
$(7-7)^2 = (0)^2 = 0$
$(9-7)^2 = (2)^2 = 4$
$(11-7)^2 = (4)^2 = 16$

Paso 3: Varianza

$\sigma^2 = \Sigma(xi - \bar{x})^2 / n$

```
σ² = (16+4+0+4+16)/5 = 40/5 = 8
```

Paso 4: Desviación típica

$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}828$

✓ σ² = 8 | σ ≈ 2,83

Nº18 Coeficiente de Variación

Dos grupos tienen: Grupo A: $\bar{x}=50$, $\sigma=5$ | Grupo B: $\bar{x}=200$, $\sigma=15$
¿Cuál es más homogéneo?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Coeficiente de variación CV = (σ/x̄)·100

Permite comparar la dispersión relativa entre conjuntos con medias diferentes.

```
CV_A = (5/50)·100 = 10%
CV_B = (15/200)·100 = 7,5%
```

Interpretación

El Grupo B tiene menor CV, lo que indica mayor homogeneidad relativa.

✓ Grupo B es más homogéneo (CV_B = 7,5% < CV_A = 10%)

Nº19 Cuartiles

Para los datos ordenados: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18
Calcula Q1, Q2 (mediana) y Q3.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

n=10 datos

Fórmulas: Q1 está en posición (n+1)/4, Q2 en (n+1)/2, Q3 en 3(n+1)/4

```
Posición Q1 = (10+1)/4 = 2,75 → entre dato 2º y 3º
Q1 = 4 + 0,75·(5−4) = 4 + 0,75 = 4,75


Posición Q2 = (10+1)/2 = 5,5 → entre dato 5º y 6º
Q2 = (8+9)/2 = 8,5

Posición Q3 = 3·(10+1)/4 = 8,25 → entre dato 8º y 9º
Q3 = 12 + 0,25·(15−12) = 12 + 0,75 = 12,75
```

Rango intercuartílico

IQR = Q3 − Q1 = 12,75 − 4,75 = 8

✓ Q1=4,75 | Q2=8,5 | Q3=12,75 | IQR=8



Nº20 Datos agrupados – Media

Intervalos de tiempos (minutos): [0,10): fi=5 | [10,20): fi=12 | [20,30): fi=18 | [30,40): fi=10 | [40,50): fi=5
Calcula la media aritmética.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Marca de clase xi = (Li+Ls)/2

```
[0,10)  → x1=5
[10,20) → x2=15
[20,30) → x3=25
[30,40) → x4=35
[40,50) → x5=45
n = 5+12+18+10+5 = 50
```

Media = Σ(xi·fi)/n

```
5·5   = 25
15·12 = 180
25·18 = 450
35·10 = 350
45·5  = 225
Σ = 25+180+450+350+225 = 1230
x̄ = 1230/50 = 24,6 minutos
```

✓ **x̄ = 24,6 minutos**

Nº21 Varianza de datos agrupados

Con la tabla del ejercicio anterior ([0-50) minutos, n=50), x̄=24,6.
Calcula la varianza σ² y la desviación típica σ.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Fórmula

$\sigma^2 = \Sigma\ f_i \cdot (x_i - \bar{x})^2 / n$

```
x̄ = 24,6
(5−24,6)²   = (−19,6)² = 384,16  →  5·384,16  = 1920,80
(15−24,6)²  = (−9,6)²  = 92,16   → 12·92,16   = 1105,92
(25−24,6)²  = (0,4)²   = 0,16    → 18·0,16    = 2,88
(35−24,6)²  = (10,4)²  = 108,16  → 10·108,16  = 1081,60
(45−24,6)²  = (20,4)²  = 416,16  →  5·416,16  = 2080,80

Σ fi·(xi−x̄)² = 1920,80+1105,92+2,88+1081,60+2080,80 =
6192,00
σ² = 6192,00 / 50 = 123,84
σ = √123,84 ≈ 11,13 minutos
```

✓ σ² = 123,84 | σ ≈ 11,13 minutos

Nº22 Diagrama de caja (Boxplot)

Con los cuartiles del ejercicio 19: Q1=4,75, Q2=8,5, Q3=12,75, Min=2, Max=18.

Describe e interpreta el diagrama de caja.


✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Elementos del boxplot

```
Bigote izquierdo: de Min=2 hasta Q1=4,75
Caja: de Q1=4,75 hasta Q3=12,75
Mediana (Q2=8,5): línea dentro de la caja
Bigote derecho: de Q3=12,75 hasta Max=18
IQR = Q3−Q1 = 12,75−4,75 = 8
```

Interpretación

La caja contiene el 50% central de los datos. La mediana (8,5) está ligeramente más cercana a Q1, indicando ligera asimetría positiva.



✓ IQR=8 | Distribución con leve asimetría positiva

Nº23 Percentiles

Para los datos ordenados (n=20): calcula el percentil 25 (P25), P50 y P75.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Definición

El percentil Pk es el valor por debajo del cual cae el k% de los datos.

Fórmula de posición

L = k·n/100

```
P25: L = 25·20/100 = 5  → Si L es entero, P25 = (dato_5 + dato_6)/2
P50: L = 50·20/100 = 10 → P50 = (dato_10 + dato_11)/2  (= mediana)
P75: L = 75·20/100 = 15 → P75 = (dato_15 + dato_16)/2
```

Relación con cuartiles

P25 = Q1, P50 = Q2 (mediana), P75 = Q3

✓ P25=Q1 | P50=Q2=Mediana | P75=Q3

Nº24 Media, Mediana y Moda del ejercicio Nº45

Calcula la media aritmética, la moda y la mediana de este conjunto de datos:
1 2 1 5 1 0 1 2 3 2 1 2 1 3 1 2 2 4 2 2 0 2 2 1 2 1 2 0

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Paso 1: Recuento

n = 28 datos

```
xi=0 → 3 veces
xi=1 → 9 veces
xi=2 → 12 veces
xi=3 → 2 veces
xi=4 → 1 vez
xi=5 → 1 vez
n = 3+9+12+2+1+1 = 28
```

Moda

El valor más frecuente: fi=12 para xi=2

```
Mo = 2
```

Media

$\bar{x} = \Sigma(xi \cdot fi)/n$

```
0·3 + 1·9 + 2·12 + 3·2 + 4·1 + 5·1
= 0 + 9 + 24 + 6 + 4 + 5 = 48
x̄ = 48/28 = 12/7 ≈ 1,714
```

Mediana (n=28, par)

n/2=14. F(1)=3+9=12 < 14. F(2)=12+12=24 ≥ 14.

```
Me = 2
```

✓ $\bar{x} \approx 1{,}71$ | Mo = 2 | Me = 2

Nº25 Puntuación ponderada – atletismo (Nº46)

Para hallar la puntuación final se multiplica por 3 el resultado de la primera marca,
por 2 el de la segunda y por 1 el de la tercera. Un atleta obtuvo: 8, 6, 9.
¿Cuál es su puntuación final?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Media ponderada

```
Numerador = 8·3 + 6·2 + 9·1 = 24 + 12 + 9 = 45
Denominador = 3+2+1 = 6
Puntuación = 45/6 = 7,5
```

✓ **Puntuación final = 7,5**

Nº26 Desviación típica con tabla de frecuencias

Datos: xi: 10,20,30,40,50 | fi: 3,5,8,4,2 (n=22). Calcula σ.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Media

```
Σ(xi·fi) = 10·3+20·5+30·8+40·4+50·2
= 30+100+240+160+100 = 630
x̄ = 630/22 ≈ 28,636
```

Varianza

$\sigma^2 = \Sigma fi \cdot (xi - \bar{x})^2 / n$

```
(10−28,636)²·3 = 347,09·3  = 1041,27
(20−28,636)²·5 = 74,60·5   = 373,00
(30−28,636)²·8 = 1,86·8    = 14,88
(40−28,636)²·4 = 129,18·4  = 516,72
(50−28,636)²·2 = 456,36·2  = 912,72
Σ = 2858,59
σ² = 2858,59/22 ≈ 129,94
σ ≈ 11,40
```

✓ σ ≈ 11,40

Nº27 Interpretación de la desviación típica

Dos clases obtuvieron en un examen:
Clase A: $\bar{x}=6$, $\sigma=2$ | Clase B: $\bar{x}=6$, $\sigma=0{,}5$
¿Qué clase tiene resultados más homogéneos?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Comparación

Ambas clases tienen la misma media ($\bar{x}=6$), pero diferente dispersión.

```
CV_A = (2/6)·100 = 33,3%
CV_B = (0,5/6)·100 = 8,3%
```

Conclusión

La Clase B tiene σ mucho menor → resultados más uniformes y homogéneos. En la Clase A hay mayor variabilidad: algunos alumnos tienen notas muy altas y otros muy bajas.

✓ Clase B es más homogénea (σ_B=0,5 << σ_A=2)

Nº28 Media de datos agrupados – notas de examen

Intervalos de nota: [3,5): fi=4 | [5,6): fi=8 | [6,7): fi=12 | [7,8): fi=10 | [8,10): fi=6 | n=40
Calcula la media.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Marcas de clase

xi = punto medio de cada intervalo

```
[3,5) → x1=4,  fi=4:  4·4  = 16
[5,6) → x2=5,5, fi=8:  5,5·8 = 44
[6,7) → x3=6,5, fi=12: 6,5·12= 78
[7,8) → x4=7,5, fi=10: 7,5·10= 75
[8,10)→ x5=9,  fi=6:   9·6   = 54
Σ = 16+44+78+75+54 = 267
x̄ = 267/40 = 6,675
```

✓ $\bar{x} = 6{,}675$

Nº29 Mediana de datos agrupados

Con la tabla del ejercicio 28, calcula la mediana.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Frecuencias acumuladas

```
[3,5):  F1=4
[5,6):  F2=12
[6,7):  F3=24  ← aquí supera n/2=20 por primera vez
```

Fórmula de la mediana interpolada

Me = Li + [(n/2 − Fi−1) / fi] · a, donde a=amplitud del intervalo

```
Li = 6  (límite inferior del intervalo mediano)
n/2 = 20
Fi−1 = 12  (acumulada anterior)
fi = 12  (frecuencia del intervalo)
a = 1

Me = 6 + [(20−12)/12]·1 = 6 + 8/12 = 6 + 0,667 = 6,667
```

✓ **Mediana ≈ 6,67**

Nº30 Moda de datos agrupados

Con la misma tabla, calcula la moda.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Clase modal

La clase con mayor frecuencia es [6,7) con fi=12.

Fórmula de la moda de Pearson

Mo ≈ Li + [d1/(d1+d2)]·a

```
d1 = fi − fi−1 = 12 − 8 = 4   (diferencia con clase
anterior)
d2 = fi − fi+1 = 12 − 10 = 2  (diferencia con clase
siguiente)
Li = 6,  a = 1

Mo = 6 + [4/(4+2)]·1 = 6 + 4/6 = 6 + 0,667 = 6,667
```

✓ Moda ≈ 6,67

Nº31 Histograma y polígono de frecuencias

Peso (kg) de 50 personas: [50,60): 8 | [60,70): 15 | [70,80): 18 | [80,90): 7 | [90,100): 2
Describe cómo construir el histograma y el polígono de frecuencias.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA


Histograma

Se dibuja un rectángulo por cada intervalo. La base coincide con la amplitud del intervalo (10 kg) y la altura con la frecuencia fi.

Intervalo	xi	fi	hi
[50,60)	55	8	0,16
[60,70)	65	15	0,30
[70,80)	75	18	0,36
[80,90)	85	7	0,14
[90,100)	95	2	0,04
Σ	—	50	1,00

Polígono de frecuencias

Se unen los puntos medios de la parte superior de cada barra con segmentos rectos. Se añaden dos intervalos ficticios con fi=0 en los extremos para cerrar el polígono.



✓ Clase modal: [70-80) | $\bar{x}$ = (55·8+65·15+75·18+85·7+95·2)/50 = 3625/50 = 72,5 kg

Nº32 Ojiva o curva de frecuencias acumuladas

Con la tabla del ejercicio anterior, construye la ojiva.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Frecuencias acumuladas (absolutas y relativas)

Intervalo	Fi	Hi
[50,60)	8	0,16
[60,70)	23	0,46
[70,80)	41	0,82
[80,90)	48	0,96
[90,100)	50	1,00

Construcción de la ojiva

Se representa la curva S que une los puntos (Ls, Fi) donde Ls es el límite superior de cada intervalo. La ojiva es una curva monótona creciente que va de 0 a n (o de 0 a 1 para la ojiva relativa).

Lectura de percentiles

La ojiva permite leer gráficamente cualquier percentil: encontrar el valor de x para el que la frecuencia acumulada es k%.

✓ La ojiva permite leer Q1 (F=12,5) en x≈63,3 | Mediana (F=25) en x≈72,2 | Q3 (F=37,5) en x≈77,1

Nº33 Tipificación de datos (Puntuación Z)

Un alumno obtuvo 75 en un examen donde $\bar{x}=65$, $\sigma=10$. Otro obtuvo 82 en otro examen donde $\bar{x}=78$, $\sigma=6$.
¿Cuál de los dos tiene mejor resultado relativo?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Puntuación Z (tipificada)

$Z = (x_i - \bar{x}) / \sigma$. Mide cuántas desviaciones típicas se aleja un dato de la media.

```
Alumno 1: Z1 = (75−65)/10 = 10/10 = 1,00
Alumno 2: Z2 = (82−78)/6  = 4/6  ≈ 0,667
```

Interpretación

El Alumno 1 se aleja 1 desviación típica por encima de la media de su grupo, mientras que el Alumno 2 sólo 0,667. Por tanto, el Alumno 1 tiene mejor resultado relativo dentro de su grupo.

✓ Alumno 1 tiene mejor rendimiento relativo (Z1=1,00 > Z2=0,667)

Nº34 Diagrama de tallo y hojas

Para los datos: 23, 25, 31, 35, 37, 42, 44, 45, 51, 53, 58, 61
Construye el diagrama de tallo y hojas e indica la mediana.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Construcción

Tallo = decenas, Hojas = unidades

```
2 | 3  5
3 | 1  5  7
4 | 2  4  5
5 | 1  3  8
6 | 1
```

Mediana (n=12, par)

Los datos 6º y 7º son: 37 y 42

```
Me = (37+42)/2 = 79/2 = 39,5
```

✓ Mediana = 39,5

Nº35 Asimetría e interpretación

Para una distribución: $\bar{x}=8$, Mo=6, Me=7,5. Determina el tipo de asimetría.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Coeficiente de asimetría de Pearson

AS = $3\cdot(\bar{x} - Me) / \sigma$ ó signo de $(\bar{x} - Mo)$

```
x̄ − Mo = 8 − 6 = +2 > 0
Mo < Me < x̄  (6 < 7,5 < 8)
```

Conclusión

Cuando $\bar{x} > Me > Mo$, la distribución presenta **asimetría positiva** (cola a la derecha): hay pocos valores muy altos que elevan la media.

✓ Distribución con asimetría positiva (sesgada a la derecha)

Nº36 Temperatura media mensual

Las temperaturas máximas diarias de un mes de 30 días fueron (°C):
18 20 22 19 21 23 25 20 19 22 21 23 24 20 19 21 22 23 25 26 20 19 21 22 23 24 25 21 20 19
Construye la tabla estadística y calcula la media.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Recuento de frecuencias

```
xi=18: 1  | xi=19: 6  | xi=20: 6  | xi=21: 6
xi=22: 5  | xi=23: 4  | xi=24: 2  | xi=25: 3
xi=26: 1  | n=34 (corrección: n=30, ajustamos)
Usando los 30 datos listados:
xi=19: fi=5  xi=20: fi=5  xi=21: fi=5  xi=22: fi=4
xi=23: fi=4
xi=24: fi=2  xi=25: fi=3  xi=26: fi=1  xi=18: fi=1
n = 1+5+5+5+4+4+2+3+1 = 30
```

Media

$\bar{x} = \Sigma(xi \cdot fi)/30$

```
18·1+19·5+20·5+21·5+22·4+23·4+24·2+25·3+26·1
= 18+95+100+105+88+92+48+75+26 = 647
x̄ = 647/30 ≈ 21,57°C
```

✓ **Temperatura media ≈ 21,6°C**

Nº37 Nota media del grupo

Las notas de un grupo de 30 alumnos son:
Suspenso (0-4): 5 alumnos | Suficiente (5): 8 | Bien (6): 7 | Notable (7-8): 7 | Sobresaliente (9-10): 3
(Usa marcas de clase: 2, 5, 6, 7,5 y 9,5) Calcula la media.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Asignación de marcas de clase

```
xi=2   (suspenso):       fi=5  →  2·5  = 10
xi=5   (suficiente):     fi=8  →  5·8  = 40
xi=6   (bien):           fi=7  →  6·7  = 42
xi=7,5 (notable):        fi=7  →  7,5·7= 52,5
xi=9,5 (sobresaliente):  fi=3  →  9,5·3= 28,5
Σ = 10+40+42+52,5+28,5 = 173
x̄ = 173/30 ≈ 5,77
```

✓ **Media del grupo ≈ 5,77**

Nº38 Comparación de dos grupos

Grupo A (n=10): 72, 65, 71, 56, 59, 63, 61, 70, 52, 49
Grupo B (n=10): 53, 93, 90, 70, 69, 68, 72, 71, 70, 71
Calcula la media y desviación típica de cada grupo y compáralos.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Grupo A – Media

```
Suma_A = 72+65+71+56+59+63+61+70+52+49 = 618
x̄_A = 618/10 = 61,8
```

Grupo A – Desviaciones

```
|72−61,8|²=105,64  |65−61,8|²=10,24  |71−61,8|²=84,64
|56−61,8|²=33,64  |59−61,8|²=7,84   |63−61,8|²=1,44
|61−61,8|²=0,64   |70−61,8|²=67,24  |52−61,8|²=96,04
|49−61,8|²=163,84
Σ(xi−x̄)² = 571,40
σ²_A = 571,40/10 = 57,14   →  σ_A ≈ 7,56
```

Grupo B – Media

```
Suma_B = 53+93+90+70+69+68+72+71+70+71 = 727
x̄_B = 727/10 = 72,7
```

Grupo B – Desviaciones

```
|53−72,7|²=388,09  |93−72,7|²=412,09  |90−72,7|²=299,29
|70−72,7|²=7,29   |69−72,7|²=13,69   |68−72,7|²=22,09
|72−72,7|²=0,49   |71−72,7|²=2,89    |70−72,7|²=7,29
|71−72,7|²=2,89
Σ(xi−x̄)² = 1156,10
σ²_B = 1156,10/10 = 115,61  →  σ_B ≈ 10,75
```

Comparación

```
Grupo A: x̄=61,8, σ≈7,56, CV=(7,56/61,8)·100≈12,2%
Grupo B: x̄=72,7, σ≈10,75, CV=(10,75/72,7)·100≈14,8%
El Grupo B tiene mayor media pero también mayor
dispersión (menos homogéneo).
```

✓ Grupo A: x̄=61,8, σ≈7,56 | Grupo B: x̄=72,7, σ≈10,75 | Grupo A más homogéneo

Nº39 Estadísticos con calculadora / hoja de cálculo

Explica el procedimiento para calcular media y desviación típica con una tabla de frecuencias.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Método sistemático

Crear columnas: xi | fi | xi·fi | $xi^2 \cdot fi$

```
xi·fi  → para la media: x̄ = Σ(xi·fi)/n
xi²·fi → para la varianza: σ² = Σ(xi²·fi)/n − x̄²
         (fórmula alternativa equivalente)
```

Fórmula alternativa de la varianza

$\sigma^2 = [\Sigma(xi^2 \cdot fi)/n] - \bar{x}^2$

Ejemplo con xi: 1,2,3 | fi: 2,5,3 (n=10)

```
xi·fi:  1·2=2, 2·5=10, 3·3=9  → Σ=21  → x̄=21/10=2,1
xi²·fi: 1·2=2, 4·5=20, 9·3=27 → Σ=49
σ² = 49/10 − (2,1)² = 4,9 − 4,41 = 0,49
σ = √0,49 = 0,7
```

✓ $\sigma^2 = \Sigma(xi^2 \cdot fi)/n - \bar{x}^2$ = método alternativo eficiente

Nº40 Datos de temperatura – tabla completa y media

Las temperaturas de 20 días fueron: 15 18 20 16 19 17 21 18 20 15 16 19 20 17 18 21 19 16 18 20

Construye tabla completa y calcula media, moda y mediana.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Recuento

```
xi=15: fi=2  xi=16: fi=3  xi=17: fi=2  xi=18: fi=4
xi=19: fi=3  xi=20: fi=4  xi=21: fi=2   n=20
```

xi	fi	hi	xi·fi	Fi
15	2	0,10	30	2
16	3	0,15	48	5
17	2	0,10	34	7
18	4	0,20	72	11
19	3	0,15	57	14
20	4	0,20	80	18
21	2	0,10	42	20
Σ	20	1,00	363	—

Media

$\bar{x} = 363/20 = 18{,}15°C$

Moda

Mo = 18 y 20 (ambas con fi=4, distribución bimodal)

Mediana (n=20 par)

n/2=10. F(17)=7 < 10. F(18)=11 ≥ 10 → Me = 18

✓ $\bar{x}$=18,15°C | Mo=18 y 20 | Me=18

Nº41 Velocidades de vehículos – tabla e histograma

Se midió la velocidad (km/h) de 40 vehículos:
[80,90): 5 | [90,100): 12 | [100,110): 15 | [110,120): 6 | [120,130): 2
Construye la tabla estadística completa y el histograma.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Tabla completa

Intervalo	xi	fi	hi	Fi	Hi
[80,90)	85	5	0,125	5	0,125
[90,100)	95	12	0,300	17	0,425
[100,110)	105	15	0,375	32	0,800
[110,120)	115	6	0,150	38	0,950
[120,130)	125	2	0,050	40	1,000
Σ	—	40	1,000	—	—


Media

$\bar{x} = (85\cdot5+95\cdot12+105\cdot15+115\cdot6+125\cdot2)/40$

```
= (425+1140+1575+690+250)/40
= 4080/40 = 102 km/h
```

Histograma

Barras de anchura 10, altura proporcional a fi



✓ x̄=102 km/h | Clase modal: [100,110)

Nº42 Desviación típica de velocidades

Con los datos del ejercicio anterior ($\bar{x}$=102 km/h), calcula la varianza y la desviación típica.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

$\sigma^2 = \Sigma f_i \cdot (x_i - \bar{x})^2 / n$

```
(85−102)²·5  = 289·5  = 1445
(95−102)²·12 = 49·12  = 588
(105−102)²·15= 9·15   = 135
(115−102)²·6 = 169·6  = 1014
(125−102)²·2 = 529·2  = 1058
Σ = 1445+588+135+1014+1058 = 4240
σ² = 4240/40 = 106
σ = √106 ≈ 10,30 km/h
```

✓ $\sigma^2 = 106$ | $\sigma \approx 10{,}30$ km/h

Nº43 Mediana de velocidades

Con los datos del ejercicio 41, calcula la mediana.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Búsqueda del intervalo mediano

n/2=20. F(90−100)=17 < 20. F(100−110)=32 ≥ 20 → Intervalo mediano: [100,110)

Fórmula de interpolación

$Me = Li + [(n/2 - Fi{-}1)/fi] \cdot a$

```
Li = 100,  n/2 = 20,  Fi−1 = 17,  fi = 15,  a = 10
Me = 100 + [(20−17)/15]·10
```

```
Me = 100 + (3/15)·10
Me = 100 + 2 = 102 km/h
```

✓ **Mediana = 102 km/h**

Nº44 Tabla estadística con datos continuos – estaturas

Estaturas (cm) de 30 estudiantes:
5,90 5,80 5,70 5,10 4,90 5,20 5,30 6,10 5,90 5,80
(Construye tabla con intervalos de amplitud 0,30 desde [4,90; 5,20))

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Intervalos propuestos

Intervalo	xi	fi	hi	Fi
[4,90;5,20)	5,05	4	0,133	4
[5,20;5,50)	5,35	7	0,233	11
[5,50;5,80)	5,65	10	0,333	21
[5,80;6,10)	5,95	7	0,233	28
[6,10;6,40)	6,25	2	0,067	30
Σ	—	30	1,000	—

Media

$\bar{x} = (5{,}05\cdot4+5{,}35\cdot7+5{,}65\cdot10+5{,}95\cdot7+6{,}25\cdot2)/30$

```
= (20,2+37,45+56,5+41,65+12,5)/30
= 168,3/30 = 5,61
```

✓ **Media ≈ 5,61 | Clase modal: [5,50;5,80)**

Nº45 Media, Moda y Mediana – datos Nº45

Datos: 1 2 1 5 1 0 1 2 3 2 1 2 1 3 / 1 2 2 4 2 2 0 2 2 1 2 1 2 0 (n=28)
Calcula la media aritmética, la moda y la mediana.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Tabla de frecuencias

```
xi=0: fi=3  | xi=1: fi=9  | xi=2: fi=12
xi=3: fi=2  | xi=4: fi=1  | xi=5: fi=1   n=28
```

Media

$\bar{x} = \Sigma(xi \cdot fi)/n$

```
Σ(xi·fi) = 0·3+1·9+2·12+3·2+4·1+5·1
= 0+9+24+6+4+5 = 48
x̄ = 48/28 ≈ 1,714
```

Moda

El valor con mayor fi es xi=2 (fi=12)

```
Mo = 2
```

Mediana (n=28 par)

n/2=14. F(1)=3+9=12 < 14. F(2)=12+12=24 ≥ 14

```
Me = 2
```

✓ $\bar{x} \approx 1{,}71$ | Mo = 2 | Me = 2

Nº46 Puntuación ponderada atletismo

Para hallar la puntuación final de una prueba de atletismo se multiplica por 3 el resultado
de la primera marca, por 2 el de la segunda y por 1 el de la tercera. Si un atleta obtiene: 1ª: 8,5 | 2ª: 7,0 | 3ª: 9,0. ¿Cuál es su puntuación final?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Media ponderada

$\bar{x}_p = \Sigma(x_i \cdot w_i) / \Sigma w_i$

```
Numerador = 8,5·3 + 7,0·2 + 9,0·1 = 25,5+14+9 = 48,5
Denominador = 3+2+1 = 6
x̄_p = 48,5/6 ≈ 8,083
```

✓ Puntuación final ≈ 8,08

Nº47 Recorrido intercuartílico y valores atípicos

Para el conjunto de datos: 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 100
Calcula Q1, Q3, IQR y determina si hay valores atípicos (outliers).

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Cuartiles (n=10)

```
Q1 = media del 2º y 3º dato = (10+12)/2 = 11
Q3 = media del 8º y 9º dato = (22+25)/2 = 23,5
IQR = Q3−Q1 = 23,5−11 = 12,5
```

Límites para outliers


Valla inferior: $Q1 - 1{,}5 \cdot IQR$ | Valla superior: $Q3 + 1{,}5 \cdot IQR$

```
Valla inferior = 11 − 1,5·12,5 = 11 − 18,75 = −7,75
Valla superior = 23,5 + 1,5·12,5 = 23,5 + 18,75 = 42,25
```

Identificación

El valor 100 supera la valla superior (42,25) → es un valor atípico (outlier)

✓ IQR=12,5 | Outlier detectado: 100 > valla superior 42,25



Nº48 Correlación lineal y diagrama de dispersión

Dado el par de variables (x,y): (1,2),(2,4),(3,5),(4,4),(5,7),(6,8),(7,9),(8,10)
¿Hay correlación lineal? Calcula el coeficiente de correlación de Pearson r.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Fórmula

$r = [n\cdot\Sigma xy - \Sigma x\cdot\Sigma y] / \sqrt{\{[n\cdot\Sigma x^2-(\Sigma x)^2]\cdot[n\cdot\Sigma y^2-(\Sigma y)^2]\}}$

```
n=8
Σx = 1+2+3+4+5+6+7+8 = 36
Σy = 2+4+5+4+7+8+9+10 = 49
Σxy = 1·2+2·4+3·5+4·4+5·7+6·8+7·9+8·10
    = 2+8+15+16+35+48+63+80 = 267
Σx² = 1+4+9+16+25+36+49+64 = 204
Σy² = 4+16+25+16+49+64+81+100 = 355
```

```
Numerador: 8·267 − 36·49 = 2136 − 1764 = 372
Factor1: 8·204 − 36² = 1632 − 1296 = 336
Factor2: 8·355 − 49² = 2840 − 2401 = 439
Denominador: √(336·439) = √147504 ≈ 384,06
r = 372/384,06 ≈ 0,969
```

Interpretación

r ≈ 0,97 indica una **correlación lineal positiva muy fuerte**.

✓ r ≈ 0,97 → correlación lineal positiva muy fuerte

Nº49 Recta de regresión

Con los datos del ejercicio anterior, calcula la recta de regresión de y sobre x.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Ecuación de la recta

y = a + b·x, donde b = pendiente, a = ordenada en el origen

```
b = [n·Σxy − Σx·Σy] / [n·Σx² − (Σx)²]
b = 372/336 ≈ 1,107

ȳ = Σy/n = 49/8 = 6,125
x̄ = Σx/n = 36/8 = 4,5

a = ȳ − b·x̄ = 6,125 − 1,107·4,5 = 6,125 − 4,982 = 1,143
```

Recta de regresión

y = 1,143 + 1,107·x

Predicción: x=9

y = 1,143 + 1,107·9 = 1,143 + 9,963 = 11,11 (aprox.)

✓ Recta: y = 1,14 + 1,11·x

Nº50 Resumen estadístico completo

Para los datos agrupados: [10,20): fi=4 | [20,30): fi=10 | [30,40): fi=16 | [40,50): fi=8 | [50,60): fi=2 | n=40
Calcula: media, varianza, desviación típica, mediana y moda.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Marcas de clase y productos

```
xi: 15, 25, 35, 45, 55
Σ(xi·fi): 15·4+25·10+35·16+45·8+55·2
= 60+250+560+360+110 = 1340
x̄ = 1340/40 = 33,5
```

Varianza

```
(15−33,5)²·4  = 342,25·4  = 1369
(25−33,5)²·10 = 72,25·10  = 722,5
(35−33,5)²·16 = 2,25·16   = 36
(45−33,5)²·8  = 132,25·8  = 1058
(55−33,5)²·2  = 462,25·2  = 924,5
Σ = 4110
σ² = 4110/40 = 102,75   σ≈10,14
```

Mediana

n/2=20. F(20−30)=14 < 20. F(30−40)=30 ≥ 20

```
Me = 30 + [(20−14)/16]·10 = 30 + 3,75 = 33,75
```

Moda

Clase modal: [30,40) con fi=16. Mo ≈ 30+[(16−10)/(16−10+16−8)]·10 = 30+4,29 = 34,29

✓ $\bar{x}=33,5$ | $\sigma^2=102,75$ | $\sigma\approx10,14$ | $Me\approx33,75$ | $Mo\approx34,29$

🎲 Capítulo II — Probabilidad

Fundamentos del cálculo de probabilidades: espacio muestral, probabilidad clásica y frecuencial, sucesos, operaciones, probabilidad condicionada, Bayes, combinatoria, distribuciones discretas (Binomial, Poisson) y continuas (Normal).



NºP1 Espacio muestral – lanzamiento de moneda

Lanzamos una moneda dos veces. Escribe el espacio muestral y los sucesos:
A = {al menos una cara}, B = {exactamente dos cruces}.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Espacio muestral

Lista todos los resultados posibles (cara=C, cruz=X):

```
Ω = {CC, CX, XC, XX}    |Ω| = 4
```

Suceso A: al menos una cara

CC tiene 2 caras, CX tiene 1, XC tiene 1, XX tiene 0

```
A = {CC, CX, XC}    |A| = 3
```

Suceso B: exactamente dos cruces

Solo XX tiene dos cruces

```
B = {XX}    |B| = 1
```

✓ |Ω|=4 | A={CC,CX,XC} | B={XX}




Diagrama de Árbol

NºP2 Probabilidad clásica – dados

Se lanza un dado de 6 caras. Calcula:

a) P(sacar un número par) b) P(sacar un número mayor que 4) c) P(sacar el 3)

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Espacio muestral

Ω = {1,2,3,4,5,6} → |Ω| = 6

a) P(par)

Favorables: {2,4,6} → |A|=3

```
P(par) = 3/6 = 1/2 = 0,5
```

b) P(>4)

Favorables: {5,6} → |B|=2

```
P(>4) = 2/6 = 1/3 ≈ 0,333
```

c) P(3)

Solo {3} → |C|=1

```
P(3) = 1/6 ≈ 0,167
```

✓ P(par)=1/2 | P(>4)=1/3 | P(3)=1/6

NºP3 Probabilidad del suceso complementario

Si P(A) = 0,35, calcula P(Ā).

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Propiedad del complementario

P(Ā) = 1 − P(A)

```
P(Ā) = 1 − 0,35 = 0,65
```

✓ P(Ā) = 0,65

NºP4 Unión de sucesos (Regla de la suma)

P(A)=0,4, P(B)=0,3, P(A∩B)=0,1. Calcula P(A∪B).

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Regla de la suma

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

```
P(A∪B) = 0,4 + 0,3 − 0,1 = 0,6
```

✓ **P(A∪B) = 0,6**

NºP5 Sucesos incompatibles

P(A)=0,3, P(B)=0,25 y A, B son sucesos incompatibles. Calcula P(A∪B) y P(A∩B).

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Sucesos incompatibles

Dos sucesos son incompatibles si no pueden ocurrir simultáneamente: $A \cap B = \emptyset \rightarrow P(A \cap B) = 0$

```
P(A∩B) = 0
P(A∪B) = P(A)+P(B)−P(A∩B) = 0,3+0,25−0 = 0,55
```

✓ **P(A∩B)=0 | P(A∪B)=0,55**

NºP6 Probabilidad condicionada

En una clase hay 30 alumnos: 18 chicos y 12 chicas. De los chicos, 10 usan gafas; de las chicas, 6 usan gafas.
Se escoge un alumno al azar. Calcula P(gafas | chico).

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Fórmula

P(A|B) = P(A∩B) / P(B)

```
P(B) = P(chico) = 18/30 = 0,6
P(A∩B) = P(gafas y chico) = 10/30 ≈ 0,333
P(gafas|chico) = (10/30)/(18/30) = 10/18 = 5/9 ≈ 0,556
```

✓ P(gafas|chico) = 5/9 ≈ 0,556

NºP7 Sucesos independientes

Se lanza una moneda y un dado. ¿Son independientes el suceso A={cara} y B={número par}?
Calcula P(A∩B) de dos formas.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Comprobación de independencia

A y B son independientes si P(A∩B) = P(A)·P(B)

```
P(A) = 1/2 = 0,5
P(B) = 3/6 = 0,5
P(A)·P(B) = 0,5·0,5 = 0,25
```

P(A∩B) directamente

A∩B = {cara y número par}: (cara,2),(cara,4),(cara,6) → 3 casos de 12 posibles

```
Ω = {(C,1),(C,2),(C,3),(C,4),(C,5),(C,6),(X,1),(X,2),(X,
3),(X,4),(X,5),(X,6)}
P(A∩B) = 3/12 = 1/4 = 0,25 = P(A)·P(B) ✓
```

✓ Son independientes | P(A∩B)=0,25

NºP8 Regla del producto – sucesos dependientes

Una urna tiene 5 bolas rojas y 3 azules. Se extraen 2 bolas sin reposición.
Calcula P(ambas rojas).

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Probabilidad compuesta sin reposición

```
1ª extracción: P(R1) = 5/8
2ª extracción (sin reposición, quedan 4R y 3A): P(R2|R1) = 4/7
P(R1∩R2) = P(R1)·P(R2|R1) = (5/8)·(4/7) = 20/56 = 5/14
```

✓ P(ambas rojas) = 5/14 ≈ 0,357

NºP9 Diagrama de árbol – dos extracciones

Con la misma urna (5R, 3A, sin reposición), calcula la probabilidad de cada resultado posible al extraer 2 bolas.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Árbol de probabilidades

Primera rama: R (5/8) o A (3/8)

```
P(RR) = 5/8 · 4/7 = 20/56 = 5/14 ≈ 0,357
P(RA) = 5/8 · 3/7 = 15/56 ≈ 0,268
P(AR) = 3/8 · 5/7 = 15/56 ≈ 0,268
P(AA) = 3/8 · 2/7 =  6/56 = 3/28 ≈ 0,107
SUMA = 20+15+15+6 = 56/56 = 1 ✓
```




Diagrama de Árbol

✓ P(RR)=5/14 | P(RA)=P(AR)=15/56 | P(AA)=3/28

NºP10 Teorema de la probabilidad total

Una fábrica tiene dos máquinas A y B. A produce el 60% y B el 40%. La tasa de defectuosos es: A→5%, B→3%.
¿Cuál es la probabilidad de que una pieza tomada al azar sea defectuosa?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Teorema de la probabilidad total

$$P(D) = P(D|A)\cdot P(A) + P(D|B)\cdot P(B)$$

```
P(A) = 0,60    P(B) = 0,40
P(D|A) = 0,05  P(D|B) = 0,03
P(D) = 0,05·0,60 + 0,03·0,40
     = 0,030 + 0,012 = 0,042
```

✓ P(defectuosa) = 0,042 = 4,2%

NºP11 Teorema de Bayes

Con los datos del ejercicio P10 (máquinas A y B), si la pieza es defectuosa,
¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada por A?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Teorema de Bayes

$P(A|D) = P(D|A) \cdot P(A) / P(D)$

```
P(D) = 0,042 (calculado antes)
P(A|D) = (0,05·0,60) / 0,042
       = 0,030 / 0,042
       = 5/7 ≈ 0,714
```

Interpretación

Si encontramos una pieza defectuosa, hay un 71,4% de probabilidad de que la haya fabricado la máquina A.

✓ P(A|D) = 5/7 ≈ 71,4%

NºP12 Permutaciones

¿De cuántas formas pueden sentarse 5 personas en 5 sillas?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Definición

Una **permutación** es una ordenación de todos los elementos.
$P(n) = n!$

```
P(5) = 5! = 5·4·3·2·1 = 120
```

✓ 120 formas diferentes

NºP13 Permutaciones con repetición

¿Cuántas palabras distintas se pueden formar con las letras de MAMÁ?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Fórmula

Si hay n elementos con repeticiones r_1, r_2..., el nº de permutaciones = n! / (r_1!·r_2!...)

```
Letras: M(×2), A(×2), n=4
Permutaciones = 4! / (2!·2!) = 24/(2·2) = 24/4 = 6
```

Las 6 palabras posibles

MAMÁ, MAAM, MAAM, AMMA, AMAM, AAMM → verificando las distintas: MAMÁ, MAÁM, MAAM, AMMA, AMAM, AAMM

✓ 6 palabras distintas

NºP14 Variaciones sin repetición

¿De cuántas formas se puede elegir un presidente, vicepresidente y secretario de entre 10 candidatos?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Variaciones sin repetición

V(n,r) = n!/(n−r)! → Importa el orden, no se repite

```
n=10, r=3
V(10,3) = 10!/(10−3)! = 10!/7! = 10·9·8 = 720
```

✓ 720 formas distintas

NºP15 Combinaciones

¿De cuántas formas se pueden elegir 3 personas de un grupo de 8 para formar un comité?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Combinaciones sin repetición

C(n,r) = n! / [r!·(n−r)!] → No importa el orden

```
C(8,3) = 8! / (3!·5!) = (8·7·6)/(3·2·1) = 336/6 = 56
```

✓ 56 comités diferentes posibles

NºP16 Probabilidad con combinaciones

Una bolsa contiene 6 bolas blancas y 4 negras. Se extraen 3 bolas al azar.
¿Cuál es la probabilidad de que las 3 sean blancas?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Espacio muestral

Total formas de elegir 3 de 10: C(10,3)

```
C(10,3) = 10!/(3!·7!) = 120
```

Casos favorables

3 bolas blancas de las 6: C(6,3)

```
C(6,3) = 6!/(3!·3!) = 20
```

Probabilidad

P = 20/120 = 1/6 ≈ 0,167

✓ P(3 blancas) = 1/6 ≈ 16,7%

NºP17 Distribución Binomial – introducción

Se lanza una moneda 4 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 caras?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Distribución Binomial

X ~ B(n,p). $P(X=k) = C(n,k)\cdot p^k\cdot(1-p)^{n-k}$

```
n=4 (intentos), p=1/2 (P(cara)), k=2
P(X=2) = C(4,2)·(1/2)²·(1/2)²
= 6·(1/4)·(1/4)
= 6·(1/16)
= 6/16 = 3/8 = 0,375
```

✓ P(X=2) = 3/8 = 0,375

NºP18 Distribución Binomial – varios valores

Un examen tipo test tiene 5 preguntas con 4 opciones cada una. Se responde al azar.
Calcula P(X=0), P(X=1), P(X≥4).

✎ **SOLUCIÓN COMPLETA**

Parámetros

n=5, p=1/4=0,25, q=3/4=0,75

P(X=0)

$$P(X=0) = C(5,0)\cdot(0,25)^0\cdot(0,75)^5 = 1\cdot1\cdot0,2373 = 0,2373$$

P(X=1)

$$P(X=1) = C(5,1)\cdot(0,25)^1\cdot(0,75)^4 = 5\cdot0,25\cdot0,3164 = 0,3955$$

P(X≥4) = P(X=4)+P(X=5)

$$P(X=4) = C(5,4)\cdot(0,25)^4\cdot(0,75)^1 = 5\cdot0,003906\cdot0,75 = 0,01465$$
$$P(X=5) = C(5,5)\cdot(0,25)^5\cdot(0,75)^0 = 1\cdot0,000977\cdot1 = 0,000977$$
$$P(X\geq4) = 0,01465+0,000977 = 0,01563$$

✓ **P(X=0)≈0,237 | P(X=1)≈0,396 | P(X≥4)≈0,016**

NºP19 Media y varianza de la distribución binomial

Para X~B(10; 0,3), calcula la media (esperanza), varianza y desviación típica.

✎ **SOLUCIÓN COMPLETA**

Fórmulas

E(X) = n·p | Var(X) = n·p·q | σ = √Var(X)

```
n=10, p=0,3, q=1−0,3=0,7
E(X) = 10·0,3 = 3
Var(X) = 10·0,3·0,7 = 2,1
σ = √2,1 ≈ 1,449
```

✓ E(X)=3 | Var(X)=2,1 | σ≈1,45

NºP20 Distribución de Poisson

En una autopista pasan de media 2 coches por minuto. Calcula la probabilidad de que en un minuto pasen exactamente 3 coches. (Usa Poisson: λ=2)

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Fórmula de Poisson

$P(X=k) = e^{-\lambda} \cdot \lambda^k / k!$

```
λ=2, k=3, e⁻² ≈ 0,1353
P(X=3) = e⁻² · 2³ / 3!
= 0,1353 · 8 / 6
= 1,0824 / 6
≈ 0,1804
```

✓ P(X=3) ≈ 0,180 = 18,0%

NºP21 Distribución Normal – tablas Z

X sigue una distribución normal con μ=70 y σ=10. Calcula P(60 < X < 80).

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Tipificar

Z = (X−μ)/σ

```
Z1 = (60−70)/10 = −1
Z2 = (80−70)/10 = +1
```


P(−1 < Z < 1)

Usando tablas de la normal estándar:

```
Φ(1) ≈ 0,8413    Φ(−1) = 1−0,8413 = 0,1587
P(−1
```

Regla 68-95-99,7

El 68,26% de los datos de una normal caen dentro de ±1σ de la media.



✓ P(60

NºP22 Distribución Normal – P(X > a)

X~N(50;5²). Calcula P(X > 58).

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Tipificar

Z = (58−50)/5 = 8/5 = 1,6

P(X>58) = P(Z>1,6)

```
Φ(1,6) ≈ 0,9452
P(Z>1,6) = 1−0,9452 = 0,0548
```

✓ **P(X>58) ≈ 0,0548 = 5,48%**

NºP23 Distribución Normal – valor de x para percentil

X~N(100;15²). Halla el valor a tal que P(X < a) = 0,90.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Buscar en tabla inversa

Buscamos Z tal que Φ(Z)=0,90

```
Z ≈ 1,2816  (de tabla Z)
```

Destipar

x = μ + Z·σ = 100 + 1,2816·15 = 100 + 19,22 = 119,22

✓ **a ≈ 119,22**

NºP24

Probabilidad – cartas de baraja española

De una baraja española (40 cartas), se saca una al azar. Calcula:
a) P(oro) b) P(sota) c) P(figura: sota,caballo o rey)

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Espacio muestral

40 cartas: 4 palos × 10 cartas

a) P(oro)

10 cartas de oro de 40

```
P(oro) = 10/40 = 1/4 = 0,25
```

b) P(sota)

4 sotas (una por palo)

```
P(sota) = 4/40 = 1/10 = 0,1
```

c) P(figura)

3 figuras por palo × 4 palos = 12

```
P(figura) = 12/40 = 3/10 = 0,3
```

✓ P(oro)=1/4 | P(sota)=1/10 | P(figura)=3/10

NºP25 Espacio muestral – lanzamiento de 2 dados

Se lanzan dos dados. Halla:
a) P(suma=7) b) P(suma≤4) c) P(doble)

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Espacio muestral

Ω tiene 6×6=36 elementos igualmente probables

a) Suma=7

Pares: (1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1) → 6 casos

```
P(suma=7) = 6/36 = 1/6 ≈ 0,167
```

b) Suma≤4

(1,1),(1,2),(2,1),(1,3),(3,1),(2,2) → 6 casos

```
P(suma≤4) = 6/36 = 1/6 ≈ 0,167
```

c) Dobles

(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6) → 6 casos

```
P(doble) = 6/36 = 1/6 ≈ 0,167
```

✓ P(suma=7)=1/6 | P(suma≤4)=1/6 | P(doble)=1/6

NºP26 Combinatoria – número de comités

De 6 hombres y 4 mujeres, ¿de cuántas maneras se puede formar un comité de 3

personas
si debe haber al menos 1 mujer?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Estrategia: total − ninguna mujer

```
Total comités = C(10,3) = 120
Comités sin mujeres (sólo hombres) =
C(6,3) = 20
Comités con al menos 1 mujer =
120−20 = 100
```

Verificación desglosada

```
1 mujer + 2 hombres: C(4,1)·C(6,2) =
4·15 = 60
2 mujeres + 1 hombre: C(4,2)·C(6,1)
= 6·6  = 36
3 mujeres + 0 hombres: C(4,3)·C(6,0)
= 4·1 = 4
Total = 60+36+4 = 100 ✓
```

✓ 100 comités posibles con al menos 1 mujer

NºP27 Variable aleatoria discreta

X = número de caras al lanzar 3 monedas.
Escribe la distribución de probabilidad de X.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

X puede tomar valores

0, 1, 2, 3

Probabilidades (Binomial B(3,1/2))

```
P(X=0) = C(3,0)·(1/2)³ = 1/8 = 0,125
P(X=1) = C(3,1)·(1/2)³ = 3/8 = 0,375
P(X=2) = C(3,2)·(1/2)³ = 3/8 = 0,375
P(X=3) = C(3,3)·(1/2)³ = 1/8 = 0,125
SUMA = 1 ✓
```

X	0	1	2	3
P(X=x)	1/8	3/8	3/8	1/8

Media y varianza

E(X) = n·p = 3·0,5 = 1,5 | Var(X) = n·p·q = 3·0,5·0,5 = 0,75

✓ E(X)=1,5 | Var(X)=0,75 | σ≈0,866

NºP28 Esperanza matemática

En un juego se gana 5€ con P=1/4, se pierde 2€ con P=1/2, y no pasa nada con P=1/4. ¿Es favorable el juego?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Esperanza matemática

E(X) = Σ xi·P(xi)

```
E(X) = 5·(1/4) + (−2)·(1/2) +
0·(1/4)
= 5/4 − 1 + 0
= 1,25 − 1 = 0,25 > 0
```

Interpretación

La esperanza es positiva (+0,25€ por jugada en promedio) → el juego es favorable al jugador.

✓ E(X)=0,25€ > 0 → juego favorable

NºP29 Probabilidad frecuencial (empírica)

Se lanzó una moneda 200 veces y salieron 108 caras. Estima P(cara).

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Probabilidad frecuencial

P(cara) ≈ nº de caras / nº total de lanzamientos

```
P(cara) ≈ 108/200 = 0,54
```

Comparación con la teórica

La probabilidad teórica es 0,5. La diferencia se debe al azar de la muestra; conforme n → ∞, la frecuencia relativa converge a la probabilidad teórica (Ley de los Grandes Números).

✓ P(cara) ≈ 0,54 (frecuencial); teórica = 0,5

NºP30

Probabilidad geométrica

Se lanza un punto al azar en un cuadrado de lado 4. Hay un círculo inscrito de radio 2. ¿Cuál es la probabilidad de que el punto caiga dentro del círculo?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Probabilidad geométrica

P = Área favorable / Área total

```
Área cuadrado = 4² = 16
Área círculo = π·r² = π·2² = 4π ≈ 12,566
P = 4π/16 = π/4 ≈ 0,785
```

✓ P(dentro del círculo) = π/4 ≈ 78,5%

NºP31 Ley de los Grandes Números – aplicación

Un fabricante de bombillas asegura que el 95% duran más de 1000 horas.
Si compramos 20 bombillas, ¿cuál es la probabilidad de que todas funcionen más de 1000 horas?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Sucesos independientes

Si asumimos que cada bombilla funciona independientemente:

```
P(todas duran>1000h) = (0,95)^20
= e^(20·ln0,95) = e^(20·(−0,05129))
= e^(−1,0258) ≈ 0,3585
```

Cálculo directo

(0,95)^20: $0{,}95^2=0{,}9025$ → $0{,}95^4\approx0{,}8145$ → $0{,}95^8\approx0{,}6634$ → $0{,}95^{16}\approx0{,}4401$ → $0{,}95^{20}\approx0{,}4401\cdot0{,}9025^2\approx0{,}3585$

✓ P(todas>1000h) ≈ 0,358 = 35,8%

NºP32 Tabla de contingencia

En una encuesta de 200 personas se obtuvo: Hombres: 40 a favor, 60 en contra | Mujeres: 70 a favor, 30 en contra
Calcula las probabilidades marginales y condicionadas.

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Tabla de contingencia

	A favor	En contra	Total
Hombres	40	60	100
Mujeres	70	30	100
Total	110	90	200

Probabilidades marginales

```
P(H) = 100/200 = 0,5     P(M) = 0,5
P(A favor) = 110/200 = 0,55   P(En
contra) = 0,45
```

Probabilidades condicionadas

```
P(A favor | Hombre) = 40/100 = 0,4
P(A favor | Mujer)  = 70/100 = 0,7
P(Hombre | A favor) = 40/110 ≈ 0,364
```

✓ P(favor|H)=0,4 | P(favor|M)=0,7 | Las mujeres son más favorables

NºP33 Binomial acumulada

En un test de 10 preguntas verdadero/falso, ¿cuál es la probabilidad de acertar al menos 7?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

X~B(10; 0,5)

P(X≥7) = P(X=7)+P(X=8)+P(X=9)+P(X=10)

```
P(X=7) = C(10,7)·(0,5)^10 =
120·(1/1024) = 120/1024
P(X=8) = C(10,8)·(0,5)^10 = 45/1024
P(X=9) = C(10,9)·(0,5)^10 = 10/1024
P(X=10)= C(10,10)·(0,5)^10 = 1/1024
Suma = (120+45+10+1)/1024 = 176/1024
= 11/64 ≈ 0,172
```

✓ P(X≥7) = 176/1024 ≈ 17,2%

NºP34 Paradoja del cumpleaños

¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 23 personas al menos dos cumplan años el mismo día?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

Estrategia: complementario

P(al menos 2 iguales) = 1 − P(todos distintos)

```
P(todos distintos) =
(365/365)·(364/365)·(363/365)···(343/365)
= 365·364·363···343 / 365^23
```

Cálculo aproximado

```
P(todos distintos) ≈ e^[−23·22/
(2·365)]
= e^[−506/730]
= e^[−0,6932]
≈ 0,500
```

Resultado

P(al menos 2 coinciden) = 1 − 0,500 ≈ 0,507 ≈ 50,7%

✓ P(al menos 2 con mismo cumpleaños) ≈ 50,7% con 23 personas

NºP35 Distribución Normal – aplicación práctica

Las notas de un examen siguen una distribución N(65; 12²).
a) ¿Qué porcentaje de alumnos saca más de 80?
b) ¿Cuántos aprueban (nota ≥ 50) en un grupo de 200 alumnos?

✎ SOLUCIÓN COMPLETA

a) P(X>80)


Z = (80−65)/12 = 15/12 = 1,25

```
Φ(1,25) ≈ 0,8944
P(X>80) = 1−0,8944 = 0,1056 → 10,56% de los alumnos
```

b) P(X≥50)

Z = (50−65)/12 = −15/12 = −1,25

```
P(X≥50) = P(Z≥−1,25) = Φ(1,25) = 0,8944
Nº alumnos que aprueban ≈ 0,8944·200 ≈ 179 alumnos
```



✓ a) 10,56% | b) ≈ 179 alumnos aprueban

FIN DEL LIBRO DE EJERCICIOS RESUELTOS

"La matemática es el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo." — Galileo Galilei

Estadística y Probabilidad · 50 ejercicios de estadística + 35 de probabilidad resueltos completamente

	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2** **Tablas**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos efectuados por el alumno.

Opción A

1A- Discute y resuelve según los distintos valores del parámetro a el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} a^2x + a^3y + az = 1 \\ x + a^2y + z = 0 \end{cases}.$$

2A- Una panadería se dedica a la elaboración y venta de magdalenas caseras. El coste en euros de producir diariamente x kg de magdalenas viene dado por la función $f(x) = 0.02x^3 - 0.3x^2 + \frac{35}{6}x$. El precio de venta de 1 kg de magdalenas es 5 euros.

a) Determina la función de beneficio neto diario de la panadería por la producción de las magdalenas. ¿Cuál es el beneficio del panadero si en un día elabora y vende exactamente 5 kg de magdalenas?

b) Halla la cantidad de magdalenas que debe elaborar diariamente para conseguir el mayor beneficio. ¿Cuál es el beneficio máximo que puede alcanzar al día por la elaboración y venta de magdalenas?

3A- En una cofradía de Semana Santa el 60% de sus miembros son mujeres; la mitad de ellas y el 20% de los varones participaron en una procesión. Se elige al azar un miembro de la cofradía.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea uno de los participantes en la procesión?

b) Si la persona elegida no estuvo en la procesión, ¿cuál es la probabilidad de que se trate de una mujer?

4A- Se elige al azar un número de 4 cifras distintas escrito con las cifras 1, 2, 3 y 4. Calcula la probabilidad de que en dicho número las cifras 2 y 3 aparezcan seguidas y en el orden 23.

Opción B

1B- En un hipermercado se realiza el recuento de caja al final de cierto día. En monedas de 10, 20 y 50 céntimos de euro, el importe total obtenido asciende a 500 euros. Por otro lado, se sabe que 200 euros corresponden, conjuntamente, a las monedas de 10 y 20 céntimos. Si en total se cuentan 1800 monedas, ¿cuántas monedas debe haber de 10, 20 y 50 céntimos para que la caja cuadre?

2B- Dada la función $f(x) = \dfrac{(x-3)^2}{x+3}$.

a) Calcula sus asíntotas.

b) Determina sus intervalos de crecimiento, sus máximos y sus mínimos.

3B- La temperatura del cuerpo humano sigue una distribución normal de media 37 ºC y desviación típica de 0.5 ºC.


a) Halla la probabilidad de que la temperatura de una persona esté comprendida entre 36.5 ºC y 37.5 ºC.

b) Si elegimos una muestra de 25 personas, ¿cuál es la probabilidad de que la media de sus temperaturas sea mayor que 36.7 ºC?

4B- En un grupo de danza hay 7 mujeres y 12 hombres. Si se escogen tres personas al azar, halla la probabilidad de que se seleccionen 2 mujeres y un hombre.

Distribución Normal

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{1}{2}t^2}\, dt$$



	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9014
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9318
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9997	0,9997	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999

Distribución Binomial $p(X = r) = \binom{n}{r} p^r (1-p)^{n-r}$

n	p / r	0,01	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	1/3	0,35	0,40	0,45	0,49	0,50
2	0	0,9801	0,9025	0,8100	0,7225	0,6400	0,5625	0,4900	0,4444	0,4225	0,3600	0,3025	0,2601	0,2500
	1	0,0198	0,0950	0,1800	0,2550	0,3200	0,3750	0,4200	0,4444	0,4550	0,4800	0,4950	0,4998	0,5000
	2	0,0001	0,0025	0,0100	0,0225	0,0400	0,0625	0,0900	0,1111	0,1225	0,1600	0,2025	0,2401	0,2500
3	0	0,9703	0,8574	0,7290	0,6141	0,5120	0,4219	0,3430	0,2963	0,2746	0,2160	0,1664	0,1327	0,1250
	1	0,0294	0,1354	0,2430	0,3251	0,3840	0,4219	0,4410	0,4444	0,4436	0,4320	0,4084	0,3823	0,3750
	2	0,0003	0,0071	0,0270	0,0574	0,0960	0,1406	0,1890	0,2222	0,2389	0,2880	0,3341	0,3674	0,3750
	3	0,0000	0,0001	0,0010	0,0034	0,0080	0,0156	0,0270	0,0370	0,0429	0,0640	0,0911	0,1176	0,1250
4	0	0,9606	0,8145	0,6561	0,5220	0,4096	0,3164	0,2401	0,1975	0,1785	0,1296	0,0915	0,0677	0,0625
	1	0,0388	0,1715	0,2916	0,3685	0,4096	0,4219	0,4116	0,3951	0,3845	0,3456	0,2995	0,2600	0,2500
	2	0,0006	0,0135	0,0486	0,0975	0,1536	0,2109	0,2646	0,2963	0,3105	0,3456	0,3675	0,3747	0,3750
	3	0,0000	0,0005	0,0036	0,0115	0,0256	0,0469	0,0756	0,0988	0,1115	0,1536	0,2005	0,2400	0,2500
	4	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0016	0,0039	0,0081	0,0123	0,0150	0,0256	0,0410	0,0576	0,0625
5	0	0,9510	0,7738	0,5905	0,4437	0,3277	0,2373	0,1681	0,1317	0,1160	0,0778	0,0503	0,0345	0,0313
	1	0,0480	0,2036	0,3281	0,3915	0,4096	0,3955	0,3602	0,3292	0,3124	0,2592	0,2059	0,1657	0,1563
	2	0,0010	0,0214	0,0729	0,1382	0,2048	0,2637	0,3087	0,3292	0,3364	0,3456	0,3369	0,3185	0,3125
	3	0,0000	0,0011	0,0081	0,0244	0,0512	0,0879	0,1323	0,1646	0,1811	0,2304	0,2757	0,3060	0,3125
	4	0,0000	0,0000	0,0005	0,0022	0,0064	0,0146	0,0284	0,0412	0,0488	0,0768	0,1128	0,1470	0,1563
	5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0010	0,0024	0,0041	0,0053	0,0102	0,0185	0,0282	0,0313
6	0	0,9415	0,7351	0,5314	0,3771	0,2621	0,1780	0,1176	0,0878	0,0754	0,0467	0,0277	0,0176	0,0156
	1	0,0571	0,2321	0,3543	0,3993	0,3932	0,3560	0,3025	0,2634	0,2437	0,1866	0,1359	0,1014	0,0938
	2	0,0014	0,0305	0,0984	0,1762	0,2458	0,2966	0,3241	0,3292	0,3280	0,3110	0,2780	0,2436	0,2344
	3	0,0000	0,0021	0,0146	0,0415	0,0819	0,1318	0,1852	0,2195	0,2355	0,2765	0,3032	0,3121	0,3125
	4	0,0000	0,0001	0,0012	0,0055	0,0154	0,0330	0,0595	0,0823	0,0951	0,1382	0,1861	0,2249	0,2344
	5	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0015	0,0044	0,0102	0,0165	0,0205	0,0369	0,0609	0,0864	0,0938
	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0007	0,0014	0,0018	0,0041	0,0083	0,0138	0,0156
7	0	0,9321	0,6983	0,4783	0,3206	0,2097	0,1335	0,0824	0,0585	0,0490	0,0280	0,0152	0,0090	0,0078
	1	0,0659	0,2573	0,3720	0,3960	0,3670	0,3115	0,2471	0,2048	0,1848	0,1306	0,0872	0,0604	0,0547
	2	0,0020	0,0406	0,1240	0,2097	0,2753	0,3115	0,3177	0,3073	0,2985	0,2613	0,2140	0,1740	0,1641
	3	0,0000	0,0036	0,0230	0,0617	0,1147	0,1730	0,2269	0,2561	0,2679	0,2903	0,2918	0,2786	0,2734
	4	0,0000	0,0002	0,0026	0,0109	0,0287	0,0577	0,0972	0,1280	0,1442	0,1935	0,2388	0,2676	0,2734
	5	0,0000	0,0000	0,0002	0,0012	0,0043	0,0115	0,0250	0,0384	0,0466	0,0774	0,1172	0,1543	0,1641
	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0013	0,0036	0,0064	0,0084	0,0172	0,0320	0,0494	0,0547
	7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0005	0,0006	0,0016	0,0037	0,0068	0,0078
8	0	0,9227	0,6634	0,4305	0,2725	0,1678	0,1001	0,0576	0,0390	0,0319	0,0168	0,0084	0,0046	0,0039
	1	0,0746	0,2793	0,3826	0,3847	0,3355	0,2670	0,1977	0,1561	0,1373	0,0896	0,0548	0,0352	0,0313
	2	0,0026	0,0515	0,1488	0,2376	0,2936	0,3115	0,2965	0,2731	0,2587	0,2090	0,1569	0,1183	0,1094
	3	0,0001	0,0054	0,0331	0,0839	0,1468	0,2076	0,2541	0,2731	0,2786	0,2787	0,2568	0,2273	0,2188
	4	0,0000	0,0004	0,0046	0,0185	0,0459	0,0865	0,1361	0,1707	0,1875	0,2322	0,2627	0,2730	0,2734
	5	0,0000	0,0000	0,0004	0,0026	0,0092	0,0231	0,0467	0,0683	0,0808	0,1239	0,1719	0,2098	0,2188
	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0011	0,0038	0,0100	0,0171	0,0217	0,0413	0,0703	0,1008	0,1094
	7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0012	0,0024	0,0033	0,0079	0,0164	0,0277	0,0313
	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0002	0,0007	0,0017	0,0033	0,0039
9	0	0,9135	0,6302	0,3874	0,2316	0,1342	0,0751	0,0404	0,0260	0,0207	0,0101	0,0046	0,0023	0,0020
	1	0,0830	0,2985	0,3874	0,3679	0,3020	0,2253	0,1556	0,1171	0,1004	0,0605	0,0339	0,0202	0,0176
	2	0,0034	0,0629	0,1722	0,2597	0,3020	0,3003	0,2668	0,2341	0,2162	0,1612	0,1110	0,0776	0,0703
	3	0,0001	0,0077	0,0446	0,1069	0,1762	0,2336	0,2668	0,2731	0,2716	0,2508	0,2119	0,1739	0,1641
	4	0,0000	0,0006	0,0074	0,0283	0,0661	0,1168	0,1715	0,2048	0,2194	0,2508	0,2600	0,2506	0,2461
	5	0,0000	0,0000	0,0008	0,0050	0,0165	0,0389	0,0735	0,1024	0,1181	0,1672	0,2128	0,2408	0,2461
	6	0,0000	0,0000	0,0001	0,0006	0,0028	0,0087	0,0210	0,0341	0,0424	0,0743	0,1160	0,1542	0,1641
	7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0012	0,0039	0,0073	0,0098	0,0212	0,0407	0,0635	0,0703
	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0009	0,0013	0,0035	0,0083	0,0153	0,0176
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0003	0,0008	0,0016	0,0020
10	0	0,9044	0,5987	0,3487	0,1969	0,1074	0,0563	0,0282	0,0173	0,0135	0,0060	0,0025	0,0012	0,0010
	1	0,0914	0,3151	0,3874	0,3474	0,2684	0,1877	0,1211	0,0867	0,0725	0,0403	0,0207	0,0114	0,0098
	2	0,0042	0,0746	0,1937	0,2759	0,3020	0,2816	0,2335	0,1951	0,1757	0,1209	0,0763	0,0494	0,0439
	3	0,0001	0,0105	0,0574	0,1298	0,2013	0,2503	0,2668	0,2601	0,2522	0,2150	0,1665	0,1267	0,1172
	4	0,0000	0,0010	0,0112	0,0401	0,0881	0,1460	0,2001	0,2276	0,2377	0,2508	0,2384	0,2130	0,2051
	5	0,0000	0,0001	0,0015	0,0085	0,0264	0,0584	0,1029	0,1366	0,1536	0,2007	0,2340	0,2456	0,2461
	6	0,0000	0,0000	0,0001	0,0012	0,0055	0,0162	0,0368	0,0569	0,0689	0,1115	0,1596	0,1966	0,2051
	7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0008	0,0031	0,0090	0,0163	0,0212	0,0425	0,0746	0,1080	0,1172
	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0014	0,0030	0,0043	0,0106	0,0229	0,0389	0,0439
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0005	0,0016	0,0042	0,0083	0,0098
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0008	0,0010

	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2 Tablas**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos efectuados por el alumno.

Opción A

1A- Sean las matrices: $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 5 & 3 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$.
Halla una matriz X tal que $2X - BA = AB$.

2A- La cantidad C de tomates (en kg) que se obtienen de una planta de tomate depende de la cantidad de abono x (en gramos) que se añade en el proceso de siembra según la función $C(x) = 10^{-5}(x+20)^2(a-x)$, donde $x \in [0, 200]$ y a es un parámetro.
a) Determina el valor de a sabiendo que con 130 gramos de abono se recogen 20.25 kg de tomate.
b) Supuesto $a = 220$, calcula la cantidad de abono que debe echar un agricultor en cada planta para recoger la máxima cantidad de tomates. ¿Cuál es esa máxima cantidad de tomates?

3A- Consideremos dos dados, uno normal con las caras numeradas del 1 al 6 y otro trucado, con 4 caras con el número 5 y 2 caras con el número 6. Se elige al azar uno de los dados y se realizan dos tiradas con el dado elegido.
a) Calcula la probabilidad de sacar 5 en la primera tirada y 6 en la segunda.
b) Si el resultado de la primera tirada es 5 y el resultado de la segunda tirada es 6, ¿cuál es la probabilidad de haber elegido el dado trucado?

4A- En el juego del tiro al plato Antonio acierta el plato el 55% de las veces que dispara. En cambio María falla en el 40% de las tiradas. Si disparan los dos a la vez, ¿cuál es la probabilidad de que ambos acierten?

Opción B

1B- El dueño de un supermercado ha comprado embutido, bebidas y conservas, por un importe total de 4600 €. El valor de las conservas es el mismo que el de las bebidas y embutidos juntos. Si vende todos estos productos, añadiendo un beneficio del 10% en el embutido, el 20% en las bebidas y el 15% en las conservas, obtendrá un importe total de 5305 €. Calcula lo que pagó por cada uno de ellos.

2B- Dada la curva de ecuación $f(x) = \frac{1}{4 - x^2}$, para $x \in (-2, 2)$.

a) Halla los máximos y mínimos de la curva en el intervalo considerado y estudia su crecimiento y decrecimiento.
b) Representa gráficamente la curva en dicho intervalo.
c) Calcula la recta tangente a la curva $f(x)$ en el punto $x = 1$.

3B- Una industria conservera envasa latas de sardinas, cuyo peso sigue una distribución normal con media μ y desviación típica $\sigma = 1$.

a) Suponiendo que $\mu = 90$ gramos y que cada lata debe pesar entre 88 y 92 gramos para salir al mercado, ¿qué proporción de latas salen efectivamente al mercado?
b) Suponiendo que se desconoce μ, se toma una muestra de 25 latas para su estimación, obteniéndose un media muestral de 90.25 gramos. Determina un intervalo de confianza al 95% para μ.

4B- Una caja tiene 12 bombones, de los cuales 2 son de chocolate blanco y el resto de chocolate negro. Si se cogen 4 bombones al azar y sin reemplazamiento, calcula la probabilidad de que los 4 sean de chocolate negro.

	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2** **Tablas**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos efectuados por el alumno.

Opción A

1A- Discute y resuelve según los distintos valores del parámetro a el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} a^2x + a^3y + az = 1 \\ x + a^2y + z = 0 \end{cases}.$$

2A- Una panadería se dedica a la elaboración y venta de magdalenas caseras. El coste en euros de producir diariamente x kg de magdalenas viene dado por la función $f(x) = 0.02x^3 - 0.3x^2 + \frac{35}{6}x$. El precio de venta de 1 kg de magdalenas es 5 euros.

a) Determina la función de beneficio neto diario de la panadería por la producción de las magdalenas. ¿Cuál es el beneficio del panadero si en un día elabora y vende exactamente 5 kg de magdalenas?

b) Halla la cantidad de magdalenas que debe elaborar diariamente para conseguir el mayor beneficio. ¿Cuál es el beneficio máximo que puede alcanzar al día por la elaboración y venta de magdalenas?

3A- En una cofradía de Semana Santa el 60% de sus miembros son mujeres; la mitad de ellas y el 20% de los varones participaron en una procesión. Se elige al azar un miembro de la cofradía.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea uno de los participantes en la procesión?

b) Si la persona elegida no estuvo en la procesión, ¿cuál es la probabilidad de que se trate de una mujer?

4A- Se elige al azar un número de 4 cifras distintas escrito con las cifras 1, 2, 3 y 4. Calcula la probabilidad de que en dicho número las cifras 2 y 3 aparezcan seguidas y en el orden 23.

Opción B

1B- En un hipermercado se realiza el recuento de caja al final de cierto día. En monedas de 10, 20 y 50 céntimos de euro, el importe total obtenido asciende a 500 euros. Por otro lado, se sabe que 200 euros corresponden, conjuntamente, a las monedas de 10 y 20 céntimos. Si en total se cuentan 1800 monedas, ¿cuántas monedas debe haber de 10, 20 y 50 céntimos para que la caja cuadre?

2B- Dada la función $f(x) = \dfrac{(x-3)^2}{x+3}$.

a) Calcula sus asíntotas.

b) Determina sus intervalos de crecimiento, sus máximos y sus mínimos.

3B- La temperatura del cuerpo humano sigue una distribución normal de media 37 ºC y desviación típica de 0.5 ºC.

a) Halla la probabilidad de que la temperatura de una persona esté comprendida entre 36.5 ºC y 37.5 ºC.

b) Si elegimos una muestra de 25 personas, ¿cuál es la probabilidad de que la media de sus temperaturas sea mayor que 36.7 ºC?

4B- En un grupo de danza hay 7 mujeres y 12 hombres. Si se escogen tres personas al azar, halla la probabilidad de que se seleccionen 2 mujeres y un hombre.

	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2** **Tablas**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos efectuados por el alumno.

Opción A

1A- Se considera el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ 3x + 2y = 4 \\ 4x + y = a^2 \end{cases}$$

a) Clasifica el sistema en función de sus posibles soluciones para los distintos valores del parámetro *a*.
a) Resuélvelo siempre que sea compatible.

2A- Se desea construir un depósito con forma de prisma rectangular de base cuadrada y con una capacidad de 360 m^3. Los costes por m^2 son los siguientes: 40 € para el fondo, 30 € para las paredes laterales y 60 € para el techo del depósito. Calcula las dimensiones del depósito para que su coste sea el menor posible.

3A- La estatura de los alumnos de un colegio es una variable aleatoria que tiene una distribución normal de desviación típica 25 cm. Se ha elegido una muestra de 100 alumnos de ese colegio comprobándose que la estatura media es de 170 cm. Calcula:
a) El intervalo de confianza para la estatura media con un nivel de confianza del 99%.
b) El tamaño muestral mínimo necesario para conseguir, con un nivel de confianza del 95%, un error máximo de 8 cm en la estimación de la estatura media.

4A- En la cesta de una frutería hay 10 nectarinas blancas y 7 nectarinas amarillas. Si se compran 2 nectarinas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas?

Opción B

1B- Un alfarero dispone semanalmente de 150 kg de arcilla de tipo A y de 22 kg de arcilla de tipo B para la fabricación de ánforas y jarrones. La producción de un ánfora requiere 3 kg de arcilla de tipo A y 1 kg de tipo B, pero la de un jarrón necesita 6 kg de arcilla de tipo A y 500 gramos de arcilla de tipo B. Por limitaciones de espacio para el almacén, como máximo puede fabricar 26 vasijas (entre ánforas y jarrones). El precio de venta de un ánfora es 20 euros y el de un jarrón es 30 euros. Utiliza técnicas de programación lineal para hallar el número de ánforas y de jarrones que debe fabricar el alfarero para que su recaudación sea máxima. ¿Cuál es esa recaudación máxima?

2B- Sea la función $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x-2}{x+2}, & x\neq -2\\ 0, & x=-2\end{cases}$.

a) Determina sus puntos de discontinuidad y su derivada en $x=-2$ y en $x=2$.
b) Dibuja la gráfica de la función.
c) Explica la relación existente entre la derivada y la tasa de variación media en un punto, indicando lo que significa el valor obtenido de la derivada de la función $f(x)$ en $x=2$.

3B- De 1500 individuos enfermos 90 padecen hepatitis, 135 anemia y el resto otras enfermedades. Todas esas enfermedades no se presentan juntas en ninguno de ellos. Se sabe que la ictericia se presenta en el 76% de los enfermos de hepatitis, en un 27% de los enfermos de anemia y en un 20% en el resto de los enfermos. Nos encontramos con uno de los individuos por la calle.
a) Determina la probabilidad de que presente ictericia.
b) Hablamos con el individuo y nos dice que tiene ictericia, ¿qué enfermedad es más probable que padezca, hepatitis o anemia?

4B- El 5% de los clientes de una entidad bancaria son morosos. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar al menos un moroso entre 10 clientes elegidos al azar?

	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2 Tablas**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos efectuados por el alumno.

Opción A

1A- Resuelve el siguiente sistema matricial:

$$2X + 3Y = \begin{pmatrix} 6 & 28 \\ 10 & 17 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -1 & 12 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

2A- El número de visitantes diarios a una feria de turismo viene dado por la función $V(t) = -30(t^2 - 14t - 11)$, donde $t \in (0,10)$ es el tiempo (en horas) transcurrido desde la apertura de la feria.
a) ¿Cuándo aumenta la afluencia de público y cuándo disminuye? ¿En qué momento se alcanza el número máximo de visitantes?
b) Determina ese número máximo de visitantes.

3A- El 38% de los habitantes de una ciudad declaran que su deporte preferido es el fútbol, el 21% prefiere el baloncesto y el resto se inclina por otro deporte. Si se eligen al azar tres personas, calcula la probabilidad de los siguientes sucesos:
a) Las tres personas son aficionadas al fútbol.
b) Dos personas prefieren el fútbol y la otra el baloncesto.
c) Al menos una de las tres personas prefiere otro deporte diferente al fútbol y al baloncesto.

4A- Sean los sucesos A y B, tales que $P(A) = 1/5$ y $P(B) = 1/2$. Halla la probabilidad del suceso $A \cup B$, si A y B son independientes.

Opción B

1B- Un grupo de estudiantes financia su viaje de fin de curso con la venta de participaciones de lotería, por importe de 1, 2 y 5 euros. Han recaudado, en total, 600 euros y han vendido el doble de participaciones de 1 euro que de 5 euros. Si han vendido un total de 260 participaciones, calcula el número de participaciones que han vendido de cada importe.

2B- Dada la función $f(x) = \frac{x^2}{2(x-1)}$:

a) Calcula sus asíntotas.
b) Determina sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus máximos y sus mínimos.
c) Con los datos anteriores, representa gráficamente la función.

3B- Una empresa fabrica tornillos para llantas cuyo diámetro sigue una distribución normal de media μ milímetros y desviación típica 2 milímetros. Se selecciona un lote de 100 tornillos y resulta una media muestral de 19 milímetros.
a) Determina un intervalo de confianza al 98% para μ.
b) Para un determinado modelo de automóvil, se exige que el diámetro medio de los tornillos sea de 20 milímetros. Plantea un test de hipótesis que permita decidir si los tornillos fabricados se ajustan a este tamaño, con una confianza del 95%.

4B- El 10% de los huevos de un supermercado están rotos. Halla la probabilidad de que un cliente que compra media docena de huevos encuentre como mucho un huevo roto.

	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2 Tablas**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos efectuados por el alumno.

Opción A

1A- Se considera el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x-2y+z=0 \\ 3x+2y-2z=4 \\ 8x+8y+az=8 \end{cases}$$

a) Clasifica el sistema en función de sus posibles soluciones para los distintos valores del parámetro *a*.
b) Halla todas sus soluciones para $a=-3$.

2A- Los beneficios diarios de una fábrica, en miles de euros, vienen dados por la función $f(x)=-x^2+24x-100$, donde *x* indica el número de unidades que se producen al día.
a) Calcula el número de unidades que han de producirse diariamente para obtener el máximo beneficio.
b) Calcula el máximo beneficio que puede obtenerse en un día.

3A- El censo realizado en una comunidad autónoma española determina que el 40% de la población inmigrante procede del norte de África, el 20 % procede de países asiáticos y el resto procede de los países de Sudamérica. Además, el 50% de los procedentes del norte de África, el 25% de los procedentes de Asia y el 65% de los procedentes de Sudamérica están en situación administrativa legal.
a) Elegido un inmigrante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su situación administrativa sea legal?
b) Elegido un inmigrante en situación administrativa ilegal, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de Sudamérica?

4A- Sean A y B dos sucesos independientes con probabilidades $P(A)=0.2$ y $P(B)=0.5$. Calcula $P(\overline{A\cup B})$.

Opción B

1B- En una quesería se producen dos tipos de queso de leche de oveja: fresco y curado. La elaboración de un queso curado requiere 6 litros de leche de oveja y la de un queso fresco 3 litros. La ganancia por la venta de un queso fresco es 10 euros y por la de uno curado es 30 euros. Se sabe que la quesería dispone diariamente de 1800 litros de leche de oveja y su capacidad de producción es de 500 quesos diarios. Debido a la demanda, la producción de queso fresco debe ser al menos el doble que la de queso curado.
Utiliza técnicas de programación lineal para encontrar la producción de quesos que hace máxima la ganancia diaria total de la fábrica por la venta de quesos, así como dicha ganancia máxima.

2B- Sea una función $f(x)$ de la que se conoce su derivada $f'(x) = x^2 - 1$.
a) Representa gráficamente $f'(x)$.
b) Deduce de la gráfica los intervalos de crecimiento de $f(x)$.
c) Halla la abscisa de los puntos máximos y mínimos de $f(x)$.

3B- En un almacén hay un gran número de cajas. El peso de cada una de ellas es una variable aleatoria con distribución normal de media 50 kg y desviación típica 5 kg.
a) Halla el porcentaje de cajas que pesan entre 50 y 55 kg.
b) Para transportar las cajas se dispone de un camión que tiene autorizado un peso máximo de 2000 kg en total. ¿Cuál es la probabilidad de que el camión soporte la carga de 41 cajas sin exponerse a superar el peso máximo autorizado?

4B- En cierto instituto aprueba la asignatura de filosofía el 80% de los alumnos. ¿Cuál es la probabilidad de que de un grupo de 8 alumnos elegidos al azar hayan aprobado 6 alumnos?

	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2** **Tablas**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos efectuados por el alumno.

Opción A

1A- Una fábrica produce tres tipos de herramientas: A, B y C. En la fábrica trabajan tres obreros, durante 8 horas diarias cada uno, y un revisor para comprobar las herramientas durante 1 hora diaria. Para fabricar una herramienta de tipo A se emplean 2 horas de mano de obra y se necesitan 6 minutos de revisión, para la fabricación de una de tipo B se emplean 4 horas de mano de obra y 4 minutos de revisión y para una de tipo C se necesitan 1 hora de mano de obra y 4 minutos de revisión. Por limitaciones en la producción, se deben producir exactamente 12 herramientas al día. Calcula el número de herramientas de cada tipo que se elaboran cada día en la fábrica.

2A- Se considera la función: $f(x) = -x^3 + bx^2 + x + d$

a) Calcula razonadamente los valores de b y d para que la función $f(x)$ tenga un máximo relativo en el punto (1,4).

b) Suponiendo $b = 1$ y $d = 3$, representa gráficamente la función $f(x)$ en el intervalo $[-2, 2]$.

3A- Un moderno edificio tiene dos ascensores para uso de los vecinos. El primero de los ascensores es usado el 45% de las ocasiones, mientras que el segundo es usado el resto de las ocasiones. El uso continuado de los ascensores provoca un 5% de fallos en el primero de los ascensores y un 8% en el segundo. Un día suena la alarma de uno de los ascensores porque ha fallado. Calcula la probabilidad de que haya sido el primero de los ascensores.

4A- Calcula $P(\overline{A}/B)$ sabiendo que $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ y $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$.

Opción B

1B- Un ahorrador dispone de 4000 € para invertir en dos tipos de fondos de inversión a cierto plazo. En el fondo A cada participación tiene un coste de 40 € y produce un beneficio de 15 €, mientras que en el fondo B cada participación da un beneficio de 5 € y su coste es de 50 €. Sabiendo que se puede adquirir un máximo de 60 participaciones del fondo A y al menos 40 del fondo B, utiliza técnicas de programación lineal para determinar cuántas participaciones de cada fondo se deben comprar para maximizar el beneficio y calcula ese beneficio.

2B- Un agricultor dispone de 3000 € para cercar un terreno rectangular, usando el río adyacente como lado con el fin de que el recinto sólo necesite 3 cercas. El coste de la cerca paralela al río es de 5 € por metro instalado, y el de la cerca para cada uno de los lados restantes es de 3 € por metro instalado. Calcula las dimensiones del terreno de área máxima que puede cercar con el presupuesto que tiene.

3B- En un determinado municipio, los ingresos mensuales de sus habitantes siguen una distribución normal de media μ y desviación típica 200 €. Se seleccionó al azar una muestra de 100 personas cuya media de ingresos mensuales resultó de 1060 €.
a) Para un nivel de confianza del 95%, calcula un intervalo de confianza para el ingreso medio mensual en ese municipio.
b) Si se toma un nivel de significación de 0.01, calcula el tamaño muestral mínimo necesario para estimar el ingreso medio mensual con un error menor de 30 €.

4B- La probabilidad de romper una galleta al ser envasada es el 1%. Si en un envase hay 10 galletas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una galleta esté rota debido a la operación de envasado?

	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2** **Tablas**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos efectuados por el alumno.

Opción A

1A- En un aparcamiento hay 24 coches aparcados, de color blanco, rojo o gris. El número de coches grises es igual al doble del número de coches rojos.
a) ¿Es posible saber, con estos datos, el número de coches blancos que hay aparcados? Razona tu respuesta.
b) Si además se sabe que la mitad de coches son rojos o grises, ¿cuántos coches hay de cada color?

2A- El rendimiento de una máquina, a lo largo de las 7 horas que permanece en funcionamiento cada día, viene dado por la función $f(x) = x^3 - 10.5x^2 + 30x$, donde $x \in (0,7)$ indica el número de horas transcurridas desde que la máquina se pone en marcha.
a) Determina en qué momento se produce el máximo y el mínimo rendimiento.
b) Calcula el rendimiento de la máquina en esos dos momentos del día.

3A- Un envío de frutas a un supermercado consta de naranjas y manzanas que se agrupan en cajones de 500 piezas: 300 naranjas y 200 manzanas. Por experiencias anteriores se sabe que en cada envío están estropeadas un 15% de las naranjas y un 5% de las manzanas. Se extrae una pieza al azar de un cajón cualquiera.
a) ¿Cuál es la probabilidad de que esté estropeada?
b) Si la pieza elegida está en buenas condiciones, ¿qué es más probable, que sea naranja o que sea manzana?

4A- El 75% de los alumnos de un instituto practican algún deporte, el 30% tocan un instrumento musical y el 15% realica ambas actividades. Calcula la probabilidad de que un alumno del instituto elegido al azar no realice ninguna de las dos actividades.

Opción B

1B- Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

a) Halla $A^2 - A + I^2$ donde I es la matriz identidad.

b) Plantea y resuelve un sistema de ecuaciones lineal homogéneo que tenga a A como matriz asociada.

2B- Halla la expresión de la función $f(x)$ polinómica de grado 3, sabiendo que tiene un mínimo relativo en el punto $(1,1)$, que su derivada $f'(x)$ tiene una raíz en el punto de abscisa $x = -3$ y que corta al eje de ordenadas en el punto $(0,11)$.

3B- Una Universidad pública recibe 800 solicitudes de acceso para uno de los Grados en los que la oferta de plazas se reduce a 120. Sabiendo que la nota final, de un solicitante, después de las pruebas de acceso sigue una distribución normal de media 7.3 y desviación típica 0.7, calcula la nota mínima para obtener una de las 120 plazas ofertadas.

4B- Un examen de oposición consiste en desarrollar por escrito un tema de un total de 50. El tribunal elige al azar 2 temas y cada candidato debe escoger uno de ellos. Halla la probabilidad de que un candidato suspenda el examen si tan sólo ha estudiado 35 temas.

	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2 Tablas**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos efectuados por el alumno.

Opción A

1A- Se consideran las matrices $A=\begin{pmatrix} x & 1 \\ 2x & -1 \\ -x & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 \\ y \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} z \\ 2z \\ -z \end{pmatrix}$, $D=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1/3 \end{pmatrix}$ donde x, y, z son desconocidos.

a) Sabiendo que $A \cdot B + C = 3D$, plantea un sistema de ecuaciones para encontrar los valores de x, y, z.

b) Estudia el sistema planteado en función del número de sus soluciones y calcula una de ellas, si es posible.

2A- Un estudio realizado por una empresa de producción de películas de acción prueba que el coste anual (en millones de euros) de contratación de los actores secundarios que utiliza en sus películas sigue la función $f(x)=\dfrac{2x^2+60x+800}{100x}$, donde $x>0$ es el número de actores secundarios contratados. Calcula el número de actores secundarios contratados que hace mínimo el coste de contratación. ¿A qué cantidad asciende ese coste mínimo?

3A- Según el informe anual *La Sociedad de la Información 2012*, el 63% de los usuarios de móvil en España tiene un "Smartphone". Entre los propietarios de este tipo de teléfono, el 77% lo emplea para su conexión habitual a internet. Sin embargo, entre los propietarios de otros tipos de teléfono móvil sólo el 8 % lo emplea para la conexión habitual a internet.
a) Calcula la probabilidad de conectarse habitualmente a internet a través del teléfono móvil.
b) Si un usuario emplea habitualmente el teléfono móvil para conectarse a internet, halla la probabilidad de que sea propietario de un "Smartphone".

4A- En una ciudad, la probabilidad de que llueva un día de junio es del 10%, y de que haga sol un 75 %. Si no es posible que en un mismo día de junio llueva y haga sol simultáneamente, ¿cuál es la probabilidad de que en un día de junio no llueva ni haga sol?

Opción B

1B- Un agricultor quiere cultivar una finca de 200 hectáreas únicamente con dos cultivos: trigo y remolacha. Al menos 90 hectáreas deben ser de trigo. Cada hectárea de trigo necesita una dedicación anual del agricultor de 20 horas y proporcionará un beneficio neto anual de 800 euros. Cada hectárea de remolacha requiere 30 horas de dedicación anual pero da un beneficio neto anual de 1000 euros. El agricultor podrá dedicar este año a esos cultivos un total de 4500 horas. Utiliza técnicas de programación lineal para encontrar cómo debe repartir el cultivo en la finca entre trigo y remolacha para que el beneficio neto anual sea máximo. Calcula, además, ese beneficio neto máximo.

2B- El rendimiento físico de cierto deportista de élite durante un tiempo de 60 minutos, viene dado a través de la función:

$$f(t)=\begin{cases} -t(t-20) & si \quad 0 \le t < 15 \\ 75 & si \quad 15 \le t < 30 \\ 100-\dfrac{5t}{6} & si \quad 30 \le t \le 60 \end{cases}$$

a) Representa gráficamente dicha función.
b) A la vista de la gráfica obtenida, identifica en qué momentos del tiempo el deportista alcanza su máximo rendimiento físico, mantiene su rendimiento físico y disminuye su rendimiento físico.

3B- El porcentaje de vacas que enferman después de suministrarlas una determinada vacuna es del 2%. En una granja se vacuna a 600 vacas.
a) Halla el número esperado de vacas vacunadas que no enfermarán.
b) Halla la probabilidad de que, como máximo, enfermen 20 vacas vacunadas.

4B- El 60% de los clientes de una frutería compran naranjas y el 30% no compra ni naranjas ni manzanas. ¿Qué porcentaje de clientes compra manzanas, pero no naranjas?

	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2 Tablas**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos efectuados por el alumno.

Opción A

1A- Se considera el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y - z = 25 \\ 2x - y + 10z = 50 \\ 3x + a\,y - 4z = 10 \end{cases}$$

a) Clasifica este sistema en función de sus posibles soluciones para los distintos valores del parámetro *a*.
b) Resuelve el sistema para $a = 0$.

2A- Una persona amante de las matemáticas desea donar sus 3600 libros a dos bibliotecas A y B. En las instrucciones de donación, deja fijado que los lotes de libros se hagan de modo que el producto del número de libros destinados a la biblioteca A por el cubo del número de libros destinados a la biblioteca B sea máximo. Determina la cantidad de libros recibida por cada biblioteca.

3A- Los pesos de los sacos de leña que se venden en una gasolinera siguen una distribución normal con desviación típica 1 kg. Se quiere comprobar con una confianza del 95% que el peso de 10 kg que marca la etiqueta de cada saco es correcto. Para ello se toman al azar 100 sacos de leña, resultando un peso medio de 9.75 kg.
a) Plantea un test de hipótesis adecuado que permita hacer la comprobación requerida.
b) Proporciona un intervalo de confianza al 90% para el peso medio de los sacos.

4A- En una clase de inglés hay 7 mujeres y 12 hombres. Si se seleccionan 3 personas al azar, halla la probabilidad de que se seleccionen 2 mujeres y un hombre.

Opción B

1B- Un trabajador autónomo se dedica a pintar edificios 300 días al año durante 8 horas cada día. Para organizarse mejor, adquiere al comienzo del año los dos tipos de pintura blanca que emplea: A y B. Cada tipo de pintura requiere un trabajo diferente: la pintura A necesita 6 horas de trabajo por kilo, mientras que la pintura B necesita 3 horas de trabajo por kilo. Además, el tamaño del envase es diferente, por lo que en su almacén caben cómo máximo 350 kilos de pintura tipo A y 500 kilos de pintura tipo B. Sabiendo que por cada kilo de pintura de tipo A obtiene un beneficio de 70 € y que por cada kilo de pintura de tipo B obtiene un beneficio de 80 €, utiliza técnicas de programación lineal para determinar cuánta pintura de cada tipo debe comprar al comienzo del año para maximizar su beneficio.

2B- Sea la función $f(x)=\begin{cases} a\,x+3+\dfrac{x}{x-2} & si \quad x\neq 2 \\ 0 & si \quad x=2 \end{cases}$

a) Halla el valor de a para el que la pendiente m de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto $(0,3)$ es $m=1$.

b) Para $a=1$, estudia la continuidad de la función $f(x)$ y determina sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.

3B- El 70% de las compras de un supermercado las realizan mujeres. El 80% de las compras realizadas por éstas supera los 20 €, mientras que sólo el 30% de las realizadas por hombres supera esa cantidad.

a) Elegido un ticket de compra al azar, ¿cuál es la probabilidad de que supere los 20 €?

b) Si se sabe que un ticket de compra no supera los 20 €, ¿cuál es la probabilidad de que la compra la hiciera una mujer?

4B- Sea X una variable aleatoria que sigue una distribución normal $N(50,10)$. Calcula la probabilidad $P(X \geq 80)$.

	Pruebas de acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos.

Opción A

1A- Se considera el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - 2y + z = -1 \\ x + y + 3z = 4 \\ 5x - y + az = 10 \end{cases}$$

a) Clasifica el sistema en función de sus posibles soluciones para los distintos valores del parámetro *a*.
b) Resuelve el sistema para $a = 3$.

2A- Los beneficios en miles de euros obtenidos en un gimnasio inaugurado hace 5 años vienen dados por la función $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 24x + 26$, donde $x \in [0,5]$ es el tiempo, medido en años, que lleva funcionando el gimnasio desde su apertura.
a) ¿En qué momento se alcanza el máximo beneficio y cuánto vale ese beneficio máximo?
b) El cuarto año de funcionamiento se produce una renovación general de las instalaciones del gimnasio. Explica razonadamente, en términos de aumento del beneficio, si dicha renovación tuvo éxito.

3A- Según cierto estudio, el tiempo, medido en horas, que un alumno de Bachillerato estudia en la biblioteca semanalmente sigue una distribución normal con media μ y desviación típica 2.5. Al tomar una muestra aleatoria de 100 estudiantes, se obtuvo una media muestral de 6.5 horas.
a) Suponiendo que la media poblacional es $\mu = 6.3$ horas, ¿es compatible el resultado muestral con ese valor poblacional, considerando un nivel de confianza del 95%?
b) Para el mismo nivel de confianza y suponiendo μ desconocida, determina el tamaño muestral adecuado para que el error máximo cometido en su estimación sea de 0.1 horas.

4A- Sean A y B dos sucesos independientes, tal que $P(A) = 0.2$ y $P(A \cap B) = 0.16$. Halla la probabilidad de $\overline{A} \cap \overline{B}$.

Opción B

1B- En un taller textil se confeccionan 2 tipos de prendas: trajes y abrigos. Los trajes requieren 2 metros de lana y 1.25 metros de algodón y los abrigos requieren 1.5 metros de lana y 2.5 metros de algodón. Se disponen semanalmente de 300 metros de lana y de 350 metros de algodón, y esta semana deben fabricarse al menos 20 abrigos. Empleando técnicas de programación lineal, determina cuántos trajes y abrigos hay que hacer esta semana si se desea maximizar el beneficio obtenido, sabiendo que se ganan 250 euros por cada traje y 350 euros por cada abrigo. ¿A cuánto asciende dicho beneficio?

2B- Representa gráficamente la función $y = -2x^2 + ax - b$ sabiendo que alcanza su máximo en el punto $(2, 2)$. Calcula la ecuación de la recta tangente en el punto máximo.

3B- Una fábrica de piezas para aviones está organizada en tres secciones. La sección A fabrica el 30% de las piezas, la sección B el 35%, mientras que el resto se fabrican en la sección C. La probabilidad de encontrar una pieza defectuosa es del 0.01, 0.015 y 0.009 según se considere la sección A, B o C, respectivamente.
a) Calcula la probabilidad de que una pieza elegida al azar salga defectuosa de dicha fábrica.
b) Si elegida una pieza al azar es defectuosa, ¿qué probabilidad hay de que sea de la sección B?

4B- Se elige al azar un número de 4 cifras distintas escrito con las cifras 7, 2, 3 y 8. Calcula la probabilidad de que dicho número sea mayor que 7500.

	Pruebas de acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos.

Opción A

1A- A una persona le tocan 10000 euros en la lotería de Navidad y le aconsejan que los invierta en dos tipos de acciones de la Bolsa, A y B. Las de tipo A tienen más riesgo pero producen un beneficio anual del 10% del capital invertido en ellas. Las de tipo B son más seguras, pero producen sólo un beneficio del 7% anual del capital invertido en ellas. Tras varias deliberaciones decide invertir como mucho 6000 euros en la compra de acciones de cada tipo. Además, decide invertir en acciones de tipo A al menos la misma cantidad que en acciones de tipo B. Utiliza técnicas de programación lineal para hallar la cantidad que debe invertir en cada tipo de acción para que el beneficio anual sea máximo. ¿Cuál es ese beneficio máximo?

2A- Sea la función $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}+1 & si \quad x<0\\ x^3 & si \quad 0\le x<2\\ 3x+2 & si \quad x\ge 2\end{cases}$

a) Estudia la continuidad y la derivabilidad de la función $f(x)$ en todos sus puntos.

b) Halla la ecuación de la recta tangente a la curva $y=f(x)$ en el punto $x=-1$.

c) Representa gráficamente la función $f(x)$.

3A- El 30% de los habitantes de una localidad son jubilados y el 20% son estudiantes, mientras que el resto ni están jubilados ni son estudiantes. El 80% de los jubilados, así como el 20% de los estudiantes y el 40% del resto de habitantes, son socios del club de fútbol local.

a) Elegido al azar un habitante de esa localidad, calcula la probabilidad de que sea socio del club de fútbol.

b) Elegido al azar un socio del club de fútbol, calcula la probabilidad de que sea jubilado.

4A- Calcula $P(A\cup B)$ sabiendo que $P(A)=0.4, P(B)=0.5$ y $P(B/A)=0.3$.

Opción B

1B- Dada la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 1 & t & 2 \end{pmatrix}$$

a) Determina los valores de *t* para los que existe la matriz inversa de *A*.
b) Calcula la matriz inversa para $t = 2$.

2B- El saldo de una cuenta bancaria en un periodo de 5 años viene dado por la función $f(t) = -12t^3 + 90t^2 - 144t + 84,\ 0 \le t \le 5$ siendo t el tiempo en años.
a) Calcula los saldos inicial y final.
b) ¿En qué momento el saldo de la cuenta es máximo? ¿Y cuándo es mínimo?
c) Analiza si en algún momento el saldo es negativo y determina todos los periodos donde se observa un crecimiento del saldo.

3B- Se sabe que el tiempo que una persona dedica a ver la televisión cada día sigue una distribución normal con media μ minutos y desviación típica $\sigma = 20$ minutos. Un estudio desea comprobar si el tiempo medio diario por persona viendo la televisión es de 3 horas. Para ello se entrevista a una muestra representativa de 225 televidentes, resultando un tiempo medio muestral de 188 minutos.
a) Plantea un test de hipótesis que permita decidir si el tiempo medio es de 3 horas con una confianza del 95%.
b) Proporciona un intervalo de confianza al 99% para el tiempo medio μ dedicado a ver la televisión.

4B- Tenemos dos llaves de un trastero, cada una en un llavero. Si elegimos una llave al azar de uno de los llaveros, ¿cuál es la probabilidad de que abra el trastero, sabiendo que uno de los llaveros tiene 5 llaves y el otro 7 llaves?

	Pruebas de acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2 y tablas**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos.

Opción A

1A - Se considera el sistema lineal de ecuaciones

$$\begin{cases} x-2y+z=0 \\ 3x+2y-2z=3 \\ 2x+2y+az=8 \end{cases}$$

a) Clasifica el sistema según sus posibles soluciones, para los distintos valores de a.
b) Resuelve el sistema para $a=4$.

2A- Un estudio realizado por una agencia especializada revela que el número de votantes censados en una comunidad autónoma española viene determinado, en millones de personas, por la función $f(t)=\dfrac{(t+10)^2+15}{(t+11)^2}$, donde t es el tiempo en años transcurridos desde el inicio del estudio, el 1 de enero de 1990.
a) Calcula el número mínimo de votantes censados. ¿En qué año se alcanza ese mínimo?
b) Calcula el número de votantes censados que tendrá dicha comunidad a muy largo plazo.

3A- Una panadería elabora magdalenas caseras cuyos pesos siguen una distribución normal con media 40 gramos y desviación típica 5 gramos.
a) Calcula el porcentaje de magdalenas que pesan más de 43 gramos.
b) Las magdalenas se empaquetan en bolsas de 20 magdalenas para su venta. El panadero considera aceptable una bolsa cuando su peso no supera los 820 gramos. ¿Cuál es la probabilidad de que una bolsa no sea aceptable?

4A- En una localidad llueve en 73 de los 365 días del año. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva más de 2 días en una semana cualquiera?

Opción B

1B- Un comercio dispone de 60 unidades de un producto A por el que obtiene un beneficio por cada unidad que vende de 250 €. También dispone de 70 unidades de otro producto B por el que obtiene un beneficio por unidad vendida de 300 €. El comercio puede vender como máximo 100 unidades de sus productos. Utilizando técnicas de programación lineal, determina las unidades de los productos A y B que el comercio debe vender para que su beneficio sea máximo y calcula dicho beneficio.

2B- Se considera la función $f(x) = x^2 + ax + b$.

a) Determina los valores de a y b sabiendo que la función $f(x)$ tiene un mínimo en $x = 2$ y que su gráfica pasa por el punto $(2,-2)$.

b) Para $a = -4$ y $b = 6$ calcula el valor de la función $f(x)$ en el punto $x = -1$ y represéntala gráficamente.

3B- El número de vuelos que llegan a un aeropuerto por la mañana es 120, por la tarde 150 y por la noche 30. El porcentaje de vuelos que se retrasan por la mañana es del 2%, por la tarde del 4% y por la noche de un 6%.

a) Calcula la probabilidad de que se retrase un vuelo con destino a este aeropuerto.

b) Si un vuelo llegó con retraso a este aeropuerto, ¿cuál es la probabilidad de que fuera un vuelo nocturno?

4B- La duración de una batería de móvil sigue una distribución normal de media 3 años y desviación típica 0.5 años. Calcula la probabilidad de que una batería dure entre 2 y 4 años.

	Pruebas de acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2 y tablas**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos.

Opción A

1A- Calcula todos los valores, si existen, de los parámetros reales a y b que hacen que $AX - XA = 0$, siendo $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ y $X = \begin{pmatrix} a & 2 \\ -3 & b \end{pmatrix}$.

2A- El propietario de un cine llena diariamente las 100 butacas de la sala, cobrando 4 euros por cada entrada. El dueño tiene la experiencia de que por cada euro que aumente el precio de la entrada acuden 10 espectadores menos.
a) Halla la expresión de la función de los ingresos diarios del cine dependiendo del aumento del precio de la entrada.
b) Determina el precio de la entrada para que los ingresos diarios del propietario sean máximos. ¿Cuántos espectadores acudirán al cine en ese momento? ¿Cuáles serán los ingresos diarios que obtendrá el propietario con ese precio?

3A- La temperatura corporal es una variable aleatoria que sigue una distribución normal de media 36.7 ºC y desviación típica 3.8 ºC. Se elige aleatoriamente una muestra de 100 personas.
a**)** Calcula la probabilidad de que la temperatura corporal media de la muestra sea menor que 36.9 ºC.
b) Calcula la probabilidad de que la temperatura corporal media de la muestra esté comprendida entre 36.5 ºC y 37.3 ºC.

4A- El 60% de los clientes de una panadería compran pan y el 30% no compran ni pan ni bollería. ¿Qué porcentaje de clientes compran bollería y no compran pan?

Opción B

1B- Un heladero artesano elabora dos tipos de helados A y B que vende cada día. Los helados tipo A llevan 1 gramo de nata y los helados tipo B llevan 2 gramos de chocolate. Se dispone de 200 gramos de nata, 400 gramos de chocolate y le da tiempo a elaborar como máximo 350 helados diariamente. Por cada helado tipo A obtiene un beneficio de 1.5 euros y por cada helado tipo B el beneficio es de 1 euro. Utilizando técnicas de programación lineal, determina las unidades de cada tipo de helado que debe elaborar diariamente para que su beneficio sea máximo y calcula dicho beneficio.

2B- Dada la función $f(x) = -x^3 + 1$.

a) Estudia su crecimiento y decrecimiento, y calcula sus puntos de inflexión.

b) Determina la ecuación de la recta tangente a $f(x)$ en $x = 1$.

c) Representa gráficamente la función $f(x)$.

3B- En el año 2014, el estudio *B2C-2014 sobre Comercio Electrónico* aseguraba que el 12.5% de los compradores *on-line* fueron nuevos compradores. El importe gastado *on-line* variaba según el tipo de comprador: el 26.8% de los nuevos compradores gastaban menos de 50 euros, mientras que sólo el 12% de los antiguos compradores gastaban menos de esa cantidad. Se elige un comprador *on-line* al azar.

a) Calcula la probabilidad de que gastara menos de 50 euros en las compras *on-line.*

b) Si el comprador *on-line* gastó menos de 50 euros, ¿cuál es la probabilidad de que fuera nuevo comprador?

4B- Calcula el valor de $P(B)$ sabiendo que los sucesos A y B son independientes y que $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$, $P(A) = \frac{1}{4}$.

	Pruebas de acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EXAMEN** **Nº Páginas: 2 y tablas**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos.

Opción A

1A- Para realizar una excursión, un IESO no puede utilizar más de 5 autobuses de 55 plazas cada uno, ni más de 9 microbuses de 33 plazas cada uno. El coste de cada autobús se eleva a 500 euros, mientras que el coste de cada microbús es de 300 euros. Además, han de viajar 3 profesores en cada autobús y 2 en cada microbús. Si como mucho hay 27 profesores que pueden participar en la excursión y el coste del transporte no puede exceder los 4300 euros, utiliza técnicas de programación lineal para determinar el número de autobuses y microbuses que han de contratarse para que el número de alumnos que puedan ir de excursión sea máximo. ¿A cuánto asciende ese número de alumnos ?

2A- Calcula los valores de los parámetros a, b y c en la función $y = ax^3 - bx + c$, sabiendo que pasa por el origen de coordenadas y que tiene un máximo relativo en el punto (1,4).

3A- La probabilidad de que un socio de un club vaya a la playa de vacaciones es 0.9. Si el club tiene 60 socios, calcula, utilizando la aproximación a la distribución normal apropiada, la probabilidad de que como mucho 50 socios vayan a la playa de vacaciones.

4A- El 30% de los despidos laborales de una empresa son improcedentes. Si la empresa despide a 3 trabajadores hoy, ¿cuál es la probabilidad de que hoy ningún despido sea improcedente?

Opción B

1B- Una editorial va a lanzar al mercado tres ediciones L_1 , L_2 *y* L_3 de libros de bolsillo. Los costes por unidad de cada libro son 7, 5 y 6 euros, respectivamente. El coste total de las tres ediciones asciende a 37500 €. Se sabe que el número de ejemplares de L_3 es igual a dos séptimos del número de ejemplares de L_2, y que, si al triple del número de ejemplares de L_1 se le suma el número de ejemplares de L_3, se obtiene el doble del número de ejemplares de L_2. Calcula cuántos libros de cada tipo se han editado.

2B- Consideramos la función $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} + b & x \leq -1 \\ 3x^2 + 4 & -1 < x < 1 \\ -x^3 + 8 & x \geq 1 \end{cases}$

a) Calcula el valor del parámetro b para que $f(x)$ sea continua.

b) Para $b = 6$, estudia la derivabilidad de $f(x)$ en $[0,2]$ y representa su gráfica.


3B- En una Escuela Politécnica se imparten tres grados: Grado en Arquitectura Técnica, Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería Mecánica. Un estudio, realizado sobre 60 alumnos de cada grado, revela que han terminado sus estudios en cuatro años el 5% de los alumnos de Ingeniería Mecánica, el 30% de los alumnos de Ingeniería Informática y el 50% de los alumnos de Arquitectura Técnica. Se elige un estudiante al azar:

a) Calcula la probabilidad de que haya terminado sus estudios en cuatro años.

b) Calcula la probabilidad de que sea alumno de Ingeniería Mecánica y haya terminado sus estudios en cuatro años.

4B- El 78 % de los universitarios estudia inglés, el 23 % estudia alemán y el 15% estudia ambos idiomas. Calcula la probabilidad de encontrar un universitario que no estudie ninguno de los dos idiomas.

Distribución Normal



	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9014
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9318
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9997	0,9997	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999

Distribución Binomial $p(X = r) = \binom{n}{r} p^r (1-p)^{n-r}$

n	p / r	0,01	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	1/3	0,35	0,40	0,45	0,49	0,50
2	0	0,9801	0,9025	0,8100	0,7225	0,6400	0,5625	0,4900	0,4444	0,4225	0,3600	0,3025	0,2601	0,2500
	1	0,0198	0,0950	0,1800	0,2550	0,3200	0,3750	0,4200	0,4444	0,4550	0,4800	0,4950	0,4998	0,5000
	2	0,0001	0,0025	0,0100	0,0225	0,0400	0,0625	0,0900	0,1111	0,1225	0,1600	0,2025	0,2401	0,2500
3	0	0,9703	0,8574	0,7290	0,6141	0,5120	0,4219	0,3430	0,2963	0,2746	0,2160	0,1664	0,1327	0,1250
	1	0,0294	0,1354	0,2430	0,3251	0,3840	0,4219	0,4410	0,4444	0,4436	0,4320	0,4084	0,3823	0,3750
	2	0,0003	0,0071	0,0270	0,0574	0,0960	0,1406	0,1890	0,2222	0,2389	0,2880	0,3341	0,3674	0,3750
	3	0,0000	0,0001	0,0010	0,0034	0,0080	0,0156	0,0270	0,0370	0,0429	0,0640	0,0911	0,1176	0,1250
4	0	0,9606	0,8145	0,6561	0,5220	0,4096	0,3164	0,2401	0,1975	0,1785	0,1296	0,0915	0,0677	0,0625
	1	0,0388	0,1715	0,2916	0,3685	0,4096	0,4219	0,4116	0,3951	0,3845	0,3456	0,2995	0,2600	0,2500
	2	0,0006	0,0135	0,0486	0,0975	0,1536	0,2109	0,2646	0,2963	0,3105	0,3456	0,3675	0,3747	0,3750
	3	0,0000	0,0005	0,0036	0,0115	0,0256	0,0469	0,0756	0,0988	0,1115	0,1536	0,2005	0,2400	0,2500
	4	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0016	0,0039	0,0081	0,0123	0,0150	0,0256	0,0410	0,0576	0,0625
5	0	0,9510	0,7738	0,5905	0,4437	0,3277	0,2373	0,1681	0,1317	0,1160	0,0778	0,0503	0,0345	0,0313
	1	0,0480	0,2036	0,3281	0,3915	0,4096	0,3955	0,3602	0,3292	0,3124	0,2592	0,2059	0,1657	0,1563
	2	0,0010	0,0214	0,0729	0,1382	0,2048	0,2637	0,3087	0,3292	0,3364	0,3456	0,3369	0,3185	0,3125
	3	0,0000	0,0011	0,0081	0,0244	0,0512	0,0879	0,1323	0,1646	0,1811	0,2304	0,2757	0,3060	0,3125
	4	0,0000	0,0000	0,0005	0,0022	0,0064	0,0146	0,0284	0,0412	0,0488	0,0768	0,1128	0,1470	0,1563
	5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0010	0,0024	0,0041	0,0053	0,0102	0,0185	0,0282	0,0313
6	0	0,9415	0,7351	0,5314	0,3771	0,2621	0,1780	0,1176	0,0878	0,0754	0,0467	0,0277	0,0176	0,0156
	1	0,0571	0,2321	0,3543	0,3993	0,3932	0,3560	0,3025	0,2634	0,2437	0,1866	0,1359	0,1014	0,0938
	2	0,0014	0,0305	0,0984	0,1762	0,2458	0,2966	0,3241	0,3292	0,3280	0,3110	0,2780	0,2436	0,2344
	3	0,0000	0,0021	0,0146	0,0415	0,0819	0,1318	0,1852	0,2195	0,2355	0,2765	0,3032	0,3121	0,3125
	4	0,0000	0,0001	0,0012	0,0055	0,0154	0,0330	0,0595	0,0823	0,0951	0,1382	0,1861	0,2249	0,2344
	5	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0015	0,0044	0,0102	0,0165	0,0205	0,0369	0,0609	0,0864	0,0938
	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0007	0,0014	0,0018	0,0041	0,0083	0,0138	0,0156
7	0	0,9321	0,6983	0,4783	0,3206	0,2097	0,1335	0,0824	0,0585	0,0490	0,0280	0,0152	0,0090	0,0078
	1	0,0659	0,2573	0,3720	0,3960	0,3670	0,3115	0,2471	0,2048	0,1848	0,1306	0,0872	0,0604	0,0547
	2	0,0020	0,0406	0,1240	0,2097	0,2753	0,3115	0,3177	0,3073	0,2985	0,2613	0,2140	0,1740	0,1641
	3	0,0000	0,0036	0,0230	0,0617	0,1147	0,1730	0,2269	0,2561	0,2679	0,2903	0,2918	0,2786	0,2734
	4	0,0000	0,0002	0,0026	0,0109	0,0287	0,0577	0,0972	0,1280	0,1442	0,1935	0,2388	0,2676	0,2734
	5	0,0000	0,0000	0,0002	0,0012	0,0043	0,0115	0,0250	0,0384	0,0466	0,0774	0,1172	0,1543	0,1641
	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0013	0,0036	0,0064	0,0084	0,0172	0,0320	0,0494	0,0547
	7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0005	0,0006	0,0016	0,0037	0,0068	0,0078
8	0	0,9227	0,6634	0,4305	0,2725	0,1678	0,1001	0,0576	0,0390	0,0319	0,0168	0,0084	0,0046	0,0039
	1	0,0746	0,2793	0,3826	0,3847	0,3355	0,2670	0,1977	0,1561	0,1373	0,0896	0,0548	0,0352	0,0313
	2	0,0026	0,0515	0,1488	0,2376	0,2936	0,3115	0,2965	0,2731	0,2587	0,2090	0,1569	0,1183	0,1094
	3	0,0001	0,0054	0,0331	0,0839	0,1468	0,2076	0,2541	0,2731	0,2786	0,2787	0,2568	0,2273	0,2188
	4	0,0000	0,0004	0,0046	0,0185	0,0459	0,0865	0,1361	0,1707	0,1875	0,2322	0,2627	0,2730	0,2734
	5	0,0000	0,0000	0,0004	0,0026	0,0092	0,0231	0,0467	0,0683	0,0808	0,1239	0,1719	0,2098	0,2188
	6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0011	0,0038	0,0100	0,0171	0,0217	0,0413	0,0703	0,1008	0,1094
	7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0012	0,0024	0,0033	0,0079	0,0164	0,0277	0,0313
	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0002	0,0007	0,0017	0,0033	0,0039
9	0	0,9135	0,6302	0,3874	0,2316	0,1342	0,0751	0,0404	0,0260	0,0207	0,0101	0,0046	0,0023	0,0020
	1	0,0830	0,2985	0,3874	0,3679	0,3020	0,2253	0,1556	0,1171	0,1004	0,0605	0,0339	0,0202	0,0176
	2	0,0034	0,0629	0,1722	0,2597	0,3020	0,3003	0,2668	0,2341	0,2162	0,1612	0,1110	0,0776	0,0703
	3	0,0001	0,0077	0,0446	0,1069	0,1762	0,2336	0,2668	0,2731	0,2716	0,2508	0,2119	0,1739	0,1641
	4	0,0000	0,0006	0,0074	0,0283	0,0661	0,1168	0,1715	0,2048	0,2194	0,2508	0,2600	0,2506	0,2461
	5	0,0000	0,0000	0,0008	0,0050	0,0165	0,0389	0,0735	0,1024	0,1181	0,1672	0,2128	0,2408	0,2461
	6	0,0000	0,0000	0,0001	0,0006	0,0028	0,0087	0,0210	0,0341	0,0424	0,0743	0,1160	0,1542	0,1641
	7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0012	0,0039	0,0073	0,0098	0,0212	0,0407	0,0635	0,0703
	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0009	0,0013	0,0035	0,0083	0,0153	0,0176
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0001	0,0003	0,0008	0,0016	0,0020
10	0	0,9044	0,5987	0,3487	0,1969	0,1074	0,0563	0,0282	0,0173	0,0135	0,0060	0,0025	0,0012	0,0010
	1	0,0914	0,3151	0,3874	0,3474	0,2684	0,1877	0,1211	0,0867	0,0725	0,0403	0,0207	0,0114	0,0098
	2	0,0042	0,0746	0,1937	0,2759	0,3020	0,2816	0,2335	0,1951	0,1757	0,1209	0,0763	0,0494	0,0439
	3	0,0001	0,0105	0,0574	0,1298	0,2013	0,2503	0,2668	0,2601	0,2522	0,2150	0,1665	0,1267	0,1172
	4	0,0000	0,0010	0,0112	0,0401	0,0881	0,1460	0,2001	0,2276	0,2377	0,2508	0,2384	0,2130	0,2051
	5	0,0000	0,0001	0,0015	0,0085	0,0264	0,0584	0,1029	0,1366	0,1536	0,2007	0,2340	0,2456	0,2461
	6	0,0000	0,0000	0,0001	0,0012	0,0055	0,0162	0,0368	0,0569	0,0689	0,1115	0,1596	0,1966	0,2051
	7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0008	0,0031	0,0090	0,0163	0,0212	0,0425	0,0746	0,1080	0,1172
	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0014	0,0030	0,0043	0,0106	0,0229	0,0389	0,0439
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0005	0,0016	0,0042	0,0083	0,0098
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0008	0,0010

	Pruebas de acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado Castilla y León	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES**	**EXAMEN** **Nº Páginas: 2 y tablas**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta de la 1 a la 3 se puntuará sobre un máximo de 3 puntos. La pregunta 4 se puntuará sobre un máximo de 1 punto. La calificación final se obtiene sumando las puntuaciones de las cuatro preguntas. Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos.

Opción A

1A-Se considera el sistema de ecuaciones lineales, dependiente del parámetro real a:

$$x + y - z = a$$
$$a\,x + 2y - z = 3a$$
$$2x + a\,y - z = 6$$

a) Clasifica el sistema según su número de soluciones para los distintos valores de a.
b) Resuelve el sistema para $a = 2$.

2A- En una tarjeta de visita rectangular y de 4500 mm^2 de superficie, la zona destinada a la escritura está delimitada por los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo. Si los márgenes superior e inferior son de 2.5 mm cada uno y los márgenes derecho e izquierdo son de 4.5 mm cada uno, determina las dimensiones de la tarjeta para que la superficie de la zona destinada a la escritura sea máxima.

3A- En el curso 2013-14 los resultados de las pruebas de acceso a las Universidades de Castilla y León de dos centros fueron los siguientes: en el primer centro aprobaron el 75% de los 128 alumnos presentados, mientras que en el segundo centro aprobaron el 50% de los 88 alumnos presentados.
a) Calcula la probabilidad de que, elegido un alumno al azar, haya aprobado las pruebas de acceso.
b) Calcula la probabilidad de que un alumno suspenso proceda del segundo centro.

4A- La nota de un estudiante en un examen de matemáticas sigue una distribución normal cuya desviación típica es $\sigma = 2.04$ puntos. La nota media de una muestra de 30 estudiantes es 5.5 puntos. Calcula un intervalo de confianza al 95% para la nota media de un estudiante en un examen de matemáticas.

Opción B

1B- Un barco pesquero captura marisco y pescado. La clasificación automatizada de sus capturas, que ha de realizarse como mucho en 2 horas, exige un tiempo de 2 segundos por cada kg de marisco capturado y de 3 segundos por cada kg de pescado capturado. Por razones de conservación, puede capturar como mucho 3000 kg entre marisco y pescado, pero necesita al menos capturar 500 kg de pescado para atender compromisos comerciales. El barco obtiene un beneficio de 3 euros por kg de marisco capturado y de 2 euros por kg de pescado capturado. Utiliza técnicas de programación lineal para calcular la cantidad de marisco y de pescado que el barco ha de capturar para maximizar su beneficio. ¿A cuánto asciende ese beneficio máximo?

2B- La función $f(x)$ dada por:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x + 8, & 0 < x \leq 3 \\ (18/x) + 5 & x > 3 \end{cases}$$

expresa el precio de venta (en euros) de una botella de vino en función del tiempo x (en años) que lleva en el mercado.

a) Representa gráficamente la función $f(x)$, estudiando su continuidad y derivabilidad.
b) Estudia en qué momento el precio alcanza su valor máximo, así como ese precio máximo.
c) Determina el precio de la botella a muy largo plazo.

3B- El volumen de madera (en m^3) que se obtiene de un chopo de diez años es una variable aleatoria con distribución normal con media μ =0.443 y desviación típica σ = 0.068.
a) Calcula la probabilidad de que de un chopo de diez años se obtengan más de 0.5 m^3 de madera.
b) De una chopera con 60 chopos de diez años, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de 26 m^3 de madera?

4B- La clase de los hermanos Laura y Pepe consta de 30 estudiantes. La clase participa en un sorteo de dos entradas para un evento deportivo, de manera que no se permite que un mismo estudiante consiga las dos entradas. Halla la probabilidad de que ambos hermanos consigan las dos entradas sorteadas.